

II. 급수(Series)

1 급수의 수렴판정법

1. 급수(series)

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 정의

$$\sum_{k=1}^n a_k = s_n \text{으로 정의(부분합수열)할 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \text{으로 정의한다.}$$

(2) 급수의 수렴과 발산

① 급수의 수렴(convergence)

- 급수가 수렴할 경우 부분합수열의 극한은 수렴하며, 수열의 무한함은 특정 실수가 된다.
- 급수의 수렴값을 표현한 것을 닫힌 표현(closed form)이라고 한다.

② 급수의 발산(divergence)

- 급수가 발산할 경우 부분합 수열은 발산한다.

③ 수렴판정법 : 급수의 수렴/발산 여부는 여러 수렴판정법을 이용해 판단할 수 있다.

예제

양자역학의 조화 진동자로 묘사되는 2원자 분자의 partition function은 다음과 같다.

$$q(T) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu / k_B T}$$

예제

다음 급수의 closed form을 구하라.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

2. 수렴판정법(Test for convergence)

(1) 일반항판정법(nth term test)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

(2) p -급수 판정법(p-series test)

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 의 수렴 조건은 $p > 1$ 인 경우이다.

(3) 적분판정법(integral test)

수열 a_n 의 실수체 확장 $f(x)$ 가 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 일 때

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴성은 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 의 수렴성과 같다.

(4) 극한비교판정법(limit comparison test)

두 양항수열 a_n, b_n 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 이 유한수로 수렴하면

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴/발산을 함께한다.

(5) 비판정법(ratio test)

수열 a_n 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 이라고 할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은

$0 < L < 1$ 이면 수렴, $L = 1$ 이면 추가 판정 필요, $L > 1$ 이면 발산한다.

(6) 근판정법(root test)

수열 a_n 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ 이라고 할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은

$0 < L < 1$ 이면 수렴, $L = 1$ 이면 추가 판정 필요, $L > 1$ 이면 발산한다.

(7) 교대급수판정법(alternating series test)

수열 $a_n = (-1)^n b_n$ 일 때, 수열 b_n 이

① $b_n \geq b_{n+1}$ ② $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ③ $b_n > 0$ 을 만족하면

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

예제

다음 급수의 수렴/발산을 판정하라.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2-1}{n^3+n+2}$ (3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n-1)}{n^2}$ (4) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n!}$

2 멱급수(Power Series)**1. 멱급수(Power series)**

1) 수렴구간에서의 연산

다음 형태의 급수를 멱급수(Power series)라고 한다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

(1) 멱급수에 비판정법을 적용하면 다음을 얻을 수 있다(아벨의 정리).

만약 $-R < x < R$ 에서 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 이 수렴하면,

① 구간 $(-R, R)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 연속이다.

② 구간 $(-R, R)$ 에서 적분 $\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}$ 은 수렴한다.

③ 구간 $(-R, R)$ 에서 미분 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 은 수렴한다.

▷ 수렴구간 내에서는 항별 미분과 항별 적분이 모두 가능하다(증명 생략).

예제 다음 급수의 닫힌 표현을 유도하시오.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

2) 매클로린 급수(Macluarin series)

(1) 가정 : 임의의 함수 $f(x)$ 가 멱급수로 표현될 수 있다고 가정한다. 즉,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$$

(2) 일반항 구하기 : 양변을 지속적으로 미분하여 $x=0$ 을 대입하면 $n!a_n = f^{(n)}(0)$ 의 해를 얻을 수 있다. 따라서

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

예제 $\cos x$ 와 $\sin x$ 의 매클로린급수로부터 오일러 항등식 $e^{ix} = \cos x + i\sin x$ 를 유도하시오.

2. 급수의 활용

1) 강전해질 용액으로의 응용

(1) 강전해질 용액의 특성

① 강전해질 용액에서 이온은 용매화에 의해 분리된다. 따라서 강전해질 용액의 퍼텐셜은 Coulomb 상호작용에 큰 영향을 받는다.

→ 이온의 평균 반지름과 용액의 특성에 따른 효과를 모두 고려하고자 $x = \kappa a$ 라는 표현을 도입한다.

(a 는 양이온과 음이온의 평균 반지름, κ 는 용액의 특성을 반영하는 인자)

② $\kappa \rightarrow 0$ 인 경우 용액의 농도가 0인 상황(Coulomb 상호작용을 무시할 수 있는 계)임을 의미한다.

예제

(염화 소듐의 수용액과 같은) 강전해질 용액에 대한 통계역학의 한 이론에 의하면 그 용액의 열역학 에너지는 다음과 같다.

$$U(x, a) = - \frac{x^2 + x - x(1+2x)^{1/2}}{4\pi\beta a^3}$$

여기서 $\beta = 1/k_B T$ 일 때, $x \rightarrow 0$ 인 경우, 즉 묽은 용액에서는 U 가 x^3 에 의존함을 보이시오.

예제

(염화 소듐의 수용액과 같은) 강전해질 용액에 대한 물리화학의 한 이론에 따르면 그 용액의 삼투압은 다음과 같다.

$$\sigma(x) = \frac{3}{x^3} \left(1 + x - \frac{1}{1+x} - 2 \ln(1+x) \right)$$

이때 $x \rightarrow 0$ 일 때, 즉 묽은 용액에서 $\sigma(x)$ 는 선형적으로 표현됨을 보이시오.

2) Dulong-Petit 극한


① Dulong-Petit 극한, Dulong-Petit 법칙

: 균등분배정리(equipartition theorem)에서 온도가 높아질수록 입자는 회전운동에 대한 기여와 아주 높은 온도에서는 진동운동에 대한 기여를 포함한다. 이때 매우 높은 온도($T \rightarrow \infty$)에서는 $c_V \approx 3R$ 이다. (단원자 기체의 경우)

② 아인슈타인은 c_V 를 다음과 같이 계산하였다.

$$c_V = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_E/T}}{(1 - e^{-\Theta_E/T})^2}$$

(Θ_E : 아인슈타인 온도)



예제

결정의 정적 몰열용량에 대한 아인슈타인의 이론은 다음과 같이 묘사된다:

$$c_V = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_E/T}}{(1 - e^{-\Theta_E/T})^2}$$

이때 R 은 기체 상수이고 Θ_E 는 아인슈타인의 상수로 결정의 특성을 반영한다. 높은 온도에서 c_V 의 값을 구하고 그 물리적 의미를 설명하시오.

예제

결정의 정적 몰열용량에 대한 디바이의 이론은 다음과 같다.

$$c_V = 9R \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

이때 R 은 이상 기체 상수, T 는 절대 온도이고 Θ_D 는 디바이 온도로 결정의 특성을 반영한다.

- (1) 높은 온도에서는 Dulong-Petit 법칙에 해당하는 $c_V \rightarrow 3R$ 임을 보이시오.
- (2) 낮은 온도에서는 c_V 는 T^3 에 비례함을 보이시오.

3) 양자역학에서의 이용

예제

양자역학의 조화 진동자 에너지는 $\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu$ 로 주어진다. 여기서 h 는 플랑크 상수, ν 는 진동자의 고유 진동수이다. 그러면 조화 진동자의 평균 에너지는 다음 식으로 주어진다.

$$\epsilon_{vib} = (1 - e^{-h\nu/k_B T}) \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n e^{-nh\nu/k_B T}$$

이것은 다음과 같은 형태의 닫힌 수식이 됨을 보여라.

$$\epsilon_{vib} = \frac{h\nu}{2} + \frac{h\nu e^{-h\nu/k_B T}}{1 - e^{-h\nu/k_B T}}$$