

请仔细阅读案例介绍，并观察图片，回答以下问题。（10分）

一、案例：某植物园的月季园最近发生了严重病害，具体症状为：月季的叶片正面出现褪色斑，叶背面布满锈色的物质。当植物园长追究责任时，负责管理月季园的师傅声称：我每天都认真巡查，谁知道从哪里钻出来的。

1)请根据描述诊断，月季发生了什么病？（2分）

2)请根据描述诊断，分析养护师傅的回答是否合理？（2分）

3)请根据“预防为主、综合防治”的植保方针，制定一套综合防治方案，来对该病害进行防治。（6分）



月季发生了锈病；

师傅的回答不合理；

综合防治方案：

- 1、园林技术措施（1分）：结合冬剪，剪除枯枝落叶，集中烧毁，减少侵染源（1分）
- 2、化学防治（1分）：冬季喷施2—3波美度的石硫合剂，消灭越冬菌体。生长季节喷施25%的三唑铜、苯菌灵等可湿性粉剂防治。要注意药剂的交替使用，以免病菌产生抗药性（1分）。
- 3、加强栽培管理，提高园林植物的抗病性（1分）。
- 4、生物防治（1分）：用生物农药抗霉菌素120等防治。

二、

案例：植物园里有几株无刺枸骨，近期有工作人员反映枸骨的树叶上面有很多黑黑的脏东西，影响枸骨的观赏性。当询问起养护人员时，养护人员答复说是黑粉病，只要喷一些杀菌剂就可以将该病控制住。结合图片信息分析：

- 1)请根据描述及图片诊断，无刺枸骨发生了什么病虫害？（2分）
- 2)请根据描述诊断，分析养护师傅的回答是否合理？（2分）
- 3)请根据“预防为主、综合治理”的植保方针，制定一套综合防治方案，来对该病害进行防治。（6分）



红蜡蚧危害（1分）；

师傅回答不合理（2分）；

综合防治方案：

- 1、人工防治：少量发生时，可用软刷、毛笔轻轻清除，或用布团蘸煤油抹杀。（1分）
- 2、生物防治：蚧壳虫天敌多种多样，种类十分丰富，如澳洲瓢虫可捕食吹绵蚧；大红瓢虫和红缘黑瓢虫可捕食草履蚧；红点唇瓢虫可捕食日本龟蜡蚧、桑白蚧、长白蚧等多种蚧虫；异色瓢虫、草蛉等可捕食日本松干蚧。寄生盾蚧的小蜂有蚜小蜂、跳小蜂、缨小蜂等。（2分）
- 3、园林技术措施：结合冬季修剪，人工剪除附有蚧壳虫的枝条。或利用其特殊习性，采用绑草把等措施防治，如草履蚧。（1分）
- 4、化学防治：冬季和早春植物发芽前，40-50 倍的机油乳剂，消灭越冬代若虫和雌虫。初孵若虫期进行喷药防治，40%速扑杀乳油，40%速蚧杀乳油 1500~2000 倍液。要注意药剂的交替使用，以免昆虫产生抗药性。（2分）
- 5、加强植物检疫，禁止有虫苗木输出或输入。（1分）

三、

案例：5月的雨后，校园里面的垂枝梅嫩梢突然出现卷曲的现象。当凑近了观察发现，嫩梢的叶片上面密密麻麻布满了2mm左右的黑色小虫子，还时不时地有蚂蚁在爬来爬去，叶片上还有一些黏黏腻腻的液体。

1)请根据描述诊断，垂枝梅发生了什么病虫害？（2分）

2)请根据“预防为主、综合治理”的植保方针，制定一套综合防治方案，来对该病害进行防治。（8分）



蚜虫（2分）；

综合防治方案：

- 1、生物防治：保护天敌瓢虫、草蛉、螳螂，抑制蚜虫的蔓延。（2分）
- 2、园林技术措施：结合观赏措施剪除有卵的枝叶或刮除有卵的枝干上的越冬卵。（2分）
- 3、化学防治：在寄主植物休眠期，喷洒 3-5°Be 石硫合剂。在发生期喷洒 50%灭蚜松乳油 1000-1500 倍液或 50%抗蚜威可湿性粉剂 1000-1500 倍液，或者 2.5%溴氰菊酯乳油 3000-5000 倍液，或者 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000-2500 倍液，或者 40%氧化乐果乳油 1000-1500 倍液。要注意药剂的交替使用，以免昆虫产生抗药性。（2分）
- 4、物理防治：利用色板诱杀有翅蚜。（1分）
- 5、加强植物检疫，禁止有虫苗木输出或输入。（1分）

四、

案例：某公园种了许多香樟树，近期养护人员发现，多棵香樟树新梢叶片粘连在一起，结成鸟巢状，地面上会有一些类似虫粪的东西掉落。把鸟巢状的新梢剪下后剥开，里面很多像虫粪的东西，还多条毛毛虫。

1)请根据描述诊断，香樟树发生了什么病虫害？（2分）

2)请根据“预防为主、综合治理”的植保方针，制定一套综合防治方案，来对该病害进行防治。（8分）



樟巢螟（2分）；

综合防治方案：

1、园林技术措施：人工摘巢，烧毁虫苞。（1分）

2、化学防治：低龄幼虫期防治，20%氰戊菊酯，1500倍液；40%啉虫毒（必治）1500-2000倍液，针对卷叶危害特点，需重点喷淋害虫危害部位，才能保证药效。要注意药剂的交替使用，以免昆虫产生抗药性。（2分）

3、生物防治：在幼虫初孵期用生物农药BT可湿性粉剂800倍液，或用0.3%高渗阿维菌素乳油1500—2000倍液喷雾。（2分）

4、物理防治：成虫羽化期夜间悬挂黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫。（2分）

5、加强植物检疫，禁止有虫苗木输出或输入。（1分）

五、

案例：某地沿江大道上种植了许多杜鹃，5月份发现杜鹃新叶上出现一些小小的白色斑点，养护人员说白色小斑点是因为象甲啃食叶片引起的，需要通过喷洒一些菊酯类的化学药剂来防治。当把叶片翻过来后，叶片背面有很多黑色小点，主要集中在叶片主脉上。

1)请根据描述诊断，杜鹃发生了什么病虫害？（2分）

2)请根据描述诊断，分析养护师傅的回答是否合理？（2分）

3)请根据“预防为主、综合治理”的植保方针，制定一套综合防治方案，来对该病害进行防治。（6分）、



杜鹃网蝽（2分）；

师傅的回答不合理（2分）；

综合防治方案：

1、生物防治：保护天敌蜘蛛、蚂蚁、草蛉、螳螂。（1分）

2、园林技术措施：及时清除落叶和杂草，注意通风透光，创造不利于该虫的生活条件。9月树干束草诱集梨网蝽成虫，清园时销毁（1分）

3、化学防治：发生严重时可用10%吡虫啉可湿性粉剂2000~3000倍液防治。1.8%阿维菌素乳油4000倍液或2.5%敌杀死2000倍液或2.5%溴氰菊酯5000倍液叶面喷施。要注意药剂的交替使用，以免昆虫产生抗药性。（2分）

4、物理防治：在成虫期可用黄板诱杀；及时铲除杂草，控制种群密度。（1分）

5、加强植物检疫，禁止有虫苗木输出或输入。（1分）