

一、单选题

1. 下列保水性最好的介质是 ()。A
A. 泥炭 B. 珍珠岩 C. 陶粒 D. 树皮
2. 下列最适合做排水层的是 ()。A
A. 陶粒 B. 泥炭 C. 珍珠岩 D. 蛭石
3. 下列最适合大部分植物生长的土壤是 ()。D
A. 沙土 B. 黏土 C. 黄泥土 D. 壤土
4. 一般用作铺面石的是 ()。C
A. 珍珠岩 B. 河沙 C. 陶粒 D. 蛭石
5. 当发现基质 PH 值过酸时 ($\text{PH} < 5.3$), 用 () 调节。A
A. 石灰 B. 硫磺粉 C. 碳酸钙 D. 硫酸
6. 当发现基质 PH 值过碱时 ($\text{PH} > 7.5$) 用 () 调节。B
A. 石灰 B. 硫磺粉 C. 碳酸钙 D. 硫酸
7. 大部分草花适宜的 PH 值范围是 ()。B
A. 5.2-7.8 B. 5.5-6.5 C. 6-8 D. 6.2-7.2
8. 大部分草花适宜的 EC 值范围是 ()。C
A. 0.7-1.3 B. 1.5-2.5 C. 1.0-1.8 D. 6.2-7.2
9. 目前温室花卉的生产上使用率最高的基质是 ()。D
A. 蛭石 B. 珍珠岩 C. 椰糠 D. 泥炭
10. 我国土壤重金属污染物主要以无机元素为主, 同时存在土壤点位超标的现象, () 严重的超标, 在最高的位置。A
A. 镉元素 B. 铬元素 C. 锌元素 D. 镍元素
11. 工程治理技术在治理土壤重金属污染中被广泛应用, 其中, 将污染土壤部分或全部换去, 换入非污染土壤的方法是 ()。C
A. 客土法 B. 深耕翻土法 C. 换土法 D. 去表土法
12. 工程治理技术在治理土壤重金属污染中被广泛应用, 其中, 在污染土壤表层加入非污染土壤, 或将非污染土壤与污染土壤混匀, 使得重金属浓度降低到临界危害浓度以下, 从而达到减轻危害目的的方法是 ()。A
A. 客土法 B. 深耕翻土法 C. 换土法 D. 去表土法
13. 工程治理技术在治理土壤重金属污染中被广泛应用, 其中, 根据重金属污染表层土的特性, 耕作活化下层土壤的方法是 ()。D
A. 客土法 B. 深耕翻土法 C. 换土法 D. 去表土法
14. 花卉园艺上的温室及保护地主要的作用在 () 方面应用。C
A. 花卉的引种、生产和科研 B. 花卉栽培中的升温

- C. 花卉的引种、驯化和科普、教学研究 D. 花卉的切花周年生产
15. 土壤的基质 PH 值的测定常用仪器是 ()。A
A. PH 计 B. EC 计 C. PH 试纸 D. 以上都可以
16. 土壤的 EC 值的测定常用仪器是 ()。B
A. PH 计 B. EC 计 C. PH 试纸 D. 以上都可以
17. 下列不适合播种草本花卉的穴盘是 ()。D
A. 128 穴 B. 200 穴 C. 400 穴 D. 50 穴
18. 山地水土保持工程应实施 () 原则。A
A. 小流域治理 B. 因地制宜 C. 植被护坡 D. 围山转
19. 山地建园不提倡 ()。C
A. 植被护坡 B. 等高撩壕 C. 围山转 D. 鱼鳞坑
20. 平畦的特点 ()。C
A. 土地利用率高 B. 保水性强 C. 土壤蒸发量大 D. 用工少
21. 不能用做覆盖材料的是 ()。D
A. 秸秆 B. 沙 C. 普通地膜 D. 细土
22. 以下哪项不属于土壤改良包括的范围 ()。A
A. 不同土壤类型施肥标准的确定 B. 不同土壤类型改良
C. 土壤熟化 D. 土壤酸碱度的调节
23. 在大、中比例尺地形图上, 为了便于读图, 将等高线分为首曲线、计曲线、间曲线、助曲线。其中, 按相应比例尺规定的等高距测绘的等高线, 图上用细线表示的为 ()。A
A. 首曲线 B. 计曲线 C. 间曲线 D. 助曲线
24. 在大、中比例尺地形图上, 为了便于读图, 将等高线分为首曲线、计曲线、间曲线、助曲线。其中, 为了方便参看等高线的高程, 规定从零米算起, 每隔 4 条基本等高线加粗实线的为 ()。B
A. 首曲线 B. 计曲线 C. 间曲线 D. 助曲线
25. 在大、中比例尺地形图上, 为了便于读图, 将等高线分为首曲线、计曲线、间曲线、助曲线。其中, 按等高距的 1/2 测绘的等高线, 用虚线表示, 补充显示局部形态的为 ()。C
A. 首曲线 B. 计曲线 C. 间曲线 D. 助曲线
26. 在大、中比例尺地形图上, 为了便于读图, 将等高线分为首曲线、计曲线、间曲线、助曲线。其中, 按等高距的 1/4 测绘的等高线, 用虚线表示, 补充局部形态的为 ()。D
A. 首曲线 B. 计曲线 C. 间曲线 D. 助曲线

27. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。2-20mm 干砾石土壤安息角为 (), 2-20mm 潮砾石土壤安息角为 (), 2-20mm 湿砾石土壤安息角为 ()。D
- A. 40° , 45° , 40° B. 35° , 40° , 35°
C. 40° , 35° , 40° D. 40° , 40° , 35°
28. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。1-2mm 干粗砂土壤安息角为 (), 1-2mm 潮粗砂土壤安息角为 (), 1-2mm 湿粗砂土壤安息角为 ()。C
- A. 25° , 45° , 25° C. 30° , 32° , 27°
B. 40° , 35° , 30° D. 40° , 40° , 25°
29. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。0.5-1mm 干中砂土壤安息角为 (), 0.5-1mm 潮中砂土壤安息角为 (), 0.5-1mm 湿中砂土壤安息角为 ()。A
- A. 28° , 35° , 25° C. 40° , 32° , 27°
B. 40° , 35° , 30° D. 30° , 40° , 25°
30. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。0.05-0.5mm 干细砂土壤安息角为 (), 0.05-0.5mm 潮细砂土壤安息角为 (), 0.05-0.5mm 湿细砂土壤安息角为 ()。B
- A. 45° , 45° , 25° C. 30° , 32° , 27°
B. 25° , 30° , 20° D. 30° , 40° , 25°
31. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。 $<0.001-0.005\text{mm}$ 干黏土土壤安息角为 (), $<0.001-0.005\text{mm}$ 潮黏土土壤安息角为 (), $<0.001-0.005\text{mm}$ 湿黏土土壤安息角为 ()。D
- A. 45° , 45° , 35° C. 30° , 32° , 27°
B. 30° , 45° , 30° D. 45° , 35° , 15°
32. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。干壤土安息角为 (), 潮壤土安息角为 (), 湿壤土安息角为 ()。C
- A. 38° , 35° , 25° C. 50° , 40° , 30°
B. 35° , 30° , 20° D. 45° , 35° , 15°
33. 在工程设计时,为了使工程稳定,就必须有意识地创造合理的边坡,使之小于或等于自然安息角。干腐殖土土壤安息角为 (), 潮腐殖土土壤安息角为 (), 湿腐殖土土壤安息角为 ()。C
- A. 58° , 35° , 25° C. 40° , 35° , 25°
B. 45° , 35° , 25° D. 35° , 35° , 15°

34. 为施工安全起见,垂直挖土超过一定深度应放坡,一般规定中等密度土垂直挖土深度的极限值是()。C
A. 1.0m B. 1.20m C. 1.25m D. 1.50m
35. 为施工安全起见,垂直挖土超过一定深度应放坡,一般规定坚硬土垂直挖土深度的极限值是()。D
A. 1.0m B. 1.50m C. 1.80m D. 2.00m
36. 绿化栽植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施。根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)规定,小灌木、宿根花卉及小藤本栽植土壤有效土层厚度应大于()cm。C
A. 20cm B. 30cm C. 40cm D. 50cm
37. 绿化栽植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施。根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)规定,棕榈类植物栽植土壤有效土层厚度应大于()cm。C
A. 70 B. 80 C. 90 D. 100
38. 绿化栽植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施。根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)规定,草坪栽植土壤有效土层厚度应大于()cm。C
A. 20cm B. 25cm C. 30cm D. 35cm
39. 根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)规定,栽植土表层不得有明显低洼和积水处,花坛、花镜栽植地()cm深的表土层必须疏松。C
A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
40. 挖掘种植穴的时候,种植深度与苗木根系幅度、主根长度一致,通常为30-50cm,种植穴的宽度要求为()。A
A. 40~50cm B. 20~60cm C. 10~30cm D. 50~70cm
41. 行道树树池大小对于种植效果起到关键作用,通常方形树池的规格是(),单位:m。D
A. 1.0*0.8*0.6 B. 1.2*1.0*0.8
A. 一顺一丁 B. 三顺一丁 C. 1.2*1.2*0.6 D. 1.2*1.2*0.8
42. 土壤过酸或过碱时,应该采取哪些措施来调整土壤的酸碱度()。B
A. 增施有机肥 B. 施用碱性或酸性肥料 C. 增加灌溉次数 D. 减少田间积水
43. 球根花卉的花芽分化一般属于()。A
A. 夏秋分化型 B. 冬春分化型 C. 多次分化型 D. 当年一次分化型
46. 在当年枝的新梢上或花茎顶端形成花芽,当年夏秋开花,属于()。D

- A. 夏秋分化型 B. 冬春分化型 C. 多次分化型 D. 当年一次分化型
47. 植物的根、茎、叶的生长称为 ()。D
- A. 生殖生长 B. 孢子生长 C. 无性生长 D. 营养生长
48. 温度在宿根花卉生长与开花的控制方面 很重要，如低温处理的作用有 ()。D
- A. 花芽的形成 B. 有助于培养良好的株型 C. 促成生长 D. A 和 B
49. 对某种花卉生长发育最快和最适宜的温度称为 ()。A
- A. 最适温 B. 最低温 C. 最高温 D. 较高温
50. 在栽培过程中，能起到降温作用的措施有 ()。A
- A. 灌溉 B. 覆盖 C. 修剪 D. 施肥
51. 在一定的光强范围内，植物的光合强度随光照度的上升而增加，当光照度上升到某一数值之后，光合强度不再继续提高时的光照度值称为 ()。B
- A. 光补偿点 B. 光饱和点 C. 光照度 D. 光强度
52. 植物的光合强度和呼吸强度达到相等时的光照度值称为 ()。A
- A. 光补偿点 B. 光饱和点 C. 光照度 D. 光强度
53. 以下植物光饱和点最低的是 ()。D
- A. 月季 B. 绣球 C. 铁线莲 D. 绿萝
54. 对多数草本花卉而言，种子经过充分干燥，储藏时其相对湿度维持在 () 为宜。
- A
- A. 30%-60% B. 20%-50% C. 10%-30% D. 40%-80%
55. 多数花卉种子在干燥密封的条件下，储藏温度维持在 () 为宜。B
- A. 10℃-20℃ B. 1℃-5℃ C. 15℃-25℃ D. 2℃-30℃
56. 最好的扦插枝条为 ()。A
- A. 健壮充实的枝条 B. 阴生枝 C. 老枝 D. 病枝
57. 除了多肉植物，剪穗过程中最重要的是 ()。B
- A. 消毒 B. 保湿 C. 修剪 D. 低温
58. 吊盆绿萝扦插过程中，() 最重要。D
- A. 见光 B. 保肥 C. 保温 D. 保湿
59. 绿萝扦插生根对水分的需求是 ()。A
- A. 高空气湿度低介质水分 B. 高空气湿度高介质水分
- C. 低空气湿度低介质水分 D. 低空气湿度低介质水分
60. 绿萝扦插苗生根最佳的介质温度 ()。B
- A. 低于 18℃ B. 18-25℃ C. 高于 25℃ D. 18-30℃
61. 将根际或地下茎发生的萌蘖切下栽植，形成独立的植株的繁殖方法称为 ()。D
- A. 根茎繁殖 B. 走茎繁殖 C. 吸芽繁殖 D. 分株繁殖

62. 采取某些植物根际或地上茎叶腋间自然发生的短缩、肥厚呈莲座状的短枝用于繁殖的方法称为（ ）。C

A. 根茎繁殖 B. 走茎繁殖 C. 吸芽繁殖 D. 分株繁殖

63. 采取地下肥大呈粗而长的根状用于繁殖的方法称为（ ）。A

A. 根茎繁殖 B. 走茎繁殖 C. 吸芽繁殖 D. 分株繁殖

64. 蒸汽消毒基质时，基质含水量在（ ）比较适宜。C

A. 10%-20% B. 25%-35% C. 35%-45% D. 45%-55%

65. 蒸汽消毒基质时，一般保持温度（ ）效果较好。C

A. 90℃-100℃ B. 80℃-90℃ C. 70℃-90℃ D. 50℃-70℃

66. 太阳能消毒基质时，基质含水量在（ ）比较适宜。D

A. 30% B. 50% C. 70% D. 80%

67. 下列透气性最好的是（ ）。B

A. 塑料盆 B. 陶盆 C. 瓷盆 D. 紫砂盆。

68. 针对已经充分生长的植株，由于多年生长，需进行修根、换土重新种植，但换土不换盆，称之为（ ）。B

A. 换盆 B. 翻盆 C. 上盆 D. 转盆

69. 地下茎极度短缩成盘状，叶变态成肉质鳞叶的是（ ）。B

A 块茎类球根 B 鳞茎类球根 C 块根类球根 D 球茎类球根

70. 具有“佛焰花序”的是下列（ ）科植物。C

A 百合科 B 凤梨科 C 天南星科 D 菊科

71. 被称为“室内观叶植物第一大科”的是（ ）。C

A 百合科 B 凤梨科 C 天南星科 D 菊科

72. 以下不属于天南星科的观叶植物是（ ）。B

A 绿萝 B 常春藤 C 广东万年青 D 花叶芋

73. 以下不属于藤蔓类观叶植物的是（ ）。C

A 千叶兰 B 绿萝 C 紫金牛 D 紫叶鸭跖草

74. 球根花卉的花芽分化都在（ ）完成。B

A 春 B 夏 C 秋 D 冬

75. 不耐寒的观叶植物一般（ ）时候进行换盆。A

A 开春前 B 春季 C 秋季 D 冬季

76. 对一些花叶品种的观叶植物出现返祖现象时，应该及时（ ）。A

A. 去异 B. 摘心 C. 换盆 D. 整形

77. 水仙花芽分化在（ ）季节。B

A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬

78. 下列哪种水仙花球最好 ()。A
A. 20 庄 B. 30 庄 C. 40 庄 D. 50 庄
79. 雕刻水养水仙最好在 ()。B
A. 秋季 B. 冬季 C. 夏季 D. 清明节后
80. 中国水仙的主要品种有 ()，水养水仙是目前国内最常见的方式。C
A. 11 类，即“金盏银台”、“玉玲珑”等
B. 11 类，即“喇叭水仙”、“大副冠水仙”等
C. 2 类，即“金盏银台”、“玉玲珑”等
D. 2 类，即“重瓣水仙”、“多花水仙”等
81. 以下花材适合种在盆器的前面或四周的是 ()。B
A. 百合 B. 千叶兰 C. 红掌 D. 朱蕉
82. 以下花材适合做背景的是 ()。D
A. 百合 B. 千叶兰 C. 红掌 D. 朱蕉
83. 月季的换盆最适宜在 ()。D
A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季
84. 月季裸根苗的种植最好在 ()。D
A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季
85. 月季盆栽用土偏 () 性。A
A. 酸 B. 碱 C. 中 D. 都可以
86. 郁金香种植如果需要元旦、春节上市，需要购买 () 种球。A
A. 5℃处理球 B. 9℃处理球 C. 自然球 D. 都可以
87. 郁金香自然球的自然花期一般在 ()。B
A. 1-2 月份 B. 3-4 月份 C. 5-6 月份 D. 7-8 月份
88. 目前市场上狭义的大花绣球一般指 ()。C
A. 圆锥绣球 B. 木绣球 C. 八仙花 D. 栎叶绣球
89. 大花绣球对光照的适应性表现为 ()。B
A. 充足光照 B. 半阴 C. 都可以 D. 高光环境
90. 当基质 PH 值在 () 范围时，一般花开蓝色。A
A. 5-5.5 B. 5.5-6.5 C. 5-6 D. 5-7
91. 当基质 PH 值在 () 范围时，一般花开粉、红色。B
A. 5-5.5 B. 5.5-6.5 C. 6-6.5 D. 5-7
92. 以下种植前需要剥皮的是 ()。C
A. 风信子 B. 番红花 C. 郁金香 D. 洋水仙
93. 刻芽时间最好在 ()。A

A. 萌芽前后 B. 冬季 C. 夏季 D. 早秋

94. 除兔眼型以外，蓝莓适宜的土壤 PH 值为（ ）。A

A. 4.5-5.0 B. 5.0-6.0 C. 6.0-7.0 D. 6.5-7.5

95. 栽培过程中，为保持土壤酸性，需要每年秋季向土壤里添加（ ）。D

A. 缓释肥 B. 腐殖质 C. 硫酸铝 D. 硫磺粉

96. 蓝莓开花期在（ ）。A

A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬

97. 风信子是（ ）休眠。A

A. 夏季 B. 冬季 C. 春季 D. 秋季

98. 蓝莓授粉主要依托（ ）。A

A. 蜜蜂昆虫 B. 风 C. 人工 D. 其他

99. 最适宜家庭栽培的蓝莓类型是（ ）。A

A. 高丛蓝莓 B. 矮丛蓝莓 C. 兔眼蓝莓 D. 都可以

100. 三角梅是（ ）科植物。A

A. 紫茉莉科 B. 紫葳科 C. 蔷薇科 D. 木犀科

101. 三角梅对温度的要求是（ ）。C

A. 0-10℃ B. 5-15℃ C. 15-30℃ D. 20-35℃

102. 三角梅花芽分化时间一般在（ ）。B

A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬

103. 三角梅花芽分化期对水分的需求是（ ）。B

A. 充足水分 B. 控水 C. 大水浇灌 D. 干旱

104. .三角梅观赏的主要部位是（ ）。C

A. 花瓣 B. 花萼 C. 苞片 D. 果实

105. 春播秋花类指在（ ）播种，当年夏秋季节开花、结果、遇霜后植株枯死的一类草本观赏植物。A

A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬

106. 以下属于秋播花卉的是（ ）。C

A. 一串红 B. 鸡冠花 C. 金盏菊 D. 千日红

107. 下列（ ）组花卉为春播秋花类（又称一年生花卉）。A

A. 鸡冠花、凤仙花、百日草、太阳花 B. 金鱼草、雏菊、金盏菊、三色堇

C. 百日草、太阳花、金盏菊、三色堇 D. 鸡冠花、凤仙花、金鱼草、雏菊

108. 秋播春花类指在（ ）播种，以幼苗越冬，一般来年春季开花、结果，遇夏热

A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬

A. 雏菊、金盏菊、金鱼草、藿香蓟
B. 雏菊、金盏菊、三色堇、桂竹香

A. 鳞茎 B. 块茎 C. 根茎 D. 块根

123. 浙江地区百合种植的最适宜季节是（ ）。A

A. 2 月份 B. 7 月份 C. 10 月份 D. 12 月份

124. 大丽花是（ ）科植物。C

A. 报春花科 B. 石蒜科 C. 菊科 D. 天南星科

125. 百合是（ ）科植物。C

A. 报春花科 B. 石蒜科 C. 百合科 D. 天南星科

126. 唐菖蒲是（ ）植物。C

A. 短日照 B. 日中性 C. 长日照 D. 中日照

127. . 中国水仙的自然花期一般在（ ）。A

A. 1-2 月份 B. 3-4 月份 C. 5-6 月份 D. 7-8 月份

128. 郁金香是（ ）科球根花卉。A

A. 百合科 B. 石蒜科 C. 鸢尾科 D. 天南星科

129. 郁金香秋冬种植时，最晚时间在（ ）。D

A. 冰冻前 1 周 B. 12 月底 C. 1 月底 D. 冰冻前 2 周

130. 郁金香盆栽时，一般 15cm 口径的盆可种（ ）。C

A. 1 颗 B. 2 颗 C. 3 颗 D. 4 颗

131. 郁金香生根温度一般要求（ ）。A

A. 5℃-14℃ B. 5℃-20℃ C. 0℃-5℃ D. 10℃-15℃

132. 多肉植物最常见集中于（ ）科。A

A. 景天科 B. 百合科 C. 五加科 D. 菊科

133. 虹之玉目前最常见的繁殖方法是（ ）。D

A. 枝插 B. 分株 C. 播种 D. 叶插

134. 秋菊加光处理可（ ）。B

A. 提早开花 B. 推迟开花 C. 没有作用

135. 切花非洲菊苗龄自组培苗出瓶至种苗出圃应有（ ）个月以上假植期。C

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

136. 华东地区切花非洲菊的定植时间最好在（ ）月份。C

A. 1-2 月 B. 3-4 月 C. 4-5 月 D. 6-7 月

137. 牵牛的茎属于（ ）。B

A. 球茎 B. 缠绕茎 C. 短缩茎 D. 半直立茎

138. 海棠、山定子种子多采用（ ）方式播种。C

A. 点播 B. 扦插 C. 条播 D. 撒播

139. 我国北方地区适宜（ ）季节植树，这个季节是树木休眠期，蒸腾量小，栽后容易达到地上、地下部分的生理平衡。落叶树早移，常绿树后移。A

A. 春季 B. 夏季 C. 秋冬 D. 冬季

140. 以下在低温下花芽分化的有 ()。D

A. 八仙花 B. 三角梅 C. 郁金香 D. 金盏菊

141. 以下在低温下花芽分化的有 ()。D

A. 八仙花 B. 三角梅 C. 郁金香 D. 金盏菊

142. 以下在低温下花芽分化的有 ()。D

A. 八仙花 B. 三角梅 C. 郁金香 D. 金盏菊

143. 以下在低温下花芽分化的有 ()。D

A. 八仙花 B. 三角梅 C. 郁金香 D. 金盏菊

144. 207. 以下不属于鳞茎类球根花卉的是 ()。C

A. 水仙 B. 风信子 C. 番红花 D. 郁金香

145. 关于图片中植物,说法正确的是 ()。C

A. 迎春花, 喜光

B. 连翘, 不耐寒

C. 木犀科, 花期 3-4 月

D. 落叶灌木, 无果实



146. 嫁接时, 芽接的时期一般不选择在 ()。D

A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季

147. 挖坑机属于哪一类机械 ()。D

A. 土方机械 B. 起重机械 C. 整修机械 D. 种植机械

148. 专供含有一定泥浆、纤维和其他固体颗粒物抽水使用的一种水泵是 ()。

C

A. 潜水泵 B. 离心泵 C. 污水泵 D. 管道泵

149. 离心泵属于什么机械 () B

A. 喷灌机械 B. 提水机械 C. 起重机械 D. 整修机械

150. 平石式雨水口的井篦与道路沟底处于同一平面, 或低于沟底 (), 以便雨水的迅速排放。C

A. 5-15mm B. 10-20mm C. 20-50mm D. 30-60mm

151. 除在苗圃中排水渠有三角形断面之外, 一般的排水明渠均为矩形或梯形断面。梯形断面的最小底宽应不小于 ()。C

A. 10cm B. 20cm C. 30cm D. 40cm

152. 在一些地形变化较大或处于河谷冲击地区的景观区域,为了防洪,需要通过设置排洪沟来预防洪水带来的危害,通常应尽量利用洪水迹线来安排排洪沟。明渠排洪沟的底宽一般不应小于()。D

A. 100-200mm B. 200-300mm C. 300-400mm D. 400-500mm

153. 雨水口是在雨水灌渠或合流灌渠上收集雨水的构筑物。一般的雨水口,由基础、井深、井口、井篦等几部分构成。雨水口一般为矩形井,以连管与排水管道相连接,连管直径一般不应小于()。B

A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm

154. 落水景观的水量与落差成正比,即落差越大,所需水量越多。通常对于布落式瀑布,滑落瀑布水厚一般在()左右。B

A. 1-3mm B. 3-5mm C. 5-8mm D. 8-11mm

155. ()墙体靠墙身自重抵抗侧压力,可采用混凝土、石块、人工砌体等。D

A. 悬臂式 B. 扶臂式 C. 半重力式 D. 重力式

156. ()墙体在墙体中加入钢筋,与墙体自重共同来承受侧压力,从而缩小墙体截面。C

A. 悬臂式 B. 扶臂式 C. 半重力式 D. 重力式

157. ()墙体凭靠墙体立壁、基座等构件承受侧压力,是一种较为常用、经济的墙体形式。A

A. 悬臂式 B. 扶臂式 C. 半重力式 D. 重力式

158. 小型水闸在园林水景应用中十分常见,以下不属于水闸的底层结构的是()。C

A. 铺盖 B. 护坦 C. 闸墩 D. 海漫

159. 小型水闸在园林水景应用中十分常见,以下不属于水闸的上层建筑的是()。B

A. 闸墙 B. 铺盖 C. 翼墙 D. 闸墩

160. 在假山工程中,假山石梁或石板的两端直接放在山洞两侧的洞柱上,属于()假山洞结构。C

A. 挑梁式 B. 券拱式 C. 梁柱式 D. 攒尖式

161. 在假山工程中,用山石从两侧洞壁、洞柱向洞中央相对悬挑伸出,并合龙做成洞顶,属于()假山洞结构。A

A. 挑梁式 B. 券拱式 C. 梁柱式 D. 攒尖式

162. 做脚,就是用山石砌筑成山脚,它是在假山的上面部分山形山势大体施工完成以后,于

163. 紧贴起脚石外缘部分拼叠山脚,以弥补起脚造型不足的一种操作技法。适用

于用在水边的山脚形式为（ ）。A

- A. 悬低脚 B. 凸出脚 C. 断连脚 D. 承上脚

164. 图中步石排列的形式为（ ）。B

- A. 交错排列 B. 三连排列
C. 双连排列 D. 雁行排列




165. 图中步石排列的形式为（ ）。A

- A. 双连排列 B. 三连排列
C. 交错排列 D. 雁行排列



166. 图中步石排列的形式为（ ）。A

- A. 交错排列 B. 三连排列
C. 双连排列 D. 雁行排列



167. 在园林铺装中，普通粘土砖、缸砖和混凝土板面层相邻两块块料的高低误差允许在（ ）mm。C

- A. 3mm B. 2.5mm C. 1.5mm D. 0.5mm

168. 使用花岗岩、大理石、拼花木板和塑料地板做园林铺装时，相邻两块块料面层的高低允许偏差在（ ）mm 以内。D

- A. 2.5mm……B. 1.5mm……C. 1mm……D. 0.5mm

169. 喷水池的基础垫层设计尺寸要求是（ ）。B

- A. 灰土层 20cm，C10 砼 10cm B. 灰土层 30cm，C10 砼 10—20cm
C. 灰土层 30cm，C10 砼 30cm D. 灰土层 50cm，C10 砼 10cm

170. 倾斜式红砖挡墙的倾斜坡度应在（ ）。C

- A. $\pm 10^\circ$ 角 B. $\pm 15^\circ$ 角 C. $\pm 20^\circ$ 角 D. $\pm 25^\circ$ 角

171. 园路设计中，通车园路的坡度应小于（ ）。C

- A. 3% B. 5% C. 8% D. 10%

172. 排水设计中，雨水管径不得小于（ ）。A

- A. 150 B. 200 C. 300 D. 500

173. 园路灰土地基的灰土比例一般为（ ）。A

- A. 1:9 或 2:8 B. 4:6 或 3:7 C. 5:5 D. 1:9

174. 在对碎石垫层碾压时使用（ ）进行，碾压时做到无漏压、无死角并保证碾压均匀。B

- A. 锤子 B. 夯实机 C. 平板振动器 D. 抹子

175. （ ）基础强度高，施工快捷，基础深度是依叠石高度而定。C

A. 铺石基础 B. 桩木基础 C. 混凝土基础 D. 碎石基础

176. 当坡岸较陡、风浪较大或因造景需要时可采用（ ）B

A. 编柳抛石护坡 B. 铺石护坡 C. 草皮护坡 D. 石笼护坡

177. 铺石护坡应有足够的（ ）以减少土壤从护坡上面流失，还需在块石下面设倒滤层垫底。C

A. 保水性 B. 坚固性 C. 透水性 D. 抗压性

178. 园桥基础施工严禁采用（ ）施工，分段位置宜设在沉降缝或伸缩缝处。A

A. 灌浆法 B. 分段法 C. 干垒法 D. 湿铺法

179. 园桥施工时为了减轻基坑坡壁顶面静荷载，沿基坑顶面周围至少在（ ）范围内不得堆置土方、物料。D

A. 0.2m B. 0.5m C. 0.8m D. 1m

180. （ ）为现场常备机具，体形小，轻便。适用，操作简单，但压实深度有限。适于小面积粘性土薄层回填上振实。

A. 平板式振动器

B. 小型打夯机

C. 羊足压路碌

D. 压路机

181. 为了保证园路的行车安全，转弯半径一般不小于（ ）。C

A. 3m B. 5m C. 6m D. 8m

182. 一般园路超过（ ）时应设台阶。D

A. 5° B. 10° C. 12° D. 15°

183. 施工简便，造价低，遇水造成结合层不平整的结合层为（ ）。B

A. 白灰干砂 B. 净干砂 C. 混合砂浆 D. 水泥砂浆

184. 在对碎石垫层碾压时使用（ ）进行，碾压时做到无漏压、无死角并保证碾压均匀。C

A. 抹子

B. 水平尺

C. 夯实机

D. 搅拌机

185. 北京颐和园的玉带桥为镶边（ ），在拱券两外侧各用高级汉白玉石镶箍成拱券，全桥整体性好。C

A. 并列砌筑

B. 连贯砌筑

C. 横联砌筑

D. 纵横砌筑



186. 园路连锁砖铺砌前要先放出边线,每隔 5m 放一 (),然后以路侧石为另一边线,与水平桩纵横挂线,用以控制方向和高程。C

- A. 垂直桩 B. 木龙骨 C. 挡板 D. 水平桩

187. 对同一种植物而言,对低温的抵抗力最强的是 ()。C

- A. 多年生老枝 B. 嫩芽 C. 休眠期种子 D. 休眠期枝条

188. 以下花卉耐寒性最强的是 ()。B

- A. 金鱼草 B. 三色堇 C. 花毛茛 D. 一串红

189. 一般室内观叶植物适合 () 环境。A

- A. 半阴 B. 充足光照 C. 都可以 D. 长时间强光照

190. 一般观花类草花适合 () 环境。B

- A. 半阴 B. 充足光照 C. 都可以 D. 长时间强光照

191. 冬季浇水最好的时间是 ()。D

- A. 早晨 B. 傍晚 C. 午前 1-2 时 D. 午后 1-2 时

192. 很多植物对自来水中 () 离子比较敏感。D

- A. 钙 B. 钠 C. 镁 D. 氯

193. 灌溉水的 PH 值在 () 间均可使用。A

- A. 5-8.5 B. 5-7 C. 5-6 D. 6-8

194. 灌溉水的 PH 值在 () 间最理想。C

- A. 5-8.5 B. 5-7 C. 5-6 D. 6-8

195. 下列能使植物生长比较健壮、坚硬的是 ()。B

- A. 尿素 B. 硝态氮 C. 铵态氮 D. 氨基酸

196. 一般促进植物开花的是 ()。B

- A. 氮肥 B. 磷肥 C. 钾肥 D. 钙肥

197. 作物的整个生长在某一个时期内,对某种养分的要求虽不多,但是却十分的迫切,这个时期如果植物缺乏这种养分,生长发育就受到很大的影响,以后即使大量供应这种养分,也难以弥补损失。我们把这个时期叫做 ()。A

- A. 作物营养临界期 B. 作物营养最大效率期 C. 作物营养敏感期 D. 作物营养期

198. 作物在整个生育期中,有一个时期吸收养分的绝对数量和相对数量都最多,肥料利用率最大,这个时期叫做 ()。B

- A. 作物营养临界期 B. 作物营养最大效率期 C. 作物营养敏感期 D. 作物营养期

199. 促进植物生长强壮性的是 ()。D

- A. 氮肥 B. 铁肥 C. 钾肥 D. 钙肥

200. 夏季不适合的温室、大棚操作是 ()。D
A. 开窗通风 B. 拉遮阳网降温 C. 灌水降温 D. 闷棚
201. 雕刻水仙的开花期主要集中在 ()。C
A. 10 月 B. 11 月 C. 2 月份 D. 4 月份
202. 以下属于阳性花卉的是 ()。A
A. 彩叶草 B. 富贵竹 C. 吊兰 D. 龙血树
203. 以下花卉华东地区能露地越冬的是 ()。C
A. 花毛茛 B. 矮牵牛 C. 洋水仙 D. 报春花
204. 月季早春抽芽时追施 () 肥料。A
A. 高氮肥和平衡肥交替使用 B. 开花肥 C. 高钾肥 D. 高磷肥
205. 大花绣球对水分的需求表现为 ()。C
A. 宁干勿湿 B. 耐旱 C. 水分充足 D. 宁湿勿干
206. 大花绣球对肥料的需求表现为 ()。B
A. 需求少 B. 需求大 C. 都可以 D. 需求较少
207. 绣球调蓝期间施肥需注意 ()。C
A. 不施高磷肥 B. 高磷肥灌根 C. 高磷肥叶面喷施 D. 不施任何肥料
208. 无花果对土壤 PH 值的要求是 ()。B
A. 微酸性 B. 微碱性 C. 中性 D. 都可以
209. 无花果地栽区域年平均气温 () 比较适宜。A
A. 13-15℃ B. 5℃左右 C. -5℃ D. 15℃以上
210. 无花果的保果肥在 () 时候施。B
A. 早春 B. 第一批果膨大期 C. 挂果期 D. 采收期
211. 无花果的越冬肥在 () 时候施。B
A. 早春 B. 入冬前 C. 冬季 D. 采收期
212. 三角梅的控水一般在 ()。C
A. 3-4 月 B. 5-6 月 C. 6-7 月 D. 8-9 月
213. 三角梅花期施 () 肥。B
A. 氮 B. 磷 C. 钾 D. 铁
214. 三角梅的花期调控主要手段是 ()。B
A. 光照 B. 控水 C. 控肥 D. 加温
215. 下最不耐寒的是 () 类铁。D
A. 早花大花型 B. 晚花大花型 C. 意大利型 D. 佛罗里达型
216. 多肉生长太过密集, 长满整个花盆, 称为 ()。C

A. 老桩 B. 闷养 C. 爆盆 D. 抽花箭

217. 四月份定植非洲菊小苗, 当气温低于 () 时, 应采用双层保温。C

A. 5℃ B. 10℃ C. 15℃ D. 20℃

218. 非洲菊追肥苗期以 () 肥料为主 A

A. 15-15-15 B. 12-5-42 C. 12-2-44 D. 硝酸钾

219. 在高温多雨的或沙质土壤上追肥要采用什么原则 ()。B

A. 少次多量 B. 少量多次 C. 多施氮肥 D. 多施有机肥

220. 观花类植物不能缺 ()。D

A. 氮肥 B. 钾肥 C. 锌肥 D. 磷肥

221. 荷花适宜的生活水深 ()。C

A. 0.3~0.5m B. 0.5~0.7m C. 0.6~1.0m D. 0.8~1.5m

222. 以下切花在华东地区栽培可以露地越冬的有 ()。A

A. 切花月季 B. 切花非洲菊 C. 切花马蹄莲 D. 切花天堂鸟

223. 月季常见的黑斑病可定期喷 () 药液防治。A

A. 代森锌 B. 粉锈宁 C. 阿维菌素 D. 除虫菊酯

224. 月季常见的红蜘蛛可用 () 杀灭。C

A. 代森锌 B. 粉锈宁 C. 阿维菌素 D. 苯醚甲环唑

225. 蓝莓最普遍发生的病害是 ()。C

A. 白果病 B. 白粉病 C. 僵果病 D. 锈病

226. 以下最不容易感染枯萎病的铁线莲是 ()。C

A. 早花大花型 B. 晚花大花型 C. 意大利型 D. 佛罗里达型

227. 据食叶害虫危害的周期性规律, 一般是 () 1 代的种类, 其连续期约为 7 年。

A

A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年

228. 山楂叶螨冬型为鲜红色, 夏型颜色为 ()。A

A. 暗红色 B. 褐色 C. 砖红色 D. 绿色

229. 什么主要发生在西北地区, 特别是新疆、甘肃一带发生较重 ()。C

A. 山楂叶螨 B. 苹果全爪螨 C. 李始叶螨 D. 二斑叶螨

230. 植物病害与伤害最根本的不同之处在于植物病害的形成要经过 ()。B

A. 组织变化 B. 病理变化 C. 形态变化 D. 寄生变化

231. 将植物病害分为单循环病害、多循环病害是根据 ()。C

A. 初次浸染的菌量 B. 再次侵染的菌量 C. 再次侵染的次数 D. 病原种类;

232. 木材中的淀粉含量约为 ()。A

A. 2%~6% B. 40%~60 C. 15%~6% D. 2%~4%

233. 下列哪种农药属于杀虫剂 ()。 A

A 乐果; B 大隆; C 百菌清; D 2,4-滴

234. 土壤结构对某些根病会产生重要的影响,如白绢病菌常在黏土中发病 ()。

D

A. 较重 B 较轻 C. 无相关性 D 重

235. 云杉锈病的病原菌冬孢子一般在 6 月中旬萌发,产生担子和担孢子,而担孢子主要通过 () 传播到云杉幼嫩针叶上侵染。C

A. 温度 B. 湿度 C. 气流 D. 雨

236. 柑橘黄龙病通过 () 传播。C

A. 气流 B. 雨水 C. 木虱 D. 土壤

237. 落叶松枯梢病从 () 侵入。C

A. 直接 B. 气孔 C. 伤口 D. 皮孔

238. 引起杨树花叶病的病毒具有耐高温的特性,致死温度在 () °C。A

A. 75~80 B. 75~85 C. 70~80 D. 70~75

239. 杀虫剂杀菌剂和除草剂按照 () 分类。C

A. 原料的来源 B. 成分 C. 用途 D. 机理

240. 下列 () 农药属于杀虫剂。A

A. 乐果 B. 大隆 C. 百菌清 D. 2,4-滴

241. 害虫 () 时期对农药敏感。B

A. 卵期 B. 幼虫期 C. 蛹期 D. 成虫期

242. 下列 () 剂型的农药不宜喷雾使用。A

A. 粉剂 B. 可湿性粉剂 C. 乳油 D. 悬浮剂

243. 有机磷杀虫剂的作用机制是抑制昆虫体内 ()。A

A. 胆碱酯酶 B. 线粒体 C. 轴突 D. 三羧酸循环

244. 触杀性杀虫剂的施药方法以 () 为主。B

A. 撒施 B. 喷雾 C. 毒饵 D. 浇灌

245. 防治白粉病的保护性杀菌剂是 ()。A

A. 硫磺 B. 三唑酮 C. 波尔多液 D. 氧氯化铜

246. 属于有机硫杀菌剂的是 ()。A

A. 代森锰锌 B. 硫磺 C. 石硫合剂 D. 波尔多液

247. 以下哪项不是三角梅常见的虫害 ()。D

A. 叶甲 B. 蚜虫 C. 蚧壳虫 D. 红蜘蛛

248. 早花大花型铁线莲花后轻剪方式是 ()。B

A. 花下即可 B. 花下 2-3 节 C. 剪掉残花即可 D. 都可以

249. 早花大花型铁线莲花后轻剪的后果可能是 ()。B
A. 当年不开花 B. 当年持续开花 C. 第二年爆发 D. 都可能
250. 早花大花型铁线莲的重剪一般在 ()。D
A. 春秋季 B. 夏季 C. 冬季 D. 花后
251. 晚花大花型铁线莲的重剪一般在 ()。C
A. 春秋季 B. 夏季 C. 冬季 D. 花后
252. 晚花大花型铁线莲花后一般 ()。C
A. 中度回缩 B. 重剪 C. 轻剪 D. 中剪
253. 剪去枝条的三分之一到一半称为 ()。B
A. 轻剪 B. 中剪 C. 短剪回缩 D. 重剪
254. 轻剪一般在 () 时候进行。B
A. 夏季 B. 花后 C. 冬季 D. 根据需要随时进行
255. 不耐寒的观叶植物一般 () 时候进行修剪整形。A
A. 开春前 B. 春季 C. 秋季 D. 冬季
256. 月季修剪中, 剪口位于强壮腋芽上方 () 处。A
A. 0.5 厘米 B. 1.0 厘米 C. 3 厘米 D. 2 厘米
257. 关于冬剪和夏剪说法正确的是 ()。B
A. 夏季修剪, 没有冬季修剪准确
B. 冬季修剪的营养损失较夏季少
C. 冬剪, 容易造成修剪枝梢部分冻伤
D. 冬季修剪后, 夏季可不修剪
258. 高度 1-2 米, 主要造景应用为限制空间、过渡视线等的植物类型为 ()。A
A. 中灌木 B. 矮小灌木 C. 高灌木 D. 小乔木
259. 高度为 3-4.5 米, 主要造景应用为塑造垂直空间、屏障视线或作为背景植物使用的植物类型为 ()。C
A. 中灌木 B. 矮小灌木 C. 高灌木 D. 小乔木
260. 高度为 0.3-1 米, 主要造景应用为分隔和限制空间、连接视线等的植物类型为 ()。B
A. 中灌木 B. 矮小灌木 C. 高灌木 D. 小乔木
261. 植物造景特性为向上引导视线, 突出空间的垂直界面的植物外形为 ()。D
A. 垂枝形 B. 水平展开形 C. 圆球形 D. 纺锤形
262. () 外形植物的造景特性无方向性和倾向性, 多以自身的形体突出其造景中的主导地位 ()。C
A. 圆柱形 B. 垂枝形 C. 圆球形 D. 水平展开形

263. ()外形植物的造景特性可作为视觉景观的重点,与几何形建筑或景观配合使用()。B

A. 纺锤形 B. 圆锥形 C. 圆球形 D. 水平展开形

264. ()外形植物是水路边界常用的植物材料,造景特性可将视线引向地面()。

A

A. 垂枝形 B. 圆球形 C. 水平展开形 D. 圆锥形

265. 种植棉花时,常摘掉枝条的顶芽,原因是()。B

A. 防止生长过快 B. 促进枝条分枝生长 C. 防止棉花长得过高 D. 促进叶的生长

266. 方便残疾人使用的园路边缘,不宜选用硬质叶片的丛生型植物,如()。A

A. 凤尾兰 B. 结香 C. 刺槐 D. 刺桐

267. 苗木栽植前的修剪应根据各地自然条件,根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012),具有中央领导干、主轴明显的落叶乔木修建时应()。C

A. 修剪主枝 B. 可剪去枝条的1/2 C. 保持原有树形 D. 修剪主剪

268. 苗木栽植前的修剪应根据各地自然条件,根据《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)规定,关于常绿乔木修剪,以下说法正确的是()。D

A. 常绿阔叶乔木具有轮生侧枝,作行道树时,可剪除基部1层-2层轮生侧枝

B. 柏类苗木应定期修剪树形

C. 修剪松树类苗木枝条时基部应留2cm-3cm木橛

D. 常绿阔叶乔木枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪

269. 早春先花后叶、头状花序黄色、枝条柔软可打结造型的是()。A

A. 结香 B. 腊梅 C. 丁香 D. 金钟

270. 下列植物中不适宜作盆景材料的是()。B

A. 槭树 B. 泡桐 C. 日本五针松 D. 红檫木

271. 根据《公园设计规范》(GB51192-2016),古树名木单株树应同时满足树冠垂直投影以外()m宽和距树干基部外缘水平距离胸径()倍以内。D

A. 3, 10 b. 5, 10 C. 3, 20 D. 5, 20

272. 古树是一种特殊的景观资源,也是一种生态资源,原因是()。A

A. 古树是在当地经过长期适应的

B. 古树具有良好的生态习性

C. 古树自然生长条件好

D. 古树的地质环境条件优越

273. 树龄100年的树木,为()级古树。C

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

274. 树龄 350 年的树木，为（ ）级古树。B

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

275. 树龄 280 年的树木，为（ ）级古树。C

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

276. 一级保护的古树和名木保护范围不小于树冠垂直投影外（ ）米。C

A. 2 B. 3 C. 5 D. 8

277. 二级保护的古树保护范围不小于树冠垂直投影外（ ）米。B

A. 2 B. 3 C. 5 D. 8

278. 三级保护的古树保护范围不小于树冠垂直投影外（ ）米。A

A. 2 B. 3 C. 5 D. 8

279. 树体枝干受外力影响导致倾斜角度大于（ ）的古树名木应判定存在安全隐患。

B

A. 15° B. 20° C. 25° D. 30°

280. 在古树名木保护策略中，如何通过修剪来维护古树的健康（ ）。B

A. 仅在春季进行修剪以促进新枝生长

B. 修剪徒长枝、枯枝、断枝以及遮挡光照的周边树木

C. 移除所有非原生的枝条以保持古树的原始形态

D. 通过修剪增加古树的果实产量以提高其繁殖能力

281. 铁线莲的攀爬依靠的是（ ）。D

A. 卷须 B. 茎 C. 气生根 D. 叶柄

282. 一般 3、4 年生的铁线莲用（ ）粗的竹竿绑缚比较合适。A

A. 直径 1.5cm B. 直径 1.0cm C. 直径 0.5cm D. 都可以

283. 一般 3、4 年生的铁线莲用（ ）高的竹竿绑缚比较合适。A

A. 2m B. 1m C. 60cm D. 都可以

284. 一般 1、2 年生的铁线莲用（ ）高的竹竿绑缚比较合适。C

A. 2m B. 1m C. 60cm D. 都可以

285. 一般 1、2 年生的铁线莲用（ ）粗的竹竿绑缚比较合适。C

A. 直径 1.5cm B. 直径 1.0cm C. 直径 0.5cm D. 都可以

286. 边坡绿化是立体绿化形式之一，一般情况下，坡面地址环境复杂，立体条件具有特殊性，种植方式多采用（ ）种植模式。B.

A. 铺设草坪+间植灌木

B. 小乔木+灌木

C. 乔木+地被

D. 乔木+灌木+草本

287. 绿化立面根据攀援植物附着的表面分为直接绿化立面和间接绿化立面，以下属于“线缆式”间接绿化特征的是（ ）。B

- A. 适用于生长缓慢的植物
- B. 适用于生长较迅速、高叶片密度的攀援植物
- C. 使用网架和网格作为攀援植物的支撑结构
- D. 使用金属线绳作为植被的支撑结构

二、多选题

1. 下列（ ）介质适合附生性兰花。AB
 - A. 树皮
 - B. 水苔
 - C. 园土
 - D. 泥炭
2. 下列属于颗粒性基质的有（ ）。BD
 - A. 泥炭
 - B. 珍珠岩
 - C. 腐殖土
 - D. 赤玉土
3. 以下适合做排水层的有（ ）。AB
 - A. 陶粒
 - B. 碎石
 - C. 蛭石
 - D. 泥炭
4. 低畦的特点（ ）。ABC
 - A. 肥料流失少
 - B. 低温稳定
 - C. 土壤不易干燥
 - D. 便于机械操作
5. 地形的作用有（ ）。ABCD
 - A. 基础骨架
 - B. 满足土方平衡
 - C. 形成环抱空间
 - D. 造景
6. 园林中常用的土方机械有（ ）。ACD
 - A. 推土机
 - B. 卷扬机
 - C. 平地机
 - D. 铲运机
7. 以下是冲击式夯土机的有（ ）。ABC
 - A. 内燃式夯土机
 - B. 振动式夯土机
 - C. 蛙式夯土机
 - D. 羊足碾
8. 以下在高温下花芽分化的有（ ）。ABC
 - A. 三角梅
 - B. 梅花
 - C. 郁金香
 - D. 金盏菊
9. 下列最适栽培水深在 5~10cm 的水湿生植物为（ ）。CD
 - A. 荷花
 - B. 香蒲
 - C. 菖蒲
 - D. 水葱
10. 下列属于球根花卉的有（ ）。AC
 - A. 郁金香
 - B. 紫罗兰
 - C. 百合
 - D. 萱草
11. 华东地区露地花卉播种的时间一般在（ ）。AC
 - A. 春
 - B. 夏
 - C. 秋
 - D. 冬
12. 以下不适合水培水仙的季节有（ ）。AB
 - A. 9 月
 - B. 10 月
 - C. 12 月
 - D. 2 月
13. 在进行月季品种的筛选时，以下（ ）因素都要考虑。ABCD
 - A. 重复开花性
 - B. 抗病性
 - C. 株型大小
 - D. 耐热性
14. 根据球根花卉的种植时间，球根花卉分为（ ）。BC
 - A. 块茎类球根
 - B. 春植球根
 - C. 秋植球根
 - D. 球茎类球根

15. 属于自根繁殖的是 ()。ABD
A. 分株 B. 扦插 C. 嫁接 D. 压条
16. 三角梅花后需要修剪的枝条有 ()。ABCD
A. 残花 B. 过密枝 C. 徒长枝 D. 弱势枝
17. 以下花卉耐热不耐寒的有 () ABC
A. 一串红 B. 鸡冠花 C. 孔雀草 D. 羽衣甘蓝
18. 唐菖蒲的越冬温度要求 () 以上, 球茎萌芽温度要求 () 以上。AB
A. 0℃ B. 5℃ C. 10℃ D. 15℃
19. 常见的秋植球根有 ()。BD
A. 朱顶红 B. 郁金香 C. 马蹄莲 D. 洋水仙
20. 香石竹作为重要的切花栽培, 其生长环境宜 () 条件。ACD
A. 性喜有良好光照和通风的环境 B. 类似上海的夏季高温多雨的气候
C. 排水良好的土壤 D. 需用几层金属网、绳索组成网络来支撑花枝
21. 在短日照季节里 (冬季), 要使长日照花卉提前开花, 或使短日照花卉延迟开花。一般采用 () 措施。AB
A. 延长光照法 B. 中断暗期法 C. 遮光法 D. 摘心法
22. 非洲菊生长期要注意 () 等植株管理措施。AC
A. 剥叶 B. 摘心 C. 疏蕾 D. 抹芽
23. 施工总图包括以下哪几个 () AB
A. 施工总平面图 B. 绿化种植总平面布置图
C. 地形图 D. 各分区块绿化种植详图
24. 生态化工程技术措施包括 () ACD
A. 地表水滞蓄 B. 硬质驳岸 C. 模拟地带性群落 D. 透水铺装
25. 居住区活动广场的铺地宜选择 ()。AC
A. 料石 B. 抛光花岗岩 C. 渗水砖 D. 玻璃地砖
26. 铺砌时应轻拿轻放, 用 () 轻敲压平, 以免损坏人园路连锁砖的边角。AB
A. 木锤 B. 橡胶锤 C. 抹子 D. 水平尺
27. 常见的短日照花卉有 ()。ACD
A. 秋菊 B. 八仙花 C. 蟹爪兰 D. 一品红
28. 内遮阳保温幕的作用有 ()。AC
A. 保温节能 B. 遮阳降温 C. 防水滴 D. 节约灌溉用水
29. 以下属于 N 素过量的表现有 ()。AD
A. 开花延迟 B. 株小 C. 黄化 D. 徒长

30. 下列适合种植大花绣球的场所有 ()。CD
A. 室内 B. 封闭阳台 C. 大树下 D. 墙角
31. 以下需要对铁线莲进行追肥的时期有 ()。BD
A. 2 月 B. 4 月 C. 5 月 D. 8、9 月
32. 铁线莲施基肥的最佳时期是 ()。AD
A. 秋冬早春换盆时 B. 盛花期 C. 秋季 D. 春季 2、3 月萌芽时
33. 朱顶红对温度的需求表现为 ()。AC
A. 喜温暖 B. 冷凉 C. 忌酷热 D. 耐酷热
34. 马蹄莲对环境条件的需求表现为 ()。ABC
A. 温暖 B. 湿润 C. 荫蔽 D. 阳光充足
35. 以下球根花卉耐寒性较强, 在华东地区能露地越冬的有 ()。ABCD
A. 水仙 B. 风信子 C. 番红花 D. 郁金香
36. 以下多肉在华东地区能露地越冬的是 ()。ABCD
A. 薄雪万年草 B. 垂盆草 C. 佛甲草 D. 八宝景天
37. 以下切花在华东地区栽培可以露地越冬的有 ()。AC
A. 切花月季 B. 切花非洲菊 C. 切花菊花 D. 切花天堂鸟
38. 生石花喜欢 () 环境。ABC
A. 温暖干燥 B. 日照充足 C. 通风良好 D. 温暖半阴
39. 当温度低于 15℃ 时, 切花百合可能出现 () 状况。ABC
A. 落蕾 B. 黄叶 C. 裂苞 D. 烂叶
40. 月季常见病害有 ()。AB
A. 黑斑病 B. 白粉病 C. 黑腐病 D. 枯萎病
41. 大花绣球常见病害有 ()。AB
A. 白粉病 B. 叶斑病 C. 黑腐病 D. 枯萎病
42. 僵果病的表现症状为 () 突然萎蔫, 变褐。ACD
A. 新叶、芽 B. 茎秆 C. 花序 D. 果实
43. 多肉植物常见的虫害有 ()。ABC
A. 蚜虫 B. 粉蚧 C. 蛾类幼虫 D. 天牛
44. 植物病原物的传播可分为被动传播和主动传播两类, 其中属于被动传播的传播方式有 ()。ABCD
A. 气流传播 B. 雨水传播 C. 昆虫及其他生物传播 D. 人为传播
45. 下列农药具有杀线虫作用的是 () ABC
A. 米乐尔 B. 克线磷 C. 灭线磷 D. 敌力脱
46. 下列属于寄生性天敌昆虫的是 () ABD

A. 寄生蜂 B. 赤眼蜂 C. 蜜蜂 D. 蚜虫蜂

47. 对观叶植物的修建整形有（ ）。ABCD

A. 剪枝 B. 摘心 C. 除芽 D. 摘叶

48. 行道树应选择（ ）的树种。ABD

A. 分支点高 B. 耐修剪 C. 四季有景 D. 花、果对行人不会造成危害

49. 古树名木生长势应根据古树名木诊断结果进行分级，生长势可分为（ ）。ABD

A. 正常 B. 轻弱 C. 中弱 D. 重弱

50. 古树名木应以养护为主，复壮应在养护的基础上进行，存在安全隐患的古树名木应进行复壮，复壮技术包括（ ）。ABCD

A. 土壤改良 B. 树体损伤处理 C. 树洞修补 D. 树体加固

51. 以下在铁线莲牵引绑缚中需注意的操作有（ ）。ABC

A. 支撑材料的高度 B. 支撑材料的粗度
C. 牵引中尽量小心不要弄伤枝条 D. 攀爬能力很强

52. 以下经常被用于屋顶绿化，做地被的有（ ）。ABC

A. 垂盆草 B. 佛甲草 C. 薄雪万年草 D. 玉露

三、判断题

1. 蔓长春花植株丛生，茎细长，匍匐生长，能快速覆盖地面，大面积栽培具有地被效果。（√）

2. 蛭石持水能力强，但长期使用，容易致密，影响透气和排水效果，一般不单独使用。（√）

3. 泥炭呈碱性或微碱性，吸水力强，有机质丰富容易分解。（×）

4. 陶粒透气性好，但保水性差，一般作为排水层使用。（√）

5. 秋天播种、幼苗越冬、翌年春夏开花、结实、后枯死，通常表现为耐寒不耐热，喜欢凉爽气候。此类花卉属于宿根花卉。（×）

6. 植物的营养生长和生殖生长是相互促进又相互制约的。（√）

7. 南方地区春播比北方地区晚。（×）

8. 介质对扦插成活没有影响。（×）

9. 园艺上可砍伤根部促其分生根蘖以增加繁殖系数。（√）

10. 根茎和匍匐茎一般长在地下，走茎一般长在地面上。（×）

11. 翻盆中修根后最好使用光谱杀菌剂对根系进行消毒杀菌。（√）

12. 抹芽一般在冬季进行。（×）

13. 摘心能促发侧枝。（√）

14. 藤月很高，灌木月季比较矮。（×）

15. 蔷薇一年可多次开花，月季一年只能开一季花。(×)
16. 月季是短日照植物。(×)
17. 多数月季有重复开花性。(√)
18. 玉簪、紫萼是耐阴性地被，除春观赏花之外，夏秋季节叶片也可观赏尤其是花叶品种。(√)
19. 条播时，黏土要比沙土适当深些。(×)
20. 如土壤过分干燥，需先洒水湿润后再行压实。(√)
21. 计算过程中土方工程量的汇总时需要有诸如认真仔细、负责、耐心的态度。(√)
22. 路堤型和路堑型园路道牙布置方式相同，排水方式不同。(×)
23. 光照太强时，阴性植物的叶片常会被灼伤。(√)
24. 杀红蜘蛛可用爱卡螨。(√)
25. 月季最常见的虫害有切叶蜂、月季茎蜂、红蜘蛛、蚜虫等。(√)
26. 杀蚜虫可用吡虫啉。(√)
27. 石硫合剂、代森锌均可用于杀菌。(√)
28. 加强植株通风透光可减少僵果病。(√)
29. 同种昆虫的同一性别成虫具有 2 种或更多种不同类型的个体的现象叫性二型现象。(×)
30. 灯光诱杀有害昆虫属于物理防治。(√)
31. 蔷薇科的植物可以用敌敌畏防治害虫。(×)
32. 铁线莲的重剪一般在冬末早春，腋芽萌动前进行。(√)
33. 早花大花型铁线莲冬季修剪剪至枝条内部呈现绿色部位即可。(√)
34. 行道树悬铃木修剪时间适宜在 11 月份。(×)
35. 乔木在种植之前需要修剪树冠，完成种植之前苗木造型。(√)
36. 树木定植前一般会及时检查枝叶分布，修剪树冠枝叶，以减少蒸腾。(√)
37. 古树名木保护应考虑人为伤害预防，对根系裸露、枝干易受破坏或者人为活动频繁的地方宜设置围栏。围栏宜设置在树冠垂直投影外延 10m 以外，围栏高度宜大于 1.2m。(×)
38. 古树名木保护应考虑人为伤害预防，对位于城市人行道或者公园、风景名胜区等地人流多、踩踏严重的区域应铺设铁算子或木栈道，长和宽宜大于 2m。(√)
39. 古树衰老具有多种原因，自然因素是最主要的。(√)
40. 垂盆草和佛甲草都是很好的屋顶绿化材料。(√)
41. 垂直绿化植物施肥的方法主要是施基肥和追肥。(√)
42. 用于垂直绿化的藤本植物对土壤要求很严格。(×)