



高等数学 A2

浙江理工大学期末试题汇编

(答案册 上)

学校: _____

专业: _____

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

(此试卷为 2021 年第二版)

目录

1 浙江理工大学 2020—2021 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷.....	1
2 浙江理工大学 2020—2021 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷.....	4
3 浙江理工大学 2019—2020 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷.....	4
4 浙江理工大学 2019—2020 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷.....	7
5 浙江理工大学 2018—2019 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷.....	10
6 浙江理工大学 2018—2019 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷.....	12
7 浙江理工大学 2017—2018 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷.....	14
8 浙江理工大学 2016—2017 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷.....	14
9 浙江理工大学 2016—2017 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷.....	16
10 浙江理工大学 2015-2016 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷.....	17

资料说明

试卷整理人：张创琦

版次：2021 年 8 月 9 日 第二版

微信公众号：创琦杂谈

QQ 号：1020238657

创琦杂谈学习交流群（QQ 群）：749060380

创琦杂谈大学数学学习交流群（QQ 群）：967276102

（此套试卷仅供需要进行 2020-2021 高数 A2 补考的同学使用，之后我们会提供新版本）

（本次共更新了五套精装版、1-10 套的版本和 11-22 套的版本，共 3 个版本，如有其它版本的需要请联系张创琦本人）

1 浙江理工大学 2020—2021 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷

一 选择题 (共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1 C 2 D 3 A 4 B 5 C 6 B

二 填空题 (共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1 $\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$ 2 $\frac{e}{\sqrt{2}}$ 3 $\frac{4}{3}$

4 $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 f(x, y) dy$ 5 $2S$ 6 $\frac{3}{2}$

三 计算题 (共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分)

1

解. 切线方程:

$$\begin{cases} (-2)(x-1) + 2(y-1) + 4(z-1) = 0 \\ (x-1) - 2(y-1) + 3(z-1) = 0 \end{cases}$$

..... 4'

即:

$$\begin{cases} x - y - 2z = -2 \\ x - 2y + 3z = 2 \end{cases}$$

切线方向为 $(1, -1, -2) \times (1, -2, 3) = (-7, -5, -1)$, 1'

故法平面为:

$$-7(x-1) - 5(y-1) - (z-1) = 0.$$

..... 1'

□

2

解. 原问题等价于求函数 $g(x, y) = x^2 + y^2$ 在约束 $x + y = 1$ 下的条件极值。考虑 Lagrange 函数 $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1)$ 2'极值点 (x, y) 必满足下面的方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - 1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

..... 2'

由上面的方程组解得: $x = y = \frac{1}{2}$, 所以可能的极值点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 由几何意义知, 该问题存在最小值, 而最小值点一定为极值点, 而我们求得的可能的极值点只有一个, 所以 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 就是最小值点。..... 2'

□

3

解.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} (y^2 \cos(xy^2)) &= 2y \cos(xy^2) - y^2 \sin(xy^2) 2xy \\ \frac{\partial}{\partial x} (2xy \cos(xy^2)) &= 2y \cos(xy^2) - 2xy \sin(xy^2) y^2. \end{aligned}$$

因此 $\frac{\partial}{\partial y}(y^2 \cos(xy^2)) = \frac{\partial}{\partial x}(2xy \cos(xy^2))$, 2'

又 \mathbb{R}^2 单连通, 1'

所以这样的 f 是存在的。

固定 $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$, 取 $C_1^{x,y}$ 为从 $(0, 0)$ 到 $(x, 0)$ 的直线段, $C_2^{x,y}$ 为从 $(x, 0)$ 到 (x, y) 的直线段, 令 $f(x, y) = \int_{C_1^{x,y}} y^2 \cos(xy^2) dx + 2xy \cos(xy^2) dy + \int_{C_2^{x,y}} y^2 \cos(xy^2) dx + 2xy \cos(xy^2) dy$, 则 f 即为所求

..... 1'

下求之:

$$\begin{aligned} f(x_1, y_1) &= \int_{C_1^{x_1, y_1}} y^2 \cos(xy^2) dx + 2xy \cos(xy^2) dy + \int_{C_2^{x_1, y_1}} y^2 \cos(xy^2) dx + 2xy \cos(xy^2) dy \\ &= \int_{C_2^{x_1, y_1}} y^2 \cos(xy^2) dx + 2xy \cos(xy^2) dy \\ &= \int_{C_2^{x_1, y_1}} 2xy \cos(xy^2) dy = \sin(x_1 y_1^2) \end{aligned}$$

因此 $f(x, y) = \sin(xy^2)$ 2'

4

解. 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq ay, x \geq 0\}$, 记 C 为从点 $(0, 0)$ 到点 $(0, a)$ 的沿着 y 轴的线段, 由格林公式:

$$\begin{aligned} &\int_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\ &= \iint_D m dx dy + \int_C (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \cdots 3' \\ &= m\sigma(D) + \int_0^a (\cos y - m) dy \cdots 2' \\ &= \frac{1}{2} m \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \sin a - ma. \cdots 1' \end{aligned}$$

5

证明. 记 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 则所求的曲面可视为函数 $z = xy, (x, y) \in D$ 的函数图像, 因此:

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \cdots 2' \\ &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy \\ &= \iint_{0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \sqrt{1 + r^2} r dr d\theta \cdots 2' \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{1 + r^2} r dr \\ &= \pi \int_0^a \sqrt{1 + r^2} dr^2 \\ &= \pi \cdot \frac{2}{3} ((1 + a^2)^{3/2} - 1). \end{aligned}$$

..... 2'

6

解. 记该公共区域为 Ω , 使用平行于 xy 平面的平面截 Ω , 记 $\Omega_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | (x, y, z) \in \Omega\}$, 则 Ω_z 为一个圆盘, 且其面积 $\sigma(\Omega_z) = \begin{cases} \pi(R^2 - (R - z)^2), & \text{if } 0 \leq z \leq \frac{R}{2} \\ \pi(R^2 - z^2), & \text{if } \frac{R}{2} \leq z \leq R. \end{cases} \dots\dots 1'$
由定义

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} 1 dx dy dz \dots\dots\dots 1' \\ &= \int_0^R dz \iint_{\Omega_z} 1 dx dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \int_0^R \sigma(\Omega_z) dz \\ &= 2 \int_0^{R/2} \pi(R^2 - (R - z)^2) dz \\ &= \pi R^3 - 2\pi \int_{R/2}^R z^2 dz \\ &= \pi R^3 - \frac{2\pi}{3} (R^3 - R^3/8) \\ &= \pi R^3 (1 - 2/3 + 1/12) = \frac{5}{12} \pi R^3 \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

7

解. 记 S_1 为椭圆盘 $\{(x, y, 0) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ 的下侧, 则 S 与 S_1 组成的封闭曲面, 记 Ω 为 S 所包围的上半椭圆, 由高斯公式, $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy + \iint_{S_1} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \iiint_{\Omega} 2(x + y + z) dx dy dz, \dots\dots\dots 2'$
由于在 S_1 上 $z \equiv 0$, 故 $\iint_{S_1} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = 0$

由对称性知, $\iiint_{\Omega} 2(x + y) dx dy dz = 0$.
所以 $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = 2 \iiint_{\Omega} z dx dy dz. \dots\dots\dots 2'$
又

$$\begin{aligned} 2 \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= 2 \int_0^c z dz \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}} dx dy \\ &= 2 \int_0^c z \pi ab (1 - \frac{z^2}{c^2}) dz \\ &= \pi abc^2 - \frac{\pi ab}{c^2} \frac{c^4}{2} \\ &= \frac{\pi abc^2}{2} \end{aligned}$$

故 $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \frac{\pi abc^2}{2} \dots\dots\dots 2'$

8

解. 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 收敛半径为 1, 又在 -1 与 1 处显然不收敛, 故收敛区间为 $(-1, 1)$. $\dots\dots\dots 2'$
记在 $(-1, 1)$ 内收敛到的函数为 $S(x)$, 只需求 $\frac{1}{x} S(x)$, 又

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{S(t)}{t} dt &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} x^n \\ &= \frac{x}{1-x}.\end{aligned}$$

..... 2'

故 $\frac{S(x)}{x} = \frac{d}{dx} \frac{x}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}$, 故 $S(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ 2'

四 (本题 4 分)

证明. 不妨设 \vec{l} 为单位向量, 则 $\cos \theta(x, y) = \vec{n} \cdot \vec{l}$, 若记 $\vec{n}(x, y) = (n_1(x, y), n_2(x, y))$, 则 $(n_2(x, y), -n_1(x, y))$ 为 C 的光滑的单位切向量场, 2'

不妨取 C 的方向为该切向量场所指的方向, 则由第一型曲线积分与第二型曲线积分之间的关系, 有:

$$\begin{aligned}\oint_C \vec{n} \cdot \vec{l} ds &= \oint_C (n_1 l_1 + n_2 l_2) ds \\ &= \oint_C (l_2, -l_1) \cdot (n_2, -n_1) ds \\ &= \oint_C l_2 dx - l_1 dy \\ &= \iint_D 0 dx dy \\ &= 0.\end{aligned}$$

..... 2'

2 浙江理工大学 2020—2021 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷

抱歉, 试卷和答案暂缺。(咱也不敢要啊, 没考之前要的话明天监狱就欢迎我了)

3 浙江理工大学 2019—2020 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷

一、单项选择题

1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C

评分标准说明: 每题 4 分, 错则扣全分。

二、填空题

1. $x-1 = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{6}.$

2. $\frac{y}{1+x^2y^2} dx + \frac{x}{1+x^2y^2} dy.$

3. $\frac{16\pi}{3}$.

4. -2π .

5. 7.

6. $2 \leq x < 4$ 或 $[2, 4)$

评分标准说明：每空 4 分，第 6 小题写成 $2 < x < 4$ 或 $(2, 4)$ 扣 2 分；其余小题错则扣全分。

三、计算题（本题共 6 题，满分 36 分）

1. 解：将 $z = 1 - 2x$ 带入第一个方程

----- 1 分

$$\text{得到 } 5\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{5}$$

----- 2 分

$$\text{引进参数 } \begin{cases} x = \frac{2}{5}(1 + \cos t) \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}} \sin t \\ z = \frac{1}{5} - \frac{4}{5} \cos t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi];$$

----- 3 分

评分标准说明：t 的范围未给出扣 1 分。

2. 解：方程两端同时对 y 求导可得

$$\cos y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \text{ 则 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\cos y}{2(1-z)}$$

..... 2 分

方程两端同时对 x 求导可得

$$2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \text{ 则 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{1-z}$$

..... 2 分

上式再对 x 求导

$$2 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \text{ 则 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{1-z} + \frac{x^2}{(1-z)^3}$$

..... 2 分

评分标准说明：该题还可以用微分形式不变性求导，结果正确满分；

3. 解：采用柱坐标

$$\begin{cases} r^2 \leq z \leq 2 \\ 0 \leq r \leq \sqrt{2} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

..... 2 分

可得

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_{r^2}^2 \frac{1}{1+r^2} dz = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r(2-r^2)}{1+r^2} dr = 3\pi \ln 3 - 2\pi \dots\dots 4 \text{ 分}$$

评分标准说明：其他方法也可

4. 解: $P(x, y) = x^2y$, $Q(x, y) = \frac{1}{3}x^3$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = x^2 = \frac{\partial P}{\partial y}$ 2 分

则 $u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} du = \left(\int_{(0,0)}^{(x,0)} + \int_{(x,0)}^{(x,y)} \right) x^2y dx + \frac{1}{3}x^3 dy$ 2 分

解得 $u(x, y) = \frac{1}{3}x^3y$2 分

评分标准说明: 第二步中起点不在 (0, 0) 也可

5. 解: 补充 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, z=0\}$ 取下侧

可得 $\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$ 1 分

$\iint_{\Sigma_1} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 0$ 1 分

由高斯公式: $\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} (x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy) = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$...2 分

采用球坐标

$\iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 3\rho^2 \rho^2 d\rho = \frac{6\pi}{5}$ 2 分

评分标准说明: 出现高斯公式, 最终结果错误, 可给 2 分

6. 解: 将 $f(x)$ 做奇周期延拓, 计算傅里叶系数

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+2) \sin nx dx = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \frac{\pi+4}{2k-1}, & n=2k-1 \\ -\frac{1}{k}, & n=2k \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

得 $x+2 = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\pi} \frac{\pi+4}{2k-1} \sin(2k-1)x - \frac{1}{k} \sin 2kx \right)$, $(0 < x < \pi)$ 2 分

评分标准说明: 最后一步未给出 x 的范围, 扣 1 分

四、综合题 (本题 8 分)

解:

设 $C(x, y)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (3, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (x-1, y-3)$ 1 分

三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 0 \\ x-1 & y-3 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |3y+x-10| \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

构造拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = (3y + x - 10)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1) \cdots \cdots 1 \text{ 分}$$

求导可得

$$\begin{cases} F_x = 2(3y + x - 10) + 2\lambda x = 0 \\ F_y = 6(3y + x - 10) + 2\lambda y = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } x = \frac{1}{\sqrt{10}}, y = \frac{3}{\sqrt{10}} \cdots \cdots 1 \text{ 分}$$

评分标准说明: 直接转化为无条件极值方法也可;

五、证明题 (本题共两小题, 满分 8 分)

$$1 \text{ 证明: 当 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{\alpha}{n}}{\left(\frac{\alpha}{n}\right)^2} = \frac{1}{2} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^2$ 收敛, 由比较判别法可知原级数绝对收敛。

2 证明: 在球坐标与极坐标下可得

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_1^t f(r^2) r^2 dr = 4\pi \int_1^t f(r^2) r^2 dr$$

$$G(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^t f(r^2) r dr = 2\pi \int_1^t f(r^2) r dr \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$F'(t) - G'(t) = 4\pi f(t^2) t^2 - 2\pi f(t^2) t > 0 \text{ 当 } t > 1 \cdots \cdots 1 \text{ 分}$$

由 $F(1) = G(1) = 0$ 可得结论 $\cdots \cdots 1 \text{ 分}$

评分标准说明: 第 2 题, 有极坐标或球坐标思想, 可适当给分

4 浙江理工大学 2019—2020 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷

一、单项选择题

1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.A

评分标准说明: 每题 4 分, 错则扣全分

二、填空题

$$1. \arccos \frac{1}{\sqrt{15}}. \quad 2. (2x \sin xy + y(x^2 + y^2) \cos xy) dx + (2y \sin xy + x(x^2 + y^2) \cos xy) dy.$$

$$3. 0. \quad 4. 4 - \pi. \quad 5. (-2, -2) \quad 6. 3$$

评分标准说明: 每空 4 分

三、计算题 (本题共六题, 满分 36 分)

1.解：该级数为正项级数，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{n^2 \sin \frac{\pi}{2^n}} = \frac{1}{2} < 1 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

根据比值判别法可知该级数收敛\dots\dots\dots 2 分

评分标准说明： 结果正确给 2 分。

2. 解：

$$f_x = (x^2 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = 0, f_y = (1 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = 0 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{解得驻点 } (1, -\frac{4}{3}) \text{ 及 } (-1, -\frac{2}{3}) \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$A(1, -\frac{4}{3}) = f_{xx} = (2x + x^2 + x^2 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = 3e^{-\frac{1}{3}},$$

$$B(1, -\frac{4}{3}) = f_{xy} = (1 + x^2 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = e^{-\frac{1}{3}},$$

$$C(1, -\frac{4}{3}) = f_{yy} = (1 + 1 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = e^{-\frac{1}{3}}$$

$$\text{可得 } AC - B^2 > 0, A > 0, \text{ 则 } (1, -\frac{4}{3}) \text{ 为极小值} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{我们也可以得到 } A(-1, -\frac{2}{3}) = -e^{-\frac{5}{3}}, B(-1, -\frac{2}{3}) = e^{-\frac{5}{3}}, C(-1, -\frac{2}{3}) = e^{-\frac{5}{3}}$$

$$\text{由于 } AC - B^2 < 0, \text{ 则 } (-1, -\frac{2}{3}) \text{ 不是极值点} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

评分标准说明： 该题还可以用微分形式不变性求导，结果正确满分；

3. 解：由奇偶性及对称性可知

$$\iint_D (x^2 + xye^{x^2+y^2}) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

由极坐标可得

$$\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 r dr = \frac{\pi}{4} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

评分标准说明： 奇偶性占 2 分

$$4. \text{ 解： } P(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}, Q(x, y) = \frac{y-x}{x^2+y^2},$$

$$\text{计算得当 } (x, y) \neq (0, 0) \text{ 时, } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{做辅助线： } L_1: x^2 + y^2 = \varepsilon^2, \text{ 逆时针方向 } \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

则原式 $= \oint_{L+L_1} - \oint_{L_1} = -\oint_{L_1} = -\int_0^{2\pi} (-1) d\theta = 2\pi \cdots \cdots 3$ 分

评分标准说明: 直接用曲线参数方程求解, 结果正确给分

5. 解: 由对称性可知

$\iint_{\Sigma} z dx dy = 2 \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\} \cdots \cdots 2$ 分

利用极坐标计算二重积分可得

$2 \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r dr = \frac{\pi}{3} \cdots \cdots 4$ 分

评分标准说明: 极坐标给出, 答案错误扣 2 分

6. 解: 利用间接法, 由于

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \cdots 3$ 分

用 x^2 代替 x

$\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$, $x \in (-1, 1) \cdots \cdots 3$ 分

评分标准说明: 最后一步未给出 x 的范围, 扣 1 分

四、综合题 (本题共 8 分)

解:

设切点处坐标为 (x_0, y_0, z_0) 则该点处法向量为

$(4x_0, y_0, -1) \cdots \cdots 2$ 分

法向量满足

$$\begin{cases} z_0 = 2x_0^2 + \frac{y_0^2}{2} \\ \frac{4x_0}{-4} = \frac{y_0}{2} = \frac{-1}{2} \end{cases} \cdots \cdots 2$$
 分

解得 $(\frac{1}{2}, -1, 1) \cdots \cdots 2$ 分

故法线方程为

$\frac{x - \frac{1}{2}}{2} = \frac{y + 1}{-1} = \frac{z - 1}{-1} \cdots \cdots 2$ 分

评分标准说明: 坐标算错不给分

五、证明题 (本题满分 8 分)

解: $P(x, y) = \frac{1}{y}(1 + y^2 f(xy))$, $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}(y^2 f(xy) - 1)$

直接计算可得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 f(xy) + xy^3 f'(xy) - 1}{y^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} \dots\dots\dots 4 \text{ 分},$$

故与积分路径无关

$$I = \int_2^1 \frac{1}{y^2} [y^2 f(y) - 1] dy + \int_1^2 [1 + f(x)] dx = \int_1^2 \left(1 + \frac{1}{y^2}\right) dy = \frac{3}{2} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

评分标准说明: 前 4 分中, 导数求错扣 2 分,

5 浙江理工大学 2018—2019 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷

一 选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. A 2. C 3. B 4. C 5. B 6. D

二 填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

$$1. \frac{x}{-R} = \frac{y-R}{0} = \frac{z-\frac{k}{2}\pi}{k}; \quad 2. 8\pi R^2; \quad 3. 4\pi; \quad 4. [4, 6];$$

$$5. \frac{1}{\sqrt{13}}; \quad 6. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad (-\infty < x < \infty)$$

三、计算题

$$1、\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{x+y} + (x^2 + y^2)e^{x+y} = (x^2 + 2x + y^2)e^{x+y}. \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2ye^{x+y} + (x^2 + 2x + y^2)e^{x+y} = (x^2 + 2x + 2y + y^2)e^{x+y}. \quad \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

2、解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n \cdot n!}{n^n}}{\frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{2}{e} < 1,$$

所以, 由比值审敛法, 该级数收敛。 \dots\dots\dots (7 \text{ 分})

3、解: 曲面 Σ 的方程为 $\Sigma: z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 8\}$ 。

$$\because z_x = \frac{-x}{\sqrt{9-x^2-y^2}}, \quad z_y = \frac{-y}{\sqrt{9-x^2-y^2}},$$

$$\therefore \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{3}{\sqrt{9-x^2-y^2}}.$$

$$\text{从而, } S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_D \frac{3}{\sqrt{9-x^2-y^2}} dx dy \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}} \frac{3}{\sqrt{9-r^2}} r dr = 12\pi \quad \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

- 4、解: 添加辅助面 $\Sigma: z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2$, 取下侧。记 Ω 为曲面 S 和 Σ 所围成的空间区域, 则由高斯公式,

$$\iint_{S \cup \Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 = 2\pi a^3 \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

而 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 0$

所以, $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy = 2\pi a^3 \quad \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$

- 5、解: 令 $P = 3x^2y + 8xy^2$, $Q = x^3 + 8x^2y + 12ye^y$ 。
因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 16xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 是某个函数的全微分。 $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy \\ &= \int_0^y (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy \\ &= x^3y + 4x^2y^2 + 12(y-1)e^y + 12 \quad \dots\dots\dots (7 \text{ 分}) \end{aligned}$$

- 6、解: $f(x)$ 满足 Dirichlet 定理条件, 傅里叶系数计算如下:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \left[\frac{2}{n^2\pi} x \cos nx \right]_0^{\pi} = (-1)^n \frac{2}{n^2}, n = 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{n} x^2 \cos nx + \frac{2}{n^3} \cos nx \right]_0^{\pi} \\ &= (-1)^{n+1} \frac{\pi}{n} + \frac{2}{n^3\pi} [(-1)^n - 1] \quad n = 1, 2, \dots \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \frac{2}{n^2} \cos nx + \left[(-1)^{n+1} \frac{\pi}{n} + \frac{2}{n^3\pi} [(-1)^n - 1] \right] \sin nx \right\} \\ x &\neq (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \dots\dots\dots (7 \text{ 分}) \end{aligned}$$

四、证明题

- 1、证明:

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy &= \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx = \int_0^1 \left[f(y) \int_0^y f(x)dx \right] dy \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^y f(x)dx \right] d \left[\int_0^y f(x)dx \right] = \frac{1}{2} \left[\int_0^y f(x)dx \right]_0^1 = \frac{A^2}{2}. \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

- 2、证明: 由 Green 公式

$$\text{左边} = \iint_D e^{\sin y} + e^{-\sin x} dx dy, \text{ 右边} = \iint_D e^{-\sin y} + e^{\sin x} dx dy.$$

由二重积分的对称性, $\iint_D e^{\sin y} + e^{-\sin x} dx dy = \iint_D e^{-\sin y} + e^{\sin x} dx dy.$

从而, $\oint_L xe^{\sin y} dy - ye^{-\sin x} dx = \oint_L xe^{-\sin y} dy - ye^{\sin x} dx$ 。 (5 分)

6 浙江理工大学 2018—2019 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷

一 选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D

二 填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. $(0, \frac{2}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{15}})$; 2. $8\pi R^2$; 3. $2\sqrt{2}$; 4. $\frac{64}{3}\pi$; 5. $[4, 6]$; 6. 0.

三、计算题

1、解: $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{1+x^3} dx = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{1+x^3} dy$.

$$= \int_0^1 \sqrt{1+x^3} \cdot x^2 dx = \left[\frac{2}{9} (1+x^3)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{9} (2\sqrt{2} - 1) \text{ (7 分)}$$

2、解: 令 $f_x(x, y) = 2x(2+y^2) = 0$, $f_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0$,

得 $f(x, y)$ 的驻点为 $(0, e^{-1})$ 。 (3 分)

在 $(0, e^{-1})$ 点,

$$A = f_{xx}(0, e^{-1}) = 2(2+y^2)|_{(0, e^{-1})} = 2(2+e^{-2})$$

$$B = f_{xy}(0, e^{-1}) = 4xy|_{(0, e^{-1})} = 0$$

$$C = f_{yy}(0, e^{-1}) = (2x^2 + \frac{1}{y})|_{(0, e^{-1})} = e$$

由于 $AC - B^2 > 0$, $A > 0$, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, e^{-1})$ 取到极小值 $-e^{-1}$ 。 (7 分)

3、解: 设 $A = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则 $f(x, y) = xy + A$ 。由题意,

$$\begin{aligned} A &= \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D (xy + A) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + A) dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^5 + Ax^2 \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{12} x^6 + \frac{1}{3} Ax^3 \right]_0^1 = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

从而, $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$ 。 (7 分)

4、解: 有向曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 3 \sin \theta \end{cases} \quad \theta: 0 \rightarrow \pi$$

$$\text{则} \quad \int_L (x^2 + xy) dy = \int_0^\pi (4 \cos^2 \theta + 6 \cos \theta \sin \theta) \cdot 3 \cos \theta d\theta \text{ (4 分)}$$

$$\begin{aligned}
&= 12 \int_0^\pi \cos^3 \theta d\theta + 18 \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \\
&= 12 \int_0^\pi (1 - \sin^2 \theta) d \sin \theta + 18 \int_0^\pi \cos^2 \theta d \sin \theta \\
&= 12 \left[\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right]_0^\pi - 18 \cdot \left[\frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^\pi \\
&= 12 \dots\dots\dots (7 \text{ 分})
\end{aligned}$$

5、解: 添加辅助面 $\Sigma: z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2$, 取下侧。记 Ω 为曲面 S 和 Σ 所围成的空间区域, 则由高斯公式,

$$\iint_{S \cup \Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 = 2\pi a^3 \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{而} \quad \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 0$$

$$\text{所以,} \quad \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy = 2\pi a^3 \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

6、解:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{-(x-2)(x+1)} \\
&= -\frac{1}{3} \frac{1}{1+x} + \frac{2}{3} \frac{1}{2-x} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \\
&= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\
&= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - (-1)^n\right) x^n \quad x \in (-1, 1) \dots\dots\dots (7 \text{ 分})
\end{aligned}$$

四、证明题

1、证明: 令 $P = 2xy^3 - y^2 \cos x$, $Q = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$ 。

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

所以, 由 Green 公式,

$$\oint_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = 0 \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

2、证明: 因为正项级数 $\{x_n\}$ 单调增加且有上界, 所以, 存在一个常数 C , 使得

$$x_n < x_{n+1} < C。$$

$$\text{从而, } \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right) \text{ 是正项系数。} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

又因为

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{x_k}{x_{k+1}}\right) = \frac{x_2 - x_1}{x_2} + \frac{x_3 - x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}}$$

$$\leq \frac{x_{n+1} - x_1}{x_2} \leq \frac{C - x_1}{x_2}$$

所以, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{x_n}{x_{n+1}})$ 收敛。 (5 分)

7 浙江理工大学 2017—2018 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷

答案先放到创琦杂谈大学数学学习交流群里啦哈 (因为答案在出书时还没有要到手, 大家补考又急需答案册子, 所有只能先出版后更新这篇的答案了, 抱歉哈)

8 浙江理工大学 2016—2017 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 A 卷

一、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. D 2. A 3. C 4. C 5. D 6. A

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. -6 2. 0 3. 2

4. $\frac{1}{1+\ln \frac{z}{x}}$ 或 $\frac{z}{y+z}$ 5. 1 6. 2

三、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 满分 30 分, 应写出文字说明及演算过程)

1.

把 Ω 投影到 xOy 面上得投影区域 D_{xy} 为由直线 $x + 2y = 1$ 与两坐标轴围成的三角形 (2 分)

$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{1-x-2y} x dz \quad \text{..... (4 分)}$$

$$= \frac{1}{48} . \quad \text{..... (6 分)}$$

2.

$$\text{解: } \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad \text{..... (2 分)}$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 + (-x^2) + (-x^2)^2 + (-x^2)^3 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{..... (4 分)}$$

$$x \in (-1, 1) \quad \text{..... (6 分)}$$

3.

设 L_1 为单位圆位于第一象限的部分。

$$\int_L |y| ds = 2 \int_{L_1} |y| ds = 2 \int_{L_1} y ds \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{设 } x = \cos \theta, y = \sin \theta, (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\text{则 } ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = d\theta \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{原式} = 2 \int_{L_1} y ds = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = 2 \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

4.

方法一：

把圆柱体表面分为三个部分：上半部分和侧面，..... (2 分)

分别则上下在 xOy 面上投影相同，侧面在 xOy 面上投影为零，..... (4 分)

在上半部分的积分互为相反数，侧面的积分为 0，所以积分值为 0. (6 分)

方法二：

设 Ω 为圆柱体闭域，..... (2 分)

$$\text{由高斯公式：} \oint_{\Sigma} (x-y) dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial(x-y)}{\partial z} dv \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \iiint_{\Omega} 0 dv = 0. \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

5.

$$\begin{cases} f_x(x,y) = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ f_y(x,y) = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

解得驻点为 $(1,0), (1,2), (-3,0), (-3,2)$ (3 分)

再求二阶偏导数，

$$f_{xx}(x,y) = 6x + 6, f_{xy}(x,y) = 0, f_{yy}(x,y) = -6y + 6. \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

在点 $(1,0)$ 处， $AC - B^2 = 72 > 0$ ，且 $A > 0$ ，故 $(1,0)$ 为极小值点。

类似地， $(-3,2)$ 为极大值点， $(1,2), (-3,0)$ 都不是极值点。 (6 分)

四、证明题（本题共 2 小题，第 1 题 4 分，第 2 题 6 分，满分 10 分，应写出详细证明和计算过程）

1.

$$\text{令 } a_n = \frac{n}{3^{n-1}},$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} < 1, \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以级数 } \sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{n}{3^{n-1}}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}} \text{ 收敛,} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

故原级数绝对收敛。 (4 分)

2.

令 $P(x, y) = 2xy - y^4 + 3$, $Q(x, y) = x^2 - 4xy^3$,则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x - 4y^3 = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以曲线积分与路径无关。..... (2 分)

$$\begin{aligned}
 & \int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 3)dx + (x^2 - 4xy^3)dy \\
 &= \int_{(1,0)}^{(2,0)} (2xy - y^4 + 3)dx + (x^2 - 4xy^3)dy + \int_{(2,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 3)dx + (x^2 - 4xy^3)dy \\
 &= \int_1^2 3dx + \int_0^1 (4 - 8y^3)dy \quad \text{..... (4 分)} \\
 &= 5 \quad \text{..... (6 分)}
 \end{aligned}$$

9 浙江理工大学 2016—2017 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷

一、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1-6 B A A B B D

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

$$-1; \quad 0; \quad 2; \quad \frac{y}{1-z}; \quad \sqrt{2}; \quad \frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$$

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 满分 30 分, 应写出演算过程及文字说明)

$$1、\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$2、\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 zdz = \frac{64}{3}\pi$$

3、设 D 为 xOy 面上的圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$, Σ_1 是圆盘 D 下侧

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} 3dv - \iint_D x^2 dxdy = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7}{4}\pi$$

$$4、\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^2 \theta \rho d\rho d\theta = \frac{3}{64}\pi^2$$

$$5、\text{幂函数的收敛区域为}(-1,1), \text{则} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-2} = \frac{1}{1-x^2}, \text{所以} s(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx +$$

$$s(0) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, x \in (-1,1)$$

四、证明题 (本题共 2 小题, 每题 5 分, 满分 10 分, 应写出详细证明和计算过程)

1、

$$\text{令 } F(x, y, z) = f(x - ay, z - by), \text{则 } F'_x(x, y, z) = f'_1, F'_y(x, y, z) = -af'_1 - bf'_2, F'_z(x, y, z) =$$

f'_2 , 由于 $aF'_x + F'_y + bF'_z = 0$, 因此曲面的切平面与方向向量为 $(a, 1, b)$ 的直线平行。

2、

因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 也为正项级数且收敛, 所以

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n + b_n)^2}{(a_n + b_n)}$, 由比较审敛法的极限形式可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛

10 浙江理工大学 2015-2016 学年第 2 学期《高等数学 A2》期末 B 卷

一、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1-6 B C C D C B

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

$$1 - \frac{2}{(x^2+y^2)^2}(x, y) \text{ 或 } -\frac{2x}{(x^2+y^2)^2}\vec{i} - \frac{2y}{(x^2+y^2)^2}\vec{j} \quad 2 \int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$$

$$3 \frac{4}{15}\pi \quad 4 0 \quad 5 \frac{\sqrt{3}}{12} \quad 6 -\frac{1}{4}$$

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 满分 30 分, 应写出演算过程及文字说明)

1. (1) (比值)

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \sin \frac{\pi}{3^{n+1}}}{2^n \sin \frac{\pi}{3^n}} = \frac{2}{3} < 1, \text{ 故收敛。}$$

(2) (加绝对值, 比值)

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{n+1}{3^n}}{\sin \frac{n}{3^{n-1}}} = \frac{1}{3} < 1, \text{ 故绝对收敛 (必收敛)。}$$

$$2. \begin{cases} f_x = (x^2 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = 0 \\ f_y = (1 + y + \frac{x^3}{3})e^{x+y} = 0 \end{cases}$$

得极值点 $(1, -\frac{4}{3}), (-1, -\frac{2}{3})$.

$$\text{又 } A = f_{xx} = (\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x + y)e^{x+y}$$

$$B = f_{xy} = (\frac{x^3}{3} + x^2 + y + 1)e^{x+y}$$


$$C = f_{yy} = (\frac{x^3}{3} + y + 2)e^{x+y}$$

$$\textcircled{1} (1, -\frac{4}{3}), \quad AC - B^2 > 0, A > 0.$$

故 $(1, -\frac{4}{3})$ 为极小值点, 极小值为 $-e^{-\frac{1}{3}}$.

$$\textcircled{2} (-1, -\frac{2}{3}), \quad AC - B^2 < 0,$$

故 $(-1, -\frac{2}{3})$ 不是极值点。



$$3. I = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (3x + 2y) dy = \frac{20}{3}$$

$$4. I = \oint_L \vec{OA} - \int \vec{OA} = \iint_D 2dxdy - 0 = \pi a^2$$

5. 计: $\Sigma_1: z = h$, 上侧。

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Sigma_1+\Sigma} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (0+0+0)dv - \iint_{D_{xy}} (x^2-y)dxdy \\ &= -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2)dxdy = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h \rho^2 \cdot \rho d\rho \\ &= -\frac{1}{2} \times 2\pi \times \frac{h^4}{4} = -\frac{\pi}{4} h^4 \end{aligned}$$



$$6. a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (3x^2 + 1) dx = 2(\pi^2 + 1),$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (3x^2 + 1) \cos nx dx = \frac{(-1)^n \cdot 12}{n^2}, \quad b_n = 0$$

$\because n$ 是从 1 到 $+\infty$, \therefore 由公式得, $f(x) = \pi^2 + 1 + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad x \in (-\infty, +\infty)$

(因为 f 连续, 所以 f 的傅里叶级数处处收敛到 f) (此处只做简要步骤说明)

四、综合题 (本题 8 分)

$$(1) P = x + 2y, \quad Q = 2x + y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$u(x, y) = \int_0^x x dx + \int_0^y (2x + y) dy = \frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2}$$

$$(2) \text{ 令 } F(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} - z.$$

$$\text{则 } \vec{n}|_{(1,1,4)} = (3, 3, -1).$$

$$\therefore \text{切平面方程为 } 3(x-1) + 3(y-1) - (z-3) = 0.$$

$$\text{即 } 3x + 3y - z - 3 = 0$$

$$\text{法线方程为 } \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-1}.$$

五、证明题 (本题共 2 小题, 每小题 4 分, 满分 8 分)

1.

$$\text{左} = \int_0^a dx \int_x^a e^{m(a-x)} f(x) dy = \int_0^a (a-x) \cdot e^{m(a-x)} f(x) dx = \text{右}.$$

2.

法一: $\because \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) \text{ 也收敛 (且为正项级数), } \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0.$$

$$\text{又} \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_n + v_n)^2}{(u_n + v_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0$$

由比较审敛法极限形式知， $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 也收敛。

法二： $\because \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛， $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0$ 。

即 $\exists N > 0$ ，当 $n \geq N$ 时，有 $u_n + v_n < 1$ 。

从而 $(u_n + v_n)^2 < u_n + v_n$ ($n \geq N$)。

由比较审敛法知， $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛。