

4
500042
CARE AND FEEDING OF

INFANTS AND CHILDREN

育
兒
指
南

醫學博士史安納編著

育兒指南

第二版增訂

中華醫學會編譯部出版

序

國家之盛衰，根於民族之強弱，而個體之得以健全無病克臻上壽者，要非洞曉夫養生之法不可。雖然，當呱呱墮地之時，飢不知食，寒不知衣，疾病不知醫治；保抱提攜，悉出人手，此時一切未來之幸福，皆仰託於母氏之手。使母氏而具醫學常識，則不難使嬰兒躋於康健之途，否則飲食失調，寒暖失時，致疾病叢生，而夭折隨之，顧不大可畏哉！

年來中國關於育嬰之書籍，善本殊不數觀，鄙人因本十餘年來之經驗，並參攷西國之書籍，用問答體而編爲此書，世之一般爲母者，苟能循此以撫育其嬰兒，吾知夭折之慘，當可減矣。

本書之譯事得華西大學盧宅仁醫師之力非尠；書成之後，復經魯德馨及舒舍予二君爲之飾文訂正；而侯寶璋醫師，余劉蘭華夫人，及李丕光醫師，陳淑娥醫師等均有極佳之貢獻，茲當出版之期，用綴一言以誌謝忱。

編 著 者

再 版 弁 言

本書從前年出版以後，到現今已經銷盡，購閱的人還是絡繹不絕，足見這本書自有牠的真價值，方纔能夠博得一般讀者的歡迎。現在同人們又把牠從頭到底，細細整理一遍，並且加進許多新的材料，特如小兒理智的發育，以及可用的菜蔬，種種食物表，撫育各期嬰兒的日程，和指導小兒的方法等，都是新增補的。這多是史安納博士十數年來臨症的新經驗，實在是非常寶貴。以前圖表所列全用英制，這次附加或改爲萬國新制，檢查的時候，又可得到不少的便利。近年來我國政府正在竭力提倡保嬰事業，我想這本書必有一些的幫助吧！

民國二十五年一月中華醫學會編譯部魯德馨

EDITORIAL PREFACE

For many years the Council on Publication has published a translation of Dr. Holt's "Care and Feeding of Children." This book contained much valuable information, but being based on conditions of life as seen in the West, did not adequately meet the needs of China.

The present book has been prepared with special reference to the facilities that exist in China for meeting the needs of children: some Western methods have been omitted, and other matters specially applicable to the East are included. It has been compiled by Dr. A. V. Scott who has had much experience in child welfare in China and has embodied in the present book the results of that experience.

The Council is very grateful to her for all the trouble she has taken in compiling the book, and to the various collaborators who have clothed her ideas in fitting language.

The book is now issued in the confident hope that it will be of great value to Chinese mothers.

On behalf of the Council,

P. L. McALL.

Tsinan, March, 1932.

育兒金箴

嬰兒所需，無論貧富貴賤，均爲一律，其要點只八，且簡而易行。

- (1) 有規則之養生法。
- (2) 合宜之食物及飲料。
- (3) 新鮮空氣。
- (4) 充足之休息及睡眠。
- (5) 飲食，衣服，環境之清潔。
- (6) 身體溫暖之調護。
- (7) 按期請醫師察體。
- (8) 慈母之愛心。

倘能奉行以上各條，則嬰兒受賜良多，將不至或缺而更有所需矣。

育兒指南目次

CONTENTS

頁數

平日照料小兒法 Daily Care of Infants and Childre \....	1
1. 小兒洗澡法 Bathing	1
2. 生殖器 Genital Organs	5
3. 眼 Eyes.....	6
4. 皮膚 Skin	6
5. 尿布 Napkins	7
6. 衣服 Clothing	9
7. 育兒室 Nursery	10
8. 新鮮空氣 Airing	12
9. 晒太陽 Sun	14
10. 睡眠 Sleep	15
11. 玩具 Toys	18
12. 運動 Exercise	20
13. 哭叫 Crying	21
14. 小兒的攜抱法 Lifting of Children	23
15. 微弱的小兒 Delicate Children	24
16. 接吻 Kissing	25
17. 壞習慣 Bad Habits	25

18. 不足月嬰兒的撫育法	Care of Premature Infants....	27
19. 處理小兒大小便的方法	Teaching Control of Rectum and Bladder	32
小兒身體與理智的發育	Growth and Development.....	35
1. 體重	Weight	35
2. 前囟門之閉合	Closing of Anterior Fontanel.....	44
3. 行動	Walking	45
4. 理智的發育	Development.....	46
5. 說話	Talking	49
6. 計算小孩確實的年歲	Estimating True Age of a Child	49
7. 出牙	Teeth	52
嬰孩養育法	Feeding Infants and Children.....	54
1. 哺乳	Breast Feeding	54
2. 每日哺育的程序	Order for Feeding	55
3. 斷乳	Weaning	63
4. 僱乳母	Wet Nurse	65
5. 人工養育法	Artificial Feeding	66
(甲) 新鮮乳	Fresh Milk	67
(乙) 改善牛乳法	Modification of Cow's Milk.....	70
(丙) 蛋白質乳	Protein Milk	76
(丁) 發酵乳	Acid Milk	77
6. 康健嬰兒的食物	Feeding for Healthy Children....	78

7. 家中預備牛乳飼兒法	Equipment for Artificial Feeding at Home	83
8. 哺育小兒的方法	How to Feed the Infant	85
9. 新鮮牛乳代替品	Substitutes for Fresh Milk	88
(甲) 乾乳粉	Dry Milk	88
(乙) 配賣的嬰兒食物	Proprietary Infant Foods	88
(丙) 罐頭乳 (煉乳)	Condensed Milk	89
10. 健康習慣的訓練	Healthful Food Habits	90
11. 小孩食物的成分	Food Components for Children	93
12. 所吃的蔬菜	Vegetables	99
13. 雞蛋做法	Egg	101
14. 第二年小兒飼養法	Second Year Feeding	102
15. 嬰兒及小兒的食物表	Diets for Infants and Children	104
小兒之疾病	Diseases in Children	108
1. 預防疾病法	Prevention of Disease	108
2. 食物在某種病狀或情形下當有的改變	Changes in Food Required by Special Symptoms	109
3. 嘔吐	Vomiting	110
4. 腸胃充氣和腹絞痛	Gas Flatulence and Colic	111
5. 嬰孩溫度	Temperature	112
6. 小兒平常易受的意外損傷	Common Accidents of Childhood	113

7. 小兒耳鼻喉部常見的病 Diseases of the Ear, Nose, and Throat	114
8. 小兒大便稀次數多的病 Diarrhea	119
9. 小兒之梅毒和淋病 Syphilis, Gonorrhea in Children	121
10. 疝氣 (赫尼亞) Hernia	123
11. 抽風 Convulsions	125
12. 外物入竅 Foreign Bodies	126
13. 貧血 Anemia	127
14. 初生小兒七日風 Tetanus in New Born	129
15. 嬰孩常見之接觸傳染病 Contagious Diseases	130
(甲) 百日咳 Pertussis	131
(乙) 麻疹 Measles	132
(丙) 猩紅熱 Scarlet Fever	132
(丁) 水痘 Chicken-pox	133
(戊) 白喉病 Diphtheria	133
(己) 嬰孩癱瘓病 Infantile Paralysis	133
(庚) 天花 Smallpox	134
(辛) 流行性腮腺炎 Mumps	135
16. 傳染病之免疫法 Immunization Against Contagious Diseases	136
17. 指導小兒的方法 Child Guidance	138

平日照料小兒法

Daily Care of Infants and Children

小兒洗澡法 Bathing

給小兒洗澡當用什麼肥皂？

不應當用鹼性太大的肥皂，因為這樣的肥皂，能使小兒的皮膚發乾，容易皸裂，凡肥皂香味濃的，或有顏色的，是表示鹼性很大，最好的是白色鹼性小的肥皂。

給小兒洗澡當用什麼樣的巾布？

當用軟潔淨布，最好用兩塊；一塊單用為洗頭，一塊用為洗肢體。

用海綿作洗澡物有何妨礙？

因為海綿不能煮，裏面容易發生細菌，使小兒的眼，口，皮膚等受病。

給小兒洗澡的要點是什麼？

洗澡當在吃奶後一點鐘，母親先將手洗淨，再看自己身上有無針，免得刺傷小兒，屋子要暖和，初生兒，七十五度為宜，不可使屋子太熱，免得小兒出別的屋子裏受了涼，並且洗臉的時候，貼身衣服仍須穿着，用軟布擦乾淨後，把小兒放在大腿上仰臥，

(南)

使小兒仰臥的緣故，就是免肥皂水流入眼內，頭在右邊，水盆也在右邊，然後用肥皂塗在軟布上，蘸上水，擦小兒的頭部，除臉以外，完全擦淨，然後再蘸水，把肥皂洗掉，如此三四次，就可用

軟布手巾，把頭輕輕擦乾，再把小兒的頭轉到左邊，母親就容易用右手洗小兒的身體和四肢了。洗時把小兒的衣服都脫去，用手巾塗上肥皂，擦全體後，舉起小孩，把頭托在母親左腕當中，左手掌托着小兒的左臂，右手拿着小兒的兩腿，速把小兒全身浸在水內（頭在外），此時可用右手洗小兒的身體，洗完再照前式，



圖 1. 小孩洗澡法

先在小孩身上擦上肥皂，預備洗澡，放入盆內時，用兩手上下托持，方不致小孩滑掉。



圖 2. 在水內洗澡要快，因水之溫度須要正在華氏表九十五至一百度，小孩方不致受寒。

將小兒托出，用軟手巾輕輕擦乾。

較大的小兒洗澡在什麼時間最合適？

頂好在晚上臨睡的時候，用溫水洗，第二天早晨要在暖和屋子裏，用涼水洗小兒的脖子和胸部，免得小兒傷風，最少每禮拜洗兩次。

初生小兒什麼時候才能放到盆內洗澡？

在臍帶落後，腹臍乾時，和種牛痘痂落後為合宜時期。

初生的小兒洗澡之水以溫度多少為合宜？

在法倫表九十八度至一百度。



圖 3. 洗完臉後，再洗頭髮，先擦肥皂，然後趕快洗完。



圖 4. 洗澡後擦油法

嬰兒洗澡完畢後，快趕擦乾，再用橄欖油或他種合用的油擦在嬰兒周身有皺摺之處。

或百度表三十六・八至三十七・八度,若無溫度表,母親可用自己前臂內側(肘下內面)試一試,以不冷不熱爲合宜。小兒在盆內時,切不可加熱水;在洗前或洗時,不可將澡盆放在爐子上,以免燙傷小兒。

在什麼景況小兒不當在盆內洗澡?

在初生軟弱的小兒,怕他受累或受涼,又有急性病時,當問明醫生,因有的皮膚病,用水洗澡後易受涼,反能使病加重。

在什麼時候不用水,可用溫熱油類(橄欖油或精製棉子油,蔴油,花生油)給小兒擦洗?

初生小兒是軟弱的,當天天用溫油擦他全身,大孩子若因滋養很不良,身體軟弱,也當用溫油擦他的全身,以代水浴。若某處有濕疹,亦可用油擦洗。

涼水洗澡當如何應用?

屋子要暖和,最好教小孩站在溫水盆內,用毛巾蘸涼水(法倫表五十至六十)擦其脖子和胸,屢擦屢蘸水,擦兩三次後,用乾布一塊擦其皮膚直至發紅。若爲三歲健壯的小孩,擦時倘見嘴唇發紫,身不舒適,千萬不可再用。三歲以上的壯健小孩可用此法。

公共的洗澡房有何危險?

公共洗澡房的毛巾能傳染數種病如淋病,腳氣,疥,癬,疥等,所以每一家庭要有自己洗澡房,不可借用朋友

的澡房與商家的澡塘。

生 殖 器 Genital Organs

女小孩生殖器的潔淨法爲何？

最好用新鮮的吸水棉花，調溫水，每日至少一次仔細洗之。倘有流液發現，應當請醫生診治。最當留意的，就是無論何時，都要預防傳染。因多種傳染病，常由於不潔淨的尿布所致。

男小孩生殖器的潔淨法爲何？

在嬰兒和小孩的初期，每星期至少須洗澡兩次，洗時用手將其陰莖包皮向後推起，完全翻轉，然後用吸水棉花和水，輕洗所露的部分，迨潔淨後，再回復之。倘包皮粘連太緊不易推起，宜請醫生診治，母或乳母，切不可用力勉強推起。

何時最宜行包皮截除術？

凡包皮過長或太緊，非用力不能將其推起洗淨裏面者，這樣宜行包皮截除術。但平常對於此等情形，大都延遲到局部發生激刺，或排尿困難時，父母方纔著急醫治，實不如及早截除爲好。

眼 Eyes

如何潔淨嬰兒的眼？

用一細綢，或吸水棉花，蘸溫開水洗之。

設眼發炎流膿，應如何處理？

眼發炎應於每日三次用溫開水洗眼。倘眼瞼粘連太緊，可在每次洗完後塗少許蒸過的凡士林（vaselin）於瞼邊上。若病輕微，如是即可制止，不致為害。倘眼有流膿，宜速請醫生診治，不然恐致瞎眼。

小孩有否視力不佳？

也是有的，所以在小孩入學校以前應當檢查其視力是否正常。

皮膚 Skin

嬰兒的皮膚應如何保護免受擦傷？

（一）洗身的肥皂不可多用，亦勿用含鹼性或藥性過烈的。（二）細心洗濯。（三）當洗時及洗後，不可用力揉擦。（四）保護皮膚的皺摺處；如腋窩，腹股溝，耳後，頸部等處。倘在極肥胖的嬰兒，更當留意，保護之法，為在此皺摺處之皮膚，洗後應十分拭乾，後擦上乾淨的橄欖油。

或棉子油皆可。倘皮膚過敏，並易受擦傷，宜立時停止用肥皂洗濯。

小兒的臀部應如何護理？

臀部為身體最易受擦傷的部位，因此處常常受濕和染污，所以尿布一濕或染污，宜立即換洗，臀處總要保持潔淨，並塗以油。

倘臀部已被擦傷應如何護理？

已擦傷的地方，不可用肥皂水洗，當用溫開水洗濯，然後塗以橄欖油或棉子油，若天氣不冷，母親當抱小孩直接在太陽下晒臀部半點鐘，便可令其速愈。

何為痱子，並何以生痱子？

痱子是從皮膚發生的一種小紅粒，常由於出汗過多，皮膚受激刺所致。

痱子的治法為何？

貼身的衣服，宜用輕細的綢子，倘用大人的舊綢子衣服改做最佳。宜用醋，水等合成的浴水，以軟巾蘸擦皮膚，拭乾後，再用棉花蘸硼酸混合液擦抹一次。

尿 布 Napkins

何樣布可做尿布？

以軟而堅實不帶顏色者為最適用。

尿布應如何處理？

尿布浸濕或染污後，應立刻更換，移出育兒室，放入有嚴密蓋子的桶內，當有暇時，隨即洗潔。

浸濕的尿布，可以晒乾即作第二次用麼？

不可用；最好每次要換洗潔淨的尿布，倘若潔淨的尿布又浸濕或染污後，立刻就再換潔淨的，這樣對於皮膚的健康很有關係。



圖5. 小孩四方尿布

小孩兜四方尿布比兜三角尿布方便，因不致拘束腿之活動。尿布為長方形以便疊上時成四方式。



圖6. 兜四方尿布法

先兜在小孩兩腿當中，兩邊的後角壓在前角上，用扣針扣於小衣之上；左右一樣，再在膝關節上用針扣住。

關於潔洗尿布，應當知道的要點是什麼？

染污的尿布，不可任之使乾，應立刻稍為搓洗，再浸

在平常水內,到有空暇的時候洗之;但每日必須洗一次。洗法:先用熱肥皂水洗,並且至少須煮沸十五分鐘,後用清水洗潔,以免激刺皮膚,最後熨之。尿布未全乾時,萬不可用。

小孩穿衣之要點 Clothing

何種衣服對於小孩合適?

第一要鬆要輕,使小孩能隨便活動身體,凡是有橫綁帶子的衣服均不可用,當處處用扣子。

小孩衣服質料何種最爲適用?

質料要以輕軟堅固而不退色者,若在冬季以毛織者爲佳。

衣服件數須多少方爲合適?

件數多少,是按着天氣和地方而定規,若天氣冷,須穿從頸長至足的衣服,使全體溫暖一致。襪筒要高過膝關節方好,雖在冷天亦不可穿的太多,因動作時出汗就易得到傷風,若爲軟弱小孩,所穿的衣服須較強壯小孩多些。天氣熱時,衣服當少。氣候不正時,當時時小心,以免受涼。

小孩戴帽子何種最爲合適?

夏日在太陽下,當戴輕草帽或布帽,並須有遮眼的。

冬日常戴絨帽,並能遮蓋耳的爲合適。若在室內則不戴帽子,因室內溫度高,易令頭出汗。

何種襪子最爲合適?

第一,襪子要大小合適,穿鞋時無有縐摺處,並須要煖且軟的。有的小孩腳易出汗,常有臭味,當每日洗腳並換襪子。若在夏天最好只穿鞋,不穿襪子。

何種鞋最爲合適?

小孩所穿之鞋最要使其順腳。做法:令小孩站在白紙上,畫下腳的樣子,照樣做鞋;尺寸要比樣子加長一寸,加寬四分之一寸。鞋尖要寬,不可使腳趾並疊。

鞋的質料?

無論布鞋或皮鞋,所有質料均以柔軟者爲佳。鞋底亦要柔軟,不可太硬;切不可用膠皮布做鞋底,免多出汗。小孩之鞋務必使足趾能隨便活動。




圖 7. 鞋底與足底的比例

育 兒 室 Nursery

怎樣方能算爲良好的育兒室?

設備宜簡單，不需要的窗簾和陳設的物品，應當除去。育兒室宜擇寬敞，空氣流通，日光充足的地方。這是因爲在一歲內的小兒，平均至少有四分之三的時間居此室內的緣故。窗面宜裝置能遮日光的簾幕，不必另加他種窗簾。兒牀除可洗濯的物件外，不可另放別物。室內的空氣，宜保持十分新鮮和純潔，不可懸晾濕尿布，烹煮食物，和燃點氣燈；只點洋燭已夠各種的需要了。

如何使育兒室溫暖？

最好用火爐，或電熱器，若大城內的熱氣管則較劣。但此又較好於熱蒸氣管。氣油比較更壞，切不可用。惟在萬不得已的時候，只可在早上沐浴時，用數分鐘罷了。

用鐵爐子與煤氣管子煖育兒室有何危險？

最可怕的就是煤氣，不但怕忽然漏出許多煤氣致小兒速死，就是慢慢漏出一點，也能使小兒中毒，故切要防備。至於所用的爐子無論何樣，要有煙筒的爲佳，煙筒的擋火門不可關嚴，即添煤時也要洞開。若是煤氣管子到不用的時候，要把螺絲門關緊，萬不可令一點煤氣漏出爲要。

育兒室內的溫度，在白天應爲若干度？

最好的溫度，是華氏表六十四至六十八度，但不可高過七十度。溫度計宜懸於離地板三尺高處。

夜間溫度應須多少？

在小兒生後二月或三月內，不可低過華氏表六十五度以下，三月後，可低至五十五度，一歲後可低至五十，甚或低至四十五度。

在育兒室內的窗戶，小孩生後若干時，方可以在夜間敞開無礙？

平常在三月以後，就可敞開，但室外溫度若低至冰點以下，則爲例外。

新鮮空氣對嬰孩之關係及得新鮮空氣之方法

Airing

嬰孩何以必需新鮮空氣？

因空氣能幫助發生新血細胞，使血清潔，若欲小孩身體發育完全，必須有新鮮空氣。

初生小孩何時可出戶外？

在夏天生後一禮拜，秋天一個月，冬天三個月可出戶外，初生嬰兒必須天氣清和，才可出戶。

小孩在不能出戶時期可用什麼方法，叫他多得空氣？

在屋內給小孩穿著出門的衣服，大開窗門，使外面的空氣流入，小孩的牀不宜直接當風，用此方法只可一刻或半點鐘之久，一天一次或兩次。

用此法是否怕小孩傷風？

不怕傷風，在起首時用此方法片時，以後慢慢加長，如此非但不怕傷風，且可免得傷風。

小孩出戶外在何時為合適？

春秋兩季，從早十點到下午四點；夏天可從早七點到十一點，下午三點到六點，總之不要使嬰孩在天氣潮溼和烈日之下。

何種天氣不當使小孩出戶？

颶風及塵土飛揚或天冷地溼冰雪融化時，不可外出。若溫度到冰點，在四個月內的小孩，不得已出外要十分小心。不滿八月的小孩，寒暑表不到二十度（法倫表），不可出戶。

小孩在戶外時，當謹防何事？

不使風直吹其面，並要使其腳暖和。更不宜使太陽晒其眼睛。

小孩能否在戶外睡覺？



圖 8. 用毯子包小孩，令其睡時溫暖之法：小孩之衣服在後面開岔，睡覺時下身之衣分摺在兩旁，中間墊上墊子，免得潮濕衣服與被褥。

可以在戶外睡覺,但要小心,因睡時比醒時容易傷風,所以必須蓋的暖和;最好找一避風的地方,預備小牀或筐子,底下鋪上油布或厚紙,防備風從下面吹過。上面的被要輕且暖,並使腳常暖,頭常戴帽子。

小孩得鮮空氣在其身體上有何現象?

食慾好,消化好,面之兩頰有紅色,全身有活潑的現象。

若小孩容易傷風如何可以幫助他避免?

睡的屋子要光亮涼快,不易叫他出汗,所穿衣服不要太厚,免他出汗。每天早晨要用涼水(法倫表五十至六十度)洗他的脖子和前後胸。依法把小孩放在太陽裏晒。

嬰兒晒太陽有何好處?

嬰兒的皮膚直接受太陽晒可助(一)骨頭生長堅固,(二)防免佝僂病(骨軟病)。所以從生後第一個月起,就應當晒太陽。太陽應當每天都晒,並當在戶外或敞開窗戶的前面,須要使他的皮膚開始變成褐色,方能得益。

在冬季,晒太陽的最佳時間為上午十一點與下午三點之間。

在夏季,日光浴應在上午十點前及下午三點後,務要小心,不使皮膚灼傷。

晒小兒之法如何(五月到十月)?

開始晒時,應將兩足避開陽光,僅將兩手或臉面每日晒五鐘分。數日後將兩袖捲起晒其兩臂。以後將襪子捲下或脫去晒其兩腿。再後僅留尿布及襯衫放置日光中。再次並將其尿布除去。最後將嬰兒裸體放在日光下,開始晒五分鐘,以後漸延長到半點鐘,甚至一點鐘。

日光浴的時間及身體暴晒的面積,均須漸漸增加,直至身體漸變成褐色。

小兒睡眠問題 Sleep

小兒可與其母同眠否?

不宜與大人同眠,須另備一牀,使小兒睡眠。有時因為與母同眠,致被壓斃。有的與母同眠後成一種常要吮乳的習慣。小孩亦宜另牀而睡,因這樣纔可以預防各種傳染病。

小兒之牀當如何預備?

最小的用一筐子即可。若為小孩,宜備一簡單而容易乾淨的牀,且以蟲子不能寄生於內的為合適。

褥子不可太硬或太軟,蓋被宜輕暖,枕頭最好不用,

如用亦須薄的，不可太厚。

預備睡覺法。

小兒每天睡覺要有一定的時間，此事很關緊要，無論有何事故，亦不可妨礙其睡眠。

小兒睡時，室內須安靜，且光線不可太強。並宜飽食及洗淨，最好脫去白天衣服，穿上睡衣，最緊要的在小兒睡覺時腳須和暖，臨睡的時候，要一直放在牀上，令其舒適。不可放任何食物或膠皮




圖 9. 用筐子作小牀，內面斜鋪毯子，預備放小孩之用。



圖 10. 用筐子作小牀，將腳下的毯子角向上疊，兩旁的毯子角向前疊，頭上的毯子角作遮風之用。

乳頭於口內，亦無須拍打與搖動，千萬不可抱於懷中睡眠，因一放下小兒即醒，致養成不好的習慣。室內須空氣流通，惟不可直接吹向小兒搖牀。溫度須冷熱適宜，以法

倫表六十度爲標準。

小兒可在戶外睡眠否？

已滿二個月的小兒白天可在戶外睡眠，若遇天氣晴和時，可把小兒的牀移到外邊。母親要常小心看護，頭戴帽子，被子常蓋好，勿使蒼蠅落在小兒的臉及嘴上。

初生兒在二十四點鐘內常睡若干時？

除去吃乳與換衣服並洗澡的時間外，其餘的時間，均當睡眠。若欲小兒身體與精神發育完全，必須使其有充足睡覺時間。最合適的每天須睡二十至二十二小時。

六個月小兒每天應睡若干時？

每天須睡十六小時。

小兒幾歲時宜於午飯後睡眠？

至少須至四歲時，最好到七八歲，都令其午飯後睡覺。

大兒晚上睡覺常用若干時？

最少爲八小時，能有十至十二小時最好。

大孩睡覺有何要點？

晚飯宜吃易消化之食物，不可太多。睡前弗使之發生情感的衝動，比如看電影，或遊熱鬧地方，或給他何樣新奇的玩物。總而言之，作父母的要小兒發育好，斷不可把小兒當作自己的玩物，妨礙其睡覺的時間，實爲重要。

小兒不安靜睡覺是什麼原因？

小兒能安靜睡覺,表明他的身體舒適,且無疾病。個不安靜睡覺有數原因:

- (一) 有因飢餓,有因吃的過多,有因消化不良,有的因為在晚上母親給小兒吃乳三四次,常叫醒他,沒有長時間睡覺的習慣。
- (二) 因為不好的習慣與易於激惹的緣故,比如小兒一哭,其母即抱起,或在睡眠時,有何驚怕的事,令小兒聽見。
- (三) 身體不舒適,或冷或熱。
- (四) 呼吸不順適,或鼻與喉不通暢,倘然是這種情形,那末小兒常常爬起或跪下睡眠。
- (五) 身內有痛處,此等情形係忽然而醒,哭泣甚哀。
- (六) 小兒如有滋養不良時,睡覺亦不安靜。

小兒的玩具 Toys

未過兩歲的嬰兒他的玩具何者為合適?

只可用幾個木頭轆轤夾上一條木棍或幾個木球,小孩最喜歡玩,或一兩個匙子亦為好玩具。這樣玩具有大的,不能放在口內有嚥下的危險。(與紙作的貓狗不同,此種紙作玩具有掉下的油漆和紙片,容易令小孩吃在口內),並且沒有尖端能扎他的眼睛,快刃割他的皮

腐,所以此種玩具較店鋪買的還好。

小孩玩具有何應當注意的地方?

小孩的玩具掉在地上或地板上就能染污,所以須用能洗淨的玩具,若已染污,必要洗淨後再與小孩子玩。若此孩子的玩具,給與彼孩也必先洗乾淨,再與彼孩,免從口內傳染疾病。若係有病的孩子的玩具,切不可給別的孩子玩。

孩童的合適玩具。

小孩兩歲後漸次長大,他的玩具也漸次有改變,並且喜歡各種玩具,須自己能改作,自己能想法子玩方為合適。最好給小孩一種樣子,令小孩自己作何樣的玩藝,例如給小孩許多四方木塊,令他自己擺一小房或小牌樓等等。若遇夏天,當給小孩在院內找一涼爽地點鋪上潔淨的沙土,外面圍上木板,在其上玩耍。更有一要緊的法子,就是小孩的玩具玩畢後,要他自己知道把玩具收拾妥當,置於規定之所,此法要常常用大人指示,令其有此習慣。他的玩具,不要固定的,必須能夠拆開,也能合攏。並且小孩玩時,須要與他孩有合作的精神,不可多有嫉妒的思想。切記不可給以危險的玩具,如有薄邊快刃帶尖銳之物件,並不可給極小之物件以致容易嚥下。

運動 Exercise

運動對於嬰兒也甚重要麼？

重要與大小兒等。

如何能使嬰兒運動？

哭叫，手舞動，腳踢打等，都是嬰兒的運動。衣服不宜過緊以阻止此等運動。每日應至少二次，只穿汗衣和襪子，放在一暖屋內的牀上，任其自由運動肢體十五或二十分鐘。到稍大穿短衣時，應放在一厚毯子或絨被上，任其自由滾轉。育兒室內的方站欄，應三尺高，下墊被褥，最合宜於小兒運動之用。因為這樣小兒纔可以在內舞動其手足而不致傾跌。惟有照此進行，小兒的肌肉纔可得到合宜的發展。

對於大小兒的運動，有何重要事項應該知道？

應在空氣流通的地方運動。

穿衣宜薄。

小兒的身體瘦弱或微小，以及神經過敏，則運動的量或種類，應該留心規定。

關於一切競爭的運動，必須經醫生檢察後認為不致妨害他的心臟，方可允之加入。

哭 叫 Crying

哭叫在何時是有益的？

在新生的嬰兒，哭叫能使他的肺部擴張，並且每日須使之再三哭叫數分鐘，以使其肺十分擴張。

正當哭叫的時間，在小嬰兒每日應該有多少？
每日哭叫十五分鐘至三十分鐘不算多。

此種哭叫的性質為何？

聲宏而壯，哭叫時面色變紅，其實此哭叫，乃是非一種呼號的聲音；此為康健所必需，也是小兒的運動。

怎樣的哭叫為不正當？

哭叫太頻，其聲不宏壯，常是呻吟，或是傷哭，有時只是一種微弱的哀啼，這是不正當的哭叫。

致如此哭叫的最大原因為何？

由於痛，脾氣，飢餓，有病和惡習慣的緣故。

痛的哭叫為何？

宏大而尖，但不纏綿，同時面容皺縮，兩膝上屈和顯其他不安的狀態。

飢餓的哭叫為何？

此聲常纏綿不斷，含有煩躁不安的情狀，但是少有宏大的。

何爲鬧脾氣的哭？

聲音宏大，同時踢腳，或彎屈其體，並且勢很猛烈。

有病的哭叫爲何？

此類的哭叫多含有不安的情形，雖稍不如意即行哭叫，但多爲呻吟的。

溺愛或習慣的哭叫爲何？

此亦常見於小嬰兒，他的哭叫爲要搖動睡籃，想要抱起，有時要亮光，要假乳頭吮嘍，或是由於一種已成的習慣。

養成嬰兒哭叫習慣的原因爲何？

就是由於嬰兒哭叫要什麼，就給他什麼，這樣溺愛小兒，雖在性情良好的小兒，也將很快的養成哭叫的習慣。

如何能除去如此的習慣？

小兒哭叫要什麼絕對不理會他。

我們如何能知道小兒的哭是由於嬌養而成的？

小兒哭叫要什麼，得到後就立即止哭，奪去或扣留後立即再哭，這定是嬌養的哭叫。

小兒夜間哭叫應如何辦理？

先須檢察小兒是否安舒？察其裏衣起皺摺否？手足暖否？尿布溼污否？倘完全合宜，則小兒的哭是想叫抱起，抱起後就不再哭。倘小兒有習慣性的夜哭，須追求其他

的原因。

鬧脾氣習慣和嬌養的哭，應如何辦理？

可以任他哭叫不理，起始有哭至一小時的，在性暴的小兒，有哭至二或三小時的，至第二次再哭，少有延長過十或十五分鐘的，第三次就罕有再如是的，此種懲戒，不可冒昧施用，必須察明確實係嬌養所致方可。

小兒的腹疝(赫尼亞)是否由於哭叫所致？

在裹有腹帶的健康小兒，罕有因哭叫而致腹疝的，過了嬰兒時期後，就是不用腹帶，也少有如是的。

小兒的攜抱法 Lifting of Children

如何將小兒由牀上抱起？

先用右手握緊其腳下的衣服，然後將左手由背下伸上扶托其頭，如是將其由牀上抱起，臥於大人肱上。

這樣的抱起小兒有何益處？

此法使全背部都有扶托，且沒有不合宜的壓力壓制其胸或腹。若以左手環抱其胸，或以兩手合抱其腋，都能壓制胸部。

小兒至能行走時應如何扶持之？

可用手攜其兩臂，不可執其手腕。

如執其手或手腕有何害處？

可傷肘節或肩節。

微弱的小兒 Delicate Children

微弱的小兒是什麼意思？

就是表示小兒的生活力微弱，高度和體重都低於正常的小兒。生長速率最低，肌肉柔弱，抗病力小，並且無論得何病，都難以復原。如此的小兒，撫育很難；須要有恆心的努力，纔有成人的希望，否則必發生種種病症。

應如何撫育這樣的小兒？

食物應簡單而滋養豐富，並且小心看護如待嬰兒一般，不懈不怠的進行，一直到七或八歲。其習慣應有一定的準則，稍有差移，即可有危險的擾亂。每日應較他小兒多睡二或三點鐘，午間的睡覺，應延至九或十歲。最好於每週內使其在牀上完全休息一日。應多呼吸新鮮空氣，但不可寵愛常常抱起。運動應有限制，切不可過多。並應細心防備使不受麻疹和百日咳的傳染。

如此的小兒，有何機會改善，使之成人？

倘在幼時沒有染何病患，則其情形的改善，必與年歲並進。有些在七歲或八歲時，情形就起始見佳。有的必到青春期的纔改好。但是倘使調養合宜，到成人期身體一定能夠健強的。

接 吻 Kissing

與小兒接吻有何危險？

害處很大，結核病（俗名癆病），白喉，梅毒，以及他種最厲害的病，都可由接吻傳染，無論何人，與嬰兒口對口接吻，都應禁止。倘必欲表示愛好而不能不接吻時，可只吻嬰兒的額部，但亦越少越好。

壞 習 慣 Bad Habits

小兒通常的壞習慣為何？

嘔物件，咬指甲，吃穢物，牀上排尿，和手淫等。

嘔什麼物件？

常嘔拇指或他指，有時咬衣服或毯子，最常見的是嘔假乳頭。

此等習慣常在何時顯現？

此可發現於最早嬰兒期，若不設法制止，能夠延長到六或七歲。

嘔物件的習慣有害麼？

倘此習慣久不禁止，口或指可失正當的形狀，並常能激刺口部，致流口液和擾亂消化，也能因此使口生鵝

口瘡和受他種傳染。雖然嘔物件可使小兒略爲安靜，不顯怪僻的性情，但是他法很多，切不可試用此法；也不可因爲誘睡容小兒吸假乳頭；或在生牙或消化不好及顯煩燥不安時，用此法以使他安舒。

如何能制止小兒嘔物件？

在此第一應當知道的，就是小兒嘔指頭，並非由於食物不足的緣故，乃是一種習慣。制止的方法，應戴瞞指手套，或將兩手束縛於兩側。倘用此等法都無效，可用一硬薄板束於肘上，使其不能彎屈伸手入口。





圖 11. 繫上硬袖，免其嘔拇指。

小兒在幾歲時多咬指甲和食穢物？並應如何制止之？

這些習慣，多患於三歲以後的小兒，特別多見於神經過敏（即易發脾氣）的，不健康的小兒，有時見於以後將患神經重病的。倘小兒有此種習慣，應常注意用各法及早制止，食穢物是一種貪慾，見於完全正常的小兒很

少。

小兒幾歲，大概夜間可不致在牀上小便？

小兒到兩歲半後，倘大人睡時抱起使其小便，從此時起就可不致在牀上小便。有些小兒在兩歲時，就能自己管束，夜間不在牀上小便，但有些須到三歲後纔行。倘過三歲後仍在牀上小便，那便算是失常的了。

倘小兒常喜在牀上小便，應如何處理？

責罰用於三或四歲的小兒有時有效。特別有效的，就是對於故意懶起牀而在牀上小便的，但在較大的小兒，不如用勸告和勉勵的方法較為妥當。一切的嬰兒或小兒，應在午前給以多量的乳或水，午後四時以後，就不應給以任何液體物質。晚飯應為固體或半固體的食物。在晚間十時或十時左右，應使小兒小便。牀上小便的習慣好久不改，常由於貧血，生活不良，或由於尿中有激惹物質，或生殖器有病所致，若用上法不能制止時，應請醫生診治。

不足月嬰兒的撫育法 Premature Infants

撫育不足月的嬰兒，在什麼地方較好？

在嬰兒醫院內好，但欲撫育這樣纖弱的嬰兒使有正常的生長，真是一種難題；縱用醫學的方法進行，和有

經驗的護士護育,也不甚易。倘沒有嬰兒醫院,必須在家內撫育,應當嚴守以下的規則:

撫育不足月嬰兒的三大要點為何?

(一)應保持嬰兒的體溫,(二)飼育,(三)保護其不受傳染。

為何應保持其體溫?

因為不足月嬰兒的生熱力很小,若不用人工生熱法助之,其體溫必低落到正常以下。體溫低下,危險很大,因體溫正常和恆定,不但為生長所必需,亦為生命之所寄託。

應該在何時就起始用人工熱?

生產後就該用,先用熱絨毯接收嬰兒將其包好,隨即放入備有人工熱的小牀內。

如何用人工法加熱小牀?

小牀和布筐(有用筐作牀者)的周圍,應用布塞好,以免通風,加熱的法,就是用熱水袋或熱水瓶,電氣墊圍放在嬰兒的周圍。

用人工法加熱小牀,應當如何留心?

最當留心的,就是不可使嬰兒過熱,因不足月的嬰兒,受過熱的害處與受寒的害處相同。並且此等嬰兒易受燙傷,所以嬰兒不宜與熱物相近,須用數層毯子隔離,並放一溫度計貼近嬰兒,以溫度在華氏表八十至八十

五度之間爲度。

嬰兒室內的溫暖,應保持至何程度?

應約爲華氏表八十度,加此溫度之法,用電熱器最便。

保持溫度當用何種衣服?

全身應穿煖而軟的衣服,只露出面部。此等衣服可隔一日一換,外面包以一不常換的棉披衣,此可用紗布製成,中夾棉花。尿布可用紗墊或吸水棉花所做的。

不足月的嬰兒應如何沐浴?

不應用水沐浴,生後和每日,應全身塗棉子油或橄欖油(但不可用力擦油入皮)。

嬰兒的溫度,應每日考察幾次?

在起始數日內,應一日考察四次。如是方能確定所加之熱是否合度。因爲倘所加的熱不足,嬰兒體溫可低至華氏表九十五度以下,或較此更低,若加熱過多,可升高至華氏表一百零五度,或更高。所以應當盡力保持嬰兒體溫常在華氏表九十八度至一百度之間。倘高低的升降過大,他的發育必不能良好。當嬰兒溫度有恆定時,可以每八小時考體溫一次,因少攪擾嬰兒,則生長更好。

如何可使不足月的嬰兒呼吸新鮮空氣?

育兒房應至少每日一次徹底的換新鮮空氣。在此時應把嬰兒置於他室內,等到室溫保持至合宜之度時,

始可移回。

如何能使此等不足月的嬰兒得着運動？

應當留心不可捆束嬰兒的四肢太緊，因其得着運動，全在舞動此等肢體和叫號。最纖弱的嬰兒，不肯多動，故數小時後照例須要改換其睡臥位置，甚為重要。總之撫育嬰兒須使其能自己運動為要。

不足月嬰兒的最好食物為何？

母乳為一切嬰兒的最好食物，在不足月和纖弱的小兒，尤非人乳不能生存。

不足月嬰兒的母親，能否哺乳其嬰兒？

倘嬰兒只欠數星期就足月，他的母親常能哺乳。但不到八個月的，他的母親能乳哺的很少。嬰兒既非母乳不能生活，故應盡力幫助母乳多生乳。

有何法能使其母多生乳？

有一個方法，就是叫一個有力無病的小兒吮乳，因不足月的嬰兒，吮乳力很微，倘完全無乳，可用一有力的嬰兒由該母親哺乳，直到生乳足用為止。此法須多時方能成功。

倘用盡各法都不能使母多生乳，又當如何？

倘力有可能，就應雇一奶母。倘只需小量，可向有子的女友，商請供濟，或向數康健婦女買得乳亦可。

這樣的嬰兒常能自己吮乳嗎？

很少,可用他數種方法哺之。

這幾種方法爲何?

可用布氏哺器, (Breck feeder) 或用滴藥管哺之。在最纖弱的嬰兒,不但不能吮乳也不能嚙乳時,就可用灌食法哺之。

布氏哺器的形狀及用法如何?

係一可容一或二兩乳的玻管,一端附有小乳頭,他端裝有橡皮球的,嬰兒含着乳頭後,哺乳者輕壓橡皮球以助之吸入。

何時宜用此種哺器?

凡一切無力吮乳或不能吮足乳的嬰兒,都嘗試用此等哺器。

何時宜用滴藥管?

若必須用此法時,必要請醫師或護士幫助。

一個未足月的嬰兒,需要多少食物?

二十四小時內所需的乳量,列表於下:

小兒體重的磅數	每日所需乳量的兩數			
體重	一至第三日	四至第七日	八至第十四日	十五日後
二磅	二兩	三兩半	五兩	六兩半
三磅	三兩	五兩	七兩半	十兩
四磅	四兩	七兩	十兩	十三兩
五磅	五兩	九兩	十二兩	十六兩
六磅	六兩	十兩半	十五兩	十九兩半

每日須喂幾次？

每日喂乳的次數，不及在二十四小時內用乳總量的重要。有許多嬰兒，在二十四小時內只吮乳六次（每四小時一次），生長甚好，在有些體力能夠吸乳的嬰兒，一日中喂乳的次數可稍加增。當此等嬰兒哺乳時，不要移動；到能自吮乳時，方可將其從小牀上抱起哺乳。

倘體重不增加應如何辦理？

倘不足月的嬰兒體重漸減是很有危險，但是不足月的嬰兒在第二或第三星期前少有增加體重的。

倘滿一月時體重仍不增加，可增加其乳量較表上程式稍微高些，也可不改動程式而加糖於人乳內。五兩人乳中可加蔗糖一或二平茶匙。

處理小兒大小便的方法

Teaching Control of Rectum and Bladder

初生小兒每日應有幾次大便？

第一星期內每天應有二三次，以後一二次。如係無病的小兒，每日當有大便一次。有時無病的小兒，每天大便三次；可是次數的多少，並不十分緊要，最要的就是要檢查大便的顏色和形狀，有不正常的情形否。

一個無病的乳嬰,其大便的形狀若何?

色黃,不乾不濕,不成塊,似濃油膏的樣子。

小兒大便有時爲什麼帶黑色?

若小兒吃鐵類或鉍類的藥,或在鼻咽部塗銀類藥,均能使其大便變黑,若是未曾用藥,大便變黑,即表示腸內或有重病。

嬰兒何時方能有按時排泄的習慣?

倘乳母留心照管,三個月後,即養成按時大便的習慣。

用何法養成此習慣?

每天須擇一定之時間令小兒大便。

用何法令其大便有一定的時候?

從頭一月起,即按着時候,使其大便,不要怕費工夫。若乳母能多用時間養成此種習慣,不但小兒身體健壯,並且關係他的一生,大便最合適時間,是在早晨第一次吃乳後,使小兒按時大便有數法,母親可用一便盆放在腿上,使小兒之背靠於母腹,坐在盆上,等幾分鐘看有大便否,倘無大便,可用一小條白肥皂塞入肛門內。這樣辦法,大多數小兒就能快排泄,倘照此法管理,數日後,雖不用肥皂,一坐在盆上就能大便。

用何法使小兒按時小便?

管理小便比大便難,但是亦能養成習慣,法用一小

盆擱在母親腿上,起初每一點鐘使其排尿一次,最好用一種東西,或搖鈴等,教小兒看見或聽見時就知道要排尿。或小兒自己作何狀態,母親一見就知道他要排尿,這樣法子最好。又一法,小兒的單褲子不要開襠,若小便排出後其褲即溼,小兒覺冷溼不舒服,以後一有小便,即要表示一種狀態,祇要母親留心看護,就可得其訣竅。

有何法能防小孩臀(屁股)和會陰部發炎?

每於小兒大便後,須用溫水洗之,用軟布輕輕拭乾,若已發炎,拭乾後塗一點凡士林油或橄欖油最好。

小兒身體與理智的發育

Growth and Development

體 重 Weight

爲何須知道小孩的體重？

因爲按着體重，我們可以規定小孩的發育及滋養如何。

小孩應當按着何種次序給他過磅？

在前六個月，每禮拜過磅一次，後六個月，每兩禮拜一次，第二年每月一次，第二年以後，每六個月一次。

小孩第一年的體重，是按何種次序增加？

第一禮拜或失去體重四至八兩，若奶多並且小孩無病，則以後六個月中，每禮拜可增四至八兩。從六個月到十二個月，每禮拜可增二至四兩。

頭一年，小孩無病，乳足用，是否應當每禮拜加增體重？

多半是，但有的小孩從第七到第十月出牙之時，或天氣熱時，體重不甚加增。

小孩肥胖是否可以表明他無病，且滋養完全？

不定，每個胖的小孩，多是無病，滋養完全，有時小孩

因多吃糖和粥,少吃牛乳鷄子等,身體雖胖,但無力量。

大孩體重增加的次序,是否與小兒的次序一樣要緊?

小孩一年以後,體重加增的次序,與嬰孩不同,有的與天氣有關係,有的關係不十分明瞭。平均說起來,少有直線式的加增。

小兒各年齡的體重,有無一定的標準?

沒有,就是同年齡的小兒,他的體重和高度也相差很大,這個對於種族和血統很有關係。

高度相同的小兒,是否體重也有一定?

是的,大概相同。雖因血統和種族的不同,相差也少許,故此可作小兒營養狀況的指示。

但是,年歲對於體重也不能忽略,比方有年齡不同的小兒,而有相等的高度,但年齡大的小兒的體重,必大於年齡較小的。

表上所列的是平均數,到底在何相差限度內,就算是正常,而屬於健康範圍?

沒有絕對的界限,大概可說,凡小兒的高度低於表上所列同年歲的平均數百分之十或更多的,其營養便算為失常。

也有許多小兒,其體重和高度雖未低至表上所列同年歲和高度平均數的百分之十,也算失常,并須細心

的撫育。

凡常低於體重和高度平均數的小兒,大概由於遺傳性的瘦弱;也或者由於過多運動或食物不合適所致,如此的小兒,應至少一年完全檢查身體兩次,並常常留心其是否健康,因他們很易顯神經病狀,或易得別的重病。

是否小兒的高度對於體重要有合宜的比例,方算是正當?

有些小兒,不但因某種原因阻礙他的發育,也能阻礙體重的增加,所以這樣的小兒,雖然他的體重對於高度合宜,但二者相較之標準則很低,就不能視為正當,倘體重太高於標準數(高過百分之二十或更多),也難算為正當,雖然過重或者不似不夠重的那麼要緊,但也甚重要,不可忽略。

除了體重較比高度應有的標準體重過低,表示營養不足外,還有別事能表示此否?

凡小兒不能得着體重常態的增加,也是表示營養不足,無論何時,此且較體重低於高度的標準體重更為重要。

按照小孩的年歲,有一定的身體高矮與體重嗎?

按着小孩的年歲,看他的高矮,體重,在幾千小兒的

[illegible]

入學後的高度體重表(以年歲計)男孩

高米 度數	高有 度延 應數	5 歲	6 歲	7 歲	8 歲	9 歲	10 歲	11 歲	12 歲	13 歲	14 歲	15 歲	16 歲	17 歲	18 歲	19 歲
1.102	15.42	15.42	15.42													
1.131	15.88	15.88	15.88													
1.160	16.33	16.33	16.33													
1.189	17.24	17.24	17.24	17.24												
1.218	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69											
1.247	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60											
1.276	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96											
1.305	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86										
1.334	21.77	21.77	21.77	21.77	21.77	21.77										
1.363	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68									
1.392	24.04		23.59	24.04	24.04	24.04	24.04									
1.421	24.95		24.95	24.95	24.95	24.95	24.95	24.95								
1.450	26.31		25.85	26.31	26.31	26.31	26.31	26.31	26.31							
1.479	27.67			27.67	27.67	27.67	27.67	27.67	27.67							
1.508	29.03			28.58	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03						
1.537	30.84			29.94	30.39	30.39	30.39	30.39	30.84	30.84						
1.566	32.20				31.75	31.75	31.75	31.75	32.20	32.20	32.66					
1.595	33.57				32.66	32.66	33.11	33.11	33.57	33.57	33.57					
1.624	35.38				34.02	34.47	34.93	34.93	34.93	35.38	35.38	36.29				
1.653	37.19					35.83	36.29	36.74	36.74	37.19	37.65	37.65				
1.682	38.56					37.65	38.10	38.56	38.56	39.01	39.46	39.46				
1.711	40.37						39.46	39.92	40.37	40.37	40.82	40.82	40.82			
1.740	42.64						41.28	41.73	41.73	42.18	42.64	43.09	43.54			
1.769	44.90							43.09	43.51	44.00	44.91	45.36	46.72	48.08		
1.798	47.17							45.36	45.81	46.27	46.72	47.17	48.53	50.35	52.62	
1.827	50.35							47.63	48.08	48.53	48.99	49.90	51.26	53.52	55.79	57.61
1.856	53.07								49.44	50.35	51.26	52.16	53.07	54.88	57.15	58.97
1.885	55.79								51.71	53.07	53.52	54.43	55.34	57.61	59.42	60.78
1.914	58.51									53.98	55.34	56.70	58.06	59.87	61.69	63.05
1.943	60.33									56.25	58.06	58.97	60.78	61.69	63.05	64.41
1.972	63.05										60.78	60.78	62.14	63.96	64.86	66.68
2.001	65.32										62.14	63.05	64.86	66.22	67.59	68.95
2.030	66.68										64.86	65.32	65.77	67.13	68.49	70.31
2.059	68.95										67.13	68.04	68.49	68.95	69.85	72.12
2.088	71.21											69.40	70.31	70.76	71.67	73.94
2.117	73.94											71.21	72.58	73.48	74.39	75.75
2.146	76.66											73.94	75.31	76.20	77.11	80.00

女 孩

高米 度數	高有 度妊 應數	5 歲	6 歲	7 歲	8 歲	9 歲	10 歲	11 歲	12 歲	13 歲	14 歲	15 歲	16 歲	17 歲	18 歲
1.102	14.97	14.97	14.97												
1.131	15.42	15.42	15.42												
1.160	16.33	16.33	16.33	16.33											
1.189	16.78	16.78	16.78	16.78											
1.218	17.69	17.69	17.69	17.69											
1.247	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60										
1.276	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05										
1.305	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41									
1.334	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.77	21.77								
1.363	22.68	22.23	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68							
1.392	23.59		23.59	23.59	23.59	23.59	23.59	24.01	24.01						
1.421	24.95		24.49	24.49	24.95	24.95	25.40	25.40							
1.450	26.31		25.40	25.40	25.85	26.31	26.76	27.67	28.12						
1.479	27.67			26.76	27.22	27.67	27.67	28.58	29.48						
1.508	29.03			28.58	29.03	29.03	29.03	29.48	30.39						
1.537	30.84			29.94	30.39	30.39	30.84	30.84	31.30	32.20					
1.566	32.20				31.30	31.75	31.75	32.20	32.20	33.11					
1.595	34.02				32.66	33.57	33.57	33.57	34.02	34.93	35.38				
1.624	35.83					34.47	35.38	35.38	35.83	36.74	37.65				
1.653	38.10					36.29	37.19	37.19	37.19	38.10	39.92	41.73			
1.682	40.37						38.10	39.01	39.01	39.92	42.18	43.54	45.81		
1.711	43.09						39.46	40.82	40.82	41.73	43.54	45.36	46.72	47.17	
1.740	45.81						41.28	43.09	43.09	44.00	45.81	47.63	48.99	49.44	50.35
1.769	48.99							44.91	45.36	45.81	47.63	48.99	50.80	51.26	52.62
1.798	51.71							47.17	47.63	48.08	49.41	51.26	52.16	53.07	53.52
1.827	53.52								49.90	49.90	50.80	52.62	53.07	53.98	54.43
1.856	54.88								51.71	52.16	53.07	53.98	54.43	55.34	55.79
1.885	56.70								53.52	54.43	54.88	55.34	55.79	56.70	57.15
1.914	58.51									56.25	56.25	56.70	58.06	58.51	58.97
1.943	60.33									58.06	58.97	59.42	60.33	60.33	61.24
1.972	62.60									59.42	60.33	61.24	61.69	62.60	62.60
2.001	64.41										61.24	62.14	62.60	63.50	64.41
2.030	65.32										61.69	62.60	63.50	64.41	65.32
2.059	65.77										62.60	63.50	64.41	65.32	65.77

量小兒高度時，最小兒可平臥桌上量之，大小兒可直立貼牆量之。計算吋數，當按最近的吋數算，年歲當按接近他的生日算。

倘小兒的體重，沒有得着有規則的增加，爲父母者應否憂慮？

發育的小兒，應準期過磅，平常是每月一次，但在一年中每月體重的增加是少有準則的。有時一個健康的小兒，在二或三月中，其體重的增加只有少許，或全不增加；但繼此一期中，則增長甚速。這速增加期，常是在秋季。

若是在一長久期內不增不減，或是一個進行式的減輕，無論在何時都應當注意。一個健康小兒的體重的增加，在一年中是很有恆定的。

小兒長久的體重不足，其通常原因爲何？

此可由於軟弱父母的遺傳，而小兒體質纖弱所致；但最多的常由於別的原因，分言如下：

(一) 食物：或因量不足，或因食物的組成於小兒的年歲不合。

(二) 飲食的習慣不好：比如吃得太快，咀嚼不全，或飲食無定則。

(三) 過於活動：比如用力的遊戲或工作太多。

(四) 睡得晚：每日的休息時間太少，和睡的時間不足，此常由於過用腦力所致。

(五) 數種缺點：如牙有病，扁桃體增大，或腺樣增殖病。

(六) 在數種重病的初期：如結核病(又名癆病)和心病等，無論何種病源，必先除去後，方能使小兒發育優美。

營養不良，體重常低於常態，此等小兒常顯的通常病狀為何？

許多的此等小兒，神經過敏，容易疲倦，睡眠不好，煩躁，易哭，活動過甚，不能靜坐，在校讀書心難專純，食慾時衰時旺，常顯大便結燥，面色蒼白，顯貧血。

營養不良，是否對於小兒為一重要事項？

不欲子女將來有強壯的身體則已，如然，則營養不良，誠為一重大事件。故在小兒生長期內，負責任的人，應常注意子女的生長，務使在正常標準內。營養不良，不但能使小兒攻讀困難，且為許多重病如結核病築下基址。所以凡小兒體重不足甚大，或發育失常，為父母的便應常注意。

如何能制止或改正營養不良？

第一要緊的事，就是要恪守普通的健康規則，食物合宜，食量不過，睡眠充足，空氣新鮮，運動適度。此等衛生教育，不但父母須有十足的了解，也應訓練小兒成為習慣。衛生當局，學校教職員以及家屬人等，俱應合作到底。

一個十或十二歲營養很不良的小兒,有何種例行的規則應當採用?

在校內所讀的功課應減少。

急烈運動或遊戲的時間應縮短。

午前和午後應有一休息的時間。

如每日規定爲三餐,在兩餐之間,應進少許飲食,平常多爲飲乳。

睡眠的時間應增加,就寢的時刻不得遲過午後七鐘。

空氣流通,不但在夜間宜保持其十分新鮮,即在白日休息時間內也當一樣。

食物宜含最單純的養料,無須肥甘,兩餐之間不可食糖類食物。

應教小兒緩吃細嚼。

小孩的前凶門(腦門)當在何時閉合?

Closing of Anterior Fontanel

平均多在十八個月時閉合,少有在十四個月內閉合者,到二十四個月應當完全閉合。

行 動 Walking

小孩當在何時自己能將頭抬起？

多半在第四月或第三月時，若扶其背，便能將頭抬起。

小孩當在何時能發笑聲？

當在三至五個月。

小孩何時能手拿玩物，兩手相換？

從第五月到第七月。

小孩幾個月能自己坐起，幾個月能自己站起？

無病小孩，七八個月能坐起；九十個月能試用腿站立，十一十二個月，能手扶他物站起。

何時能走？

起首要走，當在十二或十三個月時，平均十五六個月方能自己行走。

有何種原因能令這幾種發育較晚？

未足月所生的，或生時身體軟弱，常得慢性病，特別是慢性消化不良和骨軟症。若心靈不足，各種發育就都較晚。

小孩不會走，可否用法催他快學行走？

不可，因小孩肌骨發育到能走的時期，自然要走，不

必催他。

嬰兒理智的發育

三個月的嬰兒已經知道的有何事件？

甲. 關於用他身體的事件：

(一)抱在肩上的時候能夠穩定抬起他的頭。

(二)能夠轉動他的身體，仰臥變成側臥。

(三)在俯臥時，能自行用兩臂支起他的身體。

乙. 關於言語的事件：

(一)見笑臉時亦現微笑。

(二)聽見作聲顯示愉快狀。

丙. 關於環境的事件：

(一)其眼能隨移動的物件轉動。

(二)頭能自由轉動，觀看人物。

(三)給以大紅圈，能作許多動作。

(四)仰臥時若注視他，可看出他對於環境感覺興趣。

丁. 對於人的事件：

(一)見場所改變，顯出驚異或其他覺知的狀態。

(二)聽見人聲或音樂就安靜。

(三)到喂奶的時候就高興，表示其記得，並且張嘴

期待。

(四)常常玩他的手指。

六個月上下的嬰兒能知道的什麼事件？

甲.運動的發育：

(一)倘放在合宜靠着的位置，不用扶持，能坐片時。

(二)手指能一同屈起握住物件。

(三)能兩手各執一方物片時。

乙.語言的發育：

(一)能發數種顯明的音節。

(二)能藉聲音表示其認識相熟之人。

(三)歡樂時，作歡呼或鵠鵠聲。

丙.關於適應的動作：

(一)能執取所見的物件。

(二)指桌上所置的小方塊能伸手拾取。

(三)能用目注視桌上所置的小圓物(小球)。

丁.個人社會的動作：

(一)敲匙或拍桌玩耍。

(二)知道生客與熟人的分別。

九個月的嬰兒知道的什麼事件？

甲.運動的發育：

(一)能獨自坐着。

(二)知道怎樣用手指拾取小塊物件。

(三)將其俯臥即欲爬動。

乙.語言的發育:

(一)能說答答或類似的聲音。

(二)顯示樂聽熟悉的語言。

丙.適應的動作:

(一)見板上有孔就想用木塊塞入。

(二)歡喜用線拖大的環子。

(三)隨便指點他就注意。

丁.個人社會的動作:

(一)開始參加育嬰室內有節律的遊戲。

(二)能搖手招呼,或類此的動作。

(三)能同時玩耍杯子木塊等物。

一歲小兒所知道的是何事件?

甲.運動的發育:

(一)能扶持行走。

(二)能由站立的姿勢自行伏下。

(三)能握住粉筆在紙上塗畫。

乙.語言的發育:

(一)能說二字的語言。

(二)能服從簡單的吩咐。

(三)能聽從吩咐把木塊放在杯中或杯上。

丙.適應的動作:

- (一)模仿簡單的動作。
- (二)能將圓塊放在板上的圓孔中。
- (三)能用繩子作出種種方法去拖一環。
- (四)用紙包住木塊他能找得。

丁. 個人社會的動作:

- (一)能自拿着杯子喝水。
- (二)簡單的行動能受制止。
- (三)所有的行為如見人喜笑他就再做。

從何時起小孩要說話 Talking

在第一年時,小孩當會叫爸爸媽媽或別樣單字的話,第二年末,當會說短句話。

第二年末,小孩若無說話的趨向,是何緣故?

若有耳聾或心靈不足,便無說話之趨向;不然,此時少有不說話的。

按中國小孩的虛歲,能否計算出確實的年歲?

Estimating True Age of a Child

能算出,在北平協和醫院有一位醫師 (Dr. P. H. Stevenson) 作成一表,小孩在舊歷那一月生,有幾歲即可

算出確實的年歲。

表的用法：

從小兒舊歷歲數，減去兩年，再按下表加上合適的年月，即為確實歲數。表左為舊歷，橫念；上為新歷，直念；到兩數相對，即為加上合適的年月。

Chinese month of Birth	Present foreign month (month of enquiry)											
	JAN.	FEB.	MAR.	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.
FIRST	1 yr. 11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.	1 yr. 5 mos.	1 yr. 6 mos.	1 yr. 7 mos.	1 yr. 8 mos.	1 yr. 9 mos.	1 yr. 10 mos.
SECOND	1 yr. 10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.	1 yr. 5 mos.	1 yr. 6 mos.	1 yr. 7 mos.	1 yr. 8 mos.	1 yr. 9 mos.
THIRD	1 yr. 9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.	1 yr. 5 mos.	1 yr. 6 mos.	1 yr. 7 mos.	1 yr. 8 mos.
FOURTH	1 yr. 8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.	1 yr. 5 mos.	1 yr. 6 mos.	1 yr. 7 mos.
FIFTH	1 yr. 7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.	1 yr. 5 mos.	1 yr. 6 mos.
SIXTH	1 yr. 6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.	1 yr. 5 mos.
SEVENTH	1 yr. 5 mos.	6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.	1 yr. 4 mos.
EIGHTH	1 yr. 4 mos.	5 mos.	6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.	1 yr. 3 mos.
NINTH	1 yr. 3 mos.	4 mos.	5 mos.	6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.	1 yr. 2 mos.
TENTH	1 yr. 2 mos.	3 mos.	4 mos.	5 mos.	6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.	1 yr. 1 mo.
ELEVENTH	1 yr. 1 mo.	2 mos.	3 mos.	4 mos.	5 mos.	6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.	1 yr.
TWELFTH	1 yr.	1 mo.	2 mos.	3 mos.	4 mos.	5 mos.	6 mos.	7 mos.	8 mos.	9 mos.	10 mos.	11 mos.

出 牙 Teeth.

乳牙的數目是多少？

二十。

何時生出？

下邊兩個中門牙，從第五至第九月，常先他齒生出。其次，則爲上四中門牙，在第八至十二月內生出。其他兩個下門牙，和四個前雙牙（前臼齒），則在第十二至第十八月生出。此後，則生四個犬牙，大概在第十八至第二十四個月生出。四後雙牙（又名臼齒）（總合此數就是二十個乳牙）生出於第二十四至三十月之間。

在第一年末的常態小兒須有六個牙。

在第一年半末，十二牙。

在第二年末，十六牙。

在第二年半末，二十牙。


生牙早遲不同的原因爲何？

有由於家族不同的關係；有些家族的小兒生牙最早，然在他家族，則又過遲。遲生牙的原因，或由於久病，或由於嬰兒骨軟病的原因。

生牙的時候，有甚麼普通症狀？

在健康的小兒，常顯煩燥，睡臥不甯，至二或三夜之

恒 齒



暫 齒

圖 12. 暫齒與恆齒之列式及出生時期。

暫 齒

1. 中央門齒,五至八個月長出
2. 兩側門齒,七至十個月長出
3. 第一對白齒,十二至十六月後長出
4. 犬齒,十四至二十月長出
5. 第二對白齒,二十至三十二月長出

恆 齒

6. 第一對白齒,五至七歲長出
1. 中央門齒,六歲半至八歲長出
2. 兩側門齒,七至九歲長出
4. 第一對前白齒,九至十一歲長出
5. 第二對前白齒,十至十二歲長出
3. 犬齒,十一至十二歲長出
7. 第二對白齒,十一歲半至十三歲長出
8. 第三對白齒,十六至二十一歲長出

(有終不出者)

久;並不斷的伸手指於口內,常流口涎和食慾不佳。有時稍顯發熱和腹瀉,現有不消化的食物於糞內。這些症狀,若在纖小的兒,則更加重。

這些症狀能延至多久?

平常,只是三或四天,但體重,可延至二或三星期久均無增加。

由出牙而發生其他許多症狀的原因為何?

大概所顯的許多症狀,全由於不合宜的飼育法,以致消化不良而起。

嬰孩養育法

Feeding Infants and Children

哺乳 Breast Feeding

爲什麼嬰兒當吃母乳？

因爲沒有別樣食物，能完全代替母乳。平均在第一年內，嬰兒死亡的數目，在食他種食物的要比食母乳的多三倍。

在什麼情形之下嬰兒不當食母乳？

若母親現在或從前有癆病，或其他慢性病，以致身體軟弱的，就不當哺乳，如定要哺乳，不但有害於自己的身體，並可將病症傳給孩子。

嬰孩生後四天之內，每日當哺乳幾次？

四五次，如母親覺着奶不夠，按次序給小孩乳吃，可以幫助母親多生乳汁；若有幾天乳不夠用，可以使嬰孩多喝開水，或醫師所介紹的人工奶。此外無論那一種食物，都不可給。

到什麼時候，母乳才夠嬰兒食用？

多半在第三天，有的在第五天，最晚不過十天。

在第一年內，小孩當按什麼次序哺乳？

嬰兒在初生六個月內每日的哺育程序如何？

上午六點至六點十五分	哺乳(約十至十五分鐘)。
六點十五分至八點	復放在牀上,讓他休息。
八點	在第一個月內給以開水一囑。第二個月以上開水中並加上兩茶匙至兩湯匙的橘子汁。
八點半	洗澡,在洗前,或洗後還未穿衣服時,喂以魚肝油少許。
九點至九點十五分	哺乳。
九點十五分至十二點	在小牀上睡眠,或抱到敞開的窗前或戶外,使晒陽光。
十二點至十二點十五分	哺乳。
下午十二點十五分至三點	把小兒放在戶外日光中晒若干時,看天氣冷熱而定(陽歷七八月晒小孩應當在上午十點前及下午三點後)。
三點至三點十五分	哺乳。
三點十五分至六點	睡眠,一部分的時間並應在戶外。
五點	使飲開水一囑。
	換上睡衣,放置小牀上,或鋪毯子的桌上,任他運動。
六點至六點十五分	哺乳。

六點十五分至十點 讓他獨自睡在牀上過夜。開窗，熄燈，蓋好，不叫風直射着他。

十點至十點十五分 哺乳。

每次喂乳後，把嬰兒抱起，搭放肩上，輕輕拍他的背，以便將或有吞入的空氣逼出。

在第二或第三個月，應開始訓練嬰兒教他在便盆上大便。

六個月的小孩每日哺育的程序如何？

上午六點至六點十五分 哺乳(十至十二分鐘)。

六點十五分至八點 讓他獨自在牀睡覺或玩耍。

八點 用匙喂開水一呷，橘汁或番茄汁二湯匙。

九點三十分 洗澡，在洗澡前或洗澡後尚未穿衣服時，喂魚肝油少許。

十點至十點三十分 喂以濾過之米湯，開始一茶匙漸加至一湯匙。哺乳(十至十二分鐘)。

十點三十分至下午兩點 在小牀睡覺，或抱到敞開的窗前或戶外使晒日光若干時(陽歷七八月直接晒太陽應在上午十點前和下午三點後)

下午兩點至兩點十五分 哺乳。

兩點十五分至五點 睡覺，一部分的時間應當在戶外。

五點至六點	用匙喂開水一囑。換上睡衣，使在鋪有毯子的牀上運動。
六點至六點十五分	喂濾過之米湯一茶匙至一湯匙。 哺乳。 喂魚肝油少許。
六點十五分至十點	讓他獨自在牀過夜，開窗，熄燈，蓋好，不叫風直射着。

十點 哺乳。

在此期的嬰兒應常有適當並安全的玩具玩耍。

九個月的小孩每日哺育的程序如何？

上午六點至六點十五分	哺乳(十至十二分鐘)。
八點	喂橘子汁或番茄汁三至四湯匙。
八點至九點三十分	在牀上或小兒椅子中玩耍。
九點三十分	洗澡，喂以魚肝油。
十點至十點三十分	用濾過的粥三湯匙與上等牛奶二兩調合喂他，而後用杯喂溫牛奶六兩。
十點三十分至下午二點	在小牀睡覺，或抱至戶外或敞開窗前晒日光若干時（陽歷七八月晒太陽宜在上午十點前和下午三點後）。
下午二點至二點三十分	一星期中的三日用擦過細篩的菠菜，豌豆，胡蘿蔔或芸豆三湯匙與蛋黃一至二茶匙調合喂他。在一星期中

的四日喂以蔬菜肉湯。哺乳。然後給以鹹餅乾。

二點三十分至四點三十分 睡覺，一部分的時間在戶外。

四點三十分至六點 換上睡衣，任其活動，或在鋪毯子的牀上遊戲。

六點至六點三十分 用粥類三湯匙調合溫牛奶二兩，煮熟蘋果或李子，梅子一湯匙喂他。哺乳，或用杯喂溫牛奶六兩。給以魚肝油，放在牀上讓他獨自睡覺。

十點 哺乳。

兩餐的中間喂以開水。

此時期母親應當訓練嬰兒不尿濕衣服和被褥。

十二個月至十五個月的小孩每日哺育的程序如何？

上午七點 用杯喂溫牛奶八至十兩。此時嬰兒能自扶其杯，放在便桶上出恭。

八點 喂橘汁二三湯匙。

九點三十分 洗澡，喂魚肝油少許。

十點至十點三十分 用粥類三四湯匙與牛奶二兩調合喂他，此時嬰兒能學習自喂。用杯喂以溫牛奶六至八兩，餅乾一塊，喂完放在便桶上。

十點三十分至下午二點	睡在牀上，或抱至戶外或敞開的窗前晒日光（陽歷七八月晒日光應在上午十點前和下午三點後）。
下午二點至二點三十分	用蔬菜肉湯一杯或用濾過羅的菠菜，豌豆，胡蘿蔔或芸豆三湯匙，與一個嫩雞蛋，或烤番薯二湯匙與奶油三分之一茶匙調合喂之。餅乾或烤麵包一片，用杯喂溫牛奶二至四兩。
二點三十分至四點	放在戶外睡覺。
四點至六點	玩耍。
六點至六點三十分	喂以粥類兩三湯匙與溫牛奶二兩並煮熟蘋果與梅肉二湯匙。然後用杯盛溫牛奶六兩喂之。擦奶油之烤麵包一片，給以魚肝油。
六點三十分	換上睡衣，躺於牀上，熄燈獨睡。

倘在六個月後母乳不足，可每天用別樣合適的奶補足。

有何法能藉小兒的發育以定母乳的良好與足用？

嬰兒皮膚發紅，吃乳後，能自睡二三點鐘，或不睡而有安靜舒適的態度，天天有大便，體重常增加，就表示乳質好而且足用。

又有何法能測母乳不足或滋養不良？

嬰孩體重不增，反漸減輕，不喜玩，無精神，或常哭，不安靜，並且不能安睡，皮膚發白，有貧血的形狀，肌肉鬆弛，有時常要吃奶，有時吃一口即止，即表示母乳不足或滋養不良。

有何法可測知其母乳不足用？

於每二十四點鐘內，每次哺乳的前後，均須秤其重量，秤時所穿的衣服必須一樣，不要添換，方可測知嬰兒吃奶多少。

倘母乳不足用何法處理？

按照嬰兒有何不正當的改變規定之。比如嬰兒體重，於數週中未見增加，或反減輕，可知乳量不足，必須吃奶。法：即一次吃母乳，一次吃瓶子奶，最好每一次均先吃母乳，後吃瓶子奶；若因乳少嬰兒吃的次數少，那末乳房的分泌更少，若次數多，可使乳的分泌也多。

嬰孩每次吃乳，當用多少時間？

每次不過二十分鐘。

嬰孩每次哺乳，當兩乳盡吸否？

若母乳太多，一個即可，若不足用，當吸兩乳。

哺乳時有什麼要注意的事？

第一要有規則，第二哺乳的前後，要用開水洗乳頭。

哺乳的婦人當食何物？

分娩後尚未起牀時，當食富有滋養易於消化的，譬如牛奶，稀粥，雞蛋等。起牀後，可照常飲食，但宜避免不易消化的食物；與母乳最有關係的，就是母親每天多飲牛奶和水（約四十兩左右），少喝咖啡與茶，少吃零食，定規每天三餐或四餐。總之食物與生母的身體關係很大，不過乳的成分不全靠食物，所飲液體的量，與乳的多少大有關係。

乳母每日生活應如何？

排泄：每日大便，要有一定次數，大便須暢利，若大便乾結，須多吃水菓和青菜，多喝水，宜用食物改良大便，不要用藥品。

洗浴：因為母親乳養嬰兒，多易出汗，所以當每天洗浴使皮膚清潔，衣服乾淨。

睡眠：哺乳嬰孩，很容易疲乏，須要多睡，最好到晚八點就睡，每午飯後，休息一小時。再嬰孩不可與母親同臥；宜令獨睡，方可不受驚動。

工作：乳婦不可不作工，但不可使身體過於疲倦。用腦力的工作，比用體力的工作影響較大；最好作家庭的工作，可以隨便休息，最不合適的，為學校，商店，工廠等處的工作；若必須作家庭以外的工作，最好等至兩個月以後，哺乳時，為免母親身體受累，可躺下喂哺，但不要借此睡覺。

運動：最好的運動，就是在院內種菜栽花。

遊戲：乳婦須常有舒暢的情緒，最好的遊戲，就是叫人高興快樂的消遣品，若乳母有很掛心的事，或易於生氣，或愛情過篤，皆與母乳有莫大的關係，動怒或傷心的事，影響乳的成分，較食品更甚，若乳婦常去看戲，看電影，逛大街等事，不但無益，反使體力腦力均有疲乏之害。

若母乳不足，嬰孩兼吃別樣食物，有妨害否？

無害，若乳不足，應當仍舊照常使其吃母乳，因為每天有少許母乳，也能令嬰孩發育良好。

嬰孩吃母乳，亦有不合適的，如此嬰兒應顯何種現象？

小孩吃母乳，少有不合適的，若母乳足用，吃的不合適，嬰孩可發生不安靜的現象，像少睡，愛哭，常有噎氣，洩氣及腹脹等，有時因胃內消化不好，發生嘔吐；但消化不好，多在腸內，所以大便形稀，色綠，內有乳塊，氣泡和粘液。

嬰孩常吐乳汁有何辦法？

有的因吃的太多，有的因吃時吸入許多氣體的緣故，故須少吃，並吃的時間要短，吃的中間要把小孩抱起，使小孩腹部貼在母親的肩上，然後輕輕拍他的背，令氣從口排出。吃後仍要照樣作一次。

若母親患病小孩應斷乳否？

乳母如得急性病，溫度高，嬰兒必須當時斷乳，或暫

時停哺幾次,或停止二三禮拜。在斷乳時,小孩雖然不吃母乳,但仍須按喂哺時間將乳擠出傾去,以備病好後照常哺乳,否則恐怕乳腺以後不再生乳。

母親患感冒時,哺乳有害否?

母有感冒,最易染及小孩,並能因最輕的感冒使嬰兒發生最重的肺炎,所以哺乳時,或靠近小孩時,母親須帶口罩,切不可和嬰兒接吻,亦不可向之咳嗽及打噴嚏。

哺乳期內行經與乳是否有關,並當繼續哺乳否?

嬰孩仍當繼續吃乳,與平時一樣,有的母乳在此時減少,當酌量加一點別的食物。

乳婦又遇懷孕時,小孩應斷乳否?

如確知受孕,即當斷乳,若不斷乳,不但乳的成分不足,不能供兩小孩之用,並且與母體有極大的損傷。

小孩斷乳方法 Weaning

小孩生後幾個月即不宜單吃母乳?

六至八個月的小孩,每日當用別樣食物代替母乳一次。

爲何有時不到六或八個月就要斷乳?

(一)因小孩只吃母乳,體重不增,滋養不佳。(二)因母身有厲害的病,或懷孕在身。

何時當完全斷母乳？

多半在十二個月時，當完全斷乳（若在夏天很熱的時候，可以多食幾日）。因為母乳到十二個月時，乳汁減少，成分不足，小兒食母乳的危險，比較不食母乳的危險更大。

小孩斷乳後，用瓶子或碗給他食物，當在何時？

九個月的嬰孩，可用瓶子，十個月後當用碗。

小孩斷乳時的難處，當用何法處理？

小孩生後，每日給水喝時，當用橡皮乳頭，如此可以養成習慣，在斷乳的前一個月，每日當用匙及碗，但須不等到用匙及碗的時候，先要使小孩練習試用。若到斷乳時，小兒有不如意哭鬧等情形，母親可以不用理他，不多時就可變易他的習慣。若不如此，不但延長時日，差不多不能斷乳。

到何時不用瓶子乳頭喂小兒？

若小兒無病，到十三四個月可不用瓶子，只可晚上用一次。

一個小兒到兩三歲還能用瓶子食乳嗎？

若到兩三歲還用瓶子，不但無益，反有許多害處。用匙，碗，比用乳頭容易乾淨。小兒若用瓶子食乳，必然常要食液體物；若常久食液體物及乳，不食別樣食物，就不免有貧血，或滋養不良的病。

有何法使小兒不用瓶子食乳？

要慢慢改換，也用瓶子，也用匙，碗，然後慢慢多用匙及碗，兩三個禮拜後，就可完全改變。若到兩三歲小兒還是用瓶子，到那時可以完全不給他瓶子；若小兒不食，可任其受餓一天半天亦無妨，以後自然逐漸不要瓶子飲食。

僱乳母的要點 Wet Nurse

若母親不能乳哺自己的小兒，當如何爲此兒設法？

最妙的方法就是僱乳母。

僱用乳母有何要注意的地方？

當查乳母自己的小兒滋養如何，並延醫診查其身體是否有隱疾。

乳母有何種病不可僱用？

癆病，梅毒，淋病，及各種傳染病。

乳母的小兒同僱乳母的小兒是否當年齡相同？

不必完全相同。若產後已過三星期，乳還不足用，則不可用爲乳母，恐其乳常不夠用，生產已過十個月者，不可用爲乳母。

乳母自己的小兒當如何安置？

若有合適的親友代爲乳哺最妙。否則可令乳母同時乳兩小兒，如此乳母可以免去掛慮，多生乳汁，供給兩兒，若仍不足，可請醫士配製牛乳補充。

乳母飲食起居的要點爲何？

乳母的飲食須要富有滋養料的，固然要緊，但倘乳母素常不食優美的食品，不可忽然大改其常度，就是她的工作亦當照常，不可忽多忽少。

人工養育法 Artificial Feeding

何種食物爲乳母最好的代替品？

有多種動物的乳，都可用，但是只有牛乳爲常用而有益的代替品。

除含乳的食物外，有無他種食物可使嬰兒得正當的生長？

雖有數種食物暫時可用，但不能過久，因其中缺乏嬰兒健康的要素，像市間所賣的人造嬰兒食物等，倘常用頗有危險。

嬰兒食此等人造食物的危險爲何？

能使嬰兒發生壞血病 (scurvy)，軟骨病與角膜軟化病，貧血病，亦有只顯通常營養不良的情況的，此等小兒，雖然有時肥胖，但面色灰白，身體組織軟弱無力。

養育嬰兒的牛乳的選擇和處理法

Fresh Milk

選擇養育嬰兒的牛乳有何要點？

牛乳須取自無病的牛，由無病的人擠取和遞送；並須清潔新鮮。

乳由一牛取得的較好呢？還是由多牛取得的較好？

多牛取得的較好。因其中的組織，每日的改變較小。若單自一牛取得，其改變甚多。

以牛乳哺嬰兒，欲其結果良好，牛乳應新鮮至何程度？

此與時令，和處理法的周密很有關係。在牛乳場和家內用平常處理的牛乳，冬日過四十八小時，夏日過二十四小時，就不可用以哺嬰兒，並且就在更短的時間，也或不可靠，若牛乳處理特別周密，可保存較久。

處理牛乳有何要點？

(一) 應保持清潔和不受污染，要達到這兩個目的，須有以下的處理：牛，牛欄，和擠乳的人，應清潔，乳須盛於用火漆裝封的瓶內，以及處理牛乳的人應本身無疾病，並且不可與患傳染病的人相接觸。其他如乳桶，乳瓶，盛

乳洋鐵罐,以及其他一切與乳相接觸的器具;都應於未用以前,先用蒸汽或沸水滅菌。

(二)牛乳擠取後,應隨即冷卻,並保持其在最低溫度中,若溫度不高過華氏表五十度,則不易壞。

在許多城市上所賣的一種牛乳,其商標聲明是保險的牛乳,就是表明那牛乳是用衛生手續預備,處理特別周密,並且盛在瓶內出售的。若此種牛乳能夠名實相符,可以購取,因為該乳由特別周密的預備和運輸,所以價值較高,但是照他的良好的結果而論,又不算不經濟了。

在家中擠取牛乳後,應如何處理?

若用以哺嬰兒,先須用一層吸水棉花和數層紗布,將乳過濾,然後盛於二量磅的玻璃罐或乳瓶內,隨即蓋好並冷卻之。最好置於冰水或冷泉水內,使水淹及瓶頸至少半小時之久。若備為吃純牛乳的小兒用,則可將乳傾入容八兩的瓶內,塞以棉花,並放入冰箱內,或放在最冷的地方,這個最初的迅速冷卻,最為重要;因其能使乳質保持不變。乳瓶放在冷水內,失熱甚速;若放在冷涼室內,則甚緩。乳冷卻十二或十六小時後,若欲去乳皮,就可在此時舉行。

倘買瓶乳飼嬰兒,應如何處理?

應如剛纔所說的法子,先把乳冷卻,因在運輸時,溫

度有稍許增高的緣故。倘要去乳皮，可在涼過二三小時後舉行。

在店中零買的乳和乳皮，應如何處理？

如能買瓶乳，就決不可買這樣的乳和乳皮來飼嬰兒，因此種乳，受傳染的機會很多，如用之，應立刻傾入無菌瓶內，放在最涼的地方。

育兒房內的冷卻箱，有何應當留意的地方？

最當留心的，就是絕對清潔，因其裏層都是瓦質，玻璃，或金屬，這些物質很易污穢，全用金屬製的冷卻箱常不合用，因冰在其內，很易融化，若將平常所賣的金屬冷卻箱，買來另在其外裝一木箱，就可合用。其他簡便的方法，就是用毯或棉被做一外衣，罩蔽外面，也可收同等的效力，並且沾溼或污染時，也易洗換。

冷卻箱內的區分，應籌劃妥當，或使乳瓶與冰箱接觸，或與之距離極近，冷卻箱內的冰應多，平常所裝的冰太少，安放乳瓶又與冰相離太遠，所以乳的溫度，決不能低至華氏表六十或六十五度以下。若欲乳保持不壞，應使保存乳的冷卻箱內的溫度不過華氏五十度，可用育兒房內的溫度計，時時測試而確定之，冷卻箱不良，致牛乳敗壞，在嬰兒患急性病中，此為其原因之一；次為乳瓶，故在育兒房中，對於乳瓶的清潔，應萬分留意。

用真空瓶保存乳溫或其涼冷，有否妨礙？

在旅行時,可用暖水瓶保存乳的涼冷,但不可用以保持乳溫以待晚間瓶哺。因乳經過瓶內溫度數小時後已有變化,能使嬰兒吃後患病。

凡爲小兒預備鮮乳應否消滅乳中的細菌?

應當消滅細菌,其法有二:

(一)巴司徒氏法,即將乳加熱到法倫表一百五十度至一百五十五度,百度表六十五至六十八度三十分鐘。

(二)煮開加熱到百度表一百度二分鐘。

用此二法以後將乳放置之處溫度不可過法倫表五十度以上,如此可作小兒二十四點鐘之用。

改善牛乳法

Modification of Cow's Milk

改善牛乳的意義爲何?

就是改變牛乳中物質的比例,使其容易消化。

能否改善牛乳,使其成爲母乳的一個完全代替物?

不能,雖然能改善牛乳,使適合多數嬰兒之消化力,並使有正常之生長發育,但其與母乳的不同處,有不能用人力改好的,並且母乳的某種特性,也有爲牛乳所沒

有者。

改善的牛乳,與未改善的牛乳的名稱如何區別?

平常改善的乳,叫做改善乳。未改好的,叫通常乳,全乳或純乳,或簡稱乳。

牛乳與母乳的主要區別如何?

在牛乳內的糖,只及母乳中的一半而略多。但牛乳內的蛋白質和礦物質則較母乳多三倍。且其中的蛋白質和脂的性質,也與母乳中的不同;並比母乳內的脂質難於消化。

在此二者間不同的地方,還有無其他重要之點
應當注意?

有。母乳常係新鮮的,並特別無菌。若牛乳,則大概是經過二十四小時的,有時亦有超過於此的,因而牛乳被污穢和受菌的傳染很多,菌數增多的原因,可由:(一)乳的陳舊;(二)塵或污穢染入乳中的量很大;(三)存留乳的地方溫度增加。

要乳哺嬰兒的結果良好,不但應留心嬰兒乳哺的情況,尤應注意乳成分的比例合宜。

加乳酸於牛乳內,是否必要?

若嬰兒的消化微弱,或受擾亂,則加四耗(4 c.c., 約一茶匙)乳酸於五百耗(500 c.c., 約十六量兩)牛乳內,甚為有益;但不宜對於每個嬰兒都是如此。

增加糖的最好方法爲何？

應在小兒生時到第三或第四個月，加蔗糖二大匙（一兩）於二十兩乳內，以後須加三大匙於二十兩乳內。

應如何預備糖？

就是將糖溶解於水內，倘溶液不清，或靜置後有沉澱，可用一層吸水棉花過濾後煮開二分鐘加水到原量應用之。

用乳糖不優於用蔗糖嗎？

不然，蔗糖的效果也很好，並且價廉。

亦可用他類的糖麼？

可用麥芽糖。其好處，就是容易消化，用麥芽糖，小兒體重的增加，較用蔗糖的快。

麥芽糖還有別的好處麼？

其輕瀉性較別的糖爲大。

用麥芽糖，有無不好的地方？

倘小兒的大便稀，有繼續的或習慣的嘔吐，俱不宜用。

加糖的目的，是否使食物味甜而適口？

不全然。加糖的目的，是增加身體所最需要的成分，如（一）身體生長，（二）身體活動，（三）幼稚嬰兒大量的需要物。

乳應如何沖淡（加水）纔合宜？

在起始數星期內，應沖淡一倍，此後則宜漸次加濃。

牛乳照此法沖淡，其中所含的脂，豈不較母乳中的少嗎？

誠然，但因二者中的脂不同，故如是沖淡，只求小兒能消化而已。

何爲乳皮？

照平常說，好似乳皮就是乳內的脂一樣，其實是乳內含脂最多的那部分，乳皮與乳的區別，也就是因爲乳皮含脂最多。

取乳皮的方法爲何？

(一)地心吸力法：平常將乳靜置二十四小時後，乳面所浮的就是乳含脂最多的部分，揭之即爲乳皮，名曰地心吸力乳皮。(二)離心法：就是用離心機分出乳皮，名曰離心乳皮。現在多數城市中所賣的，就是此種。

山羊乳有什麼特別好處否？

在許多鄉間的地方，無法得着新鮮牛乳時，用山羊乳代替很好。若是新鮮的，並有潔淨的手續預備，可以當作一種恆久的食物，實在比上述任何代替品爲優。食用此種乳，其改善法概與牛乳同。但用山羊乳爲嬰兒的食物，並沒有優於牛乳的效益。

殺菌乳，煮沸乳，加熱滅菌乳。

殺乳中的菌，是什麼意思？

就是加熱殺滅乳中所含的細菌。

凡乳都含有細菌麼？

是的，就是最細心處理，乳中也含有許多細菌。倘若疏忽，並且又在夏日，細菌可以多至無窮。此等細菌中，許多是無害的，或只是使乳生酸。但是有時也有別的細菌，含於乳內而能致劇烈的病：像腸熱病，白喉病，猩紅熱病，膿性喉痛，結核病（俗名癆病），以及某種腹瀉病等。

凡用爲嬰兒食物的乳，都應該滅菌嗎？

用有信用真確的乳，雖然較飲生乳的危險少，但是，有時無論如何細心處理，流行的傳染病，仍可由之傳染。

所以在二年以下嬰兒所食的乳，除確知來自健康的牛外，其他牛乳最安全的辦法，莫如先爲滅菌。

用熱力殺菌的乳，可保存很久麼？

不能。雖用熱力殺菌可以殺死一切的活細菌，但許多未發育的細菌，或細菌的芽胞（spores），都仍無恙；並且迅速地發育成爲活細菌。平常將殺菌的乳放在冰箱內雖可保存至數日，但最安全的方法，莫如在二十四小時內食用。

殺菌乳常爲安全的食物麼？

不然，因此等乳在未滅菌前，如果是很陳舊的，污穢的，或傳染性很大的，殺菌後，雖然不含活細菌，但仍不合於哺育嬰兒。

牛乳經熱力殺菌後,是否消化較易?

在許多嬰兒,食殺菌乳消化力不見有何改好。但有些嬰兒,食殺菌乳後頗能見效。所以倘嬰兒食生牛乳不合宜,可用煮沸的乳。

加熱於乳無損麼?

乳經過熱力後,能略增大便秘性;其中制止嬰兒壞血病的維生素也有一部分損壞。故當用殺菌乳時,應加橘子汁,或防免嬰兒壞血病的食物。

乳加熱的兩個方法為何?

第一個方法,就是將乳煮沸一或二分鐘。第二個是溫熱滅菌法,只將乳加熱至華氏表一百五十五度,至三十分鐘之久。此二法用任何一法,都能殺滅致上述各病的細菌。

此二法何者較佳?

煮沸殺菌法,甚為簡單,因其不需什麼特別器具,故甚合於日用。

在家中將乳滅菌的方法為何?

就是先將乳盛於哺乳瓶內,全行置入水中煮沸一或二分鐘,隨即冷卻,最後放入冰箱內待用。

乳經煮沸殺菌後,應如何冷卻?

平常方法,就是把瓶放入冷水內,使速速冷卻,切不可靜置室內,更不可當其猶溫熱時即放入冰箱內。須要

快快冷卻，速放入箱內。

爲何必須速行冷卻？

乳涼於空氣中或冰箱內，須二或四小時方能完事。在此時間內，未發育的細菌，可變爲成熟，能改變乳的本質。如放於冷水內，只需十或二十分鐘，即可冷卻。

乳在未遞送前，即先加熱滅菌，可爲嬰兒的安全食物嗎？

一切很可注意的危險，都能潛伏於商製加熱滅菌的乳內，因商製牛乳所聲明的安全，確難深信。爲安全起見，有數事應當注意：乳未加熱滅菌前，應有確實的潔淨，一切器具，乳瓶，或其他盛乳的器皿，俱應細心煮沸殺菌。並在一切製備的手續上，應萬分精細和潔淨。因加熱滅菌法所殺的細菌，大半爲使乳變酸的細菌，他種細菌，和不能被如此熱力殺死的芽胞，當乳未保存涼冷時，可迅速生長，故當遞送或用時，乳雖不致變酸，但含細菌無窮。因此最穩妥的方法，莫如用在家中煮沸滅菌的乳。

蛋白質乳或曰乾酪素乳

Protein Milk.

何爲乾酪素乳？

此係一種改造過的乳，曾將其中的乳糖除去而加

入乾酪素者。

此乳有何用處？

最大的用處，就是適合於患慢性或急性消化不良且有腹瀉的嬰兒。

小兒能常用乾酪素乳嗎？

不能長時間用，因為不是完全食品，等到小兒的病見好，要慢慢換用應當的食物。

發酵乳，乳酸乳

Acid Milk

何為發酵乳？

就是全乳發酵，或用人工法使之變酸了的乳。

如何預備此種乳？

可由製乳場買得，或用酵母片，加入已煮沸滅菌的全乳中使發酵而成。

何為乳酸乳？

就是在全乳中加有某定量乳酸。

如何預備？

就是在兩量磅(1000 c.c.) 煮沸滅菌的全乳中，加入兩茶匙(8 c.c.) 的純乳酸。此純乳酸可由藥房買得。加乳酸宜緩，應滴滴加入，並不停的將乳攪動。每滴入一滴要

攪動六次。

此酸乳有何用處？

此乳對於有消化不良的小兒有益。在小兒有急性腹瀉的時候當吃蛋白乳，但是蛋白乳的成分不足，只可暫吃，不可長久；最好腹瀉病一見好，就改吃酸乳，等到小兒完全病好，可再改吃全牛乳。

健康嬰兒的食物

Feeding for Healthy Children

嬰兒食物，有何重要之點應先為決定？

(一) 在二十四小時內所需的乳和糖量。

(二) 在二十四小時內所需的總量，或兩數。此總量中，包括乳和所加的水或他種沖淡物。

(三) 每日哺乳的次數，由此便可均分一日的食物，和每次哺乳的間期。

最關重要的是什麼？

就是給嬰兒的乳和糖量，應足敷身體的需要：(一) 產生體溫，(二) 補償組織的消耗，(三) 供給生長。

倘所給的食物過少，有何現象發生？

因產生體溫和補償組織的消耗，為生存首要的事情，倘所吃的食物過少，生長未免受阻，並使體重不能得

合宜的增加。

倘所給的食物過多,又有何種現象發生?

食物過多,不但無益於小兒,且因不能消化而變爲小兒的重擔,反阻止他生長和發育的進步,倘長此多吃,消化和營養就受劇烈的擾亂,所以最要的格言,就是給與適量的食物,切不可多過身體所需要的。

如何能知多少食物,恰爲健康嬰兒所需要的?

可依數事爲權衡,最要的就是體重,體格和活動情形。

年齡不關重要麼?

也應當想及,但不如別的事實之更爲重要,因爲倘只根據年歲而計算食物的量,則在體輕小兒所得的食物,未免過多,在體重小兒就不夠了。譬如一個滿三月體重十二磅的小兒所需的食物,應當比同等體重而只生後三日的嬰孩多,這是年齡的關係。又如一個生三月體重十二磅的小兒所需的食物,比同年歲而體重九磅的多,這是體重的緣故,所以年齡和體重等等都應當想到的。

小兒的活動,對於他所需的食物,有否關係?

此甚重要,平常每易忽略。一個在戶外勞動工作的人,所需食物的量,大於居屋內的。一個活潑,敏捷,和有力的嬰兒所需的食物,多於安靜少動的。有時竟須增加至

一半或三分之一以上，此種需要，詳小兒食慾節。

照上面看來，小兒的食慾，豈不是他的食物需要量的一個好標準麼？

此甚重要，應當時常想及。但倘單用此事作為標準，則不可靠。因有許多嬰兒，在其所需的食物外，更多給與，亦往往能吃。

能否依同樣的標準，以飼消化不良的嬰兒？

不能。因對於此等小兒，應須顧及很多的事，特別是消化不良的情形和程度等。

一個健康的嬰兒，大約每日需要若干食物？

最好的平均數，就是每日需糖一兩。體重每磅需全牛乳一兩半。比如：一個體重十磅的嬰孩，每日約需十五兩牛乳，一個十二磅重的，約需十八兩牛乳等等。可是在起始的三星期內，所給的乳量，應當較少。

飼育健康的小孩，倘所用的乳和糖的量都合宜，

但沖淡數的多少不定，是否重要？

此事亦甚重要，但較所給食物量的關係為輕。身體每日必得定量的液體，方可得極美滿的營養。若沖乳過淡，則飼育嬰兒食物的量必過大，使胃擴張而常致嘔吐。倘加水不足，嬰兒不但不能將他完全消化，且身體因不能得所需要的液體亦有妨害。

如是，可否將不足的液體，在每次哺乳之間給以

清水?

在稍大的小兒,可用此法。但在嬰兒,特別在最幼的,想在食物之外,更給以水,很爲困難。最易的方法,就是加水於食物內哺之。

有何最簡單的方法,以改善飼嬰兒的牛乳?

可照下面所列的表,沖淡所應需的全乳量,再加糖於其內。

用全乳(含脂百分之四的)飼育正常嬰兒的表。

表式	壹	貳	叁	肆	伍	陸
年 歲	〇至二 星期	二至四 星期	一至三 月	三至五 月	五至七 月	七至九 月
乳(兩)	八	九	十	一二	一四	一六
水(兩)	一二	一一	十	八	六	四
糖(兩)	一	一	一	一	三/四	一/二
總量(兩)	二十	二十	二十	二十	二十	二十

表上所列的方式,應如何應用?

正常初生的嬰兒,開始用第一方式,若小兒消化良,體重照常增加,可按此表一直用下去,換表時要慢慢的,不可一天就加足。

普通健康的嬰兒,可於第三或第四星期時,用至三方式的濃度,此後,乳濃度的增加,應當稍緩,約每八星期後,增加一次。到九個月時,則普通嬰兒都可飲全乳了。

爲何每日飼育小兒次數,不可增多幾次呢?

每次所給的牛乳,雖已如是沖淡,但胃猶須費二至

二小時半的時間以消化之,倘沖淡不足,則須費更多的時間。倘兩次哺乳間隔的時間太短,當第一次所哺的還未消化完全,就哺第二次,則可致嘔吐和消化不良。乳哺的間期,不但須使胃有充足的時間消化以前所哺的乳,尤須使其稍有休息的時間。

在二十四小時內,合宜的哺乳次數,每次的量,和一日內的總量,分列於下表:

第一年中,健康嬰兒的合宜哺乳表。

年 歲	初生至 二星期	二至 四星期	一至 三月	三至 五月	五至 七月	七至 九月	九至 十二月
日間哺乳的間隔時間	三小時	三小時	四小時	四小時	四小時	四小時	四小時
夜間哺乳的次數	一	一	一	○	○	○	○
二十四小時內哺乳的總次數	七	七	六	五	五	五	五
一次的量數(兩)	一半 至二	二 至四	三 至五	三半 至六	四半 至六半	五 至八	七至 八半

上表係一種平均數,為健康小兒的哺乳表,其間隔時間,是從第一次哺乳起始時起算至第二次哺乳的起始止。

有何種情況,應加長哺乳的間隔時間?

在消化不良時,如有習慣的嘔吐,或瓶哺後反胃等,或食慾不旺,如食時常遺剩其食物,都應加長哺乳的間隔時間。

何時應縮短哺乳的間隔時間?

倘縮短哺乳的間隔時間,則哺乳必太頻煩。除有沉

重的病外，哺乳嬰兒的間隔時間，很少有短過於表上所列的。

照食量表所列的預備乳量，皆爲二十兩，倘嬰兒所需的量過於此數，又應如何預備？

無論預備二十五，三十，三十五，或四十兩，都是同樣簡便。

家中預備牛乳飼兒法

Equipment for Artificial Feeding at Home

家中預備牛乳，應需何種器具？

乳瓶和膠皮乳頭各數個，玻璃的或洋瓷的漏斗一個，及瓶刷子，棉花，酒精燈（最好用煤氣本生燈）等，用作溫乳瓶用的兩量磅高杯一個，瓷罐一個，備爲調勻食物之用，寬口瓶兩個，一用以盛涼開水，一用以盛蘇打水，和加熱鍋一個，並須備煮鍋一套，以爲煮稀飯等之用。

何種乳瓶最好？

長圓形，劃有量度，頸大容易洗淨，以沒有彎曲和隱角的最好。容八兩，形式簡單的瓶，就足敷第一年之用。凡形式複雜的乳瓶，都難洗淨，不便於用。乳瓶的數目，應與每日哺乳的次數相同。

乳瓶應如何處理？

當乳哺完時，應用冷水滌洗，然後以水注滿而靜置之。當未傾入乳以前，宜先用瓶刷和肥皂水十分洗潔，以後再用開水洗，然後置入沸水內煮十分鐘。

應用何種乳頭爲佳？

乳頭以簡直而能滑過瓶頸者爲佳。附有膠皮管或玻璃管的乳頭，則複雜且難使之清潔。凡黑膠皮或透明膠皮製的都可用。乳頭的吸孔，不宜過大，致使乳直流如線，只宜大至將乳瓶倒轉時，乳汁能速滴出即可。

乳頭應如何處理？

新購的乳頭，在未用之前，應先煮沸五分鐘，但不必每日如此，因爲每日煮沸就容易變軟而壞。乳頭用後，應細心在冷開水內滌洗，然後置於盛有硼酸溶液的有蓋玻杯內。但也可保存於開水內而用蓋蓋好。在未煮以前宜先將乳頭的裏面翻轉，用水和肥皂十分洗潔之。透明膠皮乳頭的好處，就是因其可常常的煮沸。

應用何種棉花？

若買不到滅菌棉花，而用市上賣的棉花，必須在開水內煮二十分鐘方可用。

預備乳的手續爲何？

預備乳的人，瓶子，棹子，以及一切的器具，都應十分清潔。倘須加粉於乳內，須先調粉於少量水內，煮沸二十分鐘，後加沸水，使其量等於表式上所需的。待其冷後，應

加入乳和糖,並轉傾於一瓷罐內,將其調勻。二十四小時所需的食物,常可一次備好,此後分注每次哺乳的乳量於各乳瓶內,並各塞以棉花或膠皮蓋,迅速放入冰箱內。或先將乳加熱滅菌,或用任何方法煮沸,皆可。

哺育小兒的方法

How to feed the Infant

瓶哺時,應如何預備乳瓶?

將乳瓶從冰箱內取出,置於盛有溫水的水甕內或瓷罐內,使溫水略高過乳面而溫熱之。此後將其十分搖勻,安乳頭於瓶上,應斟酌乳頭吸孔不過大,也不過小。

如何可試出乳的溫度?

切不可用口含乳頭試,可於未安乳頭前,傾出一茶匙嘗試之,或由乳頭滴數滴於腕的內側,以覺溫而不覺熱爲度,或用溫度計試甕內溫水的溫度亦可。水內溫度應在華氏表九十八度和一百零五度之間。

瓶哺時,有何簡單保溫法,以保持乳溫?

就是做一個法蘭絨袋,袋端附有鎖口繩,將其套過乳瓶而包紮之。

嬰兒吮乳時應居何種位置?

在起始第一月或第三月內,除了夜間外,倘不願將

嬰兒從小牀抱起，最好之法，當在瓶哺時，將嬰兒扶起臥於臂上用瓶哺之，待嬰兒稍大，可側臥於小牀上，哺者以手執瓶而哺之，直到哺完為止。否則嬰兒易成吮乳和睡眠同時並行的一種習慣，即往往含着乳頭延長至一小時或以上的。

每次瓶哺時，應容嬰兒吮若干時間？

平常不能過十五分鐘，到時，不管嬰兒是否吮足，都應當把乳瓶移開，以後不再拿乳給他，直到二次給乳的時間纔給。無論何種情況，不應養成嬰兒含着乳頭睡的习惯，若吮乳時睡覺，應輕輕拍醒之，使其再吮，或就在此時停哺。

嬰兒吮乳後，可否與之玩耍？

決不可，因為這樣常致嘔吐和有消化不良的情形。嬰兒瓶哺後，可將其由小牀上抱起，伏於大人的肩上，用手輕拍其背，使其在瓶哺時吞入之氣，由胃洩出。此後放於睡牀上，任其靜眠，不須搖醒，並不許乳母，父母，或他人稍擾動之。

何爲過哺？

就是嬰兒哺乳過多，一次或常常如是。過哺特別多在夜間，這是人工飼育法最常見的錯誤。

嬰兒食後，仍天然的想再食，這豈不是一個合宜的指示，應多給他的乳量嗎？

發育十分正常的嬰兒的食慾，常常如是，但過哺係一種習慣，逐漸養成，直到其所食的食物，過於二十四小時所應需的量。此習慣常見於消化不良的嬰兒，因胃中常多積有食物，故在一日中，特別在夜間，宜多顯饑餓之勢。

過哺的原因何在？

最常見的弊病，就是過於重視體重增加的習慣，並為母親或乳母的，見其嬰兒的肥大和增長迅速，不及其他同年齡的嬰兒，遽以為應當增加其食物量與食物力。

過哺之害如何？

凡食物多於小兒胃力所能夠消化的，就是小兒的累贅。未消化的食物，在胃或消化道內發酵生氣而致腹絞痛。若此種情況延長過久，就可發生急性消化擾亂，因此嬰兒顯不安適，煩燥，不舒快，睡眠不好，體重不增，甚或減輕。如此的現象，或反可使人疑其食物不足，至於應減少時反增加之。

過哺的最早病徵為何？

就是嬰兒不能完全食盡其食物。倘於此數日內發現一次，尚不關重要，但多數乳哺時都是如此，那就是一種警告，應當留心。當嬰兒已食盡其應需的食物時，決不可誘之多食。

新鮮牛乳的代替品

Substitutes for Fresh Milk.

當不能得着新鮮牛乳時，何種代替品最爲可靠？
乾奶粉，煉乳，蒸發乳，和山羊乳。

乾乳粉是由新鮮全乳，或曾去一部分乳皮的乳，用不同的方法製成的。他們的商標有幾種，也有只名乾乳粉或乳粉的。此等製備物內，有些曾加有糖。

(甲) 乾乳粉之用法如何？ (dry milk)

乾乳粉可調製於任何食物內服食，調製法甚爲簡單，就是把粉溶在水內，有時可溶在大麥湯內。若欲加糖，也可加於其內。在許多情形之下，此乳粉最便於用，也甚有益。但能得着好新鮮牛乳時，就不必用之作恆久食物。

以上說的代替品都是一樣好嗎？

不都是一樣好，如用乾乳粉時要十分小心，看乳粉盒子上的說明，是全乳粉，還是攪雜別物。若是全乳粉則可用，攪雜他物的不可用。

(乙) 有幾種小兒的乾食品，用以加入乳中，有何好處？ (proprietary infant foods)

有的是麥子製的，有的是礦物質製成的，並有糖製

成的,這都是工廠製造無何特別好處,並且價很貴,若是小兒食鮮牛乳或乳粉不合宜,須請醫師開方,應否加入別樣物質,不要只信公司的廣告,自己隨便加入乳中使小兒服食。

(丙) 何爲煉乳?

(condensed milk)

就是新鮮牛乳先行加熱滅菌,然後蒸發其中的水,使原乳二分半變爲一分的,甜煉乳就是大約加六兩半蔗糖於重十六兩罐頭的乳內而成的。

煉乳的用法如何?

用不加糖的煉乳加入一半開水,這樣的成分就和全乳一樣,若要爲小兒用,可用鮮牛乳的配法,他的濃度,用較此小的水量沖淡。但是煉乳,平常不能用過一比五,或一比六的比例。

煉乳可用至多久?

嬰兒若用煉乳配製合法可作爲合適的食物。

煉乳的不好處安在?

煉乳所含之維生素均不足用,若欲足用須從此外得來的。

健康習慣的訓練

Healthful Food Habits

在小兒教育中,訓練有健康的習慣,實佔最重要的位置,此種訓練,應早實行,並應在整個的小兒期內,不厭不倦的實行,以養成小兒的一種第二天性,因小兒的安穩,健康,生長和娛樂,完全以此種訓練為基礎。

一切小兒所應受的重要健康習慣訓練為何?

(甲) 喫食物的習慣:

(一) 喫合宜於小兒的食物,不可任小兒自擇。

(二) 在斷乳後喫混合的食物,不可一餐只喫含一或二類的東西,每天喫一或二磅牛乳,或單喫或加入別的食物內吃下,都可。

(三) 喫宜緩,嚼宜細,不可吞食,不可用湯送飯,並當口內含滿食物時,不可飲其他液體物。

(四) 只在規定時間內進飲食。

(乙) 在一定期間內,每日飲水數次。

(丙) 清潔:

(一) 每星期應沐浴二次。

(二) 臉和手應常清潔。

(三) 飯前和飯後都應洗手。

(丁)就寢前刷牙,早晨也應刷一次。

(戊)大便應有定時,最好在早餐後。

(己)午餐後宜稍休息,直到入校年齡為止。

(庚)就寢宜早,必須睡眠充足,如十歲的小兒應睡十一小時。

(辛)空氣宜新鮮,夜間的窗戶宜敞開。

(壬)多行室外運動和每日遊戲。

(癸)咳嗽和噴嚏時,應以手帕掩口鼻。

此等事項應在何處訓練?

在家內訓練最為合宜,如不能,則辦理教育者,應在初級起始執行,在校內此種訓練,最好分隊教授,因彼此競爭的心,可引起兒童的奮勇。

如何能教小兒細嚼他的食物?

不但給小兒喫硬的餅乾,烤脆麵包等更當細細嚼食,就是給小兒液體食物或粉類食物喫也應當細嚼。大人千萬不可將食物嚼碎後給小兒吃。

大孩食物之習慣與預備法。

有何法能使小兒有正當之習慣?

小孩生後無論何種食物都喜歡吃,以後有許多小兒不喜吃的食物,多半因為母親起首給食物時,預備的不好,與管理不好之故,所以給小孩食物時,不要問小孩食何物,當自己酌量如何預備,當給多少,就預備多少,不

可多食，以後就有好的習慣。

小孩對於食物是否有禁忌性？

普通少有禁忌性（所謂禁忌性即小孩對他所當吃的食物，吃了反發生病患）。

若小孩不喜吃當吃的食物，有何辦法？

此事有許多原因，若小孩無病，應當吃他當吃的食物，每天三次。當吃飯時，若小孩拒絕食物，可將此食物保存某處，至小孩要吃時，再給他吃；不可隨便改換，以免消化不良與不好的習慣。

小孩在一天內當吃幾次？

第二年的小孩，在二十四小時內當吃四次，三次是按着大人吃飯的時間喂之，另外在早晨起來時吃奶一次，或再在晚上十點時吃奶一次。到第三年後每天三次即可，在非吃飯的時間，其他食物如糖，菓，糕，餅乾等，均不可吃，以免在吃飯時不喜歡吃。此等糖類菓類，當在飯後給他。

小孩吃飯時當如何管理？

要使小孩細嚼慢嚥，口亦不可太滿，自起首時為母親的即當將吃飯的方法及規矩，細心教導之：例如棹，椅，匙，碗等物皆須有合式的規矩，如此小孩自然能早會自己吃飯。吃時要使小孩快樂，不可提起小孩不喜的事，亦不可令其隨意挑選食物。

揀選小孩的食物有何要點？

按經驗看，穀類，青菜類，動物類，菓類等，對於小孩身體發育最有關係。小孩常有的病，第一是滋養不良，此表明食物不能滿足他生長運動的需要。凡小孩有營養不良的病，人多以為食物不足，但不盡然，大多數因為挑選及預備的方法不相宜，所以發生這種病。

小孩若吃大人所吃的食物是否合宜？

小孩作工不能與大人一樣，其消化力也與大人不同。小孩的胃腸消化力弱，其發育亦慢慢完成，所以大人所吃的食物不能盡有益於小孩。有許多食物小孩不能消化，若給小孩此等食物，對其胃必有損害。

小孩食物必需含的成分

Food Components for Children

必需有的成分是那些？

礦物質，蛋白質，澱粉，糖，脂質，植物纖維，維生素及各種味料。

小孩的食物是否每天應當有這幾樣？

小孩每天的食物當按着身體所需要的給之。

一 奶，肉，雞蛋。

二 粥，饅饅。

三 奶油,別樣易消化的油。

四 青菜,菓子。

五 純糖類。

小孩能食的食物何者含某種成分最多?

含礦物質多的:

菓子類

蘋果

梨

檸檬

橘

桃

柿子

紅菓

青菜類

生菜

芹菜

扁豆

豌豆

番茄(西紅柿)

冬瓜

紅薯

番薯(馬鈴薯)

胡蘿蔔

菠菜

山藥

藕粉

含蛋白質多的:

奶

雞蛋

肉,鷄,魚

豆類

核桃

含澱粉多的:

粥

麪條

饅頭,各種餅類

紅薯

番薯

含糖類的:

白糖,各種硬塊糖與菓子醬

麥芽糖,各樣甜餅與蛋糕

蜂蜜

含脂油質的:

奶皮,奶油

豬油

羊油

肥肉

各種香油

何種食物內含小孩必需之維生素?

母乳,鮮牛乳,雞蛋,奶油,橘子汁,番茄,白菜湯,紅菜。

如何使食物有丙種(C)維生素?

橘子汁: 取鮮橘子瓣壓擠出汁,不加糖,可略加涼開水沖淡即成。

番茄汁: 取番茄隨汁煮爛,不另加水,以後過濾即成。或用罐頭番茄汁亦可。

白菜水: 取白菜四兩,將其切碎,煮在四兩水內十五分鐘,以後再加開水補足四兩,置一點鐘,過濾即成。

橘子汁內的三種維生素比較番茄汁和青菜水內的多三倍。

肝湯作法：取牛肝或羊肝半磅，蔥頭一小個，涼水兩磅，鹽少許，將肝和蔥頭混合切碎，放水內煮沸一刻鐘，肝與湯一同給小兒吃。

預備小兒的食物何事最爲要緊？

最要緊的不可用一切油炸的食物，要給小兒菜和菓子吃，因菜與菓子汁中含有要緊的維生素最多。

肉湯：取一磅連有少許骨頭切細的肉，冷水一量磅，食鹽少許，盛於一煨罐內，在微火上燉三小時久，約至其中的水只剩半量磅爲止。若須加水，也可再加。後用洋布過濾，當其冷時，仔細將其中的脂油除去，如須多加鹽，也可再加。食法：熱食或涼食均可。

在此肉湯中，若加調他物，則滋養更好而適口。其法：即加玉蜀黍粉或藕粉於半量磅肉汁內使之變稠，在微火上煮十分鐘，後再加調三兩乳，或一兩稀乳酪於其內。

雞，牛犢肉和牛羊豬肉，這幾種的肉都可以用做肉湯。

肉醬：取生牛肉（須去其外面的筋膜和脂肪）一片，用湯匙刮爛，或用刀切爛，加鹽少許，反覆揉捏，使其味勻。然後放在鍋內燉二十分鐘，給小兒吃。十八月的小兒可食半或一湯匙連湯帶肉。刮爛的肉醬比切爛的好。

乳凍：取一量磅新鮮牛乳熱至與體溫相等，加以少許鹽和半湯匙砂糖，後加入二茶匙凝乳酶液(rennet)，並將其攪勻，靜置室內二十分鐘，或待其十分凝固為度，就放在冰箱內，使之完全冷卻。在大小兒，可加荳蔻粉調味。

乳塊：乾乳塊的製備法，就是把乳凍的乳清濾去，或用布扭濾乳凍除去乳清而成。倘稍加鹽，更為適口。此類乳塊常用於患腹瀉的小兒。大小兒可食一滿茶匙，一日三或四次，或單食，或塗在烤麵包上食均可。給患腹瀉的小兒乳塊吃，須用新鮮的乳。乳塊未凝固前，不應加糖。

乳清：乳清的預備法，就是用叉子把以上所說的乳凍打爛，用洋布將乳清濾出（因乳凍為乳塊和乳清所成）。乳清有益於患急性消化不良而嘔吐的；但對於腹瀉的不合宜。

大麥湯：取大麥粉一平湯匙，用少許冷水調勻，攪入加有少許鹽的十兩沸水內，然後放在雙層套鍋內煮三十分鐘，過濾。過濾後，加水使成一磅，就成大麥湯了。

白蛋白水：即用一個新鮮蛋的蛋白，和八兩冷水，少許鹽，搖動調和而成。可倒在湯匙或乳瓶內給小兒冷食。此水對於嘔吐的病人最有益，雖對胃的激惹性很大，但非不能忍受。

乾麵包：可用陳或新鮮的麵包或饅頭（全麥製

的較好)切成細片,在鐵竈頂或開門的火爐面上烤之,至變脆而未燒焦爲止,幼小孩食此等麵包較餅乾好。

半煮蛋 Coddled egg: 取新鮮蛋一枚,連殼放在剛纔煮沸去火的沸水內,任蛋在去火的沸水中經過五分鐘;總以蛋白成凍性爲度。在消化微弱的小兒,只應給以蛋白,調少許鹽使有味,此等蛋的蛋白與蛋黃分開。

小兒點心

大米糕的作法

牛乳	二磅
大米	六兩
白糖	六兩
食鹽	半匙
荳蔻粉	八分之一茶匙 (或桂皮粉或檸檬皮粉均可)

先將大米淘好,把所有的材料完全合在一塊,用微火在火箱內煨三點鐘。

牛乳蛋糕的蒸法

牛乳	一磅
雞蛋	三個
白糖(或蜂蜜)	二兩
食鹽	八分之一茶匙
小兒所喜的任何香料加入少許	

先將牛乳盛於兩層套鍋內，加熱，將雞蛋，鹽，白糖，打在一塊，慢慢加入牛乳內，不時的用叉子攪和，或用打蛋器打之，一直到牛乳·雞蛋變濃成糕後，離火待冷，再加香料即成。

牛乳蛋糕的烤法

牛乳	半磅
雞蛋	一兩
白糖	二平茶匙
食鹽	少許
香料	少許

先將雞蛋打勻，後將各材料完全拌合一起，盛在四個小磁碗內，再放在有熱水的盆內，入火箱內微火烤之。

嬰兒吃的蔬菜是那幾種？

Vegetables

選擇以下的菜蔬給嬰兒吃，因為當中含有鐵質對於嬰兒有益，如新鮮菠菜，小胡蘿蔔，嫩豌豆，芸豆。

七個月時：

可飲的菜汁：

- (一) 挑選中等大小的嫩胡蘿蔔一個，或新鮮菠菜葉五六片。

(二) 細細清潔切碎,放在鍋中加大半杯水蓋蓋,約煮十分鐘。

(三) 加鹽少許,榨去菜渣,取其菜汁。

蔬菜肉湯:

(一) 將肉半磅(牛肉羊肉或雞)切碎。

(二) 加冷水三杯,在蓋好的鍋內用慢火煮兩小時。

(三) 撇去浮油。

(四) 加切碎之胡蘿蔔半茶杯,或菠菜葉四五片,再煮十餘分鐘。

八個月時:

蔬菜漿:

(一) 菠菜,洗潔後放在套鍋上蒸十二或十五分鐘,壓過細篩,加鹽少許。

(二) 胡蘿蔔,豌豆,或芸豆,洗潔後,切成小塊,放在罐中加水少許,蓋好罐蓋,速煮至略爛。胡蘿蔔約煮十五分鐘,豌豆三十分鐘,芸豆四十分鐘,加鹽少許,然後由細篩濾過。

(三) 濾過之菜漿可調於熱牛奶中餵兒,以代替菜汁或蔬菜肉湯。

十個月時:

烤番薯:

挑選中等大小的光滑番薯,細細洗潔,約烤四十五分鐘,直至變軟爲止,然後去皮用叉壓碎。

嬰兒吃的雞蛋如何做?

稍大的嬰兒,雞蛋是有益的食物。先喂蛋黃,因爲其內含:

(一) 維生素又叫維他命,能助防免嬰兒骨軟病,並助嬰兒發育。

(二) 鐵,能長血。

一歲的嬰兒每星期中可吃雞蛋三四回或五六回,若要叫他喜吃應當:

(一) 由少而多。

(二) 常常更換烹調的方法。

(三) 將雞蛋與肉湯或過篩的蔬菜,麵包屑,牛奶或壓碎的番薯調合喂他。

烹調雞蛋的方法:

帶殼軟煮 將開水放氣後,把雞蛋放入,蓋蓋,泡四至五分鐘。去殼,放在盤中挖取需要的蛋黃,與肉湯或過篩的蔬菜調合,或加鹽少許,與麵包屑調合。

帶殼硬煮 把蛋放在罐中,用水浸沒,約煮四十五分鐘,將蛋撈出,去殼,加鹽少許,由鐵絲篩壓過。

蒸雞蛋 將套鍋下部裝水加熱,將雞蛋打於上部,加牛奶一湯匙,奶油一小塊與鹽少許,放於水上,慢慢調解,直至變稠厚。

荷包雞蛋 小鍋內裝水,煮沸後去汽,將雞蛋打在碟中,溜於水內,直至雞蛋全變白色,然後用大匙取出,加鹽,用麵包屑調合。

第二年小兒飼養法

Second Year Feeding

若照前頁所說的普通規則進行,嬰兒在第十一或第十二月,常食五餐;所隔的時間為四小時,每餐的量為全乳七或八兩,此量中約四分之三應為乳,四分之一為稀飯。此外每日須有一或二兩橘子汁,或番茄汁,或白菜湯;一兩牛肉汁,或半熟雞蛋一個;三兩或四兩菜湯,和三茶匙搗爛的新鮮菜漿。

在第二年每日須幾餐?

常為四餐,直到第十五月止,以後,雖有許多小兒在第十八月後只食三餐,也長得很好,但從第十五月後,每

日仍應食四餐，無論每日三餐或四餐，主要的只宜三餐；其餘的一或二餐應完全爲乳。

在第二年內飼養中最要的，爲每日的食物量，而不甚注重於餐數分配的多少。在第一年後的乳之預備法爲何？

正常的小兒至第十月後，平常只給以全乳。每餐的乳量，分盛於各瓶內，然後煮沸滅菌。這樣做法，每次飼小兒的乳，可以分別保存，到餐時應取何瓶的乳，都是有條理的，不致雜亂無序。

當一日內用的全部乳量送到時，應按每餐所需的乳量，分盛於各瓶內。至於在何餐須兼吃飯，則於該餐時加入。

在第二年起始時，還有當改變的事麼？

乳不須改，除在午後十點鐘時給乳還用乳瓶外，其他的時候都可用杯或匙。

嬰兒食物表第一

十一個月至十五個月的嬰兒適用

時 間	食 物	量 數	熱單位(卡羅利)
早六點	全乳	六至八兩	一百二十至一百六十
早八點	全乳	六量	一百二十
	烤饅饅	一片半	六十七
	{ 稀粥(大米或麥) 或小米湯	一碗 (二百五十克)	一百零八
		八量兩	一百
早十點	橘子汁或番茄汁, 白菜湯	半至一兩	五至十二
十二點	全乳	四兩	八十
	雞蛋或切碎的雞 或牛肉	一個	六十
	菠菜或胡蘿蔔扁豆角 (過篩的, 過篩的意義即 把菜煮爛連水帶菜從篩 內濾過者)	半至一兩	二十五至五十
		二大湯匙	三十六
晚四點	魚肝油	四匙(一茶匙)	四十
晚六點	全乳	六兩	一百二十
	烤饅饅	一片	四十五
	稀粥	一碗	一百零八
晚十點	全乳	六至八兩	一百二十至一百六十

注意 烤饅饅或烤麵包能抹上奶油更好

嬰兒食物表第二

十五個月至十八個月的嬰兒適用

時 間	食 物	量 數	熱 單 位
早六點	全乳	六量	一百二十
早八點	全乳	四量	八十
	雞蛋	一個	六十
	烤饅饅	一片半	六十七
	稀粥(大米或麥)	一碗	一百零八
早十點	橘子汁或番茄汁 或白菜湯	一至二兩	十至二十四
十二點	{ 雞蛋	一個	六十
	{ 或刮碎之牛肉	半至二兩	二十五至一百
	烤番薯或大米飯	一至二兩	三十至六十
	菠菜,胡蘿蔔或白菜, 扁豆(均要煮軟過篩的)	一至二兩	十八至三十六
	稀飯	半碗	五十四
	點心(蒸蛋羹)	一至二兩	四十五至九十
	全乳	四兩	八十
晚四點	魚肝油	四至八匙 (一至二茶匙)	四十至八十
晚六點	全乳	四兩	八十
	稀粥	一碗	一百零八
	烤饅饅	二片	九十
	煮軟菓子	一兩半	二十四

注意 凡烤饅饅或烤麵包抹上奶油更好

嬰兒食物表第三

十八個月至二歲小兒適用

時 間	食 物	量 數	熱 單 位
早六點	全乳	六兩	一百二十
早八點	稀粥 (大米小米麥子玉蜀黍)	一碗	一百零八
	糖	一茶匙	十六
	雞蛋	一個	六十
	烤饅饅	二片	四十五
十二點	切碎之牛羊雞肉	一至二兩	五十至一百
	或雞蛋	一個	六十
	烤番薯	一至二兩	三十至六十
	菠菜,胡蘿蔔或白菜, 扁豆(要煮軟過篩的)	一至二兩	十八至三十六
	稀飯	半碗	五十四
	點心(蒸蛋羹)	一至二兩	四十五至九十
晚六點	全乳	四兩	八十
	全乳	四兩	八十
	稀粥	一碗	一百零八
	烤饅饅	二片	九十
	雞蛋	一個	六十
	煮軟菓子	一兩半	二十四

注意 凡烤饅饅或烤麵包抹上奶油更好

嬰兒食物表第四
二至十二歲小兒適用

時 間	食 物	量 數	熱 單 位
早六點	稀粥 (大米小米麥子玉蜀黍)	半至一碗	五十四至一百零八
	加糖	三茶匙	四十八
	牛乳	八兩	一百六十
早八點	雞蛋	一個	六十
	烤饅饅	二片	四十五
	掛麵一兩加雞蛋一個		一百五十九・六
十二點	肉湯一碗		
	或燉肉菜	半至一碗	一百五十至三百
	菠菜白菜胡蘿蔔 扁豆蘿蔔	半至一碗	七十二至一百四十四
	稀飯	半至一碗	一百至二百
	饅饅	一至三個	一百至三百
	烤番薯	四兩	一百四十八
	小兒點心	二至四兩	九十至一百八十
	生菓子或煮過的		
	八歲以後可給麵條包子		
晚六點	稀粥	半至一碗	五十四至一百零八
	雞蛋	一個	六十
	饅饅	一至二個	一百至二百
	烤番薯	四兩	一百四十八
	糖	三茶匙	四十八
	鮮牛乳	八兩	一百六十
	煮過的菓子	二至三兩	三十二至四十八

注意 烤饅饅抹奶油更好。菓子要用開水沖洗並刮去皮始給小兒食。無論何種未煮過的青菜都不令小兒食爲要。

小兒之疾病

DISEASES IN CHILDREN

注意預防疾病法

Prevention of Disease

倘照料小孩的人，見小孩發育生長正常，應當注意何事？

倘小孩發育正常，其食物，睡眠，運動，空氣等，必須適當充足。另外當注重小孩有何缺點。

小孩倘稍微有點不舒適，是否應當視為緊要？

管理小孩的人，應當明白極微的病，對於小孩身體的生長亦有礙，並同他的內臟機能有重要的關係。醫師曉得許多成人的慢性病，是種根於嬰孩時代的。

何種病在兒時患之，能遺留後患？

麻疹，猩紅熱，白喉，腹瀉，消化不良，骨關節痛等數種病，都可以使小孩身體以後發生重要的病。

有何法能預防小孩的疾病，及免除身體的衰弱？

管理小孩的人，要按一定時期，請醫師檢查小孩身體。

可否至小孩身體已有缺點,方請醫師檢查?

最好早請醫師檢查,能先行預防法,或早施治法,以免身體受損害。

食物在某種病狀或情形下當有的改變

Changes in Food Required by Special Symptoms

食慾減小

當嬰兒漸次減小食慾,而常不能食完其食物時,應如何改變其食物及哺乳?

食物漸次減少,常由於長期哺乳過度,或乳內含脂過豐的緣故,無論從那一點觀察,倘小兒只有不思飲食,但無他病,則應定時哺乳,並將乳質變淡。無論其食足與否,到十五或二十分鐘時,應即將其乳瓶移去,倘繼續誘其哺至三十或四十分鐘之久,或瓶哺之時相隔甚短,不但於事實無補,而且有害。用匙盛乳強灌小兒,此亦不但增重其病狀及增其擾亂,且反發生嘔吐,倘為十或十二個月的嬰兒,最好每日給以三次食物且多飲以水。

此等情形,平常多係由於輕的消化不良。最可靠的治法,就是減少食物,使胃在此時略得休息。最大的錯誤,就是以爲小兒食的太少,恐怕體重減輕,因用誘導,或勉強喂哺太勤。

嘔吐 Vomiting

嬰兒哺乳後，常於數分鐘內嘔吐少許食物，其故安在？

除關於食物的組成外，其他的原因甚多，通常由於哺乳次數過頻，或橡皮乳頭的孔過大，使嬰兒吮乳過速（在四或五分鐘內），或乳頭的孔過小，致吮乳過慢（三十或四十分鐘）的緣故，此等嬰兒吮乳時，常吞入許多空氣於胃內，待空氣洩出時，即繼續帶出小量食物，以至空氣洩盡為止。倘在哺後將其抱起搖動，或搖動搖籃，或抱持弄玩，亦可使嘔吐。

嬰兒吮乳後，有習慣的嘔吐，反胃，或常常吐出小量食物，應當如何改變其食物？

此等情況，常由於乳內含脂太多所致。在此情勢下宜於未搖動乳瓶以前，先將瓶上部的乳酪除去少許，除去多少須要詢問醫師。

用糖是否常增加嘔吐？

倘用糖的量適宜，也未必一定致嘔吐。但用的過多，特別是麥芽糖，有時能增劇嘔吐，所以在有嘔吐情況下，凡麥芽所製的食物，應留心免除。

應當如何改變每次哺乳的量？

此最難下一定則，平常小量濃厚的食物，較好於淡薄的大量食物。當用濃厚的食物時，可減少其每次乳哺的量至原量之半，但倘用濃厚的食物，並且較多於所應用的，是不對的。

腸胃充氣和腹絞痛

Gas Flatulence and Colic

腸胃充氣而擴張，噯氣，吐酸物或酸水，其原因為何，應如何改變其食物？

此與習慣的嘔吐相似，並由於同樣的原因所致，此是一種消化不良的病狀，也常與胃發酵同發，故食多含糖或脂的食物，能增劇此病狀；所以應將食物中的糖和脂減少。在胃中的氣，不僅由吞食物時嚥入，在許多消化不良的嬰兒，也可在不食時吞入。

當有習慣的腸胃充氣和腹內絞痛時，應如何改變其食物？

當腸胃中生氣過多，或吞入的氣進腸，因此腸胃充氣，倘腸內的氣完全洩出，小兒方纔覺得很安適，否則腸被氣擴張，而顯腹內絞痛。

此二種情形，常因大便乾結而增劇，故減免大便乾結，為最佳之制阻法。

腸內生氣，常由於糖或澱粉食物的消化擾亂所致，

在許多嬰兒的食物中,此等食物應行減免,特別是澱粉,應全行除去。直腸的溫度平常爲 98° — 99.5°F (36.7° — 37.5°C),輕熱爲 100° — 101° (37.8° — 38.3°C), 101° — 103° (38.3° — 39.4°C)爲中等發熱, 103° (39.4°C)以上爲高熱。

嬰孩溫度 Temperature

嬰孩正常的溫度如何?

嬰孩身體溫度比成人正常溫度範圍較大,成人肛門正常溫度法倫表爲九十八至九十九度半,百度表三十六度七至三十七度六。小孩肛門正常溫度常見的約與成人正常溫度相同,但在法倫表九十七度半至一百零半度,百度表三十七度四至三十八度一,亦爲正常溫度。

試小孩身體的溫度在何處最爲準確?

最合適即在肛門,肛門溫度比口內溫度高一度。

在肛門中試溫度表當用多少時?

溫度表不止一種,試時最少當在肛門中過三分鐘。

小孩溫度能幫助診斷病的輕重否?

平均而論有幫助。大凡在一百至一百零二度,或三十七度八至三十八度九,平常是輕病。法倫表若過一百零三度,百度表過三十九度半,是重病狀。發熱時間的長

短,比熱度高低尤爲緊要。切記小孩容易有高熱度幾點鐘的長久,但倘在此數點鐘內不夾雜別的病不宜因此定其病的輕重。

小孩有高溫度,較比成人有高溫度,孰爲要緊?

小孩較比大人易於發熱,成人發熱到法倫表一百零二或三度,百度表三十八度九或三十九度四,與小孩熱到法倫表一百零四或五度,百度表四十度或四十度零五相同。

小孩平常易受的意外損傷

Common Accidents of Childhood

小孩碰傷如何處理?

若皮膚碰破,當與傷口一樣注重。倘碰傷輕不爲要緊,略重一點可用熱敷法,很有益處,或用棉花蘸火酒敷在外面。

碰傷倘然皮破流血當如何?

倘是輕傷流血不多,則不緊要,因爲受傷處的細菌可隨血沖出。以後用無菌乾淨紗布裹好。若爲重傷,在四肢遠端流血太多,可在流血的上部用帶子紮住,以止其血流。

受傷的傷口用藥與否?

不當上膏子藥,可用碘酒 (Tr. iodi) 或是一種汞藥 (Sol. mercurochrome),用水洗傷口,當用開過的水爲要。

包裹傷口用何物件?

不要直接用棉花挨近傷口,要用無菌紗布包裹。倘在家中沒有紗布,可用一塊乾淨白布,在開水內煮十五分鐘才可用。要緊記無菌紗布不可隨使用任何傢具拿取,或與他物接觸,當用已煮過十五分鐘的筷子或鑷子拿取。

若小孩遇著火燒或開水燙傷,當用何法處理?

倘有小兒衣服被火燒着,千萬不可用水滅火,因爲火一見水,發生熱氣,更多燙壞皮膚,須要用任何乾厚布類蓋滅之爲妙。

倘是燒燙處較大,必須快送醫院療治。倘爲輕傷,可用家中所預備治燙傷的藥,抹在燒燙的地方,用乾淨白布包好,免得接觸空氣,令其加增疼痛。倘在四肢處,須將傷處抬高,以免多受疼痛。

小兒耳鼻喉部常見的病

Diseases of the Ear, Nose and Throat

爲何許多小兒很容易傷風?

小兒都較成人容易傷風,有些並且特別容易傷風

的,因為有的是由於所住的地方天氣的關係,有的是由於遺傳。容易傷風的小兒,若衣服,房屋和飼育不合宜,能使其更容易得傷風,若腭扁桃體和咽鼻部淋巴腺增大,也是使小兒容易傷風的一種原因。

如何能使小兒不易得傷風?

腭扁桃體和咽鼻部淋巴腺增大時,就應除去。這種方法雖不能使小兒絕對不得傷風,但可減少之。小兒住居的地方和屋內,無論在冬季或夏季俱宜有乾燥的天氣,最難治療的,就是有傷風遺傳性的。

容易得傷風的小兒的食物,衣服和平常的撫育,應如何辦理?

不可多喫澱粉食物(如穀類食物),糖和甜的食物類。多喫脂類,特別是魚肝油,能減少此病,有許多容易傷風的小兒,在全冬季都喫魚肝油,其傷風即因此減少。

小兒所穿的衣服,不可過厚。所有絨裏衣和毛衣服只宜略厚,外衣在室內宜薄,小兒縱在室外也不可穿的過厚致使運動時多出汗。

育兒室宜清涼,溫度以華氏表六十五至六十六度最合宜,若過高,則小兒遊戲時必易出汗而致傷風。

小兒臥室也應清潔涼爽和空氣流通,但在新患傷風的應當使室內略為溫暖。

若欲小兒不易傷風,應在每日早晨行冷浴,其法:先

暖浴屋，傾溫水於浴盆內，放小兒站在浴盆中，使溫水浸沒其足，急速脫去兒衣，用浸冷水的毛巾扭乾後擦其頸、肩和胸三次，此後急將小兒抱起，以粗毛巾揩乾身上的水，並迅速擦揉之，直到皮膚變紅潤為止，若欲反應良好，宜使所用的冷水最冷，進行的手續最快（最好不過半分鐘）。若不能得着良好的反應，必難得佳美的效果。若小兒的皮膚不變紅潤，此乃由於浴法不良，應當繼續揉擦。

在小兒睡眠以前，應用溫水和肥皂沐浴，每星期二次或三次。

傷風是一種傳染病麼？

傷風自然是一種傳染病，所以凡成人或小兒得了傷風，都不應同他接近，並且在微弱和容易受傳染的小兒，應當避免見一切患傳染病的人。

小兒患了急性傷風應如何治療？

食物宜減少，宜多飲溫開水。小兒宜住在室內，設有發熱（如由肛門檢查超過華氏表一百零半度），宜臥在牀上，直到溫度復常為止，室內宜稍溫暖。

不須用什麼藥，因用藥縱能減短傷風的經過，可是確能擾亂消化。

倘能講求衛生，不但能治輕傷風，就是重傷風也可以治癒，如若忽略，結果必至發生最重的夾雜病。

因爲凡小孩的病,多是從口鼻喉部傳染,倘小孩口鼻喉部常常乾淨,內裏的粘液完全正常時,就不容易染細菌。

何爲鼻的衛生要點?

管理小孩的人,當預備細軟乾潔的手巾,替小孩抹鼻涕,擦鼻子,並常教訓小孩每覺鼻內有鼻涕時,就立刻擤出,不可吸回更不當用藥水灌洗鼻子,免細菌傳到鼻副竇,倘必須洗時,當請鼻科醫師爲小孩灌洗,千萬不可自己醫治。

有何好法使小兒擤鼻涕?

先用手指壓一鼻孔,教小兒閉口,用力擤他鼻孔內的鼻涕;然後壓另一鼻孔而擤此鼻孔內的鼻涕。切不可同時壓兩鼻孔而叫小孩猛擤。

倘壓兩鼻孔擤涕有何害處?

因爲如是能使鼻液和細菌入中耳而發炎,照法擤鼻涕是一件很重要的事,應在嬰兒時期即訓練之使成一種習慣。

口喉的衛生要點爲何?

第一是牙齒,要牙齒常乾淨,不可有壞牙,倘有壞牙當趕快醫治。若有口炎,亦要快治。最好每次飯後,用鹽水漱口喉。

小兒爲何常有鼻喉的病?

因為小孩鼻的後部，喉的兩旁，有一種組織，最易染細菌，發炎腫大。

由何形狀能知道小孩鼻喉部有發炎腫大？

小孩倘有這種毛病，必然開口呼吸，睡覺不安靜，說話有鼻音，常有鼻涕，容易有嗓子痛。

小孩的鼻後組織及扁桃體腫大，對於小孩的發育有何關係？

小孩有此病，鼻喉常常塞閉，通氣不順，所吸的空氣很少，不能多得空氣的滋養；並且此病更容易傳到肺內使小孩得肺病。

倘看出小孩有此病，有何辦法？

當趕快請醫師醫治，倘鼻喉部組織常常腫大，當速用外科手術割去。

小兒耳病

倘小兒有耳痛，中耳炎以及耳內流膿是何原因？

小兒有傷風和嗓子發炎，細菌很容易從耳咽管受染到中耳，使小兒有耳痛或流膿。

小兒有耳痛，管理人應如何辦理？

小兒有耳痛，在家中可用溼熱或乾熱敷法（用乾熱物敷疼處）或用熱水袋使小兒的痛耳枕在上面，切不可用何物件掏耳，或用油，藥滴入耳內。若用熱敷，痛仍不止，可速請醫師查看，免得細菌傳入腦內。

倘小兒耳流膿應如何辦理？

小兒耳內流膿，看見後就當請醫師查看，速為醫治。倘延遲不治，恐變慢性流膿，日久不易治好，有致耳聾的危險。

小孩受意外的損傷，管理小孩的人有何辦法？

倘見小孩受要緊的損傷，當立即請醫師診查，萬一當時不能速請醫師，當用一暫時維持方法，等待醫師調治。

小孩鼻子流血當如何處理？

若小孩鼻子容易流血，要請醫師檢查他的身體，因為小孩有幾種病可先致鼻子流血；當流血時，用手捏住小孩鼻翼，以阻其多流，有時用冰放在小孩鼻翼上，或腦後枕骨下亦有幫助，並使小孩坐起，不要臥牀，頸部領扣都解開。

小孩大便稀，次數多的病 Diarrhea

小孩大便稀次數多的病，是否相同？

按其原因可分兩種，一是腹瀉，一是痢疾。

小孩為何得腹瀉？

腹瀉多見於夏天，因天氣熱時，身體受熱，消化不良，或因吃腐壞的食物所致。

如何能得痢疾？

倘吃含有痢疾原蟲或痢疾細菌的食物或水，可得痢疾。有時因蒼蠅帶細菌落在食物上，或在小孩的口脣及手上，隨之進入口內，就可發生此病。

何種食物及水能含痢疾原蟲與細菌？

未煮開的水及鮮乳，青菜，生瓜果等，或蒼蠅落過的食物，皆可致痢疾。

小孩腹瀉或痢疾有何種不舒服？

病起首時，大便稀，次數多，或有下墜，肚子痛並嘔吐，發熱，大便有粘液，或有時帶血。

預防此病的要點是甚麼？

在天氣熱時，小孩不要多穿衣服，當常在空氣流通涼快的地方玩耍，每天洗澡。孩子睡時，當在蚊帳內，倘為嬰孩，牀上須常有蚊帳，以防蒼蠅落於面上。母親應當完全管理小孩所吃的食物；腐壞的乳，萬不可吃，當完全吃自作的食物，萬不可吃街市上所賣的零碎食物，更不可喝街市上所賣的冰水與汽水等。

倘小孩已得腹瀉痢疾當如何辦理？

若為吃奶的小孩，每次吃奶時，可先給他半杯溫開水。倘有嘔吐，只喝白開水一天；最要在此時須令其多喝開水。若吃瓶子奶，預備奶時，可減少一半，奶內不可加糖，多加開水到足用數，此時當停止內服魚肝油，並且常要

涼快安靜。

倘小孩有此病，當停止吃青菜果子，只吃稀飯，米湯，雞子，要多喝水，常躺臥，不可行走，以免其病加重。

倘照以上的法小孩病不減輕，當如何辦理？

最好起首時，就請醫師診治，因此病愈早治結果愈好，倘病已重，就不易治療，切不可隨便任意吃藥，倘不便請醫師診治，只可吃一服蓖麻油，餘藥均不可用。

小孩有腹瀉為何給他瀉藥？

因為腹瀉是在腸內有腐壞食物的緣故，瀉藥可幫助腸子快排出此腐壞食物。腸內既有腐壞食物，故不可給他止瀉藥。

倘一覺得此病，最好辦法為何？

當快請醫師診查，方可對症下藥，不致錯誤。

嬰兒梅毒和淋病的傳染與管理法

Syphilis and Gonorrhea in Children

嬰兒得梅毒的原因為何？

初生嬰兒有梅毒病，乃因其為胎兒時，染母血內的毒，故生後發生梅毒。

嬰兒生後如何方能受染梅毒？

如大人有梅毒病，口內有潰瘍，與嬰兒接吻，就可傳

染。倘將口內有梅毒潰瘍的大人所用的碗及筷子使小兒用，亦能傳染。奶母有梅毒，奶頭有破裂處，嬰兒吮乳時，亦能受染。

嬰兒有何情形能使其母想及他有梅毒？

嬰兒生後，身體常較小，皮膚乾燥，發鬆，好像老人的；口唇破裂，手掌足掌脫皮，鼻常塞不通等情形，就可以疑其有梅毒。

嬰兒若有梅毒當在何時治療？

每個懷孕的母親，倘疑惑有梅毒，當在第四月前，要查其血是否有梅毒，倘有梅毒，須在第八個月前完全治好，如此方能使嬰兒生後不致有梅毒。

倘嬰兒生時有梅毒應在何時治療？

已知道嬰兒有梅毒，就當趕快醫治。

醫治母親的梅毒，是否同時亦當治療嬰兒？

治母的梅毒所用之藥，由母乳排出極少，亦不可靠，所以並不能醫治嬰兒，當另外治嬰兒自己的病。

治小兒的梅毒須若干時方能除根？

至少需兩年之久，治病時要請一良醫檢查全體，不可請只會射針的醫士。

嬰兒與小孩如何能得淋病？

此病有從生時受染的，亦有從生後受染的。

嬰兒生時如何受染此病？

倘母親陰道部有淋病細菌,當嬰兒從陰道經過時,能染及嬰兒的眼目或陰道部。

嬰兒生後如何傳染此病?

若管理嬰兒的人有淋病,此人的手指或有淋病細菌,最易染到嬰兒的眼目,及陰道部。例如洗臉盆,手巾,同廁所的凳子,更易染及嬰兒。有淋病的人,萬不可和嬰兒同眠。

小兒有何症狀能令母親與管理的人想及他有淋病。

小孩的眼睛或陰道部有流出物,並常見有不少的黃膿。

小孩有淋病當在何時治療?

一看見小孩的眼睛或陰道部有流出物,即當請醫師查看,並用顯微鏡檢查,要確實知道是否為淋病。

小孩有淋病是否容易治好?

若用除根治法,必須有耐心,聽從醫師的治法。治療的時間,長短不定,有時必用很長時間才能除根。

疝氣(赫尼亞) Hernia

平常的疝氣,就是小腸的一部分由腹腔內突出而成。在嬰兒最常見的地方就是臍部(俗名肚臍),大小兒

在腹股溝部（俗名腿腠）。

如何能認出此等疝氣？

成塊狀，大小不一，小如指頭，大如核桃，常顯現於以上所說的地方，每在咳嗽，哭叫或用力後突出，而在小兒躺平後容易推回。

如何能制止小兒的臍疝？

一切嬰兒，在起始數月內，應纏腹帶，特別是瘦小和微弱的嬰兒，應纏腹帶數月之久，肥胖的也應纏數星期。

倘嬰兒有臍疝應如何處理？

平常的臍疝，其直徑少有過半吋的。治療法，就是放嬰兒躺平，用一結實棉球將臍疝壓回；後用一條寬二吋半，長七或八吋的粘膏（又名橡皮膏）橫貼將其壓閉。俟其鬆緩後纔再換新的（大概一或兩星期一換）。照此法做去，到痊癒為止。此等粘膏遇水常不脫落，所以也應照常沐浴。當撕下粘膏時，用汽油助其分離甚易。

粘膏應貼多久？

有許多嬰兒應貼至六或八月。倘嬰兒甚小，只貼一短時期也足成功。每次換粘膏時，其皮膚應細心用酒精洗潔，並乾後撒以粉。貼粘膏時，也不一定須貼在原處，頭次橫貼臍處，第二次就可斜貼，如是可不使皮膚生瘡。

腹股溝疝或大臍疝應如何處理？

此等疝甚有關係，不可忽略，常須用疝帶，並有時須

行外科手術,如此的小兒,應請醫師治理。

抽風又名驚風 (Convulsions)

小兒抽風,倘醫生還未到,應如何辦理?

首先應當知道的,就是抽風本身並不是很危險的,在許多病人,雖不用任何治療,也只抽到數分鐘就止住了;最好不可用偏方治療。

應放小兒在一最清靜的地方,頭部敷以冷物,脚下加溫使煖,其他身體各部,用大毛巾浸芥末水(就是將一羹匙芥末,加入兩大碗(1000 c.c.)溫熱水內而成),扭乾後包裹全身,僅露出頭部。也應預備熱沐浴的物件,倘醫生到時要用,就可立時施行。

何時宜用熱水沐浴?

倘抽風不止,脈搏弱,臉色灰白,指甲和口脣變紫,以及手足冷,就可用熱水沐浴,其作用就是把血促至表面,以減輕心,肺和腦的充血。

熱水沐浴的方法如何?

水之溫度不能過華氏一百零五度,此須用溫度計試驗,若無溫度計,可用手並肘伸入水內,以覺熱不燙為度,水的溫度若不預先試定,則常有燙傷,甚有因以致命的危險,倘在浴水中加半茶杯芥末,功效更大。

外物入竅 Foreign Bodies

倘小兒吞下物件應如何處理？

第一須要確實知道小兒是否吞下物件，有時以爲該物是小兒所吞，但不久又在小兒牀上或他處尋得，不過徒受虛驚而已。第二，應用指頭探喉，倘該物尚在喉內，就當取出；倘已不在喉內，大都下到胃內，於是每日應當察視糞，以便確實知道該物是否排出。

還須用其他療法麼？

小兒應多食乾物，如麵包，洋芋，穀類食物等。但無論如何，不應服吐瀉藥。若在嬰兒，可食通常食物。

就是外物已吞入腹內，也不須過於憂愁，因爲不但光滑的物如扣子，小錢，水果核，常能經過消化道，就是有稜角的物甚至未扣着的扣針，也大抵不致有何損傷。

若服瀉藥有何害處？

瀉藥能使該物經過腸甚快，致損傷腸膜或腸壁。不應服瀉藥的理由，就是要外物緩行，被糞包裹，不致顯何損傷。

該物須若干時間纔能排出？

大概五或六天，有時須二或三星期，但有時或較此更久。

倘小兒塞外物入耳內,應如何處理?

倘該物不能用指取出,不可輕用別的方法去取,因這樣必使外物入耳更深,故倘有此事發現,應請醫生處理。

倘小兒塞外物入鼻內,應如何處理?

可叫小兒按壓空的鼻孔,用力鼓氣,有時如此即能將外物逐出,若無效應請醫生處理,也不可輕用別的方法去取。

貧 血 Anemia

何爲貧血?嬰兒及小兒患此病的原因爲何?

貧血就是血中紅血球和血色素(hemoglobin)缺乏,此病很易發現於小兒,最大的原因,就是缺乏新鮮空氣與不合宜的飼養。

小兒患貧血病的病狀爲何?

患貧血病的小兒,其皮膚常顯灰白色,特別是脣和耳,顯血循環不好,容易疲倦和手足發冷,體重不足,增重甚緩,並大概較正常的低。

在飼養中,有什麼特別錯誤可使小兒患貧血病?

在嬰兒,常由於喫人乳過久,因人乳對於小嬰兒固然很好,但在較大的小兒,就不可視爲一種完全食物。完

全哺人乳至十五月或十六月,以及人工飼養的小兒(大概全食牛乳的),或有時食至兩年半或三年的,都易得貧血病,其最大的原因,都由於斷奶或斷奶瓶過晚,而不食一切固體的食物所致。

應如何處理此等貧血的小兒?

哺乳的嬰兒,在第八或九月以後,即應起始食他種食物。

無論如何,斷乳的時期不能緩過一年以後,一切的嬰兒,在第十二或十三月以後,除了午後十點鐘用瓶給乳以外,都應當斷瓶乳,第八或第九月以後,於乳之外應給與他種食物。

患貧血病小兒的食物,每日的乳量,應不過二十至二十四兩,除乳以外,其餘的應為穀類食物,特別要緊的為燕麥,蛋類,牛肉汁,青葉菜類(特如菠菜或青荳角荳類如四季荳),橘子汁或別樣菓子汁。

患貧血病的小兒,應多在室外生活,縱在冬季,也應每日至少有四或五點鐘居於室外,日光浴,對於嬰兒或小兒都很有益處,其他的治法,藥也常為必需的一種。

初生小兒七日風（亦名臍風）

Tetanus in New Born

爲何小兒生下有發七日風的？

是因爲小兒產時，斷臍帶與包裹臍帶的物件器具，染有一種細菌的緣故。

此病有何先兆能叫母親看出知道？

有這病的小兒，生後吃乳很好，到第五六天始不吃乳，口閉很緊，再過一兩天，一觸動他就抽風。

小兒生時有何法能防此病？

最好在小兒生時，請一位的確明白產科的醫師與明白接生能用無菌法的人，不但斷臍帶時要小心用無菌法，就是換敷料時，也要小心用無菌法。

倘在鄉僻的地方不能覓此項人應如何辦理？

要先自己向藥房買此項無菌的線和敷料，預備應用，若無處去買，可用家中的白布和線在水內煮開二十分鐘，或用火酒泡兩天亦可。用鐵剪子斷臍帶，可先把剪子在水內煮二十分鐘，或在炭火內燒紅，待冷再用。以上所備的物件，均不可與別物接觸或用手摸，要用煮過的筷子或鑷子夾起放在一個煮過的盤子內。等用時，斷臍帶人要先用肥皂洗淨手，然後再拿剪子與別物剪臍帶。

與包裹臍帶,以後換臍帶敷料時,還須照用此法,不可大意。

倘小兒產生時未用此無菌法斷臍帶有何法可免此病?

倘此時未過三日,可請醫師注射破傷風抗毒素。

嬰孩常見之接觸傳染病

Contagious Diseases

何種疾病極易傳染嬰孩?

麻疹,百日咳,猩紅熱,水痘,天花,白喉,嬰兒癱瘓,此數種皆為易染的病。

有何法能預防此類病?

這數種病均由口鼻,或發炎處的膿而傳染,倘要預防,須不令有此病的人接近嬰兒,免致病者從口鼻呼出的小水點傳染此病於嬰兒,至於病人所用的器具,衣被等等,及餘賸的食物,均不可與嬰兒接觸。

倘嬰兒已得此病,有何法可防其再傳於別人?

當將有病嬰兒隔離於一特別室內;室內一切物件倘不能潔淨,可先搬於他室內,所吐的痰與鼻涕等物,均須投諸火內焚燒,並且病嬰所居的室內,別人不得任意出入。

母親對於無病的嬰兒有何法可免其傳染？

母親入病嬰室內時，須先將其外衣脫下，另穿一寬大白色衣服，此衣須蓋過全身衣服，方為合法，並用白布一塊包其頭髮，且須帶口罩。出病室時，可先洗手，將白衣在室內脫下，掛於門內，並小心將衣的外面向外，內面向內，以保護白衣的內面不染細菌；然後進他室內。倘嬰兒所穿的衣服不便洗滌，須置於太陽光內晒一日。病兒所用的碗、匙，及別樣器具，須在開水中煮沸十分鐘。至隔離期已過，可用溫水洗病人的全身，然後到他屋內換上潔淨的衣服。

嬰兒痊癒後其隔離室須用何法消毒？

薰法的功效不甚佳，最好用熱胰子水洗刷一次，然後將門戶大開，令太陽光射入，並使空氣流通二十四小時。至於所用玩物，均當浸於胰子水內；倘係不能洗的被褥，須置於太陽光下晒兩日。

(甲)百日咳早期有何病狀？

(Pertussis)

嬰孩在發生百日咳的前十天，必發現似傷風咳嗽的病狀，咳嗽漸次加重，兩禮拜後變為間歇的咳嗽，且有痙攣性咳嗽，咳嗽後有一回氣的吼聲。咳時臉發紅，眼流淚，以後或有嘔吐。

何種嬰孩得百日咳最爲危險？

不滿兩年的嬰孩倘患百日咳甚爲危險；在身體軟弱的大孩亦然。

(乙) 麻疹早期的病狀爲何？

(Measles)

此病是慢慢而起，初起時有發燒，咳嗽，鼻涕，流淚，噴嚏，三四天後，耳後發生小紅斑，以後發現於額和頸部兩旁，再漸及於周身。

麻疹一病是否重要？

在不滿兩年的嬰孩最爲重要，倘在冬季發生，最易得肺炎。

麻疹在何時最易傳染，並由何法傳染？

當小孩發燒，咳嗽，及其有眼淚，鼻涕等時，均能傳染。又於未發麻疹前的兩三天亦能傳染，多爲直接的，少爲帶菌人所傳染者。

(丙) 猩紅熱病的早期病徵病狀如何？

(Scarlet fever)

此病忽然發生，有嘔吐，溫度增高，咽喉疼痛，於二十四小時內即發生疹子，兩頰先發紅，以後頸部胸部的皮膚亦紅，不過兩日全體成桃紅色，其中能見有小紅點。

猩紅熱病在何時最易傳染？

此病於早期即能傳染別人，到溫度最高時更易傳染。倘此病發生，能使中耳發炎或頸淋巴腺腫；此等膿均可為傳染物，且最輕的病能傳給別人使得最重的病。

(丁) 水痘早期病徵病狀為何？

(Chickenpox)

早期在頭面及胸背有稀疏小紅丘疹，先見於頭皮，後見於胸背。此丘疹先為紅色，後變透明小水泡，皮膚發癢，體溫不甚高。若抓破小水泡，以後即結膿痂，如不抓破，即不結膿痂。

(戊) 白喉早期之病狀為何？

(Diphtheria)

或忽然而起，或慢慢而起，咽喉疼痛，下頷淋巴腺腫大。忽然起者，體溫忽然升高，慢慢起者，體溫慢慢增高。

(己) 何為嬰孩癱瘓病？

(Infantile paralysis)

此病沒有一定的先驅病狀。有時小孩上肢或下肢，忽有一或二肢體不能動作。有時在癱瘓前忽然體溫升高，易激惹，不喜玩。

(庚) 天花的情況爲何?

(Smallpox)

初起時發熱,頭背皆痛,沒有精神,身體無力,三天後額與手腕的皮發生硬丘疹,以後散布周身,在額面與四肢的外面特別多,再過兩日硬丘疹內有黃色液體。

設小兒染此數種病,何時發現病狀?

猩紅熱爲二至五日,至多不過一禮拜。

麻疹爲九到十四天內現出病狀。

百日咳爲一到二禮拜。

水痘二禮拜到三禮拜。

白喉無確定時間,有時一兩天,有時於兩禮拜後方現病狀。

天花爲十二日至二十日內發現病狀。

嬰兒癱瘓病則不過兩禮拜。

此數病是否同樣的易於傳染?

麻疹及水痘最容易傳染,小孩更易染此病。百日咳對於極小的嬰孩最有危險,不必定在一室內方能傳染,即在街上遇見患百日咳的小孩,從空氣中亦能傳染。白喉與猩紅熱必須接近病孩或病孩帶菌之物方能受染,隔離即不受染。

預防病孩傳染別的小孩,須隔離多少時間?

疹子發現後，當隔離兩禮拜，水痘從發現到落痂後，最少宜隔離十二天。白喉從得病日起，至九天後，連續培養三天，到證明無白喉細菌爲止。嬰兒癱瘓當隔離三禮拜。猩紅熱病，最少須隔離一月，倘有頸淋巴腺流膿，或耳流膿，須隔離到無膿時爲止。天花須隔離到痂完全脫落時爲止。百日咳從察出後必須隔離四星期，方爲安全。

(辛) 流行性腮腺炎是怎樣起頭的？

(Mumps)

耳下腫大，當其更再發展時，前可腫至頰，後至耳後。此病可顯現於一側或兩側。

幼小兒少有得這個病的，縱得也很輕，但過了十二或十三歲後常很重。

當小兒起始顯出病重的症狀時，應如何處理？

小兒應睡在牀上，倘爲嬰兒，其食物應照前面說過的沖淡一半。倘爲大兒，只應食液體食物。倘小兒發熱，應用溫度計考其溫度。無論何種藥，都不可私自給與，須請醫生診治。當醫生未到時，卽應起始隔離，等醫生到後聽命而行。

在育兒房內，有何法訓練小兒使其不十分抗

拒檢察身體和一切的治療？

應教一切的小兒漱口，及如何說「阿」字以便檢察

時顯露喉部,如何吞服藥片,如何看待醫生如同最好的朋友,並如何尊重醫生的治療,萬不可用恐嚇手段使其服從醫生的一切。

倘能循循善誘,四或五歲的小兒,就能教成自己漱口和吞藥片,二或三歲的小兒,能自願開口察喉,此等事實大半都從教育得來,所以應當努力訓練。

傳染病之免疫法

Immunization Against Contagious Diseases

打白喉預防針

何爲打白喉預防針?

就是打了此針後可以預防白喉病。

打這個針常有效麼?

不能說百發百中,但只可說大多數是有效的。

每個小兒都應該打這個針麼?

不然,有許多大兒都是天然有這種抵抗力,所以不須打這個針。

如何能知道小兒有這個抵抗力?

有一種希克氏試法 (Schick test), 能試出小兒有無此抵抗力。

何爲希克氏試法?

就是用少許試劑注射入皮內，若注射的地方，在二或三日之後，顯一特別的紅團，這是陽性反應，表明小兒沒有具着抵抗白喉的能力。

白喉預防針是怎樣打的？

有一樣藥須接連打三次，另有一藥只打一次，但須由醫生注射纔穩妥。

打這個針有危險麼？

倘注射謹慎周到，在小兒是沒有什麼危險的。

小兒在什麼年歲最合宜打這個針？

最好在小兒六個月至十二個月之內。

亦有須重打纔能生效的麼？

打針過三個月後，用希克氏試法看有無抵抗力，如未發生抵抗力，可再打。

種 牛 痘

每個小兒是否都應種牛痘？

無論如何，每個小兒都應種牛痘，因能普種牛痘所以纔少有天花的發現。在村莊或大鄉鎮和城市的地方，若種牛痘沒有普及，天花的流行就要同昔日一樣多了。

種牛痘在臂上好呢，還是在小腿上好？

難說一定，總以何處容易保護不動並且乾淨，就宜種在何處，不能行走和爬的嬰兒，宜種在小腿上。大兒宜種在臂上，倘種在大兒的小腿上，當脹漿時，應臥在牀上

不可多行走。

應在何時再種？

倘種後不出，也沒有什麼關係。可在一二星期後再種，總以種後發出爲度。以後每兩年復種一次。但是無論何時倘與患天花者相接近，就應當趕快再種。

指導小兒的方法

Child Guidance

父母與小兒的關係：

父母應當如何顧及小兒對於人生所有精神上的反應？

父母應當將小兒算作有思想有感情有理解的個體。他所有的感覺，比如愉快，疼痛，懼怕，忿怒，嫉妒，亦與成人的感覺相同。小兒向父母質疑問難時，切不可嫌其麻煩拒絕解答，因爲不回答小兒的問題，容易失去他的信仰。須要叫小兒覺得他的父母是很誠懇地隨時可以和他解決他的問題的。

指導幼兒動作的自然原則如何？

小兒的自然動作很簡單，只知滿足自己的需要，不顧他人的利害。這些動作是受感覺愉快所支配。凡可以使他快樂的事他就謀求，不舒服的事他就避開。

父母應當如何引導小兒，由天然自私的行爲到正當合羣的動作？

小兒有不良的特性，父母應當私下向他說明不好的所以然。照這樣的引導，小兒不久就覺得正當合羣行爲的愉快和寶貴。小兒所有慷慨的精神，應當鼓勵他獎勵他。

極活動的幼兒應當如何指導？

幼兒極活動而不安靜，不必用法壓制，但當指示他以相當的道路。父母當認定幼兒的活動，須要隨時加以相當的指示，即在疲倦時亦當如此，不可在此時罵他或罰他，使他難堪。

關於小兒的服從性，父母當持何種態度？

倘要養成合宜的人格，嚴格訓練，強制服從，是有害的。因為這一種的服從，是由於懼怕而來，可以摧毀他的獨立思想。並且這樣管理小兒，可以使他變成羞怯，懦弱的性情。要小兒服從，當要使他尊敬和信仰而出於樂意的。所有命令務須視其是否合理和必需的。就在必需的命令，亦應不多，纔能得到他的服從。倘小兒執意不聽，方加以相當的責罰。

父母應當怎樣同心訓育他們的小兒？

父母訓育小兒，應當取明確了解完全合作的精神。父親的命令，母親不要撤消和反對，母親的命令，做父親

的亦當如此。父母不可當着小兒爭論他的問題，以免擾亂他的觀感。小兒的行爲，亦不可當着小兒同別人討論；附耳低語的害處，比公開的表示還大。

要得小兒服從，利誘或恐嚇的方法是否可行？

用這兩種方法訓育小兒，得他的服從，都是不對的。倘因小兒盡職而付給代價，可養成他自私和貪得的人格；恐嚇只能使他害怕而不是必要的，且恐嚇多不實行，反使小兒對於父母失去信仰。

訓育小兒的人向小兒說謊是否可行？

千萬不可叫小兒知道教管他的人有違背真誠的事。凡應許小兒的事，務須要實行。

父母應當如何應許小兒的要求？

父母若要滿足小兒各樣的要求，不久就知道小兒的要求是無厭的，倘然稍微有點不遂意，就會生氣，哭啼，叫喊及暴怒。所以當在幼年的時候，就應叫他知道所喜悅或需求的事，是不能件件滿足的，因此要訓練小兒叫他感覺到家庭雖是安全，但非百事都能完全的。

小兒如何會發生害怕和害怕的害處如何？

小兒害怕動物和醫師或黑暗，都是大人常常談及和故意嚇他所誘起。不良的電影和故事，亦可以叫他恐嚇。小兒不聽說，父母切不可用送到醫生那裏去扎針的話去嚇他。倘然小兒先有害怕的成見，在生病請醫診治

的時候，往往妨礙醫生的相當診察，並且恐嚇常可減少小兒的興趣和他活動的範圍。

小兒嫉妒最常的原因從何而生，和如何表顯？

與別的小孩作不相宜的比賽，爲嫉妒發生最要的原因。嫉妒的表顯多爲易怒，忿懣和喪氣，因爲他有這樣的嫉妒心，所以遇有不遂或失望的事，就顯出忿怒的反感來。父母當訓練小兒對於此種失望的事情應安然處之，不可忿怒或叫囂。對於不遂或失望易起忿怒的習慣，在成人太爲不宜，應當在早年教訓他這一種暴烈的怪態對於自己是不相宜的。

小兒何以有破壞性？應如何矯正？

小兒破壞物件不必然由於頑皮，或因好奇心所驅使，或願意知道物件內容的緣故。給小兒的玩物最好能拆下和安上的，應在幼小時教導他能察考和不能察考的東西的分別。切不可讓小兒在發脾氣的時候毀壞物件。

戒除小兒的壞習慣有何良法？

小兒的壞習慣不必用勉強的法子去禁制他，應當用別的相宜的習慣去代替。好好告訴他不好習慣的結果，而教以好習慣。

如何教小兒明白誠實與真實的寶貴？

真誠的精神，應當貫徹在家庭之中，幼孩對於所知

事故的真實或虛妄有時不易區別。關於虛幻的故事，可對他說這是一種教人相信的故事，並非實有其事，這樣纔可以教他分別。應當鼓勵小兒誠實或真實。若見有不真不實的事，就要引他注意，但嚴重的懲罰，非但不能悔改，恐怕還要加重。

小兒偷竊的原因爲何？如何能夠矯正這種不好的習慣？

訓育小兒的人，務必記得小兒生來原沒有私有物的思想。所以在幼時應當教訓他物各有主，屬於別人的東西，非經請求，不能取用，屬於他自己的東西，也應當教他放在一定的地方，以便好好保存。倘小兒故意取他人之物，必須強制他歸還，聲明錯誤。訓練小兒不可意氣用事，應當用公開坦白的態度應付這類的事件。小兒有這種不好的行爲，父母切不可爲他掩飾。

有的小兒偷竊，爲要補償自己所缺失的，這樣當教他去做當作的事，並且鼓勵他好好去做，方可改正他卑劣的思想。

責罰小兒之目的爲何和最適當之方法是什麼？

責罰小兒的目的，在阻止他再犯，並且發展他的自治心。責罰時應當說明原因，並對於他以後的希望。倘間或必須責罰，應當緊施於犯事之後，爲父母的切不可顯意氣用事的態度。所用責罰的方法，應輕重得當，父母責

難他，剝奪他的權利或玩物，暫時將他離羣，或依自然的結果，都可以幫助他服從。有時教他注意不好的自然結果就夠了。身體上的責罰不可輕用，因為能夠叫他害怕，並且使父母與小兒間的關係惡化。

小兒在什麼年齡方可接受性的教育？

這沒有確定的時期。小兒或在很早的時候，發問小妹妹從何而來，可以坦白的告訴他是從母親生的。幼兒有所發問，倘然爽快地回答他，往往就能滿足。不必然說明得過於詳細。父母應當隨時回答他的問題不必礙口。倘父母不能盡此責任，小兒就不免要向外面向別人打聽，這是很有危險的，因為別人不免要加上多少污穢猥屑的事去告訴他。父母對於性教育的態度不要着重，亦不要秘密。

遊戲在小兒的發育上有何功用？

有益衛生和有利的遊戲能夠加增理智和情感的發育，也是養成合作，公正，誠實，體恤，同情等事的莫大機會。小兒們遊戲應當同年齡相當或稍大一點的為好。小兒遊戲應當少受成人的干涉。倘意見不合，莫若讓他們自由解決。

常用權量對照表

英 美 制	萬國制(中國新制同)	中國舊制
1 量 滴 (m.)	...0.06 蚝 (公撮, c.c.)	... 0.006 勺
1 喱 (gr.)	...0.06 克 (公分, gm)	... 1.74 厘
1 噤 (dr., 60喱)	...4. 克 或 蚝	... 0.35 勺
1 兩 (oz., 8噤)	...30. 克 或 蚝	... 2.85 勺
1 磅 (lb.)	...0.45 斤 (公斤, Kgm.)	... 0.76 斤
1 夸 (qt., 兩水磅)	... 1.00 蚝	... 0.91 升

萬 國 制	英 美 制	中國新制
1 克 (gm.)	... 16.23 喱	... 1 公分
1 蚝 (c.c.)	... 16.23 量滴	... 1 公撮
1 斤 (Kgm.)	... 2.2 磅	... 1 公斤 (即新稱2斤)
1 立特 (L.)	... 1.05 夸	... 1 公升

美國杯匙	英美權量	萬國權量
1 茶 匙	... 1 噤	... 4.5 蚝 (公撮)
1 中 匙	... 2 噤	... 10 蚝 (公撮)
1 湯 匙	... $\frac{1}{2}$ 兩	... 15 蚝 (公撮)
1 杯 (cup)	... 6 兩	... 200 蚝 (公撮)
1 盞 (glass)	... 6 兩	... 200 蚝 (公撮)

食 品 概 數 對 照

概 數		英 美 制		萬 國 制	
蔗 糖	2 平湯匙 ...	1.	兩	...	60 克 (公撮)
乳 糖 } 芽 麥 糖 }	3 平湯匙 ...	1	兩	...	90 克 (公撮)
麵 包	1 片 ...	4	噐	...	15 克 (公分)
奶 油	1 方 ...	2.5	噐	...	10 克 (公分)
鷄 蛋	1 枚 ...	1.5-2	兩	...	50-60 克 (公分)

食 物 成 分 之 熱 力 價

每 克	熱 力 價
蛋 白 質	4.1
炭 水 化 物	4.1
脂 肪 質	9.3

索引

	頁數		頁數
二 畫		牛乳蛋糕	99
人工熱	28	牛乳之選擇	67
人工養育法	66	牛乳之要點	67
人工乳之預備	83	牛乳改善法	70
入學後的高度體重表	38—41	牛乳與人乳之區別	71
三 畫		不足月嬰兒的撫育法	27
大便	32	不喜食常用品之辦法	92
大麥湯	97	五 畫	
大便之形狀	33	皮膚	6
大米糕之作法	98	皮膚保護法	6
大小便之處理法	32	白喉	133
大兒食物之預備法	91	白喉預防針	136
小兒點心	98	出牙	52
小兒之疾病	108	出生至入學時之高度體重表	38
小兒牀之預備	15	生殖器	5
小兒的攜帶法	23	半煮蛋	98
小兒易受之損傷	113	母乳之益	71
口喉鼻衛生之要點	117	外物入竅	126
四 畫		包皮截除術	5
天花	134	加糖之方法	72
水痘	133	六 畫	
戶外睡覺	17	窗門閉合	44
午後睡眠	17	衣服	9

肉醬	96	空氣	12
肉湯	96	疝氣(赫尼亞)	123
年齡	79	乳頭	84
行動	45	乳凍	97
休息	91	乳塊	97
吐乳	62	乳清	97
吐食物	110	乳量表	81
百日咳	131	乳不足	60
沖乳之法	72	乳粉之用法	88
考察溫度	29	乳瓶之處理	83
吃飯時之管理	92	乳腺多分泌法	30
耳流膿之料理	119	乳母飲食為何	66
耳鼻喉部之病	114	乳加熱及冷卻之法	75
耳炎及流膿之原因	118	育兒室	10
七 畫		易發現之病	108
冷卻箱	69	油類擦澡法	4
吮乳之位置	85	服瀉藥之害	126
吮乳之時間	86	九 畫	
尿布之處理法	8	保溫法	28
含維生素之食物	95	洗澡法	1
每日須食之次數	102	洗澡之要點	1
身體與理智的發育	35	食物表	104
八 畫		食之次數	92
玩具	18	食慾減小	109
抽風	125	食物之禁忌	92
刷牙	91	食物過多之現象	79

食物過少之現象	78	排泄按時	33
食物必含之成分	93	眼和眼病	6
食含細菌之食物	120	理智的發育	35, 46
指導小兒的方法	138	瓶乳之處理	68, 83
十 畫		瓶哺之預備	68
痲子	7	乾食品之好處	88
哭叫	21	健康習慣的訓練	90
高度	37	健康嬰兒的食物	78
哺乳	54	第二年小兒飼育法	102
哺乳器	31	梅毒及淋病之管理法	121
哺乳次數	54	十二畫	
哺育的程序	55—59	接吻	25
哺育小兒的方法	85	痢疾	120
哺乳間隔之時間	54	猩紅熱	132
哺乳應注意的事	54	喂乳次數	81
穿衣之要點	9	備乳之手續	84
病時食物當有之改變	109	備食物緊要之事	83
流行性腮腺炎	135	十三畫	
晒太阳	14	碰傷	113
十一畫		運動	20, 62
淋病	121	遊戲	62
貧血	127	睡眠	15
麻疹	132	睡覺之要點	17
授乳表	55	睡覺不安之原因	17
蛋白水	97	傷風	114
蛋白質乳	76	傷風之防法	115

傷口之用藥	113	十六畫	
腹瀉	119	營養不良	43
腹股溝疝之處理	124	選食物之要點	93
腹瀉痢疾之處理	120	燒傷及燙傷之處理	114
煉乳(罐頭乳)	89	噁氣及吐酸水之料理	111
煉乳之用處	89	十七畫	
過哺之害	87	蔬菜	99
新鮮空氣	12	臀部護理法	7
新鮮牛乳的代替品	88	臀和會陰部發炎的預防	24
歲數計算表	51	十八畫	
試乳之溫度	85	斷乳方法	63
預防疾病法	108	臍疝之處理	124
微弱兒撫育法	24	雞蛋作法	101
傳染病之免疫法	136	十九畫	
腸胃充氣和腹絞痛	111	壞習慣	25
十四畫		二十三畫	
說話	49	體溫	28
嘔吐	110	體重	35
種牛痘	137	體重不加之處置法	32
僱乳母的要點	65	二十四畫	
鼻流血之處理	119	癱瘓病	133
鼻喉發炎之形狀	118		
十五畫			
麵包	104		
養育法	54		
鞋襪帽子之合宜	9		

中華醫學會出版

各種醫書之目錄

如蒙向

上海北京路一四零號廣協書局

或

濟南齊大醫學院中華醫學會編譯部

索取當即寄奉

中華民國二十五年一月再版

版權所有

(育兒指南)

編著者 史安納 (Dr. A. V. Scott)

校訂者 魯舒 德舍 馨予

再版增訂者 史魯 安德 納馨

發行者 中華醫學會編譯部

總發售所 上海 廣協書局
北京路一四零號

分發售處

南京 教育圖書館 濟南 共合藥房
城內北門橋 西門大街

北平 郭紀雲圖書館 漢口 信義書局
燈市口六一號 兩儀街

廣州 南華基督教圖書館 成都 華英書局
長堤光樓

印刷者 上海華文印刷局

定價 每冊實價銀壹圓

