2026上海一模 · 集合与逻辑 · 学生练习版

1 集合的交、并、补运算（15题）

嘉定 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第1题。

1 已知集合 $A=(-2,2), B=(-3,-1)\cup(1,+\infty)$ ，则 $A\cup B=$ _ .

作答区

奉贤 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第1题。

已知集合 $A=(0,4), B=[2,5]$ ，则 $A\cap B=$ ____。（区间表示结果）

作答区

宝山 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第1题。

若全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ ，集合 $A=\{1,3,5,6\}$ ，则 $C_U A=$ ____.

作答区

崇明 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第1题。

已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$ ，集合 $B=\{x\mid x<3\}$ ，则 $A\cap B=$ ____.

作答区

徐汇 · 第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第2题。

设集合 $A=(-2,2), B=(1,+\infty)$ ，则 $A \cap B=$ ____.

作答区

普陀 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第1题。

已知集合 $A=\{x \mid |x| \leq 1\}$, $B=\{-2,-1,0,1,2\}$, 则 $A \cap B=$ ____.

作答区

松江 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第1题。

已知集合 $A=(-1,5), B=\{x \mid -2<x<2\}$ ，则 $A \cap B=$ ____.

作答区

浦东 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第1题。

已知集合 $A=\{x \mid x>1\}$, $B=\{1,2,3\}$, 则 $A \cap B=$ _ .

作答区

虹口 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第1题。

已知集合 $A=\{x \mid |x-1|<2\}$, $B=\{x|x>0\}$, 则 $A \cap B=$

作答区

金山 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第1题。

已知集合 $A=(-2,1), B=(0,3)$ ，则 $A \cap B=$ ____.

作答区

长宁 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第1题。

集合 $A=(0,+\infty)$ ，集合 $B=\{-2,-1,0,1,2\}$ ，则 $A \cap B=$ ____.

作答区

闵行 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第1题。

已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{-2,-1,0\}$，则 $C_U A=$ ____。

作答区

青浦 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第1题。

已知集合 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$, $B=\{x \mid x \leq 0\}$, 则 $A \cap B=$ ____.

作答区

静安 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第1题。

已知全集是实数集 R，集合 $M=\{x \mid (x-3)(x+2) \geq 0\}$ ，则集合 M 的补集 $C_R M=$ ____ .

作答区

黄浦 · 第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第3题。

已知集合 $A=\{x \mid x<-1$或$x>4\}$, $B=\{x \mid |x+1|<1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B=$ ____.

作答区

---

2 充分条件与必要条件的判断（9题）

宝山 · 第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第14题。

若 $\alpha:|x-1|<1, \beta: x^2-x<0$ ，则 α 是 β 的（）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

徐汇 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第13题。

已知 x 为实数，则“ x^2 是有理数”是“ x 是有理数”的（）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 既非充分又非必要

作答区

松江 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第13题。

若空间中三条不同的直线 a,b,c 满足 $a\perp c,b\perp c$，则 $a//b$ 是 a,b,c 共面的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

浦东 · 第13题

规则难度（初评）暂无法评级

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第13题。

已知直线 a,b 和平面 α,β，且 $a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，则“a 与 b 相交”是“α 与 β 相交”的（ ）。

A. 充分必要条件

B. 既不充分又不必要条件

C. 充分不必要条件

D. 必要不充分条件

原题条件或版本存在疑点，请结合教师版核对说明使用。

作答区

虹口 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第13题。

已知 x 、 y 为实数，则“ $x^3>y^3$ ”是“ $2^x>2^{y+1}$ ”的（）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 非充分又非必要

作答区

长宁 · 第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第14题。

甲、乙两人投篮的命中率分别为 0.7 和 0.6，两人各投篮一次，事件 A 为甲投中，事件 B 为乙投中。“甲、乙两人均投中的概率为 0.42”是“事件 A, B 互相独立”的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

闵行 · 第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第16题。

如果“若 p，则 q”和“若 q，则 p”中有且仅有一个真命题，称 p 与 q 具有“U-关系”。已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，p：$y=f(x)$ 为偶函数，则 p 与下列选项中的 q 具有“U-关系”的为（ ）。

A. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $-f(x)\geq f(x)$

B. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)\geq f(x)$

C. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=|f(x)|$

D. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=f(|x|)$

作答区

青浦 · 第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第13题。

在空间中，“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的（）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也不必要

作答区

闵行 · 第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第14题。

已知 $a,b\in\mathbb{R}$，则“$a>b$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”成立的（ ）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

4 集合新定义与元素个数（1题）

青浦 · 第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第15题。

对于实数 $m\in[-1,1]$，定义集合 $A_m=\left\{x\mid x=\sin\frac{\alpha}{2},\sin\alpha=m\right\}$，集合 A_m 的元素个数为 $|A_m|$，给出下列说法：

①存在 m，使得 $|A_m|=1$

②存在 m，使得 $|A_m|=2$

③存在 m，使得 $|A_m|=3$

④存在 m，使得 $|A_m|=4$

其中正确的说法有（）个.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

作答区