

**Problem 1:**

**Problem 2:**

**Problem 3:**

**Problem 4:**

1.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$$
$$\text{rank}(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2$$

Based on Theorem 2.1,  $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ , then the system has a solution.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2d_3 - d_4 \\ -4x_3 - 2x_4 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 - 2d_3 - d_4 \\ -4x_3 - 2x_4 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 - 2d_3 \end{bmatrix}$$

2.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 1$$
$$\text{rank}(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2$$

Based on Theorem 2.1,  $\text{rank}(\mathbf{A}) \neq \text{rank}(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ , then the system has no solutions.

**Problem 5:**

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} c & 0 & a \\ 0 & c & b \\ b & a & 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b \\ a \\ c \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{A}|\mathbf{b} = \left[ \begin{array}{ccc|c} c & 0 & a & b \\ 0 & c & b & a \\ 0 & 0 & -\frac{2ab}{c} & \frac{c^2 - a^2 - b^2}{c} \end{array} \right]$$

The one unique solution for this linear system is:

$$\begin{aligned}a &\neq 0 \\b &\neq 0 \\c &\neq 0\end{aligned}$$

The solution is :

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\x_2 &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\x_3 &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2bc}\end{aligned}$$

**Problem 6:**

$$\begin{aligned}&\begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos y & \sin y \\ -\sin y & \cos y \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} \cos x \cos y - \sin x \sin y & \cos x \sin y + \sin x \cos y \\ -\sin x \cos y - \sin y \cos x & \cos x \cos y - \sin x \sin y \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} \cos(x+y) & \sin(x+y) \\ -\sin(x+y) & \cos(x+y) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Then

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}^2 &= \begin{bmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -\sin 2x & \cos 2x \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}^{57} &= \begin{bmatrix} \cos 57x & \sin 57x \\ -\sin 57x & \cos 57x \end{bmatrix}\end{aligned}$$

**Problem 7:**

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \\f_1(x) &= x_2 - 2x + 5 \\f_2(x) &= 7x + 5\end{aligned}$$

Then

$$\begin{aligned}f_1(\mathbf{A}) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -3 & 11 \end{bmatrix} \\f_2(\mathbf{A}) &= 7 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 12 & 14 \\ 21 & 5 \end{bmatrix} \\5f_1(\mathbf{A}) - 3f_2(\mathbf{A}) &= \begin{bmatrix} 14 & -62 \\ 78 & 40 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

**Problem 8:**

$$1. f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2 + \frac{2}{3}x_2^3 - 2x_2 + 7$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 + 4x_2 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 + 4x_1 + 2x_2^2 - 2 = 0$$

$$x_1 = -6.6$$

$$x_2 = 3.3$$

or

$$x_1 = 0.6$$

$$x_2 = -0.3$$

So there are two extremum points  $(-6.6, 3.3)$  and  $(0.6, -0.3)$

2.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2 > 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2 + 4x_2 > 0$$

Then we need  $x_2 > -0.5$ , and both points satisfies these conditions. Therefore both points are local minimizers.

**Problem 9:**

$$1. f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 7x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_3 + x_1x_4$$

$$f = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$2. f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 - 3x_1x_2$$

$$f = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$3. f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2$$

$$f = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$