Hall MHD 与双流体磁重联调研

不同文章的结果

三卷本 · 第 2 卷

分卷更新：2026 年 11 月 13 日。

全文核读证据：140 篇，核读更新至 2026 年 11 月 13 日。

本卷先按七条问题线串联论文结果，再给实验对照、检索边界及 140 篇逐篇全文核读档案。未核读候选单列，不作为研究结论证据。

本卷阅读与查阅方式

本卷先按七条问题线串联论文结果，再给实验对照、检索边界及 140 篇逐篇全文核读档案。未核读候选单列，不作为研究结论证据。

三卷分别编排目录和参考文献，文献键保持一致；同一论文在不同卷的引文编号可能不同。标明“基础卷、结果卷、问题卷”的交叉引用会跳转到对应 PDF；各卷应保存在同一目录。若阅读器限制跨文件跳转，可按卷名和章节/公式号查阅。全部原文位于项目根目录的 papers 文件夹。

总索引：打开可搜索文献索引。

打开《理论与数值基础》。

打开《已解决与未解决的问题》。

目录

第一章 重要重联问题与研究脉络 1

1.1 第一条线：从 Hall 快重联到“什么才是必要条件” 1
1.2 第二条线：局地快率怎样连接层长、驱动和全局完成时间 4
1.3 第三条线：从线性启动到爆发、次级磁岛与关停 8
1.4 第四条线：为什么速率相近，闭合却仍然是核心问题 13
1.5 第五条线：三维 X 线的传播、有限长度和最终状态 15
1.6 第六条线：电子独有重联、能量去向与热化的边界 18
1.7 第七条线：从模拟图样走向实验和卫星的可区分证据 21

第二章 相关实验现象与模型检验 23

2.1 MRX 四极 Hall 场：直接测到什么，推断了什么 23
2.2 MRX 导引场：重联减慢同时包含局地与全局效应 23
2.3 如何把实验现象变成可证伪的流体检验 24
2.4 强密度不对称：MRX、MMS 与 PIC 的跨尺度对照 24
2.5 低 Lundquist 数也能有电阻性磁岛链 24
2.6 局域三维启动：感应场传播不等于总电场传播 25
2.7 MAST：双峰密度的解释需要同时纳入 Hall 与装置几何 25
2.8 2026 年跨尺度对照：延伸双峰电流片与能量分配差异 25
2.9 MRX 电子层：确认了双尺度，也留下绝对量的差异 26
2.10 UTST 合并：势降与排出同时出现，加热仍需独立检验 26
2.11 三维 EMHD 磁涡：没有观察到细电流片同样值得记录 27
2.12 新补入的实验和观测：Hall 特征也有模型歧义 27
2.13 把实验放回研究脉络：测量事实、重建与解释分开 28

第三章 检索方法、覆盖范围与阅读证据等级 30

3.1 范围与不能作出的保证 30
3.2 已经实际执行的检索 30
3.3 身份核对与版本合并 31
3.4 全文阅读标准 31
3.5 本次余量筛查：698 条逐项初筛，新增 15 篇全文核读 32
3.6 11 月 11 日历史批次：新增 6 篇全文，累计 122 篇 33
3.7 11 月 12 日加热专题：新增 17 篇，累计 139 篇 33
3.8 本地目录与继续更新 34

第四章 逐篇核读档案与全量候选索引 35

4.1 如何反查本地原文 35

4.2 Ottaviani1993：1993 年 . . . 35
4.3 Schep1994：1994 年 . . . 36
4.4 Biskamp1997：1997 年 . . . 36
4.5 L020：2000 年 . . . 37
4.6 Birn2001：2001 年 . . . 38
4.7 F766：2001 年 . . . 38
4.8 L029：2001 年 . . . 39
4.9 L204：2001 年 . . . 40
4.10 Rogers2001：2001 年 . . . 40
4.11 Shay2001：2001 年 . . . 41
4.12 L035：2002 年 . . . 42
4.13 Shay2003：2003 年 . . . 43
4.14 L049：2004 年 . . . 43
4.15 L057：2004 年 . . . 44
4.16 L058：2004 年 . . . 45
4.17 Shay2004：2004 年 . . . 45
4.18 Cassak2005：2005 年 . . . 46
4.19 E459：2005 年 . . . 47
4.20 L076：2005 年 . . . 47
4.21 Ren2005：2005 年 . . . 48
4.22 Cassak2006：2006 年 . . . 49
4.23 L089：2006 年 . . . 49
4.24 Cassak2007：2007 年 . . . 50
4.25 Arnold2008：2008 年 . . . 51
4.26 Cassak2008：2008 年 . . . 51
4.27 F717：2008 年 . . . 52
4.28 Hakim2008：2008 年 . . . 53
4.29 L119：2008 年 . . . 53
4.30 L122：2008 年 . . . 54
4.31 L123：2008 年 . . . 55
4.32 Malyshkin2008：2008 年 . . . 55
4.33 Toth2008：2008 年 . . . 56
4.34 Drake2009Pickup：2009 年 . . . 57
4.35 L137：2009 年 . . . 57
4.36 L145：2009 年 . . . 58
4.37 L154：2009 年 . . . 59
4.38 Malyshkin2009：2009 年 . . . 60
4.39 Simakov2009：2009 年 . . . 60
4.40 Sullivan2009：2009 年 . . . 61

4.41 Cassak2010：2010 年 61
4.42 E469：2010 年 62
4.43 E472：2010 年 63
4.44 Katz2010：2010 年 63
4.45 L159：2010 年 64
4.46 L160：2010 年 65
4.47 L164：2010 年 66
4.48 L166：2010 年 66
4.49 Baalrud2011：2011 年 67
4.50 E512：2011 年 68
4.51 Huang2011：2011 年 69
4.52 L156：2011 年 69
4.53 L174：2011 年 70
4.54 E471：2012 年 71
4.55 GuideExp2012：2012 年 72
4.56 L184：2012 年 72
4.57 Shepherd2012：2012 年 73
4.58 F625：2013 年 74
4.59 F672：2013 年 74
4.60 L189：2013 年 75
4.61 L190：2013 年 76
4.62 L191：2013 年 77
4.63 L193：2013 年 77
4.64 Loureiro2013Heating：2013 年 78
4.65 Stanier2013：2013 年 79
4.66 Yoo2013：2013 年 79
4.67 Andres2014：2014 年 80
4.68 Che2014Buneman：2014 年 81
4.69 E475：2014 年 81
4.70 F679：2014 年 82
4.71 L202：2014 年 83
4.72 Cassak2015：2015 年 84
4.73 F644：2015 年 84
4.74 F674：2015 年 85
4.75 L213：2015 年 86
4.76 L214：2015 年 87
4.77 L216：2015 年 87
4.78 L217：2015 年 88
4.79 Ng2015：2015 年 89

4.80 Numata2015Heating：2015 年 . . . 89
4.81 Tanabe2015MAST：2015 年 . . . 90
4.82 Wang2015：2015 年 . . . 91
4.83 Andres2016：2016 年 . . . 92
4.84 E448：2016 年 . . . 92
4.85 F611：2016 年 . . . 93
4.86 L210：2016 年 . . . 94
4.87 L223：2016 年 . . . 95
4.88 L224：2016 年 . . . 95
4.89 L227：2016 年 . . . 96
4.90 L230：2016 年 . . . 97
4.91 F697：2017 年 . . . 98
4.92 F798：2017 年 . . . 98
4.93 L236：2017 年 . . . 99
4.94 L238：2017 年 . . . 100
4.95 L241：2017 年 . . . 101
4.96 Ng2017：2017 年 . . . 101
4.97 Yoo2017Heating：2017 年 . . . 102
4.98 E553：2018 年 . . . 103
4.99 L244：2018 年 . . . 104
4.100 L250：2018 年 . . . 104
4.101 L251：2018 年 . . . 105
4.102 L256：2018 年 . . . 106
4.103 Yamada2018：2018 年 . . . 107
4.104 Yoon2018Heating：2018 年 . . . 107
4.105 F659：2019 年 . . . 108
4.106 F743：2019 年 . . . 109
4.107 L243：2019 年 . . . 110
4.108 L247：2019 年 . . . 111
4.109 L262：2019 年 . . . 112
4.110 L263：2019 年 . . . 112
4.111 L264：2019 年 . . . 113
4.112 TenBarge2019MMS：2019 年 . . . 114
4.113 F792：2020 年 . . . 114
4.114 Kaptanoglu2020：2020 年 . . . 115
4.115 L267：2020 年 . . . 116
4.116 L268：2020 年 . . . 117
4.117 Ng2020：2020 年 . . . 117
4.118 E552：2021 年 . . . 118

4.119 Finelli2021：2021 年 . . . 119
4.120 L272：2021 年 . . . 120
4.121 L275：2021 年 . . . 120
4.122 E474：2022 年 . . . 121
4.123 F589：2022 年 . . . 122
4.124 L283：2023 年 . . . 123
4.125 L294：2023 年 . . . 123
4.126 Yoon2023PhaseSpace：2023 年 . . . 124
4.127 Huang2024：2024 年 . . . 125
4.128 E473：2025 年 . . . 126
4.129 F606：2025 年 . . . 126
4.130 F703：2025 年 . . . 127
4.131 F741：2025 年 . . . 128
4.132 F788：2025 年 . . . 129
4.133 L296：2025 年 . . . 129
4.134 TS6FEC2025：2025 年 . . . 130
4.135 Closure2026：2026 年 . . . 131
4.136 F600：2026 年 . . . 132
4.137 F635：2026 年 . . . 132
4.138 F655：2026 年 . . . 133
4.139 L312：2026 年 . . . 134
4.140 L313：2026 年 . . . 135
4.141 L314：2026 年 . . . 135
4.142 未完成核读的候选：不据此作内容结论 . . . 136

第一章　重要重联问题与研究脉络

本章按问题重新编排已经核读的研究，而不按下载或续读批次罗列。各条线先说明前一组结果留下了什么问题，再比较后续模型怎样回答；原有的参数、反例和证据限制仍保留。这里的连接是本报告的**问题导向阅读顺序**，除明确说明的前序研究外，不冒称已经核实所有作者间的直接引用关系。

先区分四种问题：磁通是否改变拓扑；已经启动的局地层有多快；全系统多久完成重联；能量怎样进入不同物种及自由度。回答第二种问题的成功不能自动推广到其余三种。尤其要区分峰值、准稳态与时间平均，以及局地上游场和初始全局场归一化。

问题线	文献之间的推进关系	继续阅读入口
局地快率	两流体/GEM 基准 → 色散解释 → 无快速色散波反例与压力机制	第1.1节
局地到全局	未选定层长 → 动态供磁与背压 → 岛合并、驱动和尺寸效应	第1.2节
启动与状态	惯性尖化/非线性加速 → Hall 内层与递归磁岛 → 往复、间歇及关停	第1.3节
压力与热流	总率相近但结构不同 → 各向异性/十矩 → 热流、模态与闭合迁移	第1.4节
第三维	孤立 X 线 → 扩展与历史 → 有限活跃长度 → 三维模式与湍流状态	第1.5节
能量与热化	同谱不同粒子参与 → 电子独有重联 → 分物种功、相混合与熵	第1.6节
可观测证据	四极场 → 嵌套与多物种歧义 → 电势/流速/温度的联合检验	第1.7节

怎样把叙述反查到论文。　每节引文可跳到参考文献，再进入第 4 章的稳定文献键档案及本地 PDF。末章每篇还标出本章的问题线；模型基础与算法文献另列为“模型与数值可信度”，主要对应《理论与数值基础》第 1、2 章。HTML 索引同时支持按问题线筛选。模型推导均在《理论与数值基础》第 1 章；本章涉及 PIC、混合动理学或实验时明确保留身份，不把它们改称 Hall 流体模拟。

1.1　第一条线：从 Hall 快重联到“什么才是必要条件”

这一线索先问一个有限的问题：已经启动的薄层能否在弱耗散条件下快速处理磁通？Biskamp 的双流体计算和 GEM 比较给出肯定的模型证据；Rogers 进一步把快率联系到色散波和开放排气。后来的研究把这个解释变成可以检验的必要性命题，进而发现没有快速色散波的快支、以及电子各向异性改变几何的另一条路径。因而这些论文的关系是“建立基准—提出机制—寻找反例—收紧结论”，不是后一篇简单宣布前一篇失效。

阅读时必须保留两层机制：Hall 或压力响应怎样组织排气，电子冻结又由哪一个非理想项打破。第二层不因宏观速率对某耗散系数较弱敏感就可以省略。以下把模型开关、扫描路径和实际破冻结项并排检查，再在下一条线追问上游场和层长由谁决定。

1.1.1　Hall 解耦与快率：GEM 解决了什么，没解决什么

Biskamp et al. [1]在准中性、均匀密度、标量压力的双流体模型中发现，电子层随电子尺度变化，而某些宏观通量率对电子质量和电子黏性弱敏感。计算包含正则化耗散，实际伪谱计算还采用六阶扩散。电子 Kelvin–Helmholtz 湍流主要关联有限耗散率，并没有显著增加原本已快的重联率。

该文表 II 按 Alfvén 时间归一化后，d_i 从 0.4 降到 0.05，峰值率由约 0.68 降到 0.34；作者明确没有确定 $d_i \to 0$ 极限。固定密度也移除了某些压力动力学。因此不能把它改写为“任意系统尺寸、无耗散且普适 0.1”。

Birn et al. [2]的 GEM 比较使用有限磁岛种子，刻意跳过线性触发阶段。Hall、混合与 PIC 模型的非线性通量曲线较接近，峰值约 0.24；然而粒子模型中的电子电流层和离子喷流宽度可比对应流体模型大约两倍。文章还指出过量耗散可降低重联率，并把结论限定在二维。

因此 GEM 提供的是**同一已启动算例的部分宏观量可跨模型复现**的证据。它并未证明自然触发、压力张量、电子层厚度、能量分配和三维不稳定性均可由一个 Hall 项替代。

1.1.2　色散波与开放排气：有力的模型内关联，有限的普适性

Rogers et al. [3]把 whistler 和 kinetic Alfvén 波的二次色散，与电子流出随层厚变化及排气开口联系起来。其等温两流体扫描中，两类分支都允许时重联率约 0.12；仅一个分支时约 0.06；强导引场、冷等离子体且两类二次色散分支均被抑制时，电流层较长，速率显著下降。

控制参数包括投影 Alfvén 速度、声速和质量比，而不是单独的 B_g/B_{rec}。将线性分类用于非线性重联时，相关重联磁场分量自身随时间和位置变化；作者用上游反向场作方便的参数替代，并承认这一点。这不是适用于任意电子压力闭合的必要条件定理。下文电子 CGL 机制说明，同样的开放排气还应检查压力项而非仅凭波模名称解释。

2015 年的两篇强导引场研究进一步给出同类两流体框架内的反例：在 $d_e \gtrsim \rho_s$、没有快速色散波的参数区，仍可得到对耗散弱敏感的快重联，并以 PIC 作对照。它们还重新检查 2001 年的扫描路径，发现启动期上游场耗尽与初始片宽也参与决定测得速率；详见本章第1.1.3节。因而本节的早期结果应读作特定扫描中的关联，不能继续写成快重联的必要条件。[4, 5]

1.1.3　没有快速色散波的快重联：反例具体推翻了什么

Stanier et al. [4]在强导引场两场模型中分别研究 $d_e > \rho_s$ 和 $\rho_s > d_e$。前者没有通常用来解释快重联的快速色散分支。超电阻从 10^{-11} 增到 10^{-8} 时，两流体算例的归一化率仍在约 0.025–0.029；对应单流体率则近于 $\eta_H^{0.252}$。这是同一类耗散扫描中的实测差别，不是从 X 形图像直接判定快慢。

其关键新发现是**微观耗散层的上游场和长度会自调节**。当耗散层比 $h = \max(d_e, \rho_s)$ 薄，上游 B_δ 随厚度一起减小；某些区间内层长度也随厚度缩短。因此，对固定 B_δ 和固定内层长度推导出的耗散依赖，不一定是实际算例采取的路径。《理论与数值基础》式(1.304)把这一观察重建成两层匹配。它解释给定 B_h, w_v 时的弱耗散依赖，却没有自洽选出这两个外部量。

长文 Stanier et al. [5]进一步比较流体与 PIC。在有快速色散波的一组参数中，两模型峰值率相差不到约 10%，但启动和饱和时刻不同；PIC 早期出现的次级岛、喷流弯曲也没有在流体中逐一重现。在无快速色散波的小盒算例中，没有次级岛仍能快速重联。因此，该组证据同时排除了“快速色散波必须存在”和“次级岛必须出现”这两种过强的必要性表述；并未排除它们在其他参数区影响速率。

重做早期扫描：区分改变声尺度和改变电子尺度

长文第 VII 节重做类似 Rogers 等的扫描：固定 d_e 而减小 ρ_s 时，速率下降可以出现；但固定 ρ_s、在仍无快速色散波的区间增大 d_e，速率也会上升。两组都改变了 h 相对于初始电流片宽的比例，因而改变启动等待时间及启动时还能供应多强的上游场。按当时测得的 B_h^2 归一化后，差别明显缩小。这里的结论是早期扫描不能单独隔离色散波的因果作用，并非“线性波对重联毫无作用”。[3, 5]

尺寸扫描没有同时放大所有方向

Harris 系列把流出方向长度从基准的 0.5 倍变到 8 倍，基准 $L_{x0} = 100h$；入流方向盒宽与初始片厚保持不变。局地上游场取离中面约 $4h$ 的位置，按入流穿越时间平均，所得流体与 PIC 率约 0.09–0.17。长文还排除最后约四分之一时窗，以减少可用磁通耗尽的影响。这个结果支持所测试几何中的弱尺寸依赖，但不能替代全几何自相似放大，也不能证明任何边界下都为 0.1。

学习时可先对照短文图 1、3，再读长文图 14–19：前者检查耗散层如何变化，后者检查尺寸、归一化和扫描路径。两篇包含相关算例，不能作为两次完全独立的统计验证。[4, 5]

1.1.4　电子 CGL 的新机制：快率与四极场极性反转

Cassak et al. [6]逐项关闭 Hall、电子惯性，或改用离子 CGL、仅把电子各向异性放入动量方程，构成机制对照。特定电子 CGL 进入欧姆定律时，仍可得到约 0.06–0.1 的快率和开放排气；仅离子 CGL 或仅动量各向异性则较慢。面外四极扰动的极性与通常 Hall 四极场相反，是比“存在四极图样”更具体的判据。

不过模拟始终保留电阻 0.005 和四阶耗散，压力方程还省略电磁功加热；因此快几何机制不等于 CGL 压力在 X 点独自打破冻结。原文提到另一电子状态方程的慢结果只来自私人通信，PIC 相符也未给出对照图。这些内容应作为进一步检验方向，不能与已展示的消融证据同权。

1.1.5　早期闭合与移除 Hall 对照：不能只比较开关

Yin et al. [7]的 Hall/混合比较采用特定经验电子压力张量闭合，且其方程省略磁旋转项；这与今天完整十矩不是同一模型。它提示离子非对角压力输运能改变层结构，不能从全局磁通相近推断离子应力无关。Malakit et al. [8]对无 Hall 快速重联的检查更具体：粗格 Sweet–Parker 层约 2.5 个网格时出现岛，约 5 格时可恢复较稳定层；去掉 Hall 后的率仍约 0.015，含 Hall 约 0.03，但仍有超电阻等耗散。因此该对照揭示分辨率与耗散的作用，不能单独证明所有系统中 Hall 既必要又充分。

Yin and Winske [9]的边界压缩算例中，混合模型因离子回旋效应出现更宽的响应，进入快速阶段的时间与 Hall 模型不同；局部嵌入 Hall 区可复现其特定总通量演化。这解决的是*该驱动条件下局地两流体区域是否足以改变整体响应*，未解决任意装置边界下的模型耦合。

这一线索走到了哪里。　这条线已建立的可靠结论是：多个不同微观实现能在特定已启动算例中产生相近的局地快率；快速色散波、四极图样、开放 X 形中的任一个，都不是单独判定快重联的充分证据。下一步的判别应保持外部供磁、初始片宽和电子非理想机制可比，分别扫描微观尺度，测量瞬时上游场后再归一。尚未被选出的长度和供磁条件，正是下一节的起点。

1.2　第二条线：局地快率怎样连接层长、驱动和全局完成时间

局地速率一旦能在多个模型中复现，问题就从“能否快”转向“谁选择这个局地层”。Shay 的宽片研究先把漫长等待与短暂快阶段分开；局地解析模型给出速率对上游场和层长的依赖，却把这两个量留给外部解；Sullivan 的耗散扫描则说明层长本身也会调整。把这些结果接起来，才看得出显式电阻消去以后，全局问题仍然存在。

受迫边界和磁岛合并进一步改变供磁、背压与完成条件。这里依次阅读局地层选择、不对称与驱动，再读跨模型岛合并和全几何尺寸扫描。它们不是在测同一个数：瞬时电场、固定时间窗平均率、单位 X 线长度的通量，以及两个岛最终完成合并的时间，必须各自保留定义。

1.2.1　嵌入宽电流片：漫长启动与局地快速阶段可以共存

Shay et al. [10]研究的初始电流片宽度随系统尺度变化，电子 / 离子扩散区则嵌在其中。七组二维周期算例中，四个较大算例在岛半宽约 6.1–9.9d_i 后进入快速阶段；最大算例最后约 3% 的模拟时长完成约 90% 的磁通重联与 75% 的岛宽增长。这个时间结构是本文的重要发现，不能概括成“从开始到结束都以 0.1 重联”。

作者实际测量局地上游场 $B_d(t)$：以离子面外电流峰值的 25% 位置定义上游边缘，以电子和离子流出速度交点定义下游边缘；启动期另作修正。后期 $V_{\text{out}} \propto B_d$，输入速度约为局地 Alfvén 速度的 0.1。若以远处固定磁场归一化，同一时段的率会显著变化。研究没有扫描质量比，故其质量比无关的表述是联系先前工作后的预期，不是本组算例独立证明。

图 8 还给出一个容易被忽略的现象：小 Δ' 算例即使已呈开放 X 形，压力背压仍几乎抵消磁张力，离子喷流及重联仍很慢；较大 Δ' 的长片则在电子片变薄、Hall 贡献增强后快速缩短。因此，单凭某一张 X 形磁力线图判断快重联并不可靠。默认 d_e 只有两格，另一个高分辨算例还同时降低四阶耗散；这不是严格的独立网格收敛扫描。

1.2.2　解析层模型：显式消去电阻，不等于已确定全局速率

Malyshkin [11]从 X 点附近和电子层上游的方程展开得到连接 Sweet–Parker 与 Hall 极限的公式；强 Hall 极限为 $E/(B_m V_A) \sim d_i/L$。但 L 是由上游磁场沿层方向的曲率定义的局地尺度，与 B_m 一起作为输入。原文明确把求解它们留给全局问题。因此，该文解决了“给定局地几何后各项如何平衡”，没有从任意边界与初始电流片推出唯一的 0.1。

Simakov and Chacòn [12]把电子区与离子区作有限区域平衡，以 35 组岛合并算例检验。其归一化率覆盖约 1200 倍，模拟 / 理论比在 0.5–2.3 之间；强 Hall 极限得到电子层长度 w 控制的率。这里 w 和局地上游场仍从模拟提取。重要的新结果是：**细长电子层可以对应对耗散系数不显含的率；开放电子 X 形也可能处于耗散控制的慢支**。该文的一般过渡公式是渐近匹配插值，不能称为没有近似的全局解析解。

Malyshkin [13]进一步把电子漂移惯性加入总动量，得到电子半厚约 d_e、电子层长度随有效电阻的倒数增长、率随有效电阻正比变化的稳态支。这里“collisionless”指电阻被解释为待动理学决定的有效量，X 点仍满足 $E_z = \eta J_z$。它与 Andrés et al. [14] 的无显式耗散、非稳态惯性重联研究的是不同极限；两者并列并不构成逻辑矛盾。

1.2.3　电阻从公式中消去，仍有未选定的长度

Uzdensky [15]用电阻拖曳同时决定电子排出和耗散层厚，得到 $E \sim B_m V_{A,m} d_i/L_e$；电阻消去后 L_e 和 B_m 仍是外部输入。Litvinenko [16]从给定 Harris 外场及给定电场构造弱 Hall 局地解，也未选择全局率，且局部展开出现中心 O 点等几何问题。Malyshkin [17]的有限质量比稳态分支又显

示：当电子层厚受到 d_e 限制，$E \sim \eta B_m/(\mu_0 d_e)$ 可显含电阻。这些研究并不互相取消，而是采用不同闭合、长度约束和稳态假设；“快率与微观项无关”必须附带具体分支条件。

1.2.4　电子层长度会依赖耗散，归一化会改变速率的表述

Sullivan et al. [18]在等温 Hall / 惯性双流体岛合并中扫描超电阻。无电子惯性时，电子层长约随 $\eta_H^{1/3}$ 变化，厚度约随 $\eta_H^{4/9}$ 变化；因此不能把局地理论中尚未求出的层长默认为只由边界决定的常数。

更值得学习的是原文图 9、10 的对照：用局地电子层上游场和密度归一化，速率随超电阻变化；用初始全局量归一化，或直接看原始电场，则速率近乎不变，约在 0.1–0.2 范围。这不是数据互相矛盾，而是局地归一化量本身随耗散改变。作者把“处理初始岛磁通所需的整体时间”与局地层的归一化几何区分开。

该研究**没有**重现动理学中长度约 $10d_i$ 的长电子片：其无惯性超电阻扫描最长仍不到一个 d_i。惯性扫描所得长度可拟合 $m_e^{3/8}$，但一数量级质量比区间不足以区分 $3/8$ 与 $1/3$。真实质量比下约 $15d_e$ 的长度和约一个 d_e 的厚度均为外推。最低超电阻算例的厚度接近网格，原文也标明不可靠；不能仅凭论文题名中的“延长”断言已解决长电子层问题。

1.2.5　非耗散双流体的数值证据与系统尺寸问题

Andrés et al. [14]的无显式耗散伪谱比较提供了有价值的对照：提高分辨率时，理想 MHD 与无惯性 Hall 的伪通量变化趋小，保留电子惯性的模型则趋向非零变化。它比单独展示一张磁岛图更能支持惯性作用。

但总能误差小于 10^{-8} 并不保证所有电子尺度结构准确。真实质量比、Hall 参数 0.1 时，$d_e \simeq 0.00233L_0$；$2\pi L_0$ 周期盒的 2048 网格间距约 $0.00307L_0$。全局通量相近仍不能称作充分解析一个 d_e 宽的局地层。该研究的“惯性必要”限定在标量压力、不可压、无其他非理想项的模型中。

Andrés et al. [19]保持初始几何并扫描 Hall 参数 0.07–0.16，共十组，测得电流层厚度约随 d_e 变化，上游场和层长较弱变化，准稳态平均率约为 $0.11\lambda^{0.98}$。这是有限参数窗中的近线性趋势，不能简写成原归一化下 $\mathcal{R} = \lambda$；论文后一个关系另外把归一化长度和磁场改取局地值。

还须区分数值趋势与解析解释。该预印本的稳态推导有惯性旋度项符号不一致；严格对称、停滞的二维 X 点若无非对角压力和电阻，稳态对流惯性不能独自支撑有限 E_z，必须检查时间惯性或评估位置。报告保留可见的扫描结果，但不把该局地量纲推导当作已闭合的普遍稳态理论。

1.2.6　不对称重联：三个特征点分开，标度与绝对数值分开

Cassak and Shay [20]检验反平行、无导引场的非对称 Hall 重联。混合 Alfvén 速度为

$$v_{\text{out}}^2 \sim \frac{B_1 B_2 (B_1 + B_2)}{\mu_0(\rho_1 B_2 + \rho_2 B_1)}. \tag{1.1}$$

其九组算例的通量率和喷流随不对称参数的变化大体符合该标度；对称基准率实际为约 0.0587。值得关注的结构是：磁 X 点、电子停滞点和离子停滞点可以不同位置；磁岛向弱场一侧鼓起，电流片向强场一侧移动。测流入速度应使用移动 X 线参考系。

该文另一种离子流出速度定义会改变绝对数值约 60%，但不明显改变参数标度。说明“标度符合”比“所有流速数值相同”弱。计算还采用 $\beta_{\text{min}} = 4$、质量比 25、惯性项中的常密度近似和四阶扩散。作者把可靠不对称程度限制在约 4 以内，并指出更大不对称时电子层会失真；不能直接外推到强密度差、导引场存在的磁层顶。

1.2.7　受迫重联：同一个“快”字包含不同驱动和结束方式

Taylor 墙位移：快峰值后仍有漫长慢尾

Fitzpatrick [21]研究最终停止移动的导体墙，给出线性和非线性、MHD 和 Hall 的不同峰值标度。低电阻时，超电阻对 X 点电场的贡献会超过普通电阻；即使扫描中率对超电阻弱敏感，也不能把实际计算说成只含普通电阻的 Hall 模型。

任意导引场的四场扩展在 $\beta_F = 10^{-2}$ 至 10^2 范围、保持 d_β 相同时，得到相似的 Hall 突发阶段。保持的是 $d_\beta = c_\beta d_i$，并非 d_i 固定。典型快峰值约为电阻参照的 30 倍，并有约 8 个 Alfvén 时间的延迟；**第一轮快爆发只把岛宽增长到最终值约四分之一**，随后仍有慢的 Rutherford 阶段。因此，“出现快速峰值”不等于“全部受迫磁通迅速完成重联”。[22]

两文将自身结果与近 0.1 的说法比较，但驱动、局地场和速率归一化不同。尤其后一文讨论中对上游磁场的线性标度与通常 $B_u V_{Au} \propto B_u^2/\sqrt{n_u}$ 不同，不能只照搬其反驳措辞。更可靠的结论是：有限墙位移问题中的峰率和完成时间需要分别预测。

体力持续压入：磁通堆积改变速率的分母

Sullivan et al. [23]从较宽、撕裂稳定或边缘稳定的正弦片开始，用局域离子体力驱动入流。较弱驱动可建立平衡；较强驱动先积累上游磁场、压薄片，约到当地 0.7–0.8d_i 时出现快速阶段。其具体扫描中的临界驱动幅度在 0.005–0.0075 之间，这是选定盒子、驱动宽度和闭合的结果。

增加驱动宽度可提高绝对电场，却因堆积的 B_u 更强而降低 $B_u V_{Au}$ 归一化后的率。与自发薄片对照时，受迫算例的归一化出流和率可低约 50%。另一个值得单独记录的现象是：**磁岛宽度几乎饱和，岛内磁场却继续增加，故重联磁通仍增长**。用岛宽作为唯一通量代理会错判重联已经停止。

这篇 2005 年论文与 2008 年同题论文研究不同维数，不能合并成一个文件。2005 年表 I、正文算例交叉引用及部分图的驱动力数字有不一致；报告保留其主要可核实趋势，不为缺失输入自行补出精确对应。

局域三维驱动：大部分磁通可以绕过重联层

2008 年研究把驱动同时沿第三方向局域化。二维中被驱动区域推来的上游磁通，超过 70% 经过重联；相应三维例中约为 10%，其余可以沿第三方向偏转离开。三维局地电子电流还把磁结构向负 z 搬运，最大重联率不再位于驱动中心。持续显著重联的阶段也较短，典型比较约 23 对 38 个归一化时间。[24]

这里三维总磁通由场线追踪和面积积分求得，二维值则按单位第三维长度定义。作者将三维总率除以驱动全宽 $2w_z = 10d_i$ 作比较；这是一种有效长度归一化，不是一般三维重联率的唯一定义。典型对照的体力幅度也分别为二维 0.15、三维 0.2，并非仅改变维数的一对完全相同输入。结论应是*局域第三维提供了磁通旁路，并改变局地层与整体驱动的联系*，而不是三维必然比二维快或慢一个固定倍数。

1.2.8　磁岛合并：Hall 模型的快峰值可能高估整体合并

Ng et al. [25]用同一 Fadeev 岛合并构型比较 MHD、Hall、十矩与 PIC。局地 Hall 层可以很快，但 Hall 平均率对岛尺度只有较弱依赖，而所比较 PIC 率约呈 $\lambda^{-0.8}$。Hall 结果可高出 PIC 两到三倍。这里的平均窗是 0 到 $1.5t_A$，不能与另一宽高比或不同平均窗的 -0.5 指数直接混用。

十矩局地闭合通过调节离子松弛尺度可改善小系统压力支撑；大系统却产生 PIC 中未见的次

级磁岛，并缺少相应弹回。Ng et al. [26]改为非局地闭合后，片宽约 $1.20d_i$，接近 PIC 的 $1.15d_i$，而 Hall 约 $0.18d_i$；但平均率尺寸指数约 -0.45，仍不同于 PIC 约 -0.8，压力非旋转对称度也不完全匹配。

Ng et al. [27]的温度梯度闭合进一步改善该尺寸依赖，并出现导引场从 0 增加到约 1 时岛合并峰值率先升、到 2 时再降的结果。不能用“导引场总会抑制重联”替代具体几何的计算。该研究的附录还说明，没有热流的某些稳态十矩停滞点会导致不合理的压力趋零；多演化六个压力分量并不会自动消除闭合难题。

1.2.9　Hall 模型也能使磁岛弹回，但结果受电子层处理控制

Bard 与 Dorelli 表明，不含离子动理学的 Hall 计算也可能在岛合并中出现弹回。在中等网格上，开放的双尺度层与弹回能够同时存在；继续细化后某些小系统不再弹回，而最大系统仍弹回并出现次级岛。这补充了早期“Hall 合并过快”的结论：弹回并非动理学独占现象，但不同模型是否给出相同的平均完成时间仍需比较。[25, 26, 28]

该文以网格代替显式电阻，因此其层形转变并不是固定物理参数下发现了两个连续解。要把“数值耗散减少后的变化”提升为“物理双稳态”，还需要同物理参数、不同历史的持续分支检验；要建立普适合并标度，则需要控制电子层尺度和平均时间窗。

1.2.10　导引场有时提高率，也会改变模型之间的差距

磁岛合并研究 [29] 的结果比“导引场抑制重联”更丰富。小系统中从无导引场增加到 $B_g = B_0$，PIC 与混合模型峰值率分别提高约 51% 和 53%，而 Hall MHD 略降。此时动理学模型中的离子更磁化，离子层变薄，堆积场和喷流增强，Hall 与动理学模型的宏观率趋于接近。再增大导引场，则率重新缓慢下降。

无导引场时，PIC 离子喷流比 Hall 结果弱约七倍，离子非旋转对称应力是重要阻力；Hall 标量压力不能表达它。导引场较强时虽然宏观喷流相近，压力与应力的各项分解仍不相同。十矩用合适闭合长度可在小系统接近 PIC，较大无导引场系统却产生 PIC 没有的次级岛，说明闭合的可移植性仍是问题。

全局岛合并还会反弹：若片内处理磁通不够快，两个岛先接近，再分开，之后再合并。无导引场 PIC 平均率随岛尺寸下降较陡；$B_g = B_0$ 时四种模型的平均率指数接近。大尺度无导引场 PIC 堆积区出现镜模相容的磁峰和密度凹陷；作者的线性色散检验支持该解释，但它是否进一步导致重联减慢尚未证明。

1.2.11　强导引场磁绳合并：中间态阻塞，几何改变排岛

MAST 参数的 Hall 计算展示三类行为：厚于声回旋尺度的稳定碰撞片；中间尺度上迅速产生中心磁岛；薄层形成开放 X 点及高峰值率。平面算例保留 180 度对称，中心岛没有优先排出方向，长大后阻塞合并；环形轴对称几何打破这一对称，岛被排出并完成合并。新现象是外部几何可以决定同类局地岛是否终止全局重联。[30]

最低超电阻的峰值率较高，却有较慢的早期磁通处理，且开放分离线后来可再闭合、产生偏心岛对。超电阻控制断线同时加热局地电子，改变 ρ_s；离子黏性也被人为增强。将这一组结果简化为“超电阻越小，重联一直越快”会丢掉文章最重要的非单调和时序信息。

1.2.12　全局重联是否存在系统尺寸效应

Huang et al. [31]在固定宏观形状的二维 Harris 片中发现：尺寸增加 30 倍，PIC 的全局平均率

约降低 2.6 倍；Hall 扫描增加 100 倍，率约降低 3.4 倍。小尺寸 Hall 结果近似 $\ell^{-1/3}$，更大尺寸下降变缓，是否最终平台仍未确定。排气张角变窄伴随率下降；PIC 持续产生磁岛，而 Hall 后期近单 X 点，Hall 中的波列也没有在 PIC 中同样出现。

这对“跨尺度时一个固定率就足够”提出直接限制，但不构成对所有局地 0.1 机制的简单否定。初始片厚是否随盒子一起变、比较局地还是远上游场、按物理时间还是相同磁通阶段统计，会改变被回答的问题。《理论与数值基础》第 1 章压力亏损模型针对局地准稳态；本篇针对整个演化的磁通处理，二者需要在同一诊断下重新比较。该文的平均区间排印矛盾及质量比 25 使其精确指数仍应审慎使用。

这一线索走到了哪里。　这一问题尚未由“约 0.1”解决。局地快层可与慢全局演化、磁岛反弹、驱动磁通旁路和尺寸依赖同时出现。比较 Hall 与 PIC 时，最有区分力的是同一供磁过程下的层长、压力阻力、累计重联磁通和完成时间，而不是各自挑一个峰值。后文有限长三维 X 线还会增加一个几何比例：整条 X 线中究竟有多长处于活跃状态。

1.3　第三条线：从线性启动到爆发、次级磁岛与关停

本线把时间顺序放回讨论中心。惯性两场模型先发现电流子层的持续变薄和非线性加速；暖电子、热离子及更高分辨率计算再揭示细丝、双重加速、次级岛与间歇减速。它们回答的是一个已被扰动的电流片如何发展。双稳态与自发转快研究则追问：系统为什么在某个时刻切换分支，且为什么同一参数会记得不同历史？

接着把线性 Hall 内层、磁岛切短电流片、递归破裂和非线性状态选择连起来。这个顺序十分重要：Hall 改变初级增长、Hall 在次级片中变强、开放层是否继续生岛，是不同阶段的三个判断。最后回到压强关停与能量转换，检验“更多岛、更快增长”是否真的对应更大的净磁通处理和能量释放。

1.3.1　电子惯性重联：电流子层比电子惯性长度更薄

Ottaviani and Porcelli [32]研究无耗散、不可压的二维冷两场模型，使用大 $\Delta' d_e$ 撕裂序列。其新发现不是简单的“电子惯性能断线”，而是**不同物理量出现不同层宽**：早期非线性阶段，速度与磁通扰动仍跨约 d_e 的尺度，电流却产生不断缩窄的子层。广义磁通 F 的拓扑仍被输运保存，普通磁通已改变。

论文用近似保持形状的宏观对流胞构造解析解。若 $A(t)$ 为流体位移幅度，在 $d_e \ll A \ll L$ 区间，子层厚度近似为 $d_e \exp[-A/\widehat{d}_e]$，其中 $\widehat{d}_e$ 与 d_e 同阶；无量纲幅度方程含 $A'' \sim A + cA^4$，体现非线性加速。这里的“准爆发”是有限适用区间内的加速，不能解释成真实等离子体产生无限电流。

本地 JET 预印本采用 1024×64 Fourier 分量，$L_x/L_y = 0.5$、$d_e/(2L_x) = 0.04$，仅一个线性不稳定模。作者在归一化时间约 125 时因子层无法解析而停止计算，并指出需要 FLR、压力梯度、三维及可能的微不稳定性。这篇文章没有完成最终饱和和热化问题。

1.3.2　暖电子约化模型：宏观饱和与微细结构继续演化共存

Schep et al. [33]构造的二维约化系统保存两族广义通量组合；其 X 点与普通磁通 X 点可以分离。有限电子质量使电流本身不再在相应定常传播解中奇异，但不保证电流梯度有界。该文的全 FLR 离子响应明确是满足若干极限与守恒要求的构造，而不是从 Vlasov 严格推出的任意尺度闭合；完整非线性本征解也没有求出。

Pegoraro et al. [34]展示了这一结构的非线性后果。对于有限 $\rho_{\mathrm{sound}}/d_e$，$G_+$ 与 G_- 在磁岛中沿不同方向卷绕，逐渐变成细丝。总能量仍守恒，磁能被转到小尺度流动和电子压缩等通道，粗粒化后的磁岛却可近似饱和。**“岛宽不再长大”与“所有自由度都停止演化”因此并不等价**。

冷电子极限则出现不同情况：初期电流更像条状层，随后速度剪切激发二次 Kelvin–Helmholtz 型不稳定性，产生单极与偶极涡、岛形脉动以及流体动能与电子动能间的振荡交换。随着 $\rho_{\mathrm{sound}}/d_e$ 增加到约 1，所展示算例在岛饱和前不再出现该二次不稳定性。原文图 1–3 可直接比较暖电子细丝化、冷电子破碎和涡量结构。

这些图像不是任意参数下的相图。作者明确指出：无耗散暖电子层不断变薄，最终会使流体近似失效。随后用漂移动理学的正则动量薄片说明更丰富的相混合，但二维沿电流方向的对称性仍是关键条件。

1.3.3　热离子改变细结构，未必明显改变总重联率

Grasso 等的三场陀螺流体模拟给出一个容易被只看磁通曲线漏掉的结果：热离子与热电子算例可有相近岛宽和发展速度，但静电势是否形成细丝、岛内密度是否变平、平行电场是否出现小尺度结构明显不同。热离子使静电势包含未经平滑的密度贡献，而陀螺平均势仍平滑；《理论与数值基础》第 1 章已逐步推导这一关系。论文据此讨论流体电子束及可能增强的加速，但没有粒子分布函数，不能称为非热粒子谱的预测。[35]

另一个三维陀螺流体研究在小 Δ' 参数下得到非线性爆发加速。最高扫描 $\beta_e = 1.6 \times 10^{-3}$ 时，以 $L_\perp/c_s$ 归一的非线性峰值增长率为 0.009，线性值 0.0008。这里“增长率”来自扰动能量的对数导数，不能与 $E/(BV_A)$ 直接比较。扫描同时改变盒子和初始片宽；X 点分裂为两个 Y 点等拓扑变化在这篇短文中主要由文字报告，两幅结果图仅显示能量与增长率。三维是否必要、高速流是否是加速原因，作者仍留作后续问题。[36]

1.3.4　爆发律的更新伴随计算分辨率的更新

Hirota et al. [37]以能量变分纠正冷惯性模型的非线性爆发指数，Hirota et al. [38]在暖双场模型中强调局域 X 几何及 $\dot{\epsilon} \propto \epsilon^{7/4}$。Hirota [39]进一步比较离子/电子温度与弱电阻：固定岛幅时某些速率和能量释放曲线对微观尺度较弱敏感，但从种子开始的总时间仍依赖线性内层尺度。更关键的是，其冷模型会出次级岛并间歇减速；作者明确指出早期横向模数少和数值黏性漏掉了磁岛。因此新结果是“局域爆发与磁岛间歇相竞争”，而不是一条适用于所有无碰撞重联的幂律。

1.3.5　陀螺诱导双重加速：先出现细尺度强流，再打开宏观排气

Comisso et al. [40]用强导引场四场陀螺流体，在大 Δ'、热离子和微观尺度远小于系统尺度时看到：线性增长之后先急剧加速，继而短暂减速或停滞，随后再次加速进入快重联。原文图 6、8、9、11 应连着看，分别追踪增长史、静电势、流场和排气开口；只看峰值会把两个过程合并。

第一轮加速与热离子有限回旋半径有关。在保持组合热尺度 ρ_τ 相同、互换热离子 / 热电子贡献的对照中，热离子例出现更强的局地电势细结构，$E \times B$ 流可约高一个数量级；冷离子例缺少同样的第一轮加速。《理论与数值基础》第 1 章已从准中性算子说明：热离子内区电势可直接跟随细密度结构，冷离子内区则经逆 Laplacian 平滑。这是与可测场量相连的机制对照。

第二轮加速随排气结构进一步开放，冷热离子均可出现。小尺度与宏观尺度分离越明显，两轮之间的减速越清楚。原文所画 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \mathrm{d}\ln \delta\psi/\mathrm{d}t$ 是*对数磁通增长率*；它的尖峰不等于重联电场本身的尖峰，不能拿来与 0.1 直接比较。

表 I 将 d_e 从 0.2 减至 0.025 时，归一化峰值率由约 0.283 逐渐接近 0.100；分母采用*初始最大*

面内磁场，不是随时间测得的局地上游场。作者也限定 $d_e\Delta' \gtrsim 1$：若固定 Δ' 继续令 $d_e \to 0$，最终会进入小岛饱和区。因此该表不能证明严格理想极限仍有普适有限率。谱滤波、最细结构失去解析后的停止时刻和电子回旋效应缺失，同样限制了后期判断。

哪些部分已经有动理学对照，哪些还没有

Zacharias et al. [41]比较四场陀螺流体与 EUTERPE 陀螺动理学，先让两种代码各自对照其模型的线性本征解，再进行跨模型比较。这能把“离散是否解对自身方程”与“两个模型是否近似同一物理”分开。

在所扫线性波数中，增长率差别可达约 20%；减小平衡面内场后差别减弱，但没有自动降到零。非线性部分主要检验小 Δ'：两模型都得到小岛饱和及其振荡，振荡频率很接近；饱和半宽差在较大驱动的 $k_y = 1.6$ 处约 30%，接近边缘稳定时明显减小。岛宽对温度相对不敏感，振荡频率却可随离子温度增加而近乎加倍。

论文文字称一个温比扫描的岛宽仅变约 5%，但图 11 显示的变化明显更大；据图估读，动理学约从 0.040 到 0.049，流体约从 0.046 到 0.053。这里只把它判为原文内部数量不一致，不把图上估读当作精确源数据。更关键的是，动理学非线性计算保留的模主要为 $m = 0, \pm 1$，参数也在小岛区；**它没有检验前文大 Δ' 的两次加速**。振荡可与粒子反弹频率比较，不代表有限矩模型恢复了完整俘获分布。

1.3.6　Full-F、任意波长极化与多 X 点不同步

GREENY 及其后续论文 [42, 43] 显示，保留任意波长极化后，某些算例比长波近似发展更快并出现更细的电势和电流结构；全密度模型还保留了小振幅模型忽略的乘积项。初始电流由电子还是离子承担会明显改变过程，后续研究中离子载流启动通常慢约一个数量级。拉长盒子后可有多个 X 点在不同阶段同时活动，不能用一条单 X 点曲线代表整个域。

非正规线性算子提供暂态放大的可能，非线性阶段又伴随谱展宽；两者不能直接画等号。暖离子会改变态的形貌，但主岛数不随温比稳定单调增加。若只看摘要中的“新模型更快”或“非正规性导致爆发”，容易漏掉正文对范数、排序、初值和参数标签的限制。《理论与数值基础》第 1 章给出了可以自行检查的能量范数和极化推导。

1.3.7　快慢双稳态、迟滞与突发转换

Cassak et al. [44]的重要证据是同一参数、不同启动历史下出现两种状态。在其 F3D 算例中，归一化电阻约 0.015 时可得约 0.06 的快支与约 0.01 的慢支；降低电阻后再恢复，系统可留在快支。原文图 3、4 给出两个方向不同的转换阈值，这比仅比较两个不同参数算例更有力。

同时应记录，电子惯性长度为 0.2 而网格为 0.1，只有两格跨一个 d_e；2005 年正文没有单独展示网格收敛。对 DIII-D 的温度估算低约一个数量级，MRX 比较当时缺少片宽数据。因此模拟中的迟滞证据与实验的定量验证必须分别评价。

Cassak et al. [45]给出鞍结分岔的简化动力学解释，并在关闭电子惯性的 Hall 计算中仍得到双稳态。但它保留电阻和四阶耗散，并非无耗散证明；描述片宽变化的方程还没有自洽决定局地长度和演化中的上游场。该文对电阻平衡 Hall 态稳定性的论断，与后文的大系统结果存在需要区分参数和几何的争议。

1.3.8　强场被带入后的自发启动：保持电阻也能转快

Cassak 等 2006 年从宽正弦片出发，发现慢重联把越来越强的上游场输送到内嵌 SP 层。电阻保持不变时，层仍逐渐变薄；达到当地 d_i 附近后离子电子解耦，出现开放排气与快速流入。慢阶段符合 η/δ，快阶段采用 $0.17V_{A,\mathrm{up}}$ 拟合。这给出“先积累、再迅速释放”的一种具体模型过程。[46]

展示的低电阻运行早期由另一电阻运行重启，启动前瞬变已消失；因此准确说法是后期转变不需要在触发时继续改变电阻。太阳参数下的积累及转换时间只是量级相容，既未直接解析太阳的电子层，也未纳入高 S 磁岛、热反馈及三维竞争，不能据此唯一判断耀斑启动机制。

1.3.9　线性 Hall 加速有条件，不能当成理想 Hall 直接断线

Craig and Litvinenko [47]研究线绑边界的线性 X 点衰减；弱 Hall 拟合同时依赖 d_i 和电阻，因此将尺寸变化只归到 d_i^2 会漏掉归一化电阻的变化。Shivamoggi [48]提出三层变分近似，却没有完整 Δ' 外匹配，且高斯试探电流导致某个 $1/k^2$ 积分需额外正则化说明。其弱 Hall 修正还存在可直接代数复核的系数问题。故本报告保留其启发，不将其形式上有限的无电阻增长解释成平滑理想 Hall 中磁通已被打破。

更系统的 Hall 撕裂分析 [49] 区分可压缩、常磁通与非常磁通分支；某一分支增长不显含 S，仍需有限电阻完成内层匹配。Vekstein and Kusano [50]在受迫稳定 Taylor 平衡中找到尤其值得注意的中间区：早期已出现 Hall 动力学，后期却能回到 MHD 式受限演化，尽管片厚小于 d_i。Hall 还可能提高单模增长却增大最快波长，使可容纳的磁岛更少；“更快增长”与“更多磁岛”不是同一句话。

1.3.10　磁岛先改变内层，再触发 Hall 阶段：中间态可以往复切换

Baalrud et al. [51]分清了两个阈值。长薄片的整体宽度可以仍大于 d_i，但撕裂扰动的电阻内层 d_η 已小于 d_i，Hall 项便可改变增长率与本征结构。适用排序为 $d_\eta \ll d_i \ll \delta_{\mathrm{SP}}$，不是整体电流片已经成为 Hall 开口层。

在该排序、快速增长和长波近似下，理论得到

$$\frac{\gamma_{\max}}{\Gamma_0} \simeq 3.2(d_i/L)^{6/13}S^{7/13}, \quad k_{\max}L \simeq 2.9(d_i/L)^{1/13}S^{11/26}, \quad \Gamma_0 = 2V_A/L. \tag{1.2}$$

全非线性计算提取的初期增长率，在 $S = 10^6$、$d_i/L \simeq 2\times10^{-4}$ 附近从弱依赖变为明显依赖 Hall 尺度，与预测转折接近；作者也明确说，有限参数区和增长率提取误差不足以精确验证 $6/13$ 指数。图 8 显示长片中的小磁岛已带四极面外场。

Huang et al. [52]研究另一层次：磁岛把长片切成短片，使局地片先达到 Hall 尺度。$S = 5\times10^5$ 的扫描中，$L/d_i = 2500$ 可保持开放单 X 点，5000 时却在开放层、延长层和多磁岛状态之间循环，速率约在 0.005–0.03 变化。10000 的情况没有进入相同 Hall 阶段。**“进入 Hall 尺度”不保证最终永久停在单 X 点**。

这些比较还受厚度定义影响：原文某时刻四分之一峰值全宽约 $0.7d_i$，半高半宽却约 $0.17d_i$。用不同定义讨论“片宽是否超过 d_i”会造成假矛盾。该文还说明，自然系统的尺度参数可能远离其循环中间区，不应把循环当作所有耀斑或磁尾的必然模式。

1.3.11　递归片破裂：初级 Hall 很弱，次级 Hall 仍能显著增强

Pucci 等线性本征计算显示，Hall 作用可以在 $d_i < a$ 却 $d_i > \delta_\eta$ 时改变撕裂，形成变宽的 Hall 中间层和变薄的内电阻层。拟合的增长指数与简单量纲匹配不同，并给出修正的临界长宽比；推导和适用范围已集中在《理论与数值基础》第 1 章。[53]

Papini 等的非线性计算进一步发现，初级磁岛之间自发形成半厚约初始 0.1–0.15 的次级片，片可先保持近压强平衡，再迅速破裂。按原片内层计 $d_i/\delta_\eta = 0.2$ 时，Hall 几乎不改变初级增长，却使次级增长增加约 17%；比值 1.4 时次级增长接近加倍。关键新情况是：一个在宏观初级阶段可忽略的项，经由递归尺度缩小成为重要项。[54]

同时必须保留三条未决限制。第一，文中 $\gamma_{\rm rec}$ 是对数磁通增长或磁扰动指数拟合，并非通常的 $E/(BV_A)$；次级 2.3 与初级 0.48 不能与“普适 0.1”直接比较。第二，换成各次级片自己的阿尔芬时间后，增长仍为一的量级；实测 Hall 次级片长宽比却不吻合前述线性拟合标度，原文明确承认参数扫描不足。第三，强 Hall 下次级片不再可见，可能是更快破裂或 X 点几何改变，也可能是分辨率不足，不能写成已确证的“Hall 必然抑制磁岛”。

1.3.12　递归破裂后的三种状态：开放 X 点仍可持续排出磁岛

Shi 等在固定电阻、相同随机种子的七组 Harris 片计算中，观察到随 d_i 增强发生的变化：纯 MHD 反复形成更短电流片；弱 Hall 在开放 X 点继续产生并排出次级岛；较强 Hall 则形成不再明显生岛的开放层。排气开口角约由 10 度增至 28 度。这个中间态不是“Hall 态与长 SP 片反复跳转”，而是开放结构与持续生岛共存。[55]

磁通斜率从约 0.032 升至 0.058，但 MHD 晚期递归破裂后的 0.034 已经超过最弱 Hall 算例。较强 Hall 层长逐渐不变时，其半长仅剩约 3–4 个横向网格；最小 MHD 片也达到网格尺度。因此，观测到的状态差异比“已证实普适 0.06 上限”更可靠。它与 Papini 等的次级增长增强并不矛盾：线性增长、非线性开口和后期是否继续生岛，是三个阶段不同的问题。[54, 55]

1.3.13　次级磁岛并不总带来更快的净能量释放

三个证据应并列而非互相替代。第一，磁岛合并的强导引场 PIC 会不断生成次级岛，Hall 却维持开放 X 形，二者平均率仍相近 [29]。第二，PIC 质量比扫描中低质量比容易生成岛，但岛并未使全局能量转换像电阻 MHD 算例那样显著提高；主电子层和移动次级 X 点的非理想预算也不同 [56]。第三，欠分辨的 MHD 可以产生额外岛和假平台率 [57]。

因此值得研究的新问题是：在什么驱动、寿命和尺度区间，岛的生成真正控制磁通通量？不能仅用“有岛”推断“岛介导的率”，也不能用一个无岛的已分辨算例否定其他初值下的撕裂。质量比趋于真实值、离子 FLR、导引场、噪声和开放边界仍需联动检验。

1.3.14　EMHD 岛内部还会发生另一种不稳定性

Del Sarto et al. [58]在冷惯性 EMHD 中发现，早期有序的电流片级联被岛内射流的 Kelvin–Helmholtz 类涡旋破坏；电子压缩性可延迟或抑制这一过程。它考察的主要是磁岛内部电流/涡量重新组织，不应只按“撕裂产生更多磁岛”概括。模拟最高另做到 2048×512；晚期能量/Casimir 误差可达 5%–10%，不能由衰减曲线直接推断真实电子加热。

Bellan [59]则在惯性/电阻 EMHD 线性问题中强调纯增长本征模与驻波 whistler 不同，并构造有限中心电流的解。其与 MRX 的增长时间和宽度只是尺度估计：计算约 1.2 cm 宽、实验比较约 3.3 cm，且从假定 10% 初扰动估总时间；未直接模拟稳态 MRX 排出和全欧姆预算。

Graf von der Pahlen and Tsiklauri [60]的强导场 X 点塌缩结果来自 PIC，应放在动理学对照类。其中电子涡旋可伴随次级 X 点，部分区域由对流惯性支撑电场；三维出现倾斜涡管。但其三维图没有相应完整欧姆预算或全局率诊断，Q 涡旋指标也不是重联判据，不能据图证明“电子压力项在三维全处消失”。

1.3.15　磁岛触发 Hall 之后，重联还可能因压强结构被关停

Shepherd and Cassak [61]在一组大 S 计算中看到 Sweet–Parker、磁岛增强、Hall 快速阶段先后出现，Hall 阶段排出竞争磁岛。后续文献已有开放 X 点持续排岛的情况，因此“Hall 与磁岛互斥”只能限于该组边界、尺度与时段。Beidler and Cassak [62]则把压强梯度带入重联层，发现即使还有可释放磁能，反向抗磁漂移相对出流足够大时也可抑制重联。该模型强导场、冷离子、绝热电子压力，MAST 比较又依赖尺度估计；它提出了饱和/关停候选机制，尚非完整托卡马克锯齿预测。

Tassi et al. [63]研究的是另一个问题：初始密度梯度使线性岛传播并降低增长；热离子时传播可朝离子抗磁方向。其解析频率/增长率与数值有可见偏差，并未等价地验证 Beidler and Cassak [62]的非线性出流竞争条件。

这一线索走到了哪里。　已发现的状态远多于一个稳定 X 点：冷层子尺度尖化、暖模型细丝化、两次加速、快慢迟滞、反复长片与开放层、开放 X 点持续排岛、次级剪切涡，以及磁能尚存时的压强关停。尚缺的是在同一初边值、充分分辨和统一率定义下连接这些状态的相图。任何新出现的磁岛或爆发指数，都应先通过层宽、谱尾、噪声和寿命检查；《理论与数值基础》第 2 章的数值检验因此是这条发现链的一部分。

1.4　第四条线：为什么速率相近，闭合却仍然是核心问题

GEM 式宏观一致性留下一个更严格的问题：模型能否同时预测密度、压力、电流层、热流和不稳定性？Shay 的跨模型密度空穴已经显示，相同输出通量可由不同宽度和峰速实现。本轮 F611 把这一点推进到电子各向异性：流体电子状态方程改变延长电流层和面外磁场，后期总率却仍相近。

由此产生两条互补路线。一条在明确俘获与磁化条件下构造各向异性状态方程；另一条演化完整压力张量，并用动理学热流检验局地、非局地或梯度闭合。Landau 与分群电子模型又分别补入沿场相混合和多来源分布信息。以下按“增加什么信息—改善哪个可测量量—还错在哪里”比较，不把增加矩数或一个漂亮的岛图当成闭合已成功。

1.4.1　密度空穴是额外检验：总率相近仍可能有显著结构误差

Shay 等 2001 年的跨模型研究不仅比较总率，还明确报告分离线密度耗尽：相同上游密度 0.2 下，Hall 流体最低约 0.03、混合模型约 0.1、PIC 约 0.15。离子动理学喷流约宽两倍而峰速约减半，总输出通量因而仍接近。原文将空穴联系到 Hall 电流造成的磁场堆积和排斥离子的电场；有限轨道效应减弱空穴。[64]

因此，“Hall 模型算对了重联率”不能单独用来认证卫星沿轨道密度峰谷。该流体计算还为防止负密度加入二阶扩散，电子惯性用常 d_e 反演，使电子层比当地低密度 PIC 约窄两倍。其无质量电子计算靠六阶耗散断线，不是理想 Hall 模型自行改变磁拓扑。

该文关于小均匀电阻不能平衡电场的论证，使用了电子层宽长比近固定的几何关系。后续电阻 Hall 层理论放松几何约束，得到不同分支。阅读这些结论时，应先对照层长怎样决定，再判断是否互相矛盾。[11, 12, 64]

1.4.2　各向异性状态方程：长电子层出现，后期总率仍相近

Lê et al. [65]在中等导引场的 force-free 和 Harris 片中比较全 PIC、各向异性电子混合模型和等温电子混合模型。最直接的新现象是：前两者出现跨数个 d_i 的电子电流层，等温例没有同样长的

层；Harris 片 X 线附近的面外磁场还增强到背景的约 1.5–2 倍。图 6 的沿片剖面为双峰，不能把所有增强都画成 X 点正中心的单峰。

这补足了前面 Sullivan 层长研究与压力闭合研究之间的联系：层长不仅会随耗散改变，也可能由电子各向异性支撑。force-free 例的 $F_e = \mu_0(p_{e\parallel} - p_{e\perp})/B^2$ 峰值约 0.7；Harris 长层处约大于 0.5。但图 3、7 的后期率在三种模型中仍接近，说明**复现总率不等于复现长层及 Hall 场**。早期时钟并不一致，Harris 比较还用了不同种子并作时间平移。

这一结果与 Cassak et al. [6]不能合并成“任意电子各向异性均能独自产生快重联”。两者的状态方程不同；F611 明确指出，所用俘获插值闭合在该参数区主要改变结构，并不自行提供无 Hall 快支。其 Harris 实现还要沿二维磁通标签追踪上游值，并修改闭合的参考密度以避免中心非物理各向异性。适用于无导场和复杂三维几何的可迁移闭合仍未建立。《理论与数值基础》第1.37.1节给出状态方程、极限和曲率电流的逐步推导。

1.4.3　梯度闭合的推进：从直接热流检验到三维不稳定性

Allmann-Rahn et al. [66]先从 Vlasov 分布函数计算热流矩，检查局地各向同性松弛闭合是否给出正确的散度形状、符号和幅度，再提出对压力偏离各向同性部分作 Laplacian 的闭合。这一步比仅比较重联率更有约束力：局地松弛会在实际热流很弱的上游区域产生错误的热流散度，改变 k_0 不能同时修正所有分量的结构。

其梯度闭合在磁岛尺度 $\lambda/d_i = 5, 10, 15, 25$ 的算例中产生磁岛反弹，平均率约随 $\lambda^{-0.73}$ 下降；两套分辨率得到接近的平均与峰值率。但是 GEM、大 Harris 片与岛合并分别用了 $k_{0s}d_s = 3, 1/3, 1/2$。作者明确按动理学结果选取参数，故这些结果证明了模型的拟合与迁移潜力，还没有证明无需校准即可预测所有电流片。

Allmann-Rahn et al. [67]进一步使用统一的 $\chi = 3, k_{0s}d_s = 1$ 检验重联、岛合并和低杂漂移不稳定性（LHDI）。质量比 100 的特定静电 LHDI 算例中，Vlasov、梯度十矩、五矩和局地松弛十矩的增长率分别约为 $2.2, 2.4, 3.2, 0.67\Omega_i$。这显示增加矩数本身不是充分条件：**五矩可以把不稳定性发展得过快，某些十矩闭合又会抑制过强**。最快增长模式会随模型和质量比变化，只检查预先指定的单一波数可能得出不同判断。

该文电磁 LHDI 支的 Vlasov / 流体增长率约为 $0.41/0.21\Omega_i$，都出现了超过初始重联场量级的磁扰动与强电流片弯曲，其高饱和原因仍不清楚。三维重联较二维更早启动，后期电流片加宽，出流区湍动强于电子扩散区；后期另一个不稳定性仅被称为“类似电流片剪切不稳定性”，尚未完成模态确诊。

一个尤其值得研究的新情况是**噪声决定不同过程的先后顺序**：密度扰动幅度由 10^{-10} 增至 10^{-2}，独立测试的 LHDI 启动约从 $30\Omega_i^{-1}$ 提前到 $4\Omega_i^{-1}$。若不稳定性先长成，它能建立多个重联点；若种子重联先启动，又会改变密度梯度并减弱 LHDI。因此，比较流体与 PIC 时，粒子噪声、初始种子与闭合导致的启动延迟都必须记账，不能把所有湍动差异都归因于“二维还是三维”。

1.4.4　十矩三维闭合：恢复不稳定性，同时产生新的误差

Wang et al. [68]的十矩与 PIC 比较不能概括成时间历程一致。两者在不同时间达到相同重联通量时，近 X 点一些结构相近；但速率随时间的曲线不同，某压力非对角分量峰值约相差四倍，下游压力结构也不一致。

Bradshaw et al. [69]在基于 MMS 非对称事件的三维设置中比较局地与梯度闭合。梯度闭合恢复了局地闭合所压制的低混合漂移和弯曲模，并产生次级磁岛、磁通绳和混合。计算采用质量比 100、$1152 \times 576 \times 288$ 网格，梯度闭合开销约为局地方案三倍。

同时，梯度模型仍产生范围过大的各向异性与非旋转对称压力；部分峰值出现在与 MMS /

PIC 不同的一侧；弯曲模在 Vlasov 中数个回旋周期即可发展，而该流体算例需数十周期。文章未提供网格与质量比联合扫描。它说明闭合会改变哪些模式能够出现，并未证明十矩已与动理学等价。

1.4.5　加入 Landau 闭合：岛面积相近，增长时钟与温度结构已改变

Tassi et al. [70]构造含电子平行 / 垂直温度和离子垂直温度的六场模型，实际重联模拟则使用冷离子子系统。保留非局地电子热流后，线性增长下降；某些较高斜向模数的模式由不稳定变为稳定。闭合在谐振面局地为零，不妨碍它通过面外响应改变整个本征模。

非线性图像若用各自的 γt 作横轴，岛形和最终面积可以相近，但实际时间已经不同。不能把这种重标度后的重合写成“Landau 阻尼不改变重联速度”。温度、密度和电流的细结构也变平滑，所示电子平行温度峰值约降为无热流情况的一半。新发现是**宏观岛面积对闭合相对稳健，细结构和热响应却不稳健**。

其热流自由能损失可作为向未解析速度空间转移的代理，但模型没有复现所引用动理学研究中磁能释放与电子加热之间的明显时间延迟；作者提出闭合可能耗散过强。另一个量化限制是，约 $0.002H_0$ 的数值能量误差已占本次释放磁能约 20%。故能量分配的精确比例没有像磁岛形态那样受到充分验证。

这些算例只含单一螺旋性，可以用 $y^* = y + (k_z/k_y)z$ 约成二维；它们验证斜向结构与沿场闭合，却不能等同于多个斜向模相互作用的完整三维湍流。原文图 4–7 和能量段应一起读，避免只选最相似的岛图而忽略时间、闭合耗散与能量误差。

1.4.6　来源分群的新闭合方向：改善形状与解决热流并非同一结论

2026 年 McGrae-Menge 等预印本把片两侧电子分别演化为十矩流体。每群自身三阶矩较小时，群间相对漂移和温度差仍能产生很大的总热流；《理论与数值基础》式(1.253)给出精确分解。与单电子十矩相比，两群模型改善了电子层密度空洞和压力堆积，重建的热流符号与空间结构更接近 PIC，但幅度仍偏高。[71]

其证据边界尤其重要：离子固定；参数精度图是对各 PIC 算例在时间内选取最佳重建指标，不是两流体模拟的全时段平均精度；不同图使用独立色标。高 β 时人工标签梯度可引发错误膨胀，晚期同群内部又出现多束。论文提出的动态分裂、三维、湍流及离子耦合尚未验证。所谓 156 倍压缩是表示自由度估算，不是测得的运行加速。这是一条具体且值得检验的新方向，尚不能写成一般热流闭合问题已经解决。

这一线索走到了哪里。　这条线的进展是逐步增加可独立检验的量：先率与岛形，再压力散度与层长，随后是热流、不稳定模、启动延迟和三维混合。未解决的是同一组闭合参数能否跨 Harris 片、岛合并、非对称和三维环境迁移。模型应同时通过这些约束；改善某一个结构而破坏另一个结构，需要报告为取舍，不能只展示改善项。

1.5　第五条线：三维 X 线的传播、有限长度和最终状态

二维平移对称把 X 线视为无限长，因而没有“前沿到哪里、活跃区有多长”的问题。早期三维双流体看到孤立 X 线；后续导引场与非均匀片研究把传播速度、启动延迟和上游历史分开。本轮 F659 与 F792 补上另一端：若外部几何阻止 X 线继续伸展，电子搬运重联磁通会使同一 X 线内部出现活跃区和受抑区，整体率随可用长度下降。

沿这条线继续走，必须再问三维模式会选择什么状态。斜向增长、X 线倾角、电子层展宽、Hall 湍流和多螺旋发电机分别改变局地结构及全局松弛；它们不能压缩成“三维增加一个加速因子”。先讨论传播和长度，再讨论模式及最终状态，也能避免把线性相速度、重联前沿速度与喷流速度混为一谈。

1.5.1　三维 X 线扩展：传播方向、启动延迟与有限磁能

Shepherd 和 Cassak 在电子携带全部初始电流的三维 F3D 算例中，观察到弱导引场主要沿电子运动方向扩展，较强导引场转为双向、接近导引场 Alfvén 速度。导引场为 $2.5B_0$ 时，两侧测得约 3.0 和 $2.9V_{A0}$。这不是无限精确的转变阈值：用电流阈值定义前沿有 15%–20% 速度不确定度，拟合还要截在斜向 X 线相互作用之前。弱导引场反方向的“零速度”只是该观测窗口内没有分辨。[72]

Arencibia 等把机制转成直接可检查的量：沿 z 变化的 E_x 是否在前方诱发正确极性的 B_y。表 I–III 分别比较 Hall 电场梯度、对流电场梯度、磁张力与对应的磁场或速度变化，支持反平行时电子输运、强导引场时场线弯曲的解释。但研究还发现两个不能被简单传播标度省略的现象。[73]

第一，同样初始半厚 $2d_i$，方形重联平面的 X 线只整体移动，而长度加倍的矩形域中 X 线持续伸长，速度约 $-0.51V_{A0}$。作者提出方形域更早耗尽可用磁能；这是待能量与边界扫描检验的假说。第二，用压力种子替代磁场种子后，压力脉冲近磁声速度双向传播，但重联仍以约 $-0.92V_{A0}$ 单向扩展。因此“最快传递的扰动”不自动等于“重联前沿”。此外，某切面 B_y 扰动约 $t = 60$ 到达，显著重联约 $t = 170$ 才建立。前沿判据及延迟必须和速度同时报告。

追溯早期三维结果：有限长 X 线不是固定尺度定律

Shay 等的 2003 年模拟已发现：初始较厚电流片出现空间孤立的有限长 X 线，较薄电流片中的 X 线可逐渐连接，形成更广泛的磁通释放。所见约 $10d_i$ 长度与磁尾 BBF 的量级比较是一种解释候选；粗电流方向网格、质量比 25、缺少平衡法向磁场和微不稳定性，都限制了对亚暴的直接推断。将其与 2021 年长宽比试验联读，比单独引用“厚片形成孤立 X 线”更准确。[73, 74]

1.5.2　重联沿非均匀电流片扩展会保留上游历史

Arencibia et al. [75]得到薄片向厚片扩展时 $v_s \sim V_A d_i w_1/w^2$，厚片向薄片时约为 $V_A d_i/w$。前一种含起始薄片厚度 w_1，因此前沿速度并非只由当前局地片厚决定；薄处生成的重联磁通进入厚处后被稀释，是这一“记忆”的来源。这是比均匀片双向/单向传播更具体的新预测，适合与局域启动实验及非均匀磁尾比较。

论文表中的个别差值符号和磁尾应用时间需要独立检查。按文内 $w_1 = 0.89$ 或 $3.5d_i$、$w_2 = 8.9d_i$、过渡指数 2、距离 $133d_i$、$d_i = 720$ km、$V_A = 1400$ km/s 积分，相应传播时间约 10.0–23.5 分钟；不直接沿用正文 2.5 分钟的下限。这是对该组输入的复算，不是对真实亚暴时间作新拟合；文后正式勘误涉及的参考文献/图例问题也不能自动视为已修正这些数值。

1.5.3　有限长 X 线：Hall 磁通输运产生受抑区及整体率下降

Liu et al. [76]用三维 PIC 把薄片夹在两端厚片之间，阻止 X 线无限扩展。其薄片长度为 31、12、8.4 和 $4d_i$；短于约 $10d_i$ 时，率和离子喷流显著下降。长例也不是处处以同一速率重联：电子漂移侧形成活跃区，离子漂移侧保留较厚、较弱的受抑区；次级撕裂优先出现在前者。

作者逐项检查欧姆定律后，并未把现象简单归于一个新增三维压力梯度项。活跃区破冻结仍主要由非对角电子压力散度支撑；关键的几何反馈是电子沿电流反方向搬运重联法向场 B_z，使另

一侧缺少驱动出流和继续变薄所需的磁张力。将约 $10\Omega_i^{-1}$ 的变薄时间乘该处量级为 V_A 的电子漂移，得到约 $10d_i$ 的受抑长度。其图 8 中局地非理想电场约 0.12，沿整条线积分并除以薄片长度却约 0.068；两者同时成立。

Huang et al. [77]沿同一研究路线补做八个长度算例，以 $\delta < 2d_{e,\mathrm{local}}$ 定义活跃区。按活跃长度归一后，有活跃区的率回到 $O(0.1)$；按整条 X 线长度归一则下降。进一步的动量预算显示，J_y 和被搬运的 B_z 在第三方向错位，降低 J_yB_z；因此喷流减弱不只是把二维出流转向第三方向。《理论与数值基础》第1.37.2节重建长度比例与梯形重叠模型。

这两篇是**动理学对照和同一连续研究序列**。2019 例质量比 75，2020 例 25，没有完成共同的真实质量比收敛；图 5 标度使用本组模拟拟合的受抑长度、过渡宽度和速度幅度。最短两例没有活跃区，却仍出现初扰动引发的瞬态喷流，零输出近似解释不了；作者也明确没有严格建立最大喷流与总率的唯一关系。弱导场、不同 β 及多斜模是否保留相同阈值，仍需检验。

1.5.4　斜模更快与二维全局最快可以同时成立

Akçay et al. [78]在强导场 force-free 平衡、电子惯性和较弱超电阻下，固定波数比较发现小倾角撕裂比平行模快；导场比约 10 时部分倾角可快约两倍。提高超电阻又使平行模重新占优。Shi et al. [79]使用电阻、不可压 Harris 平衡，完整扫描 (k_x, k_z) 后发现：某些固定较大 k_x 切片上斜模略快，但若盒能容纳较长波，全局最大增长仍在 $k_z = 0$。两者的平衡、电子非理想项、扫描维度都不同，不能抽掉这些条件后写成互相证伪。后者的复频率还表示扰动沿片传播，线性相速度不等于重联前沿扩展速度。

Schreier et al. [80]三维不对称算例测得 X 线倾角约 $35.9^\circ \pm 8.5^\circ$，同时涵盖最大出流准则约 34.3° 和最大率准则约 31.7°。因此这是对角度量级的支持，精度不足以在两理论中作唯一选择；局地电流判据、有限盒和电子尺度分辨率也限制精确判别。

1.5.5　电子片展宽与 Hall 场减弱也属于新现象

Rogers et al. [81]的三维惯性双流体计算中，重联建立的梯度激发静电涨落/低混合漂移类活动，电子层从约 d_e 展宽到 $2.5d_e$，率比对应二维低约 25%，Hall 场幅降低约 30%–40%。其平均惯性关联更像动量输运或异常黏性，不能统一称作异常电阻；密度梯度的放松还与磁场输运有关。该算例质量比约 278，d_e 约 3 格，盒第三方向仅 $1.25d_i$，因此是有条件的减速证据，不是三维必然减速定律。

Yokokawa et al. [82]则发现 Hall 驱动的场向电流空间图样可不同于 MHD 的射流偏转机制；即使电流片较厚，系统沿电流方向的尺度与片厚之比仍会控制哪类图样主导。模型没有地球偶极场、电离层反馈或电子加速闭合，不能直接声称重现完整亚暴电流楔。

1.5.6　三维 Hall 重联：湍流不一定比单 X 线更快

Huang and Bhattacharjee [83]使用压缩性 Hall MHD、无电子惯性和标量绝热压力，在 $S = 2 \times 10^5$、导引场与重联场同阶时比较二维和三维。其大算例达到 $2000 \times 1000 \times 2000$ 网格。二维两种 Hall 参数都形成单 X 点；三维中 $L/d_i = 500$ 可接近二维态，1000 则维持自生湍流。

新现象是**维数改变了最终状态选择**。并且单 X 点 Hall 态最快，三维 Hall 湍流虽快于相应电阻 MHD，却慢于单 X 点 Hall 态；不能写成“湍流必然再加速”。文中三维率采用平均磁场代理量，需要与场线连接意义下的三维重联区别。亚离子谱区间还不够长，$k^{-11/3}$ 只是参考斜率，并非已证明的宽惯性区标度。

1.5.7　Hall 发电机既能协助，也能抵消磁松弛

扩展 MHD 的 RFP 研究 [84] 不是孤立二维 X 点问题，而是三维多模撕裂和平均电流松弛。首次准单螺旋态崩解时，Hall 与 MHD 发电机同向展平电流；后续多螺旋事件中，Hall 项有时抵消部分 MHD 项。主模减弱、邻近模增强改变了相关电动势的符号；净松弛仍持续。

相应 Lorentz 力先驱动动量，Reynolds 响应随后抵消一部分。后续事件中核心速度与电流的改变量同向，更接近 MST 集合观测；只看首次事件会得到相反判断。这个现象说明 “Hall 必然加速” 过于笼统，也说明只验证总磁能释放相近不足以验证离子流和动量输运。

这一线索走到了哪里。　这条线最值得继续验证的新判断是：Hall 输运既可扩展重联，也可搬走某一片段维持重联所需的法向磁通；两者取决于供磁、片厚变化和边界。当前约 10di 的受抑尺度来自特定反平行 PIC 序列，尚不是普适 Hall 定律。下一步需要用共享初值比较 Hall、惯性双流体、十矩和 PIC，检查磁通搬运、压力破冻结、活跃长度与真正三维连接变化是否一起复现。

1.6　第六条线：电子独有重联、能量去向与热化的边界

磁通曲线和磁谱描述的只是重联的一部分。混合动理学研究显示，谱相近时离子参与方式仍可不同；电子独有重联既可关联小注入尺度，也可由大尺度重联产生的次级片或电子剪切生成。因此需要从 “片有没有重联” 继续追问 “谁响应、谁受力、能量进了哪些自由度”。

这一线索连接三类容易混写的结果：Hall 重排后的电流与电阻损失，电子平行相混合及弱碰撞热化，以及面内电场导致的离子加速和轨道展宽。共同的守恒约束是 Hall 项对总电流不直接做功；这不禁止它改变能量通道。以下分别核对分物种电功、内能和熵的证据，最后与下一节的实验原始诊断对接。

1.6.1　电子独有重联：同样的能谱可隐藏不同的粒子参与

Califano 等的混合 Vlasov 计算以动理学离子和惯性等温电子比较两种湍流注入尺度。注入更靠近离子尺度的一组形成短电流片和电子独有喷流；另一组出现较长片以及离子、电子共同喷流。两组能谱却相似。这说明 “谱看起来一致” 不能单独验证流体模型的重联类型，必须同时检查离子响应、局地拓扑和片寿命。[85]

该文是*动理学对照*而非纯 Hall 模拟。自动识别的数千电流峰并非全在重联，人工核对的重联层样本较小；电子惯性长度仅约 1.36 格，谱滤波与广义磁通的数值改变仍是限制。结果支持注入尺度可能选择电子独有重联的机制，不足以给出普适长度阈值。等温电子模型也不能用 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}'$ 直接预测电子升温。

1.6.2　电子单独重联可以由大尺度重联和剪切流二次生成

F655 的 2026 年预印本 [86] 给出两条清楚的时序候选机制。其一，大尺度离子耦合重联先形成岛链，喷流使岛互相挤压，小于离子耦合尺度的新片再出现电子喷流。其二，湍流先生成电子速度剪切，随后出现与电子 Kelvin–Helmholtz 不稳定性相容的涡链，磁场被卷曲后形成小重联点。电子单独重联因此不必全靠直接在离子附近尺度注入能量。

这些图像有研究价值，但 “太阳风中普遍发生” 和 “主导加热” 尚超出本算例能证明的范围。系统仍为二维周期域，注入尺度约 $50d_i$；电子尺度仅约一格。算法找到 516 个强电流结构，其中 69% 薄于 d_i 且短于 $5d_i$，并未逐个证实都是重联。部分 D_e 为负，所有片的平均量很小；不能把强局地正峰相加便当作净不可逆耗散。

结合解析速率研究 [87] 还得到另一个容易忽略的现象：无离子喷流并不意味着离子不反馈。周期小系统的离子反压仍可通过面内电场限制电子平台速度，使远上游离子归一率为 $O(1)$；电子峰值、平台速度、局地电子归一率是三个不同量。

1.6.3　回旋平均、能谱与加热：全局相似不意味着模型等价

Comisso et al. [88]的四场陀螺流体显示，热离子改变导心流、X 点尖角、电子密度分离线结构和高谐波，而部分全局磁通仍相近。其 N_i 是导心密度，不是仪器测到的粒子密度；把两者直接比较会把极化响应误判成电子–离子非准中性。Granier et al. [89]加入有限 β_e 和电子 FLR 后出现非线性减速间隔与第二轮超指数阶段，电子密度出现嵌套四极及更平缓梯度，而广义不变量仍继续细丝化。此结果的方向随固定参数组改变，见《理论与数值基础》式(1.332)；部分增长率振荡还来自 X 点移动。

Papini et al. [90]比较 Hall 与混合动理学湍流时，磁场谱相似而速度及能量分配可不同；对比时段对应不同成熟阶段，不能仅由频率相近建立完整因果能量通路。Rossi et al. [91]的 KH 驱动 Hall 谱在离子尺度附近变陡，并在小电流片识别重联候选；但模型没有显式电子破冻结项，数值滤波就是必须审计的部分。这些研究支持 Hall 模型捕获部分多尺度磁结构，尚未证明它精确预测粒子热化。

Zocco and Schekochihin [92]提供了一个清楚的边界：电子平行相混合可把流体自由能送到高 Hermite 矩，再由弱碰撞热化。这需要流体–动理学扩展，不能用纯 Hamiltonian 双流体的磁能下降代替。Ng et al. [93]又从分布重建说明有限矩的内容边界：即使 21 矩恢复三角形主体，仍缺双峰与精细多轨道群。Boozer [94]所讨论的电子正则磁场冻结则强调惯性拓扑变化不必耗散能量；它是理论框架讨论，没有本篇新的大规模重联模拟。三维指数分离可缩短特定流程中的尺度形成时间，但三维并不自动保证混沌，常密度固定离子前提也不可随意推广。

1.6.4　“Hall 电流耗散”不是 Hall 项直接加热

该文发现面内电流的电阻耗散 $\eta(J_x^2+J_y^2)$ 占总 ηJ^2 的比例可从约 40% 升到 55%，沿场电流的比例约 45%。这两种划分并不相互补足，因为面内 / 面外与平行 / 垂直是不同坐标分解。Hall 项自身依然满足 $\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})=0$。变化的是 Hall 重排后的电流结构及其电阻损失，不能称 Hall 项把一半磁能直接变成热。

原方程压强绝热演化，没有把 ηJ^2 回收到内能，因此这些量也不是完整的分物种加热预测。中心线磁谱从浅段加陡段过渡到近单一约 $k^{-2.22}$，但固定线谱、有限拟合区间和不同平均时间窗还不足以证明普适湍流级联律。[55]

1.6.5　Hall 电场与离子加热：轨道证据应怎样读

Yoon and Bellan [95]把电子正则涡量描述、给定场试粒子与 PIC 图像连接起来，提出强面内电场梯度使离子失去规则回旋运动的机制。所示 PIC 中，梯度指标较大的区域与高离子温度区大致对应；导引场由 0 增至 0.5 时，强效应的范围和程度减小。它提供了比“释放了磁能所以会热”更具体的空间预测，但图 6、7 来自其 2019 前序工作，不能计为一套独立复现。

认真读方法还需保留三个区别。第一，试粒子图 1、2 把粒子能量分布的标准差记作 TE，它不是通常由中心速度二阶矩定义的温度。第二，倒抛物势的线性运动方程本来就有指数发散解；仅凭这个例子不能独立建立复杂混沌或不可逆熵增。第三，论文中由准中性采用不可压缩，以及把给定几何下的阈值称作普遍热化条件，都需要额外假设。《理论与数值基础》第1.37.3节给出带符号的轨道方程、倒抛物势系数复核和能量分解。

这些限制没有取消其 PIC 中的空间关联，却改变了结论强度：它支持一条可检验的失磁化与增能途径，尚不足以单独解释所有导场、三维和高 β 重联中的热化。与 Zocco and Schekochihin [92]的相混合—弱碰撞链相比，有限矩模型还缺乏对速度空间细化及熵产的直接约束；与第1.7.4节 MRX 原文比较，也不能把后续解释倒写为实验当时已唯一证实的机制。

1.6.6　双温 Hall 已经能算局地加热，分配可信度仍取决于闭合

2026 年 11 月 12 日的加热专题沿上述问题继续核读。Browning et al. [96]图 3 给出 MAST 双温 Hall 计算：离子黏性耗散在下游形成双峰，电子耗散空间分布不同；其前身 Stanier2013 采用固定 $p_i = p_e = p/2$，不能把前身的结果当成独立分配预测。L223 双温扩展仍是初步结果，电子热点受自由超电阻参数控制，图 3 网格/时间步与独立收敛序列未报告。Kaptanoglu et al. [97]进一步以三维双温 Hall 研究 HIT-SI 驱动、温度与损失并比较多种实验诊断；存在尚未取得全文的勘误，不能把未经勘误对照的精确比例作为核心结论。

这两篇直接说明“Hall 模型完全不能研究离子/电子加热”过强。可以计算的是指定闭合下的局地温度和能量预算；能否代表真实热化，须检验黏性、热流、物种交换及电阻/超电阻。Longcope and Bradshaw [98]用共同流速、独立两温的碰撞激波模型得到离子先升温、电子后经碰撞和热传导响应；它不是自洽求 Hall 重联层。Li and Livescu [99]的一般双流体方程含完整输运，但第 IV 节四个验证算例强制两温相等并删去离子能量方程，不能将其数值验证说成加热比验证。

1.6.7　从轨道展宽到两物种熵产：补全前后文仍不能混算模型

Yoon and Bellan [100]先以固定离子 EMHD 产生场，再积分测试离子；Yoon and Bellan [101]用自洽 PIC 支持低/中导场下的失磁化机制。L272 的图 6–7 继承后者，不能算独立再验证。Yoon et al. [102]进一步把冷多束叠加导致的高二阶矩与混沌展宽拆开；作者仍明确留下磁能进入离子的精确份额，以及有序/随机增能相对份额。该链没有演化出普适 Hall 两温闭合。

另一方面，Loureiro et al. [103]基于 E512 计算电子相混的高阶 Hermite 自由能与延迟耗散；它没有完整离子竞争通道。Numata and Loureiro [104]用双物种陀螺动理学给出随 β 增加离子熵产作用增强的条件性结果，部分晚期瞬时 D_i/D_e 达量级 1；这既不是累计普适比例，也不是有限矩 Hall 的成绩。L244 的有限矩 Landau 模型实际用冷离子，耗散峰没有上述滞后；这正是闭合需要检验的内容。[70]

TenBarge et al. [105]图 1 已直接输出两物种流能和热能，十矩二维/三维全域预算相近；但热能增量没有扣除所有可逆压缩。电子各向异性幅度接近 MMS、平行优先升温区却落在不同侧，固定尺度闭合又抑制 LHDI。Finelli et al. [106]证明改善流体电子闭合会反馈动理学离子，但作者把详细能量分配留待未来；Che [107]是 PIC 诊断后的近似双流体描述，实际未发生重联，仍需动理学理论或 PIC 标定拖曳。模型身份不能因标题含“two-fluid”而合并。

1.6.8　实验的 2:1 究竟是哪一个比例

Yoo et al. [108]扩展 Yoo2013，增加实验量级离子碰撞 VPIC：无碰撞下游包含多束，加入碰撞后更近 Maxwell。它支持电势加速、轨道混合到下游热化的条件性路径。Yamada et al. [109]正式版图 7 中离子/电子沉积功率为 $0.71 \pm 0.15/0.35 \pm 0.06$ MW，约 2:1；同图的热能变化却为 $0.27 \pm 0.10/0.26 \pm 0.10$ MW，约 1:1，而且按式 (6) 包含储存与边界焓流，仍不是局地熵产。Yoo et al. [110]非对称 MRX 两种沉积更相近，直接限制普适 2:1 的外推。

Tanabe et al. [111]测到窄电子热点、下游离子热点及约 4–10 ms 物种交换时间，直接引用 L223 作温度结构解释；缺乏直接磁探针约束，不能唯一确定黏性/激波机制。强导场、闭合磁面与驻留

时间也不容直接套用弱导场 PIC 趋势。Ahmadi et al. [112]虽提及 Hall MHD，实际报告的模拟是 VPIC，约 20% 比较针对电势幅度；独立 Hall 加热结果未展示，不能补作加热比验证。

1.6.9　拾取与轨道混合：补上的参照与未统一的归因

Drake et al. [113]（2009，JGR）把离子跨窄 Hall 磁场边界后的非绝热运动、反向束和下游温度联系起来。图 2 给轨道与分布，图 3 在随出流的参考系中消去主要电场；冷入流近似下式 (8) 给 $\Delta T_i \simeq m_i v_0^2/3$。该温度是中心二阶矩，不要求 Maxwell 分布。图 6 的 22 次 Wind 高剪切出流观测支持速度平方标度，但系数仅预测的 0.39；各向异性也未定量吻合。其正式版 14 页含附录 A 已在 11 月 13 日新增核读，不能与尚未核读的 2009 年 ApJ 强导场/丰度论文混为一篇。

Drake2009 第 16 段在下游近稳态轨道模型中认为面内静电场往返功相消，净增能与重联电场有关；Yoon et al. [102]原文 Discussion 部分和结论却批评以拾取解释零/弱导场整体增能，强调单阱混合与面内场，并称重联电场净功为零。这是原文之间尚未由本报告裁决的差异。其图 7 分力的速度积分不能单独代替逐分量 $\int q_s E_a v_a \mathrm{d}t$ 的能量积分，末速度恢复亦不单独证明累计电功为零。应在同一场、粒子和时间窗核对净动能与全部电功；不能将这两种叙述直接写成统一的 Hall 热化定律。

这一线索走到了哪里。　双温 Hall/双流体已经能研究条件性的两物种温度和能量预算；电子独有喷流、磁能下降、正局地电功与不可逆热化仍是不同量。应分别记录温度比、沉积率比、内能变化和熵产，核查同一控制体的压力功、热流与边界损失。独立专题补充场/流几何、轨道与相混物理图像，展开诊断和逐图阅读，并将已修复的报告遗漏与原文未决分别登记。文件位于项目根目录 `specific problems/离子加热问题/`。

1.7　第七条线：从模拟图样走向实验和卫星的可区分证据

上述研究最终都要回答：哪些观测能区分两个给出相近重联率的模型？单个四极图样曾是两流体解耦的重要标志，但它的幅度、极性、尺度及嵌套结构还受压力、多个 X 点和多物种影响。L213 与 L283 尤其说明，形状相似的内外四极可来自不同过程；必须同时检查电子/离子流、时间尺度和穿越轨迹。

实验链也需要分层。先把 Ren2005、GuideExp2012 等直接 Hall 测量与理论场结构相连，再把 Yoo2013 实际测得的电势、光谱和离子流，与 L272 后续提出的随机加热解释相连。这个次序把“观察事实”和“解释候选”区分开，也为第 2 章的仪器尺度、积分效应与误差分析提供明确的问题。

1.7.1　四极 Hall 场的理论结构怎样接受实验检验

Uzdensky and Kulsrud [114]从稳态不可压 EMHD 出发，用单位磁通的体积积分解释四极 Hall 场与电子流函数的关系。该推导最有价值的细节是：理想 EMHD 内区的面外场主要由电子输运，生成需联系离子过渡区；预设 X 形面内场还在分离线产生对数奇异，必须靠惯性等修正。它解释四极结构，未独立确定重联率和电子层长。Ren et al. [115]的实验只在远离 X 点和分离线的部分区域支持其沿射线近似恒定的场幅，近区明显偏离。

1.7.2　嵌套四极：多个 X 点并不自动产生同样的图样

Jain and Sharma [116]在 EMHD 中显示，强主 X 点的出流与弱次级 X 点的入流相互作用，可

以形成一个不直接围绕单个 X 点的新外四极，包围原来的扩展四极。特别值得保留的对照是：三个同强度重联点并未产生相同嵌套结构。因此，多 X 点只是条件之一，**相对强度和相互作用顺序**也决定图样。

其与 Cluster 的比较依赖虚拟轨道：依次核对三个磁分量的过零、Hall 峰以及法向电场的投影，而不是直接测到一张完整二维四极图。模拟片半厚约 $7d_e$、观测约 3–5d_e；法向场仅约 1 nT，坐标方向不确定度可达 20 度，单航天器又不能唯一分离时间和空间变化。报告因此把它列为与 EMHD 解释相容的观测，保留替代结构和坐标误差。

这也给下一小节的尘埃嵌套四极提供一个必要对照：两者可以形似，但前者来自电子尺度多 X 点相互作用，后者含更慢的第三物种响应。要判别机制，应比较内外尺度比、建立时间和分物种电流，不能从“嵌套”二字直接识别模型。

1.7.3　多组分带来新的 Hall 图样和电场抵消

冷离子 MMS 事件 [117] 表明，不同离子群可在同一分离线具有不同磁化程度；冷离子仍随电场漂移，其对流项可与 Hall 项同量级。负尘埃 PIC[118] 进一步出现内外极性相反的嵌套四极 Hall 场，外侧结构随着缓慢尘埃响应而建立。后者是三物种结果，不能列成标准电子–离子两流体已解释的现象；尘埃质量比、电荷和密度只取少数组合，也没有对应实验确认。

1.7.4　MRX 先测到加速与下游升温，热化机制仍待区分

Yoo et al. [119]直接测得 MRX 的面内电势井在下游变深、变宽，面内电场约 500–800 V/m，离子跨越分离线后可加速至约 $0.5V_A$。沿下游方向到约 9 cm 后，流速开始趋于饱和而离子温度上升；温度横向剖面比喷流更窄。图 2 电势、图 3 离子流与电功、图 4 光谱和温度必须连读，才构成“先加速、再下游升温”的测量链。

这一实验约束了能量进入离子的路径，却没有唯一选出随机加热。原文明确保留再磁化、下游碰撞、波粒作用、势阱反弹及装置边界等解释；下游离子均程降至 2–5 cm，也不支持把全区域一概称为严格无碰撞。电子压力梯度在电势重建中不可忽略，不能把测得的整个面内电场都机械等同于单独的 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}/(en)$。

Yoon and Bellan [95]后来用电场梯度估计解释同类实验，是对这些事实提出的机制候选。与本报告已核读的非对称能量收支实验 [120] 相连后，研究问题变为：不同闭合能否同时预测电势、喷流饱和位置、温升位置和分物种能流？仅使一个电场阈值超过一，还不足以完成这四项检验。

这一线索走到了哪里。　有区分力的实验不只寻找某个图样是否出现，而是同时约束它的尺度、相位、速度、压力和能量预算。多点原位测量或与真实诊断一致的合成观测，可以排除单轨道、视线积分和坐标误差产生的歧义。本章给出的每条机制线，均应回到这类可测的联合约束；《已解决与未解决的问题》第 2 章据此列出尚待解决的问题，第 2 章展开实验依据。

第二章　相关实验现象与模型检验

2.1　MRX 四极 Hall 场：直接测到什么，推断了什么

Ren et al. [121]在 MRX 中测得重联平面外的四极磁场，并比较氢和氘放电、不同碰撞性条件。局地高分辨磁探针阵列间距 1.25 mm，误差小于约 10 G；二维图使用更粗的空间扫描与重复放电平均。重联场约 100 G 时，高分辨测得 Hall 场可达 50–60 G，粗二维扫描则约 20–40 G，说明仪器分辨率本身影响峰值。

实验四极场宽度与离子惯性长度同阶、长度约数个 d_i；随着电流片尺度与平均自由程的比值增大，Hall 场相对重联场减弱。它是离子与电子解耦电流系统的直接证据，而不是仅从速率反推 Hall 效应。

但原文给出的约 20 km/s 电子流是根据磁场与 Ampère 关系推断；Hall 电场约 140 V/m 与测得重联场约 100 V/m 的比较在上游区域完成，且某个磁分量有明显不确定性。该文没有完成电子 X 点全部欧姆定律项的局地闭合。四极场与高频扰动可共存，因此也不能由它排除其他非理想过程。

建议对照原文图 2 与图 4：前者看结构及测量布局，后者看碰撞性变化。学习时应把“直接测量的磁场”“由它推断的电流 / 速度”和“对断线机制的解释”写成三列。

2.2　MRX 导引场：重联减慢同时包含局地与全局效应

Tharp et al. [122]扫描导引场大小与极性，发现重联速率降低，同时面内 Hall 相关结构改变。装置参数中片半宽约 2 cm，d_i 约 5 cm，声回旋半径约 2.5 cm，几个尺度彼此接近，不能套用无限分离的渐近模型。

该文的 Hall 相关测量选在离层约 3 cm 上游和约 5 cm 下游的位置，密度归一化也主要使用中心测量。图 5–7 显示，流出受装置磁通核限制时，导引场在下游堆积并增加背压；观察到的速率下降大于所比较的局地预测。

作者明确表示，现有数据不能把局地 Hall 改变与全局几何 / 边界的贡献定量分开，仍需完整压力和离子流测量。因此这篇实验支持“导引场和边界共同影响重联”的判断，不支持对任意天体电流片直接使用同一个减速系数。

2.2.1　2013 长文：导引场压缩发生在比电流层更大的尺度

Tharp et al. [123]进一步展示约 20 cm 范围的导引场压缩，远大于约 2 cm 的片半宽。在反螺度操作中，局地导引场可达外加值约两倍；归一化率由无导引场附近约 0.08，降到 $B_g/B_{\mathrm{rec}} \simeq 1.5$ 时约 0.02。伴随流出区磁压增加，但实验并未把这一背压与局地 Hall 变化的贡献独立隔离。

这篇长文的 Hall 比较测点为上游约 4 cm 和下游约 8 cm，与 2012 短文的测点不同，不能混作同一组剖面。测量位于 X 点外；由 Hall 项与局地电场相近不能推断 Hall 项直接提供 X 点的破冻结电场。图 3 的各面板采用不同色标，比较导引场前后的幅值应读数值刻度，不能凭颜色深浅。

配套 Hall 模拟采用 $25 \times 12.5 d_i$ 的 Harris 片，初始半厚 $0.5 d_i$、扰动 0.05、$T_i = T_e$、总压绝热指数 $5/3$、电阻 0.005，流出周期而流入导体。其平板几何没有产生实验的全局导引场压缩；要取得较好局地比较，需使用实测局地增强后的导引场。论文没有提供网格和步长，所以这不是一个已具完整输入的装置复现。

同螺度与反螺度操作的初始磁结构和全局演化也不同，不能把两类数据拼成只改变 B_g 的严格单参数扫描。真空环向场近 $1/R$ 时，磁压力梯度与曲率张力本可相互抵消；讨论额外背压应针对被压缩的场及其几何，而非仅看到导引场就加一个未平衡的磁压。这是局地模型需要全局实验信息才能可靠解释的具体例子。

2.3　如何把实验现象变成可证伪的流体检验

对于 Hall MHD，优先比较可测的四极场极性与形状、电子 / 离子流分离、片漂移和全局通量率。对于十矩双流体，进一步比较压力各向异性、非对角压力及欧姆定律分量。压力模型预测的新图样应与仪器能实际分辨的量联系；例如 CGL 的反极性四极图样是待实验检验的机制判据，不能因模拟中出现就写成已观测事实。[6]

相关实验 / 观测候选已单列在索引中。尚未完成全文核读的实验条目，不在本章据摘要评定是否“验证”某种流体模型。

2.4　强密度不对称：MRX、MMS 与 PIC 的跨尺度对照

Yamada et al. [120]比较 MRX 氦放电、2015 年 10 月 16 日 MMS 磁层顶穿越和 VPIC 粒子模拟。**该文讨论双流体物理，但配套模拟不是双流体流体代码**。密度比约 10、导引场很弱时，Hall 四极场变成近双极结构；电子与离子的面内停滞点均偏离 X 点，且偏移量不同。MRX 中电子停滞点偏离约 5–10d_e，离子约 0.3–0.5d_i。实验电子速度由磁场旋度、电荷密度和离子速度反演，而非直接逐粒子测速。

电子电磁能量转移集中在电子停滞点附近，垂直电功贡献显著大于平行贡献。离子受偏向低密度侧的势阱加速；MMS 可看到离子反向流束，而较有碰撞的实验更接近热化分布。这些现象对标量压力模型提出直接挑战：即使平均流速和磁场相似，离子内能及分布函数也未必相同。

以输入磁能为 1，原文表 2 给非对称 MRX 的出射磁能、离子获得能量、电子获得能量分别为 0.44、0.31、0.25；配套 PIC 为 0.43、0.32、0.25。这个积分比较针对选定近 X 点体积，不是宇宙中普遍的能量分配定律。MMS 有限穿越轨迹不能独立测出相同的全局库存；为比较大尺度结构，该文还滤除了高于离子回旋频率的电场成分。因此不能用其图表排除高频波对能量交换的贡献。作者也未找到波幅与重联率之间的确定关系。

PIC 采用质量比 100、$40d_i \times 20d_i$ 区域、4200×2100 网格，能量在 $2.5d_i \times 3d_i$ 子域积分。方法段对周期方向和导体 / 反射方向的文字与单电流片坐标需进一步核对输入文件，报告保留这一复现疑点。实验、空间和模拟的形态一致是有价值的证据，但不足以直接判定某个五矩或十矩闭合已被验证。

2.5　低 Lundquist 数也能有电阻性磁岛链

Jara-Almonte 等在 MRX 碰撞氩等离子体中发现电阻性亚离子电流片的磁岛链。尺度为

$$d_e \sim 0.5\,\mathrm{mm} < \lambda_{\mathrm{mfp}} \sim 2\,\mathrm{mm} < \delta \sim 9\,\mathrm{mm} \ll d_i \sim 20\,\mathrm{cm}.$$

片内电子温度约 4 eV、密度约 $2 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，测得电阻接近 Spitzer 值；存在明显 Hall 四极磁场，但电子惯性可忽略。这是“碰撞性”与“双流体尺度”同时成立的例子。磁岛在 $S < 100$ 即出现，不能套用不可压缩单流体常见的 $S \sim 10^4$ 经验阈值。[124]

证据来自约 400 个磁探针：最佳径向分辨率 6 mm、轴向 3 cm。研究结合局地场插值的 X/O 点、Poincaré–Hopf 绕数和磁场过境变号确认磁岛；仅凭积分磁通图识别小岛反而较不可靠。约 500

次磁岛形成事件中，超过四分之三伴随电场增强；200 次放电的统计显示，平均一个磁岛对应约 10% 的全球归一化重联率增量。没有磁岛时率已约 0.1–0.2，因此磁岛不是这批实验“从慢到快”的唯一开关。

具体电子撕裂机制尚需含实际密度剖面、可压缩性、Hall 场与有限长宽比的二维本征计算。实验还留下结构问题：为何 $d_i \gg \delta \gg d_e$ 的长薄层能存在，而未自动变为电子尺度开放 X 形？可压缩电阻 Hall 模型有机会解决其中一部分，但需复现实验驱动和尺度，不能只画相似磁岛。

2.6　局域三维启动：感应场传播不等于总电场传播

Katz 等的 VTF 环形氩实验使用强导引场，密度约 $2 \times 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、电子 / 离子温度约 15 / 1 eV。在外部轴对称驱动下，重联仍先在局部环向位置启动。六个环向位置测得感应电场双向传播，正文报告速度约两倍 Alfvén 速度；加上静电部分后，总电场仍局域在启动附近。将摘要中的“近 Alfvén”理解为精确等于 V_A 会丢失这一细节。[125]

快重联与外区安全因子 $q \simeq 2$ 或 3 以及旋转电势模相伴；论文详析 $q = 2$。离子极化电流使局域下降的平行电流能够闭合。以实测势和磁场构造的半经验模型得到 22 微秒增长时间，与实验 20 ± 6 微秒一致。但模型已使用拟合电势、实测感应场和二者共同增长的关系，不能视为从任意平衡无参数预测启动。浮动势近似、8 cm 电流分辨率及边缘磁化的离子也需纳入比较。

2.7　MAST：双峰密度的解释需要同时纳入 Hall 与装置几何

Stanier 等从总电流 268 kA 和估计磁绳半径构造 MAST 合并初值，并在模拟中按实验 Thomson 散射弦的位置 $Z = 15$ mm 取径向密度剖面。环形内侧空间较小，磁绳靠近中心柱和重联喷流使内侧压缩；Hall 电子平行流又形成四极样密度结构。两者叠加使诊断弦穿过两个高密度区，出现双峰；随合并结束，外侧峰减弱或消失，内侧峰保留。[30]

这是对实验形状和演化顺序的解释，不是逐时定量重现：图中模拟每 $20\tau_0 \simeq 5.8\,\mu$s 取样，实验约每 0.1 ms 取样，峰值密度也不同；初始磁结构尚无法从实验完整反演。模型强制 $T_i = T_e$，离子黏性和超电阻增强，故不能由这篇直接推断离子、电子的真实加热分配。它最有价值的验证策略，是先比较诊断真正看到的弦剖面，再追溯产生剖面的二维结构。

2.8　2026 年跨尺度对照：延伸双峰电流片与能量分配差异

Yoo 等比较 MRX、2017 年 6 月 19 日 MMS 磁尾穿越、2021 年 4 月 29 日 PSP 日球电流片穿越及 VPIC 模拟。核心新结果是：分离线两侧的窄电流峰可以沿宏观排气区持续延伸，并伴随法向电势井、离子加速和密度增强。它把局地电子 / 离子解耦与宏观开放排气边界联系起来；**配套数值为 PIC，不是 Hall 流体模拟**。[126]

MRX 在离 X 线约 $6d_i$ 处用高分辨探针拟合双 Harris 片，两个半厚约 $0.29d_i$ 和 $0.70d_i$。二维阵列本身分辨率不够，电流峰不能只靠其粗网格图确认。密度、离子速度剖面来自约 250 个出现清晰目标结构的重复放电；$T_i = T_e$ 则依据相近条件的氦放电作估计，而非这批氢放电逐点直接测量。

环境	势井估算（两侧）	势井测量（两侧）	主要限制
MRX	12 / 6 V	11 / 5 V	浮动势代理、密度非对称
MMS	6 / 5 kV	5 / 7 kV	法向速度估计、时间积分
PSP	120 / 60 V	未可靠测得	电场误差过大

《理论与数值基础》式(1.285)给出相应磁压差标度。MRX 的数量接近，MMS 则是量级相符，不能写成各环境都精确验证。MMS 电流与 $E\times B$ 漂移电流的吻合只在强法向电场的边界时窗成立；复杂多维区还有没有对应磁场台阶的电流峰。

能量分配也不同：扣除上游温度后，MMS 离子焓流仍超过体动能通量，PSP 则体动能通量较大。作者提出低杂漂移与相混合可能影响这种差异，但两个不同环境的个例不能单独隔离 β_e 的因果作用。实验中没有独立扫描出普适的 β 阈值。

大盒 PIC 为 $200\times 40d_i$、4032×800 网格、质量比 100、$T_i/T_e=1$；小盒为 $20\times 20d_i$、1280^2、质量比 1836 和温比 5。二者不是仅改变系统尺寸的对照。大盒内 $\beta=0.012$ 时大岛破坏边界延伸，0.12 / 0.36 时可局部延伸，1.2 时保持到计算边界；这支持在*受测参数*下的准稳态条件，没有给出所有导引场、质量比和三维条件的相图。

Hall / 双流体下一步可直接检验电流双峰间距、厚度随下游距离的变化、势差与磁压关系，以及采用同样时间滤波的合成轨道。低杂波、束流与准确热化仍应由适当张量闭合和动理学对照验证。该文为 Article in Press；本地保留了原文与透明评议文件，源数据 Figshare 接口在检索日返回 404，故未声称完成原始数据复算。

2.9　MRX 电子层：确认了双尺度，也留下绝对量的差异

Ren et al. [115]使用五列磁探针测 B_T，径向最高分辨 2.5 mm，轴向约 3 cm。由 Ampère 定律反演面内电流，再以 $\boldsymbol{u}_e\simeq-\boldsymbol{J}/(en)$ 求电子流；Mach 探针检查离子流是否可忽略。因此电子速度是由磁场导数和密度反演的量，不能写成直接电子分布测量。其 H、D、He 放电中，Hall 四极幅度可达上游重联场约 30%–60%，电子排出通道比离子窄且更快。但只有约一半放电出现可辨四极场，文章选这些事件作分析；这限制其统计结论的适用总体。

电子层宽 δ_{BT} 定义为速度峰到降至峰值 40% 位置的径向距离，并取轴向排出速度峰处的值。它约为 $8d_e$，而比较二维模型常为 1–2d_e；峰值排出约 $0.11V_{Ae}$，V_{Ae} 所用磁场在电子层边缘取值。宽度乘速度的归一化乘积约 $8\times0.11=0.88$，支持较宽较慢通道仍能输送相近电子通量的图像。长度约 40–80d_e，随密度变化的趋势不支持简单 $L_e\propto d_e$，更不能据大误差数据宣布严格反比例律。

图 13 中，重联场约 170 V/m，经典电阻约 40 V/m，另一个未细测 Hall 分量估约 50 V/m，所估对流惯性约 1 V/m。压力张量及涨落项尚未全测，欧姆预算并未闭合。《理论与数值基础》第 1 章摩擦模型能把电子排出拉低，但有效碰撞率来自 E/J 反推，并假设同样作用于排出方向；仍可能高估约两倍。这项研究最有价值的未决结果就是：*测到正确的电子尺度缩放，不等于已经解释绝对层厚与速度。*

对应 PIC 模拟纳入通量芯、粒子吸收与壁面，质量比 75，并以整体率和离子层厚选择参数。较好的流型吻合强调边界的重要性，也意味着它不是完全不依赖实验输入的预测。流体后续验证应使用同样的诊断定义和仪器卷积，而不是用理想无限 Harris 盒与实验数值直接比高低。

2.10　UTST 合并：势降与排出同时出现，加热仍需独立检验

YAMASAKI et al. [127]在球形托卡马克合并中同步比较磁探针、浮动电势径向扫描和 Doppler 光谱。在约 200–205 微秒，重联磁通变化加快、电流降低，X 点附近浮动电势梯度变陡；覆盖 X 点的视线看到接近极向 Alfvén 速度的离子流。典型重联场 $B_p=0.01$ T、导场 $B_t=0.1$ T，电场估 400–800 V/m，碳离子流约 27 km/s，极向 Alfvén 速度约 24 km/s。用 $\tau_{\mathrm{acc}}=m_iv_i/(q_iE_r)$ 估加速时间 2.1–4.2 微秒，与碳离子回旋周期 3.9 微秒可比，支持瞬态静电加速的可能性。

但浮动电势并不就是空间电势：二者相差依赖 T_e 的鞘层项，只有空间温度差较小才能把其梯度当电场。本文未给完整同步温度修正；视线积分的谱宽也混有流动展宽，作者对此明确保留。正

文 CIII 与图 6 HeII 标注不一致，进一步限制精确的物种温度解释。故直接证据是势降、近 Alfvén 流及重联时序的联系；“Hall 独自导致不可逆离子加热”和具体热化机制仍是待验证解释。

2.11　三维 EMHD 磁涡：没有观察到细电流片同样值得记录

Stenzel et al. [128]在大尺寸氩等离子体中用天线先建立反向偶极磁场，关断电流后观察自由松弛。三维磁场来自可重复放电中移动磁探针的扫描，空间步约 0.75 cm、时间分辨 10 ns，电子惯性长度约 0.75 cm。初始 cusp 零点在等离子体电流作用下变成不规则 spiral 零点；闭合磁通随后转为开放。双磁涡还经退化零点、零线的变化合并成更长寿命 FRC，这是区别于二维 X 点图像的重要实验现象。

Langmuir 探针显示电子温度约倍增，发光主要发生在天线关断后的松弛期间；反转天线极性而不形成同类零线时，发光弱得多。实验没有观察到强 whistler 湍流、显著异常电阻或细至 d_e 的电流片；由回路电压和电流估计的导电率与经典值接近。这些负结果值得保留，不能为配合某类模拟而省略。另一方面，空间分辨本就约 d_e，未直接测得完整压力张量；“黏性/轨道效应比惯性重要”来自非绝热区约 5 cm 大于 d_e 的尺度判断，并非独立完成的欧姆预算。文章卷期年份是 2001，平台 2014 日期不应改写这一研究的历史位置。

2.12　新补入的实验和观测：Hall 特征也有模型歧义

2.12.1　MAIZE 导引场实验：四极密度并非直接测得四极磁场

Varnish 等 [129] 在约 500 kA、200 ns 的 MAIZE 电流驱动双碳丝阵列中，以阵列倾角调节 $B_g/B_{\mathrm{rec}} = 0, 0.4, 1$。两正交视线的 1064 nm、2 ns 干涉诊断显示，导引场下密度层产生旋转和四极密度特征；不同时间的重复发次提供了其持续性的证据。典型 d_i 估计约 0.5 mm，装置约 $40d_i$，不是尺寸无限大的理想平板。

该文的三维计算是 GORGON 电阻 *MHD*，100 μm 网格、$480 \times 400 \times 280$，不是自洽 Hall 计算。扭曲层几何可解释部分投影，却不能复现四极密度；作者进一步给出预设密度的 Hall 启发式模型，能得到更相似投影。这使 Hall 解释成为值得验证的候选，但没有直接测量层内 Hall 磁场、完整流速和温度来唯一确认它。两条视线也不足以唯一反演三维密度；模拟密度比实验高约 2–3 倍，零点校正依赖质量烧蚀对倾角不敏感等假设。

因此应写“与 Hall 机制相容的四极密度结构”，而不是“实验已经自洽验证了三维 Hall 重联模型”。密度团块也不自动等于闭合磁通岛。最直接的新研究是使用同一驱动、辐射/电离模型及边界加入 Hall 项，再合成相同干涉视线，检查新增四极信号与实测幅度是否同时匹配。

2.12.2　MMS 冷离子：同一位置的热、冷离子不一定同时退磁

André 等 [117] 分析 2015 年 11 月 12 日 MMS 磁层顶分离线事件。四星间距约 10 km，电子/离子采样 30/150 ms；跨层宽度估计 70–100 km，冷离子约 50 eV、回旋半径约 25 km，而较热离子的回旋尺度约 100–320 km。冷离子仍磁化、热离子已退磁，因此使用单一离子温度会丢失不同尺度响应。

法向电场约 10 mV/m，压力项约 2–3 mV/m；冷离子密度分数约一半，其对流项能与 Hall 项相当。这里测的是分离线法向场，不能改称 X 线重联电场。电场处理中还用了 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}=0$ 约束和约 2 mV/m 偏置校正，压力/电流梯度来自四星平均；这些诊断条件应与结论一起保留。此单事件支持多离子模型的必要性，没有给出冷离子对全局率的普适修正因子。

2.12.3　MRX 部分电离：Hall 形态保留，喷流却明显减速

Lawrence 等的 MRX 实验 [130] 保持离子密度和电子温度大致相近，提高氦中性密度。Hall 四极场相对上游场的形状和幅度接近不变，离子喷流速度却降低并接近按总质量密度定义的 Alfvén 速度。喷流通道宽度没有按无限域强耦合理论预期扩大，导致以离子 Alfvén 速度归一的重联率下降；换用总密度速度则近常数。

这不是简单的“电阻增大所以速率减小”：较高密度区电阻率平台或上升时，率仍下降，离子动量与中性拖曳是重要限制。最高中性密度时预期有效 Hall 尺度约 83 cm，超过实际设备尺度，边界可能阻止通道扩大。中性密度约有 50% 误差，中性压力未直接测量，所以这一边界解释仍需联合模拟验证。

2.12.4　MST 比较：应按松弛前态分类，再谈模型是否吻合

扩展 MHD 研究 [84] 比较了 MST 电流与平行速度在松弛期间的改变。首次准单螺旋态崩解与后续多螺旋松弛给出不同符号关系；后者才更接近常规实验集合平均。该比较是模拟作者对既有实验数据的分析，不是本项目另行精读了其全部实验引用。也不能把模拟壁面的动量注入解释直接搬到真实装置，原文对此明确保留。

2.13　把实验放回研究脉络：测量事实、重建与解释分开

2.13.1　MRX 的离子加速与升温：核读被后续理论回引的原文

第1.7.4节的发现来自 Yoo et al. [119]。该研究从 4200 余次氦放电中按参考探针的重现性选取数据，扫描重建二维剖面；它不是同一次放电瞬时取得所有点的完整二维相空间。浮动电势结合电子温度估计等离子体电势；磁探针给出电流，离子流则由经光谱校准的 Mach 探针测量。独立输入经电子动量平衡积分得到的电势，与探针结果在误差范围内相容。

离子光谱的细节尤其关系到“是否加热”的判断。作者对 He II 468.6 nm 谱线用 13 个 Gaussian 分量处理精细结构，指出忽略它会把离子温度高估约 15%–25%。门控时间 5.6 微秒、空间 3–4 cm，也会平均局部细结构。若用 Hall 或十矩计算比较，至少应先合成相同分辨率的速度与温度诊断，而不是直接对比网格点极值。

面内电场对离子的电功在下游可达 20–50 W/cm^3，面外电场项约 2–8 W/cm^3。这支持能量首先经面内场进入离子的路径，却仍不是完整的不可逆离子加热率。该区域的密度升高、均程降低和再磁化均可能影响热化；原文把微观过程留给后续研究。因此，L272 用其电场尺度检验失磁化指标，是对实验的一种后续解释，不能反过来说原实验已排除了碰撞、势阱反弹或波粒作用。[95, 119]

2.13.2　Cluster 嵌套四极：合成轨道比图样命名更重要

Jain and Sharma [116]用 EMHD 结果沿虚拟轨道抽取电磁场，再把电场从边界法向坐标转到 GSE 坐标。倾斜电流片使观测的某一电场分量主要来自法向电场；如果忽略这一投影，可能误认成重联电场本身。比较应包括各磁分量过零的先后、峰值相对位置及弱外四极，而不只挑两个相似的峰。

本文事件中其余三颗卫星间距大于典型电子尺度，主要证据仍是单轨道，不能唯一确定结构的时空演变。应把它与第1.7节的多物种同形图样及前文实验积分效应一起读：模型只有在经过同样的测量变换后仍能区分替代解释，才获得更强的实验约束。

2.13.3　加热诊断补充：先分清测量、反演和机制

Yoo2013/F679 的电势来自浮动电势与电子温度换算，电子动量平衡积分是另一条一致性检验；温度是 13 个 He II 精细结构分量拟合，空间平均 3–4 cm，二维图由筛选后的重复放电拼接。Yoo2013 指出热点不在经典无磁化黏性剪切最强处，不能将 MAST 的黏性出流解释直接移植到 MRX。非对称 MRX 中，Yoo2017 图 11 即使低密度侧电场大，离子因势垒与流向也未获得相应大电功；图 10 预算在本地 PDF 第 15 页。[108, 110, 119]

Tanabe2015MAST 的图 2 单次时间序列与图 3 跨脉冲二维重建应分开：电子 Thomson 与杂质离子 Doppler 层析看到初期不同热点，图 4 晚期三峰约束物种交换，图 5 约束导场和输运的共同影响；没有直接磁探针，局地耗散机制仍非唯一。HIT-SI 模型论文转述的 HIT-SI3 初步 Thomson 数据也不是 HIT-SI 同一次共址测量。专题的实验章节提供具体分辨率、误差来源、图号和竞争解释。[97, 111]

第三章　检索方法、覆盖范围与阅读证据等级

3.1　范围与不能作出的保证

主范围是电子–离子 Hall MHD、准中性 / 完整双流体、电子惯性扩展 MHD，以及与重联直接相关的五矩 / 十矩闭合、EMHD 和强导引场约化模型。实验与动理学论文作为检验或对照单列。离子–中性、部分电离、相对论和电子–正电子“双流体”需要特别标识；这些名称相似，但不等于主范围中电子–离子 Hall 模型。

目前是持续核读工作稿，尚未完成全部候选的全文资格筛选。检索不可能证明世界上所有文章均已收录；尤其是数据库覆盖、非英文文献、早期会议记录、题名未含模型名、订阅全文与出版版本差异均可能造成遗漏。本项目不把“检索命中”“拿到 PDF”“完整阅读”和“结论可靠”合并成一个数量。

3.2　已经实际执行的检索

宽检索。　OpenAlex 中先使用 Hall magnetic reconnection、two fluid magnetic reconnection、electron inertia reconnection、ten moment reconnection、Hall plasmoid reconnection、Hall reconnection guide field、Hall reconnection experiment、Hall reconnection numerical method、two fluid tearing mode、Hall reconnection three dimensional、Hall reconnection sawtooth、electron magnetohydrodynamic reconnection 等 12 组检索。初轮每组取 200 条，因此这一轮**不是穷尽式分页**，检索日志保留了总命中数与截断量。

题名分页。　随后对 Hall、two-fluid、electron inertia、electron magnetohydrodynamics、ten-moment、five-moment、gyrofluid 这 7 组模型词，分别配 reconnection 和 tearing，共 14 组题名检索。该轮全部翻页至耗尽，去重后得到 484 条源记录。Hall + reconnection 为 279 条，two-fluid + reconnection 为 72 条；这些只是数据库当次返回量，不等于最后纳入篇数。

arXiv。　实际检索式为：

> all:reconnection AND (all:Hall OR all:”two-fluid” OR all:”two fluid” OR all:”ten-moment” OR all:”electron inertia” OR all:”electron magnetohydrodynamics”)

该轮返回 262 条，已完成分页。另通过引用追踪补充模型基础论文、作者主页、机构预印本库及实验机构公开文献。

失败与恢复。　带引号全文检索的一次扩展遇到游标鉴权与响应解析失败；这不是零命中。失败检索式、已返回部分与错误记录保留在 expanded_search_log.json。后续题名检索改用普通页码，避免把失败游标误记为全部检索完成。

进一步补做的完整分页。　随后执行以下全文字段查询，前五组均翻页到当次返回末页；数字为原始命中数，可跨查询重复：

查询组合	返回条数
Hall MHD AND (reconnection OR tearing)	1585
Hall magnetohydrodynamic AND (reconnection OR tearing)	865
two-fluid AND magnetic reconnection	2425
electron magnetohydrodynamics AND reconnection	365
electron inertia AND reconnection	1170
gyrofluid AND reconnection	200 / 234

最后一组尚缺 34 条：接口返回 429，重试仍受限；这不是没有更多文献。实际带引号的完整查询、日期过滤（截至 2026-11-10）、每页 50 条及原始响应见 full_search_log.json 与 raw/full_search。合并后原始唯一记录 4484 条。对题名含 reconnection / tearing、题名或摘要含模型词的记录再作候选过滤，补充 247 条；该步骤是广泛召回，不是人工全文纳入。检索中出现的动理学对照、离子–中性双流体、会议资料与学位论文仍需逐篇分流。

3.3　身份核对与版本合并

首先按 DOI、arXiv 标识和题名合并，随后用 PDF 首页题名、作者、期刊信息和文件散列复核。自动相似题名比对只用于发现候选，不能作为最终身份确认。例如两篇题名仅相差“任意导引场”的 Taylor 问题文章，一度匹配到同一个 PDF；首页 DOI 复核后已改正。另有学位论文被误配到同题论文预印本，已撤销其“获得正确全文”状态。

一些种子书目也经全文检查改正：非线性无碰撞重联的 Ottaviani–Porcelli 论文 DOI 为 10.1103/PhysRevLett.71.3802，70.3259 实际是另一篇锯齿研究；半隐式 Hall 求解器的作者是 Arnold、Dreher 和 Grauer；2020 年的改进十矩闭合作者是 Ng 等。预印本的自动排版日期有时晚于 arXiv 提交日期，机构库封面也可能误写年份，均在核读档案中说明。

已确认的版本重复保留指向主记录的映射，不再次计算为独立研究。新闻稿、会议海报、幻灯片和学位论文单列；下载文件保留供核查，但不把其页数当成论文数量。

本轮续读进一步核对了 2005 / 2008 年同题受迫重联、2004 年两篇 Taylor 问题，以及 2015 年强导引场短文与长文。这些是相关但不同的出版物；数据部分重叠时，在证据判断中说明，不以篇数制造独立验证的印象。MRX 的 2013 年长文已从作者所在机构的公开目录取得 6 页期刊全文，来源为PPPL 作者公开版本，与 2012 年短文分别登记。

对若干尚缺核心文章的出版社公开接口及其他公开入口也进行了补查；HTTP 401 / 403 和未匹配到全文的记录保留在`research/raw/core_retrieval_continuation.json`。访问失败不等于论文不存在，也不等于已读。尚未取得的 2008 年 Simakov 短文不能由已经核读的 2009 年长文顶替。

3.4　全文阅读标准

2026 年 11 月 11 日上一批根据重要性从已有全文中选择 39 篇，逐篇完成正文、方法、结果、讨论及适用附录阅读，使总核读数由 62 增至 101。选择依据是补齐核心机制争议、数值算法、闭合及实验对照，不以短文、重复版本或仅摘要满足数量。该批包含 Hall / 双流体、EMHD 与回旋流体的模型研究，也包含明确标识的动理学对照、流体–动理学模型、算法及实验；篇数不是独立 Hall 模拟次数。

上述 39 篇批次没有新增 PDF 下载，主要消化已取得全文。其队列、全文提取和逐篇人工笔记在`research/read_to_101/`，合并后证据集中在`research/reading_notes/verified.json`。

同时修正平台日期与正式卷期年份混淆：L204、F766 为 2001 年卷期，E459 为 2005 年卷期（2004 在线）；L156、L210、L243 的预印本年份分别为 2010、2015、2018，正式期刊年份为 2011、2016、2019。各笔记明确实际所读版本；修正年份没有增加独立篇数。

每篇被本报告用于研究结论的文章，均须阅读模型方程、闭合、初边值、数值 / 实验方法、结果、讨论和结论；有附录时一并核对。扫描件先 OCR，再直接看关键公式和图像，不能只信 OCR。每篇档案记录：实际阅读版本和全部页码、核对的图表、参数与诊断定义、主要发现、作者承认的限制，以及本报告额外的推导或一致性检查。

完整阅读不意味着逐行重现作者代码。无公开输入、缺少网格收敛、未展示的私人通信或仅文字提及的 PIC 对照，均降低相应结论的证据强度。对于公式印刷疑点，本报告从原始方程重建；没有核对实现代码时，不进一步声称作者代码也有相同错误。

3.5　本次余量筛查：698 条逐项初筛，新增 15 篇全文核读

以上一版剩余 698 条为固定基线，逐条检查题名与书目信息，并对重点候选进一步检查摘要及公开版本入口。**698 条全部完成的是题名和元数据初筛，不是 698 篇全文阅读**。筛查台账记录每条的分流理由；没有仅凭题名把记录永久排除。初筛时的分流数量如下，它们是工作队列，不是独立的学术质量评级。

初筛去向	条数
保留待全文核读	430
优先获取或核读	122
会议记录追溯正式论文	82
模型边界待全文确认	30
长文或学位资料单列	25
综述与章节单列	9

本次完成 15 篇的全部正文、方法、结果、讨论、适用附录与关键图表核读，总数由 101 增至 116；所读主版本共 185 个 PDF 物理页，包含参考文献和机构库封面。页数仅说明阅读范围。文献键为 E473、F589、F600、F606、F625、F655、F703、F741、F788、F798、L190、L227、L241、L283、L314。选择覆盖全局尺度效应、Hall 能流理论、电子独有重联、导引场下模型分歧、网格与磁岛、Full-F 算法、三维 Hall 发电机及多组分和实验边界。

新增取得并核读 F788 的 10 页 JFM 正式版本，保留旧 8 页预印本以供版本对照。GREENY 的 F802 期刊登记和 F803 SSRN 登记与 E473 指向同一研究，已合并；E473 实际所读为 arXiv v1，不能据此声称核读过正式修订版。因此原始登记仍为 807 条，非重复且非排除候选从 799 变为 797 条；该 15 篇批次完成时仍有 681 条未完成全文核读。308 条非重复候选关联 PDF，物理 PDF 文件总数与文章数不同。

初筛表、逐篇笔记、原文提取、关键页图像、版本校正和本轮统计见`research/remaining_screen/`。`screening.json` 与`screening.csv` 保留初筛时快照，当前已读 / 未读状态以总索引和`progress.json` 为准。自动提取全文、获得 PDF、检查题名都不计入完整阅读。部分重点候选仍缺全文或待核读，故本报告仍为持续更新工作稿。

3.6　11 月 11 日历史批次：新增 6 篇全文，累计 122 篇

本次以 116 篇版为基线，继续复核原优先队列中 107 条未读候选的题名、已有书目和初筛理由，选择能连接三维几何、压力闭合、场结构诊断与离子加热的 5 篇存量论文进一步全文核读：F659、F792、F611、L213、L272。通过 L272 的参考文献追踪，另补入并全文核读 Yoo2013 原始 MRX 实验。累计完成 122 篇；这次所读主版本共 58 个 PDF 物理页，包含出版/机构封面和参考文献。

新增下载 4 个文件：F792 的 10 页正式版、L213 的 6 页正式版、L272 的含封面 10 页正式版，以及 Yoo2013 的 5 页正式版。前三者原预印本或稿件仍保留，主索引改指本次实际核读的正式版。F659 核读的是 9 页 arXiv v1，F611 是含机构封面的 18 页接受稿，不把它们冒记为期刊正式版。新取得全文的公开来源分别为 USTC 作者目录、Copernicus 出版社、Caltech 作者库和 PPPL 作者目录。

引用追踪还发现 3 条原候选库遗漏的前序研究：Ohia2012、Ohia2015 与 Jain2009。已核对书目并登记，但未取得并完成正文核读，故不据其摘要作内容判断，也不计入 122 篇。新增 4 条登记后，原始记录为 811 条，非重复且非排除候选 801 条，309 条关联可解析 PDF；尚有 679 条候选未完成全文核读。原优先队列减少 5 条，加上 3 条新的前序待读记录，当前优先待读 105 条，其中 49 条已有 PDF。

第 1 章此次实际重排原来的科学论述，拆出跨主题段落，与新发现共同组成七条问题线；合计 54 个内容块都有归属记录。只有过时的批次导语被删除，原有数值、反例及限制保留。第 4 章和 HTML 索引为全部 122 篇增加研究脉络关联；模型基础与算法另列“模型与数值可信度”。这些关联是本报告的逻辑阅读路线，并不冒称完成了 122 篇论文之间的全部直接引用网络核验。

续筛理由、逐篇笔记、全文提取、关键页图像、下载及版本信息、重排记录和新代数核验见`research/synthesis_continuation/`。本次复核 107 条的是优先候选元数据；完成 58 页主版本阅读的是上述 6 篇。其余未读候选及引用的未取得前序方法继续明示，不把复核题名、自动提取或引用追踪冒充阅读全文。

3.7　11 月 12 日加热专题：新增 17 篇，累计 139 篇

从问题卷原《理论与数值基础》第 1.4.5 节出发，以 Yoo2013、L272、E512 为种子追踪参考文献和引用它们的文献；OpenAlex 一跳取得 379 条有向关系、363 个去重节点。宽关键词检索保存 16020 个去重元数据，但含大量不相关工程传热命中，未全部人工筛选；第三式取得 3800/15993 条后受 HTTP 429 限制，后续七式首轮受限，不能将其计为零命中。人工定向检索与原文追引覆盖双温 Hall、双流体输运、十矩、Landau/动理学扩展及实验对照。详见 `specific problems/`离子加热问题`/search/`。

三条阅读分支新增 17 篇全文核读，主版本合计 300 个 PDF 物理页；另完整重读 Yoo2013、L272、E512、L244 共 70 页，主代理补读已核读 F635 的 10 页。关键公式、图表及文内附录均覆盖；未取得的前序方法、独立补充、勘误与源数据继续单独说明。新增 15 个原文 PDF 含不同版本，Kaptanoglu 早期 21 页版本仅部分阅读，不另计一篇；F674 正式版替换主索引而保留旧预稿。

目前登记 822 条、非重复且非排除 812 条，322 条关联 PDF，原文物理文件 339 个，全文核读 139 篇，尚待核读 673 条。新增读档包含实验、PIC、陀螺动理学、混合模型及会议稿，不是 17 次独立 Hall 模拟。既有历史批次数字保留原日期；当前数量以全局索引与审计为准。未取得的 Drake2009 拾取加热、L046 电子加热、Kaptanoglu 勘误等列入专题缺口，不据摘要进入科学结论。

3.8　本地目录与继续更新

文件 / 目录	用途
main.tex、preamble.tex	主文档、字体与简洁排版
sections	《理论与数值基础》第 1 章模型推导及其余专题章节
references.bib	全部登记条目的文献数据；正文参考文献打印实际引用条目
papers	已取得 PDF；旧键名可能与改正后的文献键不同，以索引路径为准
paper_index.html	本地可搜索索引，核读档案可展开，直达本地 PDF
paper_index.csv	可导入文献 / 表格工具的状态清单
research/catalog.json	原始元数据、下载来源、身份核对与重复映射
`research/reading_notes/verified.json`	人工全文核读笔记；不是摘要自动生成的内容判断
research/raw、research/text、research/qa	检索原响应、全文提取 / OCR、关键页图像
scripts	检索、下载、身份修正和索引生成脚本

第四章　逐篇核读档案与全量候选索引

本章前半部分是已完成正文与关键图表核对的文献档案；后半部分是尚未完成核读或待进一步筛选的候选目录。待核目录的题名、年份与链接是检索信息，不等于对其方法、发现或相关性的确认。

4.1　如何反查本地原文

文献键是稳定检索标识。各档案提供本地 PDF 链接、DOI 或版本入口和页码。PDF 阅读器可能限制相对文件链接，可直接在项目的 papers 文件夹打开对应文件；完整路径及全部状态也在 paper_index.html 和 paper_index.csv 中。

4.2　Ottaviani1993：1993 年

Nonlinear collisionless magnetic reconnection[32]

M. Ottaviani; F. Porcelli.

核读范围：JET-P(93)66 PDF1-16 全部，扫描件 OCR 后核关键公式与图；**图表**：图 1-4，关键式 11 和图 3 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Ottaviani1993.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无耗散、不可压、二维周期冷两场惯性模型，忽略 Larmor、密度和压强梯度，F=psi-de^{2}lap psi 被输运。

计算 / 实验细节　psi0=cos x, Lx=pi, epsilon=Lx/Ly=.5, de/(2Lx)=.04，Delta'de 约 2.03，仅 m=1 不稳定；伪谱 1024×64 Fourier 分量；t 约 125 小尺度不可解析而终止。

核实的发现　早期非线性 de<w«Lx 内对流胞保持宏观结构，电流子层按 delta~de exp(-位移/de) 缩窄，流速层仍约 de；幅度方程 A" 约 A+c2 A^4 给准爆发增长。

限制与未完成问题　是早期非线性与大 Delta' 结果；到宏观岛宽时增长变慢的另一计算仅文字报告；不能把有限时形式发散当成物理无限电流；无收敛扫描且细层未解析后主动停止。读取的是投稿前 JET 版，不冒充期刊最终版逐字核对。

本报告判断　重要新现象是多尺度电流 / 速度结构与非线性加速，排除了该序列中必然 Sweet–Parker 式减速；不提供任意参数的最终饱和 / 热化预测。

4.3　Schep1994：1994 年

Generalized two-fluid theory of nonlinear magnetic structures[33]

T. J. Schep; F. Pegoraro; B. N. Kuvshinov.

核读范围：PDF1-11 全部（正文 2843-2852）；**图表**：式 1-18 视觉复核；图 1、2 及全文理论.

打开本地 PDF：papers/Schep1994.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　低 beta 强导引场、等温电子，平行离子流忽略，保留电子惯性和电子陀螺黏性抵消；离子响应采用全 FLR 非线性构造。

计算 / 实验细节　频率低于离子回旋 / 磁声、高于离子声响应；slab, yz 周期；定常传播解背景指数密度及线性磁剪切；本文无时变重联模拟网格。

核实的发现　构造能量与非正则 Hamilton 结构，二维有两族电子 Casimir，冻结组合是 Psi_e±de sqrt(beta_e) ln(n/n0)，不是 Psi 或 Psi_e；有限惯性去掉电流本身的奇点，但梯度仍可能很大，广义通量 X 点分离。

限制与未完成问题　第 2845 页明确全 FLR 离子方程是 ansatz，并非从 Vlasov 严格推导；第 2849 页未求解完整非线性本征问题；第 2851 页指出相关传播尺度 Landau 共振使流体模型失效；机构库封面年份错误，正文 1994。

本报告判断　适合严谨说明约化模型的构造条件与守恒；不能把全 FLR 构造称为完整动力学或已完成数值重联验证。

4.4　Biskamp1997：1997 年

Two-fluid theory of collisionless magnetic reconnection[1]

Dieter Biskamp; E. Schwarz; J. F. Drake.

核读范围：1-8（全部）；**图表**：图 1-5 及表 I-III；表 I-II 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Biskamp1997.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　准中性、标量压强、均匀密度、两流体惯性；电子黏性与离子黏性正则化；忽略电阻；常密度使标量电子压强不进入感应。

计算 / 实验细节　2D 周期 2pi 方盒；伪谱 2/3 去混叠；N=256 至 2048；用六阶扩散替代四阶以集中小尺度；EMHD de=0.1 至 0.01；离子扫描 di=0.4 至 0.05，di/de 约 6.6-13.3。

核实的发现　电子惯性层长宽随 de 缩小；表 I 速率对 de 与超黏性弱敏感；表 II 在 Alfven 单位 E*=Edi，di 下降时 E* 由 0.68 到 0.34；电子 KH 湍流主要改变有限耗散率，而非增加已快的重联率。

限制与未完成问题　未确定 di 趋零渐近；恒密度强制会产生局地能量源汇；低 beta 模型未纳入平行电子压强效应，不能推广成强导引场都慢；FLR 仅粗略处理。

本报告判断　把拓扑改变尺度与吞吐尺度区分开；不是严格无耗散模型，也不证明普适 0.1 或无限系统尺寸无关。

4.5　L020：2000 年

The onset of turbulence in collisionless magnetic reconnection[81]

B. N. Rogers; J. F. Drake; Michael A. Shay.

核读范围：GRL 27, 3157–3160（2000），物理页 1–4 全部，含模型、二次不稳定性、消融、PIC 对照与参考文献；**图表**：图 1–4 与三次色散式 (1)，物理页 2–3 直接视觉核验；扫描文本的符号以原图为准.

打开本地 PDF：`papers/L020.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维等温双流体，Hall 与电子惯性、无显式电阻；承接早期 F3D 模型。标量压力缺离子 FLR、梯度 B 漂移共振和 Landau 阻尼；PIC 只另检验初始一维片的二维 LHDI。

计算 / 实验细节　双周期片初始 w0=di，质量比 277.8、de/di=.06，512×256×64、10×5×1.25di，全周期，初始总压 $1.5B0^2$；$Ti+Te=B0^2/(4\pi n\infty)$。比较 de=.2di、Bg=2B0、w0=.5di 等；无绝对时间步和完整收敛表。

核实的发现　非线性重联先形成陡峭梯度，约 t=4 离子回旋时间出现电子剪切流不稳定性，约 6.5 再出现 LHDI；不是初始片线性阶段就同样不稳定。电子电流层由约 de 变为 2.5de，仍为电子尺度；三维平均率反而比二维低约 25%。ESF 惯性速度关联支撑 X 线平均电场，空间积分近零，体现异常黏性而非异常电阻。LHDI 削弱分离线面内电子电流/Hall 场 30–40%，密度梯度趋边缘稳定；去掉直接粒子关联通量影响很小，抑制 Bz 异常输运则继续陡化并崩溃。

限制与未完成问题　Lz 仅 1.25di，能容纳电子短波但排除更长三维结构；de 约 3 格。二维 PIC 对照验证增长量级，不能替代非线性三维动理学验证。模拟磁声激波在真实动理学中可能被 Landau 阻尼；有限 beta 梯度 B 稳定作用等被省略。没有证明湍流必然加快重联。

本报告判断　直接纠正湍流等于异常电阻、等于加速的简化图像；应分别测动量通量、磁场输运、粒子通量与总率，并记录不稳定性启动顺序。可与 2026 十矩三维研究形成长期证据链。

4.6　Birn2001：2001 年

Geospace Environmental Modeling (GEM) Magnetic Reconnection Challenge[2]

Joachim Birn; J. F. Drake; Michael A. Shay; B. N. Rogers; R. E. Denton; M. Hesse; M. M. Kuznetsova; Z. W. Ma; Amitava Bhattacharjee; A. Otto; Philip L. Pritchett.

核读范围：1-5（全部）；**图表**：图 1；PDF 第 3-4 页数值与说明.

打开本地 PDF：`papers/Birn2001.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GEM 跨代码比较；有限种子 Harris 片，二维；Hall 组的电子惯性 / 耗散并不统一。

计算 / 实验细节　a=0.5di, n_b/n_0=0.2, T_e/T_i=0.2, mi/me=25, Lx=25.6di, Lz=12.8di；网格和无质量电子代码的耗散留给参赛者；psi0=0.1。

核实的发现　图 1 的 Hall / 混合 / PIC 通量曲线接近，峰值率约 0.24；但粒子模型电子层和离子喷流宽度可比对应流体模型大约两倍。

限制与未完成问题　有限种子刻意跳过线性触发；过量扩散降低速率；原文末段明确限定二维，三维次级不稳定性和亚暴触发未解决。

本报告判断　适合作为非线性通量率基准，不能据此声称所有扩散区细节或自然触发均可由 Hall MHD 替代。

4.7　F766：2001 年

3D EMHD reconnection in a laboratory plasma[128]

R. L. Stenzel; J. Manuel Urrutia; M. C. Griskey; K. D. Strohmaier.

核读范围：EPS53 卷 553–560，2001 年全文 8 页；库的 2014 为平台登记错误，不能用作发表年份；**图表**：图 1–9，直接核验页 5 磁通/发光及页 7 双涡合并 FRC 演化.

打开本地 PDF：`papers/F766.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　UCLA 实验三维 EMHD 参数区的无持续驱动磁涡松弛；先由回路天线建立反向偶极场再断电，三维磁探针跨重复放电扫描并由 curl B 求电流，Langmuir 探针及光电二极管诊断。

计算 / 实验细节　氩等离子体柱直径 1m 长 2.5m、ne≤1e12cm^{-3}、Te≤3eV、B0 约 5–10G、中性压.3mTorr；空间步.75cm、时间 10ns，天线脉冲约 5μs、下降.75μs。双 10cm 天线相距 25cm，de 约.75cm、非绝热电子区约 5cm、电子碰撞自由程 ≥20cm。

核实的发现　关断后势场 cusp 零点变为不规则 spiral 零点，约 5μs 闭合磁通变开放；双涡经退化零点/零线合并为寿命约单涡两倍的 FRC。无观测到细 de 电流片、whistler 湍流或明显异常电阻；回路磁通变化约 5V，Eθ0.1V/cm、J2A/cm^2 推 σ20Ω^{-1}cm^{-1} 与 Spitzer28 接近。电子温度约倍增、发光主要发生关断后；早期离子密度脉冲更可能是外加场驱动。

限制与未完成问题　黏性/压力张量主导来自轨道尺度比 de/碰撞尺度的推断，未直接测完整 Pe 散度预算；导电率接近经典值并不独立确认破冻结项。空间分辨约 de，不能排除更薄瞬态结构；跨放电重构依赖可重复性。文中广义涡量加号错误，正确 B*=B-de$^2\nabla^2$B；零点存在并不自动证明拓扑变化，射流动能也非必然不可逆热化。

本报告判断　作为 EMHD 三维零点演化和流体模拟预测的独立实验检验；报告保留无薄片/无湍流这个负结果及诊断分辨限制，而不将其写成普适禁止。

4.8　L029：2001 年

Hybrid and Hall-MHD simulations of collisionless reconnection: Effects of plasma pressure tensor[7]

Lin Yin; D. Winske; S. Peter Gary; Joachim Birn.

核读范围：LA-UR-01-2484，封面及 ISSS-6 论文正文 1–4 页（物理页 1–5）全部；这是正式会议短文，不是同作者另两篇期刊文章；**图表**：图 1–2 及电子压力演化式；物理页 3 和 5 直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L029.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无电子惯性、无显式电阻的 Hall 流体与动理学离子混合对照，电子非对角压力进入欧姆定律。文中印出的压力方程为输运/形变加 Ωe/τ 各向同性松弛，没有显式磁旋转项，不能不加区别称完整 Vlasov 十矩方程。另用粒子估计离子非对角压力修正 Hall 动量。

计算 / 实验细节　Harris 片 α=.4di、10×10di 和 128^2；另一组 α=.8di、20×20di 和 256^2。上游 beta=.2，Ti/Te=5，y 周期；x 边界横向速度/场为零。交错有限差分/leapfrog；Hall 磁场 RK4，每流体步 5–10 磁场子步，磁场六阶超黏性和流体平滑；τ 及绝对步长未列。

核实的发现　电子压力在 X 点、Hall 项在其周围支撑 Ez；两种模型整体率和构型近似，却在离子面外速度明显不同：标量离子压力使 vz 一直峰于 X 点，混合模型将动量搬到两侧。粒子 Hall 用 Piyz 及 Pixz 修正后恢复分裂速度峰，主要改善来自 Piyz。电子压力还通过面内电场拖曳离子，影响出入层动力学。

限制与未完成问题　会议论文只有两幅结果图，平均率改善没有给定量误差或收敛；没有完整电子旋转项的所印方程与现代十矩定义不同。粒子压力纠正依赖离子分布，已不是闭合纯流体。MHD 嵌入只说明接口程序，没有展示其全球结果，不能据此称全球耦合已验证。

本报告判断　重要早期反例：总重联率接近，并不认证离子动量输运正确；应把 Piyz 和 vz 空间结构加入 Hall 模型验收。后续十矩及混合模型的必要性可由本篇的直接对照说明。

4.9　L204：2001 年

Hall effects on field-aligned current generation in three-dimensional magnetic reconnection[82]

N. Yokokawa; M. Fujimoto; Y. Yamade; Tohru Mukai.

核读范围：Earth Planets Space 53, 501–507 (2001) 全部 7 页；出版年份不是数据库误收的 2014；**图表**：图 1–8 及初始化/数值段，图 7–8 直接视觉核验，比较固定 Ry 与固定 Ry/D 两条扫描路线.

打开本地 PDF：papers/L204.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维 Hall MHD，冷无质量电子、离子压力和焦耳/黏性加热；人为局域增强电阻触发，因此不研究电子破冻结机制。

计算 / 实验细节　D=1.5di 磁尾主例，Bx=tanh(z/D)，n=1+2sech^2(z/D)，离子 β=0.5；η=D[4exp(-x^2/Rx^2-y^2/Ry^2-z^2/Rz^2)+1]/Rm，Rm=200，Rx=4D，Ry=10di，Rz=2D。盒 80D×10Ry×20D，格 0.4D×0.1Ry×0.2D，四阶差分/RK4，Re=200。x, z 对称边界，y 周期；厚度至 10di、Rm100–400 扫描。

核实的发现　Hall 电子先晨向后昏向偏转产生纬向分层的强场向电流，传播到远离 X 线处，区别于 MHD 喷流分叉产生的晨昏电流对。D=1.5 例峰上行 FAC 约 0.7 初始片电流，换算约 7nA/m^2 和总 1.5×10^5A。固定 Ry 增加 D 时 MHD 分量增强；固定 Ry/D=6.7 则 Hall 分量到 D=10 仍占优，MHD/Hall 峰比约 0.6。说明纵横比与三维程度不能被片厚单变量替代。

限制与未完成问题　Ry/D>7 且 D 到数十 di 仍重要是由有限 Rm 扫描和 Hall 峰 ∝√Rm 外推，非全部直接计算。无偶极场、电离层耦合、电子加速动力学；对称边界抑制跨尾 KH。模拟没有重现传统亚暴电流楔，不可宣称已解释极光。Ry<7di 喷流不足的结果未作图；网格随 D 变粗且无完整收敛表。

本报告判断　重要发现是 Hall 改变大尺度电流闭合形态，非仅局部四极磁场；实验/空间联系应把模型预测 FAC 和实际电子能谱、极光辐射分开。

4.10　Rogers2001：2001 年

Role of Dispersive Waves in Collisionless Magnetic Reconnection[3]

B. N. Rogers; R. E. Denton; J. F. Drake; M. A. Shay.

核读范围：1-4 全部；**图表**：图 1-4；图 3、4 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Rogers2001.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维等温双流体，电子惯性，周期双电流片；EMHD 和约化 KAW 机制推导及完整线性两流体色散关系。

计算 / 实验细节　主要扫描 mi/me=82.6, Lx×Ly=20di×10di, w0=di，Bg/Bx=3 和 30；另用质量比 300；早期图 1 盒 10×5di、质量比 300；正文未报告网格及耗散实现。

核实的发现　同时允许 whistler 和 KAW 时率约.12；仅一分支约.06；强导引冷等离子体无二次色散波时率显著低、长片。控制量 mu_k=(me/mi)(c_A^2+c_s^2)/c_Ak^2 与 beta_k/2=c_s^2/c_Ak^2，而非单独 Bg/Bx。

限制与未完成问题　线性波向非线性外推时 By 随时间空间变化，图 2 用 Bx 上游作方便替代，作者明确承认；不是任意闭合、对等离子体或动理学的必要条件定理；无网格收敛展示。

本报告判断　证据支持其等温流体模型的波模 / 几何关联，后来的压力机制及动理学反例需要单独核验。

4.11　Shay2001：2001 年

Alfvénic collisionless magnetic reconnection and the Hall term[64]

Michael A. Shay; J. F. Drake; B. N. Rogers; R. E. Denton.

核读范围：期刊 3759-3772 全部 14 页；**图表**：图 1-13 正文图注；模型页、图 7-9 和 11-12 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Shay2001.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GEM Hall/惯性标量压强双流体、混合粒子离子、全 PIC 对比；流体 gamma5/3，常 de 惯性反演。

计算 / 实验细节　25.6×12.8di，x 周期 z 导体，背景密度.2；有限岛种子跳过线性阶段。质量比 25 主比较 512×256；混合质量比 9-100 最高 1024×512。磁方程六阶谱耗散，密度/压强二阶防负扩散；混合电子子步为离子 1/50-1/100，PIC c/VA25 和场 6 子步。

核实的发现　Hall、混合、PIC 总磁通率相近，但离子动理学喷流约宽两倍、峰流速约一半；常 de 使流体电子层比 PIC 约窄两倍。电子质量变化时内层宽度、峰喷流随 de 与电子 Alfven 速度变化，Bx^2/L 近常数；me0 时层缩到网格而总率仍接近。分离线密度耗尽：上游.2，Hall 最低.03、混合.1、PIC.15；对应 Hall 电流与磁压增强。

限制与未完成问题　小盒反平行、有限种子及质量比 9-100 不能证明任意系统、启动、导引场和闭合都无关。无质量电子断线来自六阶/网格耗散；没有严格理想 Hall 断线证据。均匀小电阻不足的论证使用电子层宽长比近固定 1/5 等几何假设，不能排除后来的其他电阻 Hall 分支。密度扩散防负数也可能影响空穴细节；其系数与完整离散流程本文未列。

本报告判断　总吞吐相近不保证密度、离子喷流或电子扩散层正确；原文 Hall 最小模型结论应限制到已测试的问题。

4.12　L035：2002 年

Simulations of current sheet thinning and reconnection[9]

Lin Yin; D. Winske.

核读范围：正式 JGR 2002JA009507 全文 11 页，含图页及参考文献；**图表**：图 1–9、式 1–14，图 9 嵌入/全 Hall 磁通重合直接视觉核验；核对式 3 与式 9–11.

打开本地 PDF：`papers/L035.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维混合粒子离子/流体电子与 Hall 标量离子模型对照，电子无质量但演化经验各向同性化压力张量；式 3 不含完整 Vlasov 磁旋转项，非未经简化的十矩方程。无显式常电阻，四阶磁超扩散。

计算 / 实验细节　小盒 10×10di, 128^2，初始 a=2di，βi=0.2, Ti/Te=5，混合 20 背景 + 平均 20 片离子/格；边界驱动最高入流 0.1VA 后关闭，Hall 驱动至 30、混合至 40。嵌入测试 60×20di、512×256、a=4di，有限法向 B 约 0.05B0；Hall 内区 x5.5–14.5, y0–50。交错网格/leapfrog，Hall 场 RK4 每流体步 5–10 子步；过渡 erf 权重。

核实的发现　压缩生成厚等离子体片中的电子承载薄电流层。混合模型离子出平面速度从中心向片边及 X 点两侧分散，Hall 标量 Pi 保持中心峰；离子运动使片变宽，需更久驱动才能起重联。测试粒子在 Hall 场中恢复混合形态，支持非对角 Pi 输运解释。嵌入 Hall/MHD 测试给平滑场与重联磁通时间曲线几乎重合，较 2001 会议文已有实际验证。

限制与未完成问题　薄化阶段 Pixz 因片边粒子少而噪声大，没有反馈实现，作用仍是推测；Piyz 反馈验证指向既往论文。嵌入外域尚与内域同格，未展示节约算量/AMR；权重梯度 ∇α×E' 人为生磁场，作者用平滑处理，不是严格守恒耦合。电子闭合时间和超扩散系数等复现信息不全；无完整局部非理想预算，模型能研究离子尺度但不能声称解决全部真实电子物理。

本报告判断　把其作为‘外部压缩—电子薄层—模型间离子输运差别’和早期多模型嵌入证据，区分已计算结果与拟议改进。

4.13　Shay2003：2003 年

Inherently three dimensional magnetic reconnection: A mechanism for bursty bulk flows?[74]

M. A. Shay; J. F. Drake; M. Swisdak; W. Dorland; B. N. Rogers.

核读范围：期刊 4 页全部；**图表**：图 1-3 与正文全部，图像视觉核查.

打开本地 PDF：`papers/Shay2003.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维等温 F3D Hall+ 电子惯性，全部方程加四阶耗散。

计算 / 实验细节　原文 x 流出、z 流入、y 电流；51.2×128×51.2di，网格.1×2×.1di，质量比 25；半厚.5/1/2，n1-1.5。随机磁场与离子电流扰动最大.2；孤立 X 线试验用 $\mathrm{sech}^2(y/10)$ 种子，|Jy|>2.5 端点；y 网格做两值检查。

核实的发现　较厚 2di 电流片产生约 10di 有限长 X 线且可整体向电子方向移动，较薄片多个 X 线逐渐连接为全局重联。一端速度随初始片厚倒数，另一端可静止、反向扩展或同向平移；后者伴三维慢模样压力/磁压反相结构。

限制与未完成问题　小噪声时厚片在有限时间不启动，不是严格线性稳定证明。耗散系数与完整时间算法此文未列；电流方向粗网格抑制微不稳定性。磁尾 1-4Re 和 BBF 只量级类比，缺平衡法向场及动理学；2021 改变盒子长宽比已显示固定长度不是仅由片厚决定。

本报告判断　早期发现介观三维局域 X 线及合并，不应把有限盒中的孤立结构升格为普适亚暴触发模型。

4.14　L049：2004 年

Developments in the theory of collisionless reconnection in magnetic configurations with a strong guide field[34]

Francesco Pegoraro; D. Borgogno; F. Califano; Del Sarto, D.; E. Yu. Echkina; D. Grasso; T. V. Liseykina; Francesco Porcelli.

核读范围：1-11 全部；**图表**：图 1-5，PDF 第 5-7、9 页视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L049.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　作者团队强导引场约化双流体及漂移动理学结果综述；二维 Hamilton 两场；暖电子模型需保留抵消抗磁漂移惯性的压力张量修正。

计算 / 实验细节　psi0=-L/[2cosh^2(x/L)]，Lx=2Ly=4pi L，Nx=2048, Ny=1024，de=.3L, rho_s/de=0-1.5；只一个线性不稳定模，随机扰动。

核实的发现　暖电子 G± 不断卷绕细丝，粗粒化磁岛可饱和而总能量守恒；冷电子极限出现二次 KH、单极和偶极涡，岛形脉动与流体 / 电子动能交换；rho_s/de 接近 1 时饱和前未见 KH。漂移动理学按不同正则动量薄片发生不同方向卷绕。

限制与未完成问题　第 573 页明确暖电子细丝无限变薄导致流体近似不一致；综述未给完整算法细节；未证明三维、任意尺度或热化过程。

本报告判断　可以学习磁拓扑与广义拓扑不相同以及宏观饱和不等于微观静止；不能把细丝当成已被解析的真实耗散。

4.15　L057：2004 年

Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamic Taylor problem[21]

Richard Fitzpatrick.

核读范围：期刊 937–946 全文；物理页 1 封面、2–11 正文/参考文献全部；**图表**：图 1–13；图 10–13 与耗散分解视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L057.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压零导引场 Hall MHD，无电子惯性，含均匀电阻/离子黏性及数值用超电阻；Taylor 导体墙位移驱动。

计算 / 实验细节　x±1 导体墙、y 周期 L=8，psi0=-x^2/2；墙扰动 Xi=Xi0[1-(1+t/tau)exp(-t/tau)]，tau1。256×128、x 集中网格、dt1e-3，二阶空间/时间，Harned–Mikic 型半隐式。线性 Xi0=1e-4；非线性常 Xi0=.01、nu=2.5e-9，电阻约 1e-6–1e-3，按图另扫。

核实的发现　J 诊断定义为 R/eta，不能直接当物理重联率。线性 R~di*eta^(1/3)*Xi0，Hall 转折 di~eta^(1/3)；非线性峰值约 R~di^(3/2)*Xi0^2，电阻/超电阻依赖较弱。图 10 中低 eta 时超电阻贡献主导，不能称纯电阻快重联。Hall 电流局域化、离子与细层解耦。

限制与未完成问题　指数来自有限扫描拟合，di 接近系统大小时失效；没有独立网格/步长收敛数据。无电子惯性使极低耗散极限不可无限外推，短波正则化必要；峰值非稳态/全程平均。与自发薄片的上游场选择不同。

本报告判断　适合学习驱动协议、线性与非线性、R 和 R/eta 的区分；不能把所有快 Hall 重联概括成同一 di 指数。

4.16　L058：2004 年

Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamical Taylor problem with arbitrary guide field[22]

Richard Fitzpatrick.

核读范围：期刊 3961–3968 全文；物理页 1 封面、2–9 正文/参考文献全部；**图表**：图 1–7，式 13–24；物理页 4、6、8 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L058.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　消去快压缩波的冷离子四场模型，保留小压缩率与大导引场乘积；无电子惯性。c_beta=sqrt(beta_F/(1+beta_F)), d_beta=c_beta di，beta_F=Gamma P0/Bg^2。

计算 / 实验细节　Taylor 同 L057 几何；256×128、dt1e-3、二阶半隐式，超电阻 2.5e-9，mu=kappa1e-7。beta_F 从 1e-2 到 1e2；比较固定 d_beta，不是固定 di。典型 eta1e-6, Xi0=.01, d_beta=.5。

核实的发现　固定 d_beta 时跨四个数量级 beta 峰值和初始爆发相似；初始约 8 个 Alfven 时间后骤增，峰值约电阻 MHD30 倍，但首波仅长到最终岛宽约 25%，之后慢而不稳并趋 Rutherford 增长。拟合 Rmax~d_beta^(3/2)*$Xi0^2$；强导引场下 d_beta 趋声回旋尺度。

限制与未完成问题　“任意导引场”仍受快压缩波分离、冷离子、忽略密度变化等排序约束，非完整任意 beta 双流体。beta_F 与本报告 beta 常规定义差 Gamma/2。对 Shay 模型的反驳依赖难以定义的上游边界及原文线性场强说法，不足独立推翻 R~Bup^2/sqrt(n)。W/d_beta 约 10 案例指数拟合本身不精确。

本报告判断　突出初始爆发与长期磁通处理不等价；四场约化需从压力平衡和小压缩率逐步推导，不能直接设所有 div(v)=0。

4.17　Shay2004：2004 年

The scaling of embedded collisionless reconnection[10]

M. A. Shay; J. F. Drake; M. Swisdak; B. N. Rogers.

核读范围：期刊 2199-2213 共 15 页全部；**图表**：表 1、图 1-11；图 3-5、8、10 及方程视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Shay2004.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维 F3D 准中性等温 Hall 加常系数电子惯性 Bprime=(1-de^2lap)B；非完整可压双流体惯性。

计算 / 实验细节　全周期正弦双片，n1-1.5, T=1, mi/me25；Lx51.2-409.6di, Ly12.8-102.4di，通常 dx=.1di、de=.2di。四阶耗散所有方程 mu4=5.1e-5；run7 dx=.05、mu4=5e-7。四个大算例初始岛半宽.55di；加 B 及离子流噪声 1e-4。

核实的发现　局地 Bd 用离子 Jz 峰的 25% 位置定义，上游/下游边界并非任意取 di；下游取离子电子流速交点。大系统后期 Vin 约.1 局地 Alfven 速度，进入该阶段时岛半宽约 6.1-9.9di。最大算例最后 3% 时段完成约 90% 磁通重联、75% 岛宽增长。小 Delta-prime 时即使呈 X 形，压力背压抵消张力仍慢；大 Delta-prime 时电子层变薄、Hall 增强伴离子层从长片缩短。

限制与未完成问题　无导引场、单质量比；质量比无关只是援引先前研究和预期。启动持续时间强依赖尺寸与初值，非普适 0.1。de 仅两格，run7 同时改网格和耗散不能当作单独网格扫描。局地 Bd 定义含 25% 阈值；迟期边界干扰后停止比较。印刷式 2 以 Ji 为粒子通量却压力项写 T/n grad n，且温度文字 Ti+Ti，不能照抄作一致守恒方程。

本报告判断　关键贡献是分开启动与快速阶段、实际测定局地上游场；宏观归一化与局地归一化不同，不能据后期结果抹去启动难题。

4.18　Cassak2005：2005 年

Catastrophe Model for Fast Magnetic Reconnection Onset[44]

P. A. Cassak; Michael A. Shay; J. F. Drake.

核读范围：1-10（全部，arXiv v2）；**图表**：图 1-4；图 3 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2005.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D 二维双周期双 Harris 片、等温、均匀电阻；含电子惯性；四阶耗散加在全部方程。

计算 / 实验细节　409.6di×204.8di，dx=dy=0.1di，mi/me=25，初始 w0=2di，eta4=2e-5；快慢两支启动程序不同，最终方程相同。

核实的发现　相同 eta'=0.015 有约 0.06 与 0.01 两个速率；图 3 慢快临界 0.011-0.013，快慢临界 0.020-0.0225；图 4 先降电阻再恢复仍保持快支，检验历史依赖。

限制与未完成问题　de 仅两格，论文未展示独立网格收敛；强导引场 rho_s 替代在该文只是外推；DIII-D 温度估算低约一数量级；MRX 缺片宽不能定量比较；二维未处理湍流。

本报告判断　双稳态证据来自同参不同历史与迟滞试验，而非仅凭两条速率曲线；实验比较不能写成普遍定量验证。

4.19　E459：2005 年

Current layer cascade in collisionless electron-magnetohydrodynamic reconnection and electron compressibility effects[58]

Del Sarto, D.; F. Califano; Francesco Pegoraro.

核读范围：HAL 封面及 PoP12, 012317(2005) 全部 8 页正文，共 9 页；发表在线 2004、卷期 2005；**图表**：图 1–9 及式 1–10；物理页 6–8 直接核验广义磁通/电流涡旋与能量曲线.

打开本地 PDF：papers/E459.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷电子惯性 EMHD，静止离子、强均匀导向场，无碰撞无动理学；F=ψ-de$^2\nabla^2$ψ 随电子流冻结，W=b-de$^2\nabla^2$b 有磁力源。电荷分离压缩修正仅把 W 中的 de 换成 λe=de$\sqrt{(1+\Omega ce^2/\omega pe^2)}$。

计算 / 实验细节　Lx=4πL，Ly=2πL，1024×512，de=.06–1L；de=.12/.3 另用 2048×512。ψ0=-L/(2cosh^2(x/L))，k=1 的 Δ' 约 14.3。独立射流试验 1024^2、δ 约 de、u 约.085L/τw；主比较 de=.3, λe=.3/.67。

核实的发现　平滑磁岛内不重联的 F 细丝形成电流条带，条带相撞折转，随后弯曲射流/KH 型次级不稳定性卷出蘑菇状涡旋，破坏规则电流层级联。提高 de 或电荷分离压缩延缓涡旋形成；压缩独立射流约 20 个 whistler 时间无明显改变。晚期磁场两个分量和电子动能振荡交换，伴磁岛脉动。

限制与未完成问题　离子质量形式上取无穷，长时间结果不能自动用于真实电子离子系统。饱和前能量/Casimir 误差 <1%，晚期不可解析细尺度使总能误差达 5%/10%；故晚期阻尼不能定量归因物理耗散。能量重分配不是热化；模型无离子异常动量交换。未完整列出时间推进与边界实现，引用旧代码。

本报告判断　将 L313 的正则磁通冻结变成实际非线性形态证据；是电子压缩抑制次级流体不稳定性的重要原始模拟。

4.20　L076：2005 年

The scaling of forced collisionless reconnection[23]

Brian Sullivan; B. N. Rogers; Michael A. Shay.

核读范围：2005 期刊版 122312 物理页 1–12 全部；不是 2008 同题论文；**图表**：表 I、图 1–14；模型页 2、图 11、14 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L076_2005.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维等温两流体、简化 B*=(1-me/mi Laplacian)B 惯性；正弦宽电流片，稳定/边界稳定的撕裂初态；离子动量内加局域体力。

计算 / 实验细节　双周期 102.4di 方盒，512×1024、dx=.2、dy=.1，质量比 25；另质量比 100 用 1024×2048。四阶差分、二阶 trapezoidal leapfrog；密度/动量四阶耗散 5.1e-5。驱动 Gaussian 宽 wx=10、wy=2.22、tau_f=10，F∞=.005/.03/.05/.11，另连续爬升、宽度 7.07/14.14、Bg=5、低温对照。

核实的发现　强驱动先堆积磁通/压力，再在片厚约.7–.8 局地 di 时转入快重联；弱驱动形成新准平衡，无快阶段。临界 F∞ 在.005 与.0075 之间，仅适用于该设定。绝对率随局地 Bd^2/sqrt(n) 增加；较宽驱动的绝对率更大，但除以 Bd^2 后反而较小。强迫案例的归一出流/率比自发薄片对照约低 50%。岛宽停止长大时内部场仍能增强，磁通仍改变。

限制与未完成问题　准稳态 X 点靠数值扩散破冻结；de 法向仅约 2 格，无完整分辨率扫描。惯性算子是模型近似，非变密度精确双流体。表 I、正文交叉图号、图 9/10 的 F∞ 标注存在不一致，复现须核对输入；不把驱动阈值推广为通用常数。

本报告判断　外部供给控制上游场、局地层处理磁通的两层关系得到明确展示；必须同时报告绝对率和局地归一率。

4.21　Ren2005：2005 年

Experimental Verification of the Hall Effect during Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma[121]

Yang Ren; Masaaki Yamada; Stefan P Gerhardt; Hantao Ji; Russell M. Kulsrud; Aleksey Kuritsyn.

核读范围：055003-1 至 4（全部 4 页）；**图表**：图 1-4 及式 1；主要结果图视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Ren2005.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 无初始净导引场的 H/D 实验；二维磁探针与高分辨率 1D 扫描。

计算 / 实验细节　71 通道径向间距 1.25mm，系统误差小于 10G；90 通道 2D 图轴向 4cm、径向扫描 1cm 且多次放电平均；重联约 40 微秒对 Alfven 约 1 微秒。

核实的发现　四极 Hall 磁场高分辨率 50-60G，对重联场约 100G；粗 2D 图 20-40G。Hall 结构径向约 di、轴向约 5di；碰撞率指标 delta/lambda_mfp 由.2 到 20，BHall/Brec 约.6 降.25。

限制与未完成问题　电子 20km/s 由电流及电子承担假设推断，并非直接流速测量；Hall 电场 140V/m 对 Erec 约 100V/m 是上游量级估计，部分区域 BR 不准，未全项闭合，也不证明 Hall 在 X 点断线。误差棒为放电差异。

本报告判断　强证据是四极场的空间极性及碰撞率关联；与湍动同时存在，不能排除其他耗散机制。

4.22　Cassak2006：2006 年

A Model for Spontaneous Onset of Fast Magnetic Reconnection[46]

P. A. Cassak; J. F. Drake; M. A. Shay.

核读范围：arXiv physics/0604001v1 全部 11 页；**图表**：图 1-2 全部视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2006.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无导引场 F3D 等温惯性 Hall 双流体；宽正弦片内嵌 SP 层，均匀电阻。

计算 / 实验细节　409.6×204.8di0，网格.1di0，质量比 25，D4=2e-5；Bx=cos(2pi y/Ly)、n=1+.5sin^2、T1。扰动.004；电阻.009 和.0025 两组均转快；展示的.0025 组从.009 组 t5364 继承，过渡扰动至约 11000 消失。

核实的发现　固定电阻后，重联输运较强上游磁场使内嵌 SP 层逐渐变薄；约 t18000 离子电子解耦，至约 19500 转入开放排气。慢阶段 vin 约 eta/delta，快阶段以.17VAup 拟合；电子层降至.2di0。建立长期缓慢积累与短时加速的自发启动候选机制，无须在启动时外加降低电阻。

限制与未完成问题　所示运行并非从最初到最后电阻从未改过，后期自发转换与早期重启应分开说明。原文 400 离子时间的扩散时间估计与图中约 1500 的整体转换窗仅量级接近，不宜称严格上界得到数值验证。太阳 11 小时积累、28 秒转换是选定参数估算；VTF 支持仅私人通信。未含导引场、演化电阻、热反馈、3D 和后来的高 S 磁岛竞争，未唯一解释耀斑触发。

本报告判断　关键新证据是强场被慢流入自动带入后引发 Hall 转变；宏观耀斑时间相似只能算相容，不能作机制判定。

4.23　L089：2006 年

Physical origin of the quadrupole out-of-plane magnetic field in Hall-magnetohydrodynamic reconnection[114]

Dmitri Uzdensky; Russell M. Kulsrud.

核读范围：arXiv astro-ph/0605309v1 全部 44 页，正文 1–32、附录 A/B33–40、参考文献和图 42–44 均读完；**图表**：式 1–69、A1–A14、B1–B18，图 1–3；图 1/3 与电子惯性阈值页 27 直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L089.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　定常不可压 2.5 维理想 EMHD，无导向场；内域离子静止均匀背景，电子质量与电阻主推导忽略，标量 Pe。外缘须恢复离子电流，内电子非理想层不在解域。

计算 / 实验细节　解析无网格/扫描。给定面内磁通 Ψ=-cEzt+B0δ(y^2/δ^2-x^2/L^2)/2 及外给 Ez，δ≪L。定义 V=∫dlpol/Bpol，D=4πne/c，Q=(L/di)(vrec/VA)；没有求出 L、δ、Ez 的全局闭合。

核实的发现　电中性与不可压迫使电子沿扩张/收缩磁通管进出，给 Φe=-cEzV、Bz=-DΦe=cDEzV；四极 Bz 近分离面呈对数增强。在严格定常理想 EMHD 内域，Bz 沿电子流线不变、vez 沿面内磁力线不变，故差动拉伸的生成源必须在离子电流尚重要的过渡区，不能放在纯 EMHD 内域。附录给 $\nabla^2\Psi=F(\Psi)$ 一致性条件。双极面内 E 将离子拉入形成对向束，HallB 偏转为排流。

限制与未完成问题　此为给定磁几何的局部结构解，不自洽预测快率；分离面对数奇性、所有理想轨道汇 X 点是理想化失效。估计惯性破坏区 y*≈δ[(me/mi)ln(mi/me)]^1/4，不能等同通常 de 厚度的普适测量；未求完整正则化解。假设剖面的平坦 jz 与边界推出的尖锐 vez 有不一致，仅用磁压回馈定性修正。Pe 与电势在修正电场中简并，真实离子加热需碰撞/波散射；对向束的二阶矩增加不自动是热化。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章可用来推导 Hall 四极场及说明内外区域匹配。四极场作为两流体标志的强说法仅在本文对称无导向场假设内成立；与 L137 给定流动例和强导向场 F644 比较，不能将形态当充分因果诊断。

4.24　Cassak2007：2007 年

Scaling of asymmetric magnetic reconnection: General theory and collisional simulations[131]

P. A. Cassak; M. A. Shay.

核读范围：期刊 102114 全部 11 页；**图表**：式 1-37、表 I-II 及图 1-7；核心图表 3-7 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Cassak2007.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维反平行非对称守恒标度；数值验证是电阻 MHD，不是 Hall，作为后续 Hall 理论的基础。

计算 / 实验细节　F3D 显式梯形 leapfrog 和有限差分；409.6×204.8L0 双周期，dx.1；w0=2、eta.05、gamma5/3、D4=1e-4。六组 B01/B02 为 1/1、1/2、1/3、1/4、1/5、2/4；密度均 1、最低 beta1；温度不对称，未加 Joule 热。

核实的发现　磁 X 点、流停滞点和电流峰不重合，较低 Alfven 速度侧的等离子体穿越 X 点。磁岛向弱场鼓起，但 X 线相对于盒子向强场漂移；片内 X 点仍偏弱场侧，两种说法参照不同。强场外侧出现纯扩散区，与喷流宽度不同；分片 tanh 比简单平移 tanh 更能描述剖面。流出速度、通量率与两侧 B 和 rho 的混合标度符合受测参数范围。

限制与未完成问题　流出密度公式假设磁管混合时体积近不变；能量标度忽略压力贡献，不是严格完整热力学解。表 I 使用实测局地 B 和层长，强侧厚度还依赖电流峰对称化重建。仅直接扫描磁场不对称且密度相同；密度差与 Hall 验证留给他文。均匀大电阻且无欧姆热；强场纯扩散区未必存在于真实无碰撞实验。

本报告判断　应把无指定耗散的守恒约束与确定层长宽所需的闭合分开；不能用此文单独定出 Hall 绝对率。

4.25　Arnold2008：2008 年

A semi-implicit Hall-MHD solver using whistler wave preconditioning[132]

Lukas Arnold; Jürgen Dreher; Rainer Grauer.

核读范围：1-11（arXiv v1 全部）；**图表**：图 1-4、表 1、式 13-21；主要结果图表视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Arnold2008.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　质量为零电子 Hall MHD；仅 Hall 感应项 Crank–Nicolson 半隐式，其余 RK2 显式；局地 3×3 近似 Jacobian、Richardson 平滑与非线性多重网格。

计算 / 实验细节　64^2 单 whistler 模式测试；GEM 类对称子域 Lx=5di, Ly=2.5di, Nx=256, Ny=128；显式 dt=.0002；隐式.002, .004, .0082。

核实的发现　高波数误差较快衰减，低波数由多重网格修正；2-3 个 V 周期收敛。步长最大 41 倍，通量曲线接近显式且减 dt 改善，计算时间约减 80%。

限制与未完成问题　是特定算例的耗时与时间步检验，不等于任何 AMR 重联均加速；Alfven 波仍限制显式其余部分。预印本没有详列 GEM 电阻及所有运行参数。

本报告判断　局地 whistler 预条件比纯流体 Jacobian 更适合 Hall 刚性；隐式稳定不保证对线性增长率的时间精度。

4.26　Cassak2008：2008 年

Scaling of asymmetric Hall magnetic reconnection[20]

P. A. Cassak; Michael A. Shay.

核读范围：期刊 PDF1-5 全部；**图表**：表 1、图 1-3，PDF 第 2-3 页视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2008.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D2D 反平行非对称双周期 Harris；绝热离子 gamma5/3、冷电子；电子惯性近似采用常密度且忽略离子速度。

计算 / 实验细节　204.8di×102.4di, dx=.05di, mi/me25, w0=2di, beta_min4；无二阶电阻黏性，所有方程四阶扩散约 6.25e-6 di^3 vAmax；磁噪 5e-5, 速度噪.08。场比至 3、密度比至 4。

核实的发现　九组算例率与混合 Alfven 标度基本一致；对称基准率.0587，离子喷流.685vA、电子 2.067vA；离子 / 电子停滞点及 X 点可三者分离；磁岛向弱场鼓起，片向强场移动。两种率测法差 1-10%。

限制与未完成问题　电子惯性未一致保留密度不对称；高 beta、无导引、二维；另一离子流速定义绝对值差 60% 但标度相同。作者限可可靠研究的不对称度 <4；更大时电子片失真；表 1ABN1 行 p、T、rho 不相容，复现需查原始输入。

本报告判断　支持有限范围的反平行标度，不证明磁层顶强不对称与导引场情形普适 0.1。

4.27　F717：2008 年

The scaling of forced collisionless reconnection[24]

Brian P. Sullivan; Barrett N. Rogers.

核读范围：arXiv0906.0334v1 物理页 1–10 全部；对应 2008 年期刊，页眉 2021 为排版日期；**图表**：图 1–6；物理页 7 的式 17/18 与图 3/4 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/F717.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　等温含简化电子惯性两流体；三维局域离子体力驱动，与同尺寸二维比较；无初始导引场。

计算 / 实验细节　25.6di 周期立方体、128×256×128、dx=dz=.2、dy=.1、质量比 25；四阶空间差分、二阶 trapezoidal leapfrog，四阶密度/动量耗散 5.1e-5。wx=wz=5；典型 2D F∞=.15、3D .2；三维率为场线识别磁岛面积内磁通导数，另比较中心切片及除以 10di 的代理。

核实的发现　三维磁通和等离子体可沿 ±z 绕开重联区，强迫压缩较弱、重联持续更短；该例初始强迫区磁通被重联的比例二维超过 70%、三维约 10%。磁通分布沿电子载流方向偏移。盘状出流几何给 Vin/Vout≈2delta/D，二维矩形则 delta/D；局地 Bd 归一后率仍相近。

限制与未完成问题　3D 总磁通率除以 2wz 只是人为的每单位长度比较，非一般 3D 重联率定理。盒子小、等温、X 点数值扩散，无压力张量与粒子谱；未给三维网格收敛。预印本式 17a/18a 把 delta/D 乘到 Vout，和邻文及图 6 的 Vout/VA≈1 矛盾；式 10 的 tan 与稳定性论述亦不一致，tau_f 前后写法不同，不能原样作复现输入。

本报告判断　新现象在三维磁通绕流和电子输运导致偏斜；相近的局地率不能推出相近的全局转换效率。

4.28　Hakim2008：2008 年

Extended MHD Modelling with the Ten-Moment Equations[133]

Ammar H. Hakim.

核读范围：期刊 36-43 页（全部 8 页）；**图表**：图 1-4、式 19-26、42-47；图 3-4 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Hakim2008.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　一般推导为两物种十矩全 Maxwell，但实际 GEM 例是十矩离子、充分松弛的五矩电子；热流散度设零，离子碰撞设零。

计算 / 实验细节　GEM 近似设置：Lx=8pi, Ly=4pi, 网格 256×128, a=.5di, mi/me=25, nb=.2, Ti/Te=5, psi0=.1；x 周期，y 开边界；初始电流仅电子承担。

核实的发现　通量在 t 约 10 后快速增长，作者与 GEM/五矩基准比较；电子层边缘强流后期激发 counter-streaming 流体不稳定性。论文还展示真实质量比 1/1832.6 的 1D 色散 Riemann 算例。

限制与未完成问题　不能把 1D 真实质量比当作 2D 重联质量比；正文明确数值算法未详述而引用 2006 论文，GEM 没有独立网格收敛或压力张量对 PIC 细节验证。零热流不是普适物理闭合。

本报告判断　属于早期模型可行性验证；摘要“ten-moment”不能理解为该重联例两物种均演化完整压力张量。

4.29　L119：2008 年

Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma[115]

Yang Ren; Masaaki Yamada; Hantao Ji; S. Dorfman; Stefan P Gerhardt; Russel Kulsrud.

核读范围：PPPL4329 全部 46 物理页，包括封面、完整正文、图 1–18 与参考文献；正文印刷页 1–39；**图表**：图 1–18；直接核验物理页 28 图 13 欧姆预算、33 图 16 尺度、34 图 17 速度、37 图 18 摩擦模型比较（34 页渲染备查，速度另由原文及图 17 数据描述核对）.

打开本地 PDF：`papers/L119.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 无外加导场实验，五列磁探针由 BT 导出面内电流，再用 ve≈-j/en 和 Mach 离子探针验证双尺度；另与具有 MRX 通量芯边界的 NPIC 二维全动理学模拟比较。稳态一维电子排出摩擦模型只用于机制估计。

计算 / 实验细节　径向磁测最高 2.5mm、轴向 3cm；H/D/He 扫描密度与碰撞性，约半数放电出现可辨四极场，分析选择这些放电。模拟 75×150cm、两通量芯面距 40cm、质量比 75、初始 n2.6e19m^{-3}、线圈下降 200 初始离子回旋时、通量芯吸收粒子；用整体率与离子片厚选参数。

核实的发现　Hall 四极幅度约上游场 30–60%，电子超离子 Alfvén 排出与更宽更慢离子通道并存。δBT 定义为峰值到 40% 速度点的半宽，在轴向速度峰处测得 δBT≈8de；vout≈.11VAe（VAe 用电子层边缘 B），均无显著离子质量依赖。长度约 40–80de 且随密度降低而缩短，不支持统一 L∝de；与二维 1–2de/更快电子流存在真实差别。乘积 (vout/VAe)(δ/de) 约.88 接近 1。

限制与未完成问题　图 13E 约 170V/m、估另一 Hall 分量约 50V/m、经典电阻约 40V/m、所估惯性约 1V/m，Pe 张量及涨落预算未测全，不能宣布耗散机制解决。摩擦模型 u^2+Au=1，A=νL/VAe；经典预测.3–.6，经验 ν* 预测.1–.3 仍可能高两倍；ν* 由 ET/jT 反推并假设各方向同样阻尼，不是独立异常碰撞测量。匹配全局率的 PIC 非无调参预测；速度从磁场求导、密度与离子流近似得，非直接电子谱测量。选择四极事件限制普适性，长度误差大不能据其图拟合严格反比例。

本报告判断　详细报告实验直接量、反演量、选样、分辨率、边界及未闭合欧姆项；《理论与数值基础》第 1 章给摩擦模型推导，第 2 章说明同尺度指数并不等于电子层绝对厚度/速度已获验证。

4.30　L122：2008 年

Hall resistive tearing mode: A variational formulation[48]

Bhimsen K. Shivamoggi.

核读范围：arXiv0801.3453v1 全部 8 页，无图，读完变分泛函与两支渐近推导；**图表**：无图；页 6–7 直接视觉核验式 33–44，独立对式 38 作弱 Hall 展开.

打开本地 PDF：`papers/L122.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压、准中性、无电子惯性的电阻 Hall 四场线性撕裂，内层 F≈x；Hall 参数 σ=di/a、ε=ηc^{2}τA/a^2。

计算 / 实验细节　解析 Rayleigh–Ritz，高斯电流试探函数 J(k)=exp(-μk^2/2)，假定 μω/ε≫1；没有网格/独立模拟，无显式 Δ' 外层匹配参数和连续波数扫描。

核实的发现　提出三层结构的变分近似，将电阻支与 Hall 支写为 ω^2-√(εω)-σ^2/4=0，形式上给 ω≈ε^1/3 或 σ/2 及转换 σ≈ε^1/3；线性 b 在 x、y 皆奇，对应四极场。

限制与未完成问题　不能把形式上 η→0 有限增长当完整理想 Hall 断线证明：电子非理想项仍来自电阻，外层匹配与奇异极限未解决。式 31 含 $\omega J^2/k^2$，高斯 J(0)=1 使普通积分发散，但式 33 使用有限值而未说明正则化/匹配。式 36–37 给 $\mu^2=\omega\varepsilon$，电阻支上 μω/ε=1 而非 ≫1，不能同时宣称该渐近式严格恢复该支。原文式 43 写 +σ^2ε^1/6/6；直接展开式 38 应为 +σ^2/(6ε^1/3)，属于所读版本代数不一致。称 ε^1/3 为 FKR 亦缺小 Δ' 条件，不宜替代经典常 ψ 的 S^-3/5 标度。

本报告判断　记录为有启发但需审查的早期近似，报告不给它与完整匹配/数值本征解同等证据权重；用作学习如何检查近似适用条件的例子。

4.31　L123：2008 年

Influence of the Hall effect on the reconnection rate at line-tied magnetic X-points[47]

I. J. D. Craig; Yuri E. Litvinenko.

核读范围：A&A484, 847–850（2008），物理页 1–4 全部，含线性方程、拟合、讨论与参考文献；**图表**：图 1–2 与式 (13)–(16) 视觉核验；重新换算拟合的系统长度指数.

打开本地 PDF：papers/L123.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷、可压、线性化电阻 Hall X 点，忽略电子惯性和压力。平衡 ψE=xy，研究小扰动在刚性线缚方盒中的振荡衰减；不是非线性开放边界 Hall 层。

计算 / 实验细节　$[-1,1]^2$、δψ 初始 =.1(1-x^2)(1-y^2)，墙 u=0、δψ=0、∂nZ=0。η1.5e-4 至 2e-2，di/√η=.1–.9，ν=.1η，20 余例；最终拟合排除高 η 数据。未给格点数/步长/离散算法的可复现明细。

核实的发现　Hall 经沿平衡场的电流梯度产生 Z，再驱动轴向 W，增强扰动衰减。拟合 log10(Δα/α0)=-.16+1.89log10di-.31log10η；无 Hall 参考 $\alpha 0\approx\pi^2/(2\ln^2\eta)$。作者忽略弱 η 依赖后提出相对衰减增强随 L^-2 衰减，表明边界和尺度可改变 Hall 收益。

限制与未完成问题　实际 di/√η<1，只覆盖弱至过渡 Hall 的小扰动。α 是模幅衰减率，能量指数为 2α；不能直接与非线性 Ez/(BVA) 比较。若保持物理 n、B 和磁扩散率固定，di∝L^-1 且 η∝L^-1，完整拟合给 L^-1.58，而非严格 L^-2；后者额外丢弃 η 依赖。大尺度和强 Hall 外推缺直接验证。

本报告判断　结论重点是具体线缚线性问题中的尺寸依赖；不应把近似 L^-2 包装成已推翻所有快 Hall 重联的普遍定理。报告保留作者结论并显式说明拟合与简化步骤。

4.32　Malyshkin2008：2008 年

Model of Hall Reconnection[11]

Leonid Malyshkin.

核读范围：arXiv0810.3278v2 1-5 全部，含发表后说明；**图表**：图 1 及式 11-26，PDF3-4 页视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Malyshkin2008.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压、标量压力、均匀电阻、无导引无电子惯性 Hall MHD；准稳态局地泰勒展开。

计算 / 实验细节　没有新数值模拟；外给 Bm 及 L^2=-2Bm/(dyy By)_up；电阻用磁扩散单位；S=LVA/eta。

核实的发现　Ez/(BmVA) 约 sqrt(sqrt(3)/S+2di^2/L^2)。Hall 强时电子层 delta 约 eta L/(VA di)、离子层 Delta 约 di，率约 di/L。注意电子层上游离子 Vin 约 VA L/(Sdi) 很小，而离子层外磁通输入 VR 约 VA di/L；两者不能混称。

限制与未完成问题　L 和 Bm 必须由全局解确定，未由本理论求出；小电阻极限电子电流发散且电子惯性/压力张量被删去。条件 Ez 远小于 BmVA 且无层内不稳定性；不能外推 di/L 约 1。热化密度反馈仅讨论，没有求解能量方程。

本报告判断　给出局地 Hall 层的连接标度，未解决全局率选择；正文中的 collisionless 不能读成 X 点无需非理想项。

4.33　Toth2008：2008 年

Hall magnetohydrodynamics on block-adaptive grids[134]

Gábor Tóth; Yingjuan Ma; Tamas I. Gombosi.

核读范围：1-23（作者稿全部）；**图表**：图 1-9、表 1-2、式 14-35；主要结果图表视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Toth2008.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　保守 Hall MHD，忽略电子压强梯度与惯性；BATSRUS 三维块 AMR、广义坐标、MUSCL；显式 RK2 或 BDF2 及 Newton-Krylov-Schwarz；8-wave 散度控制。

计算 / 实验细节　AMR 面电流需三阶磁场 ghost 插值得二阶 curl，细网格通量覆盖粗面。GEM25.6×12.8，64×128，dx=.4, dz=.1, eta=.005, psi 扰动.1 或.5，z 零梯度开边界；并行测试约 250 万格。

核实的发现　whistler 波速随 1/dx，直接一阶 LLF 不一致；minmod 显式退为一阶，光滑区 MC 保二阶；隐式 W=0 减少通量黏性。GEM 小种子分裂成双 X 点与中间岛，较大种子保持单 X 点但通量率相近。三维磁尾有四极场、准周期 plasmoid。

限制与未完成问题　GEM 有显式电阻且电子层不在模型中；三维物理解读留待后续，不能当成 FTE 机制证实。强扩展显式到 1616 核好，隐式约 256 核后下降；32 核隐式 14 倍、混合 20 倍是具体机器算例。

本报告判断　展示离散与 AMR 的一致性问题，拓扑细节可对初始种子敏感而通量率不敏感；需要分开数值验证与物理验证。

4.34　Drake2009Pickup：2009 年

Ion heating resulting from pickup in magnetic reconnection exhausts[113]

J. F. Drake; M. Swisdak; T. D. Phan; P. A. Cassak; M. A. Shay; S. T. Lepri; R. P. Lin; E. Quataert; T. H. Zurbuchen.

核读范围：PDF 1–14，正文 §1–6、方法、结果、讨论、附录 A、参考文献全部；图 1–7、表 I 和关键公式直接查看 PDF；**图表**：PDF 3–10 图 1–7、表 I；PDF 7 式 (7)–(10)，PDF 12–13 附录 A；图 6 斜率 0.39，图 5 与表 I 需区分标量与径向温度.

打开本地 PDF：`papers/Drake2009Pickup.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　反平行二维 p3d PIC + 2D/1D 场测试离子 + de Hoffmann–Teller 参考系解析 + Wind/ACE 观测；不是 Hall MHD 温度闭合

计算 / 实验细节　双周期 Harris，Lx×Ly=204.8×102.4 dp，半宽 1.5 dp，网格 0.05 dp，质量比 25，c/vA=15，背景密度 0.2，Te=1/12、Ti=5/12 mpvA^2，低密度区 100 粒子/格；无系统质量比/网格收敛序列。测试轨道取下游近稳态场。

核实的发现　入流跨窄 Hall 场边界后失磁化、拾取状增能与反向束；冷入流解析 ΔTi≈mi v0^2/3，预测的各向异性并不准确。Wind 22 次高剪切穿越支持平方标度但系数仅预测的 0.39；ACE 重离子径向温度有质量标度线索。

限制与未完成问题　原文保留各向异性散射、远下游慢激波结构与膨胀解释；不提供电子分配，不能解释全部高能尾或强导场阈值。SWICS 12 min 采样、只测 Trr 且场方向改变；未读取原始数据/运行代码/前序仪器方法。

本报告判断　补足拾取参照及定量不符；与 Yoon2023 对电场净功和主导机制的归因有实质差异，尚未在同一场/轨道/时间窗复算，不能宣布统一或谁已被排除。末速度恢复不能单独代替电功积分。

4.35　L137：2009 年

ANALYTICAL DESCRIPTION OF STEADY MAGNETIC RECONNECTION IN HALL MAGNETOHYDRODYNAMICS[16]

Yuri E. Litvinenko.

核读范围：ApJ694, 1464–1470（2009）全部 7 页，含局域轴向场附录 A；**图表**：图 1 几何、式 (24)–(48)、附录 A1–A4；页 5 的 O 点展开和层长表达直接视觉检查.

打开本地 PDF：papers/L137.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　稳态二维不可压无黏电阻 Hall、标量压力；以横向导数远大于纵向导数作弱二维展开，预设 Harris 形 J0 和轴向 Z1=b0tanh(x/l)。不是全局初边值解。

计算 / 实验细节　无新模拟；ψ、φ、W、Z 按 y 幂展开，给定 E 及轴向梯度 b0。半厚 l=η/(E+di b0)，流入 φ1=-E tanh；太阳参数仅作 Hall 模型失效量级估算。

核实的发现　Hall 把平面流与四极轴向场耦合，使层厚、有限纵向尺度和流出相互联系。正常 Hall 极性 b0>0 时，低阶中心磁通竟为 O 点而非 X 点；作者和审稿人明确讨论其可能是数学伪象。四极轴向场在此预设流场下即使 di=0 也可存在，四极形状本身不唯一认证 Hall。附录改用局域 Z1=b0tanh×sech^2 后，厚度改为 η/E、流入不反向需 E>di b0，且远处轴向速度不再发散。

限制与未完成问题　弱二维假设恰在中心可能失效，O 点不能当作被验证的新物理岛；主文 Z1 远处不消失导致 W 无界。附录未完成二阶 ψ2 和新层长。E 仍外给，0.1 需额外采用 w≈10di 和 Ba≈1；未从模型选出普适率。太阳参数下薄层可能小于 de，使无电子惯性模型失效。

本报告判断　模型假设影响结论的清楚案例：只读摘要会漏掉中心拓扑和附录改变标度。宜用来教学生检查 ansatz、适用域和局地解的全球匹配，不把形式解析解等同真实重联结构。

4.36　L145：2009 年

On the physical interpretation of Malyshkin' s (2008) model of resistive Hall magnetohydrodynamic reconnection[15]

Dmitri Uzdensky.

核读范围：arXiv0901.0520v1 物理页 1–2 全文；页眉自动日期 2018 不是出版年，期刊 2009；**图表**：无图；式 (1)–(6) 全部重算，页 1 视觉核对.

打开本地 PDF：papers/L145.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　稳态、二维、不可压、电阻 Hall，电子质量忽略；外给电子层半长 L、上游 Bm、n 和磁扩散率 η。标量压力沿出流可能与磁力同阶但不改变量级论证。

计算 / 实验细节　解析论文，无新数值运行。用高斯单位，η=η'c^2/(4π) 为磁扩散率，η' 才是电阻率；坐标 x 入流、y 出流、z 电流。

核实的发现　电子出流由磁力与电阻拖曳平衡，非电子惯性控制。出流和面外方向都有同样电阻因子，消去得 veyδ=diVA、δ=ηL/(diVA)、vin=diVA/L、cEz=BmVA di/L。因而速率不显含 η 不表示电阻没有作用，也不表示出流不由碰撞拖曳决定。Ez 中的 diVA 不依赖离子质量。

限制与未完成问题　L 与 Bm 仍是未决定的外部输入；若 L 随宏观尺度增长，即使 η 消去，率仍可能太慢。Bm 不能直接替换成离子层外 B0，必须匹配两层电流。固定 L, Bm 令 η 趋零使 δ 缩小、vey 增大，终将失去忽略电子惯性的适用性。没有新模拟或独立尺寸扫描。

本报告判断　为已读 Malyshkin2008、Simakov2009 提供透明的力平衡解释与明确的未闭合问题。适合放入《理论与数值基础》第 1 章逐步推导，并阻止把局地代数解称全局快率理论。

4.37　L154：2009 年

The hall effect in magnetic reconnection: Hybrid versus Hall-less hybrid simulations[8]

K. Malakit; P. A. Cassak; Michael A. Shay; J. F. Drake.

核读范围：GRL36, L07107（2009）物理页 1–5 全文，方法、关 Hall 实验、分辨率和局域电阻对照均读；**图表**：图 1–2 全部；物理页 2 方程和页 3 时序/归一化图直接检查.

打开本地 PDF：`papers/L154.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　P3D 二维混合，动理学离子、me=0、Te=0；Hall-less 仅在推进 B 的 EOHM 删 Hall 项，粒子推进 EION 仍保留 J×B 以维持平均离子力。两种电场本来就不同；不能当作自洽双物种 Maxwell 模型。

计算 / 实验细节　204.8×102.4di、1024×512，dx=.2，100 粒子/格、Ti=.5、上游 n1，双 Harris 片宽 1、Bg0、全周期、种子.3。均匀 η=.015、η4=1e-3；关 Hall 时 t300。另 η=.007 在 dx=.2 与.1 作分辨对照；未给绝对时间步。

核实的发现　标准混合率约.03，无 Hall 约.015 并符合实测上游 SP 预测；在 t300 关闭 Hall 后不到 10 离子回旋时间降至慢率，层延长。随后绝对率回升由上游堆积引起，除以上游 B^(3/2) 后与 SP 支相符。η=.007 时半宽.52 只有 2.5 格，出现网格岛与假快率；5 格则恢复稳定慢率。额外采用局域 cosh 电阻，Hall-less 也能快，解释与早期文献的差异。

限制与未完成问题　标准例电阻不小，η=0 仍有 η4，去掉 η4 则层塌到网格；不是无耗散证明。无 Hall 出岛对率影响小仅适用于本系统，未排除极大盒磁岛链。没有电子动理学和三维。图 2d 把 Hall-less 时间 1700 压到 300，不能据曲线同横坐标比较启动时间。

本报告判断　强的模型消融和数值反例：必须同时控制均匀/局域耗散、网格和上游场；结论限定于冷无质量电子混合体系，不能外推成任何压力闭合下 Hall 普遍必要。

4.38　Malyshkin2009：2009 年

Model of Two-Fluid Reconnection[13]

Leonid Malyshkin.

核读范围：arXiv0904.0660v3 1-4 全部；**图表**：图 1、式 3-23 与讨论；PDF2-3 页视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Malyshkin2009.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维准中性常密度双流体，标量压力、有限电子惯性、均匀有效电阻、准稳态、无导引。

计算 / 实验细节　无新模拟；扩展动量保留-de^2(j · grad)j；全局 Bext、Lext 给定，局地电子半长 L 与离子尺度区分。

核实的发现　惯性强支给 delta 约 de、离子厚 di、电子喷流约电子 Alfven 速度；Ez 约 eta Bext/de，L 约 VA de di/eta。离子在电子层内可很慢，在电子喷流减速区才继续加速；存在可同时容纳 SP 与较快支的参数窗。

限制与未完成问题　率显式正比电阻；collisionless 命名指把 eta 解释为待动理学计算的有效电阻。Hall 过渡支的长度未唯一求出，转变路径是假说；稳态模型不能描述迟滞过程。预测长度 me^(1/2) 与所引 PIC 的 me^(3/8) 不同；实验层宽约 8 倍差异仍未解释。

本报告判断　这是有残余有效耗散的稳态惯性理论，不与 Andres 的非稳态无电阻拓扑变化等价。

4.39　Simakov2009：2009 年

Quantitative analytical model for magnetic reconnection in Hall magnetohydrodynamics[12]

Andrei N. Simakov; Luis Chacòn.

核读范围：LANL2008-09-29 预稿 PDF1-34 全部，期刊 2009 年 PoP 扩展篇；**图表**：式 1-25 逐页图像核对、两页 35 算例表及图 1-4 全部视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Simakov2009.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压高 beta Hall MHD；无电子惯性、无导引；均匀电阻加超电阻；离散区域解析近似加非线性岛合并。

计算 / 实验细节　Fadeev 平衡 epsilon=.2，35 算例 di=0 至 1、eta=0 至 1e-3；表中 etaH 最高 7.6e-6（正文写 7.6e-7 不一致）。解析电流形状系数 mu=16；在峰值时测电子片厚/长、上游 Bin，比较半高宽与速度峰两定义。本文未列实际网格、时间步和边界截断，数值算法指向 Chacon-Knoll2003。

核实的发现　统一匹配 SP 与电子 Hall 极限，强 Hall 局地率约 sqrt(2)di/w；电子层细长也可耗散系数不显含的快率，超电阻造成开放 X 形却仍可处于慢支；有限四极 Bz 本身不判快。35 算例归一化率跨度约 1200 倍，理论比值范围.5-2.3；固定这组岛合并的强 Hall 区率大致随 di 上升。

限制与未完成问题　一般过渡公式是两渐近极限的插值，层长 w 和 Bin 从模拟取值，并未预测宏观驱动选择。忽略电子惯性产生过快电子喷流和大于动理学常见值的局地率；不能无条件推至 di 无限大。只比较峰值附近准稳态，未完成整段时史理论。预稿题名与 PRL2008 短文相近但不是同一篇。

本报告判断　是电子层几何与率的有用定量检验，不是全部参数都由初值唯一预测的全局理论。

4.40　Sullivan2009：2009 年

Extension of the electron dissipation region in collisionless Hall magnetohydrodynamics reconnection[18]

Brian P. Sullivan; A. Bhattacharjee; Yi-Min Huang.

核读范围：arXiv0905.4765v3 1-11 全部；**图表**：图 1-13；图 4-6、8-13 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Sullivan2009.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　等温压缩性双流体；参考密度常系数 B' 惯性；超电阻断线，密度和动量另含四阶扩散。

计算 / 实验细节　周期 12.8di 方盒、512^2、dx.025；四岛正弦平衡、总温 1、beta 最小 11.45、V0.1；全部初始电流由离子携带；mu4=5.1e-7；扫描 eta_H 约 3.9e-5 至 3.9e-3 及 mi/me25-200；另盒 6.4 和 25.6。

核实的发现　无惯性扫描 L_e 约 eta_H^(1/3)，delta_e 约 eta_H^(4/9)，局地归一化率随 eta_H 变，而原始率和全局归一化率约.1-.2 且弱依赖；惯性扫描长度可按 (me/mi)^(3/8)，厚度近 1/3 幂，长宽比弱变化。

限制与未完成问题　无惯性超电阻扫描最长仍不到 di，未复现动力学长约 10di 片及大量次级岛；最低 eta 层接近网格不可靠；3/8 与 1/3 在一数量级质量窗无法区分；真实质量比 15de 长度和 1de 宽度为外推；边界、导引与惯性超电阻同时重要区未扫描。

本报告判断　重要发现是电子层长度也依赖断线机制，以及局地与全局归一化可能给出不同表述；不是 Hall 成功复现任意长电子层的证明。

4.41　Cassak2010：2010 年

A saddle-node bifurcation model of magnetic reconnection onset[45]

P. A. Cassak; Michael A. Shay; J. F. Drake.

核读范围：062105-1 至 7（全部）；**图表**：图 1-8；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Cassak2010.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　以片宽为变量的鞍结分岔现象学模型；F3D 双流体与无电子惯性 Hall 对照。

计算 / 实验细节　409.6×204.8di, dx=.1；有限质量比 25 的旧例 D4=2e-5，无惯性新例 D4=8e-5 作用全部方程，初始片宽 1.2di, T=1, eta=.012，磁种子.004 与随机 5e-6。

核实的发现　无惯性下相同 eta 仍有快慢支与迟滞；片宽相图有非单调结构，电子出流随层变薄增加，与 k 约 1/delta 的双流体波速相关。

限制与未完成问题　模型没有自洽给出层长；因上游场随时间变，正文明确不做片宽演化定量比较。无惯性算例保留更强超电阻，不能称无耗散。Hall-电阻平衡必然不稳定的论断后来被 Huang2011 在其他几何中反驳。

本报告判断　强证据是关闭电子惯性仍保留历史依赖；对任意电阻 Hall 层不稳定的外推需要保留争论。2010 称已做收敛，不等于 2005 正文展示了独立收敛曲线。

4.42　E469：2010 年

Nonlinear gyrofluid simulations of collisionless reconnection[35]

D. Grasso; E. Tassi; François L. Waelbroeck.

核读范围：HAL 封面加作者稿 1-16 页，共 17 页全读；**图表**：模型式 1-26 及图 1-6；全部图像视觉核验.

打开本地 PDF：papers/E469.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维强导引场 Hamilton 陀螺流体三场；演化离子导心密度、电子密度及电子广义磁通；Pade 极化与陀螺平均。

计算 / 实验细节　$[-\pi, \pi]^2$ 周期，1024×128；de.2，rho_s/rho_i 取.01/.2/.4；平衡 $\mathrm{sech}^2 x$ 截断 23 个 Fourier 模。均匀导心密度，离子密度四涡扰动使电子初始扰动 0；总能损耗 <1% 内视为可信。

核实的发现　有限离子 Larmor 半径使静电势保留电子密度的细丝，虽陀螺平均势仍平滑；分离线附近垂直电场峰增强、平行电场出现细结构。岛内密度趋平，细丝更集中于分离线；改变能量通道，并在所测条件抑制冷等离子体中的二次 KH。交换 rho_s 与 rho_i 时岛形/率可相近，而广义不变量和势结构不同。

限制与未完成问题　0.4 离子半径、.01 声半径一组作者自称非物理隔离极限；不等于真实热电子/离子空间等离子体。没有分布函数，电子束与加热是流体结构的暗示，不能量化非热加速。小尺度不断形成，无网格扫描与完整离散算法，能量误差 <1% 不能单独证明细丝收敛。式 13 明确磁通由 G+ 与 G-之和恢复；结论处误写 difference；文中 inverse Kelvin-Helmholtz operator 实际指 Helmholtz 逆算子。

本报告判断　新发现是相近总重联发展掩盖显著不同的电场/密度细结构；保守模型能量项不能自动解释为不可逆热化。

4.43　E472：2010 年

Gyrofluid simulations of collisionless reconnection in the presence of diamagnetic effects[63]

E. Tassi; François L. Waelbroeck; D. Grasso.

核读范围：HAL 封面及 JPCS260, 012020(2010) 全文 9 页，共 10 页；**图表**：表 1、图 1–2、式 1–12；页 6/8 磁岛及六场结构直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/E472.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三场 Hamiltonian gyrofluid，ni 纯 gyro 平均 E×B 输运，无离子平行流；ne 和惯性磁通耦合，等温、低 β 强导向，无 Landau 阻尼；线性平衡密度梯度提供抗磁漂移。

计算 / 实验细节　双周期的是扰动，背景 n'0x 本身不周期；x∈[-π, π]，y∈[-aπ, aπ]，a=1.5/2，1024×128，非线性升至 1024×256；de=.2，ρi=.35/.4，ρs=.2/.4，v*=-.04, -.16, -.4, -.64。线性种子 10^-6，非线性 10^-3。

核实的发现　抗磁漂移降低线性增长，v*=-.64 例稳定；Ti>Te 时岛沿离子抗磁方向传播，理论 $\omega=(\omega^*e+\omega^*i)/2$，$\gamma^2=\gamma0^2-(\omega^*e-\omega^*i)^2/4$。强梯度非线性岛更窄，分离线电子密度瓣不对称。热离子极限 φ 含电子细丝和离子 gyrocenter 大尺度两项，不能再简单 φ∝ne。

限制与未完成问题　表 1 增长率与渐近理论差 15%–38%，频率量值也有明显偏差，不能称精确吻合；Δ' 增大改善趋势但 ρi/de 仅约 2。有限幅岛的所谓饱和未展示长期收敛。强导向假设下作者明确不直接应用磁层顶；不能与 L174 出流阻断准则混为一谈。没有粒子热化/平行动量反馈。

本报告判断　与 L174 比较线性抗磁稳定、岛旋转、小幅饱和和自发终止是不同问题。

4.44　Katz2010：2010 年

Laboratory Observation of Localized Onset of Magnetic Reconnection[125]

Noam Katz; Jan Egedal; Will Fox; Ari Le; Jeff Bonde; Arturs Vrublevskis.

核读范围：MIT 封面 +PRL4 页，共 5 页全读；**图表**：图 1-5 及式 1-5；核心图 2-5、公式视觉核对.

打开本地 PDF：papers/Katz2010.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　VTF 强导引场环形氩实验；三维电势和离子极化电流半经验模型，非 Hall 模拟论文。

计算 / 实验细节　n 约 2e18/m^3、Te15eV、Ti1eV；主导环向场 56mT 在 R1m。感应电场测 6 环向位置，电流密度 8cm 分辨率；浮动势作等离子体势近似。模型 b'.035T/m, l0=1.7m, 椭率 1.7；电势幅 6V、宽.12m 由实验拟合；只早期 10-20μs。

核实的发现　轴对称外部驱动仍出现局域起始，感应电场双向绕环传播约 2 倍 Alfven 速度；加入静电场后的总电场仍局域。快重联仅在测到外区 q 约 2 或 3 时，本文详析 q2；旋转电势允许极化电流闭合局域电流下降。半经验增长时间 22μs，与实验 20±6μs 一致；二维先前对应振荡，三维符号改变可给指数增长。

限制与未完成问题　离子仅边缘磁化；浮动势近似、均匀密度、线性几何与拟合势使分离线不吻合。增长模型使用实测电场空间形状和势/感应电场共同增长关系，并非无参数第一性原理预测。约 2VA 不应抹成精确 VA，更非验证 Hall 唯一驱动；局域微观冻结破坏未由本篇完整辨析。

本报告判断　提供全局几何、电流闭合与三维启动的实验约束；比较 Hall 模型时必须把感应场与总场分开。

4.45　L159：2010 年

Comparison of Secondary Islands in Collisional Reconnection to Hall Reconnection[61]

L. S. Shepherd; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1006.1883v2 对应 2010 PRL105, 015004，物理页 1–4 全部；**图表**：图 1–4、三阶段判据；页 3 的磁岛排出时空图和多岛对照视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L159.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维电阻 Hall/F3D、电子惯性、恒温、无导引场；另从相同状态关 Hall 和电子惯性作电阻 MHD 对照。

计算 / 实验细节　819.2×409.6di 双周期双 Harris 片，初始宽 12di、质量比 25、η=.008、T1、上游 n1，种子.016 并加随机磁扰动打破排岛对称。dx=.2 和.1 比较，展示后者，D4=1.75e-4。Sg 约 1e5，LSP 约 200；未列绝对步长和噪声幅度。

核实的发现　明确分离三阶段：t 约 700、片半高半宽约 2di 时先出次级岛，t 约 1780、半宽约 di 时再进入 Hall。率约.004→.005→ 数倍至近一数量级提高。Hall 启动后短强层将原有次级岛及竞争 X 线排走；另一张片三岛例也显示排出。t1120 关 Hall/惯性后率最终约.009，符合 N=2 的 SP×√N 估计，未达到 Hall 支。

限制与未完成问题　只有该 S、几何和有限岛数，不能推出任意高 S 磁岛链必慢于 Hall、也不能推出 Hall 与磁岛普遍不能共存。D4 减小使 Hall 率略增；质量比 25 未扫描。恒温忽略 Ohmic 热反馈，缺导引场/三维/Spitzer 温度依赖。时空图每 70 时间单位采样再插值，不能由平滑斜线提取更细瞬态。冠状观测的阶段对应只为猜想。

本报告判断　与后续 Huang2011、Shi2024 等联读：此处是 Hall 排出现有岛，后续研究另出现 Hall 层持续生岛或往复转换；差别需按参数和阶段说明。

4.46　L160：2010 年

Fast and slow two-fluid magnetic reconnection[17]

Leonid M Malyshkin.

核读范围：arXiv1005.3760v1 物理页 1–16 全部；2010 Physica Scripta 长文，扩展已读 2009 PRL 推导，不算独立模拟验证；**图表**：式 (1)–(53)、表 1 和图 1–2；表 1 及图 2 直接视觉核验，中心惯性/压力项逐项核对.

打开本地 PDF：`papers/L160.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　准中性不可压非相对论双流体，任意 Z 和质量比，标量物种压力、常电阻、无黏性，二维对称准稳态。保留中心质量动量中的电子相对漂移应力及广义欧姆惯性。

计算 / 实验细节　解析论文，无计算网格。外给 Bext、Lext、η；电子层 δ, L 与离子层 Δ, Lext 分开。c=4π=1；γtilde 是 Hall/理想项比，不是时间增长率。快支要求 Lext/de≪S≤Lext^2/(de di)。

核实的发现　从两种粒子动量严格重组得附加 ω+^{2}de^2(j · ∇)j；若把它吸入共同参考系压力，压力便不再标量。对称稳态 X 点仍 Ez=ηj0，导出 δ≥ 约 de、快支 δ≈de、Δ≈di、L≈VA de di/η、Ez≈ηBext/de。电子先达到电子 Alfvén 喷流，离子在更远下游继续加速。质量相等的对等离子体 Hall 系数消失，本模型却错误给慢 SP，作者归因遗漏压力各向异性。

限制与未完成问题　快支仍正比有效 η，不是 η=0 惯性稳态断线；η 需另由动理学决定。中间 Hall 支的 L 不能求出，把其安排在固定 S 阈值上作为快慢转换属于猜想。图 2 无分支稳定性、转换时长或迟滞计算；不能作动态证据。B 在两层边缘近相等、压力曲率和薄层均为假设；长电子喷流外冻结，与 PIC 压力非理想区不完全相符。提出 Hall-Petschek 激波但未完整推导其双流体跳跃条件。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章可用其完整质量重组避免漏动量项；结论章应把静态可行分支与 Cassak 的实测迟滞分开。它解释特定电阻/惯性平衡，未统一决定实际无碰撞快率。

4.47　L164：2010 年

Slow shocks and conduction fronts from Petschek reconnection of skewed magnetic fields: two-fluid effects[98]

D. W. Longcope; S. J. Bradshaw.

核读范围：PDF 1–45 including all Sections 1–7 and references; no internal appendix；**图表**：Direct PDF visual: Eqs.4–7 (p10), Eqs.14–18 (p12), Figs.4–7, 9–14 (pp17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37). Remaining figures/captions read in text..

打开本地 PDF：papers/L164.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　采用准中性、共同密度和共同速度的一维两温碰撞流体描述平行激波，再映射到外部给定的 Petschek 偏斜磁场重联出流。共同速度来自本问题无电流的特殊约化，并非一般 Hall 假设。保留离子黏性、两物种经典热导及库仑温度交换；电子惯性忽略，压力梯度电场维持电子力平衡。它不是自洽 Hall 扩散区模拟。

计算 / 实验细节　例子包含入流马赫数 2.4、3.6、5，初始双曲正切速度层宽 1–500 个归一化离子黏性长度；电子和离子 Prandtl 数 0.013、0.33，交换参数 0.019。输运系数随温度的 5/2 次方变化，交换频率随 nTe^(-3/2) 变化。中心镜面、远端持续入流；稳态用射击积分，时变网格和时间步未报告。偏斜角约 ≤120° 时几何约化较可靠。

核实的发现　离子黏性子激波先把出流动能转为离子内能，随后长下游区域的碰撞交换加热电子，电子传导又形成前导热波；三个区域及相关时间尺度明显分离。早期离子温度可超过最终平衡值，电子升温滞后，而远下游最终跳跃仍可与单温结果一致。初始速度层足够宽时，局地两温大小关系也可改变，不能压成固定加热比。

限制与未完成问题　原文发现部分强激波早期离子热流达到或超过自由流值，黏性修正甚至违反压力正定条件，故经典闭合恰在关键加热层可能失效。电子热流较小与未包含 X 点直接电子加热有关，不能外推到所有重联。模型不含自洽 Hall 场、完整动理学尾、动态磁通管截面和反平行极限，也没有进行实验 Ti/Te 定量验证。

本报告判断　这是两温流体可研究热化过程的清楚实例：它把离子流能耗散、物种交换和电子传导在空间与时间上分开，同时主动揭示经典离子闭合的失效。可据此说明“双流体并非不能研究加热”，但不能把给定出流的碰撞激波结果当作无碰撞 Hall 重联的普适分配律。文中与拾取加热等动理学机制的联系应作为模型边界保留。

4.48　L166：2010 年

Three-dimensional simulations of the orientation and structure of reconnection X-lines[80]

Ron Schreier; M. Swisdak; J. F. Drake; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1009.1650v1 物理页 1–12 全部，含方法、结果、讨论和参考文献；**图表**：图 1–6 及式 (1)–(7)；图 4 电流等值面与图 6 角度峰值直接视觉核验，注意图 4 横纵轴比例不同.

打开本地 PDF：papers/L166.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维可压缩 Hall F3D、电子惯性、标量等温压力；非对称双 Harris 电流层，全周期，比较二维和三维 X 线方向选择。

计算 / 实验细节　B1=√3、B2=3，ρ1=4、ρ2=1，剪切角 54.7°；场分量 (1, 0, √2) 和 (-1, 0, 2√2)，w0=0.5di，T=1，质量比 25。三维盒 51.2×51.2×409.6di，网格各 0.2di=de，四阶扩散 0.001，无显式 η、ν；二阶时间、四阶空间。随机磁扰动 10^-3，kz 最高 5；无质量比及网格收敛扫描。

核实的发现　二维在 Sonnerup 磁剪切准则禁止的边界情形仍发生重联，率约 0.02。三维初有多方向 X 线，后来少数占优；Canny/Hough 对 Jxz 等值面投影测得 α=35.9±8.5°，与最大出流预测 34.3° 相容。X 线长度早期即停止增长，作者归因不同共振面磁岛相互作用，区别于反平行单共振面无限延伸。

限制与未完成问题　最大归一化率预测 31.7° 也在误差内，不能区分两种选择原则。X 线由电流形态代理识别，部分场向电流结构不是重联；无三维零点。周期盒离散共振面 k · B=0 限制可选方向；单几何且无盒长扫描，有限长度结论不能普适化。de 只有一格，无法确认电子层结构；固定纵横比率公式在三维未经证明。

本报告判断　三维发现是方向竞争与跨共振面相互限制；验证强度是排除一个过严准则、与另一预测相容，尚非唯一识别全局最优化机制。

4.49　Baalrud2011：2011 年

Hall magnetohydrodynamic reconnection in the plasmoid unstable regime[51]

Scott Baalrud; Amitava Bhattacharjee; Yi-Min Huang; K. Germaschewski.

核读范围：arXiv1108.3129v1 1-8 全部；**图表**：图 1-9，图 8-9 视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Baalrud2011.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压标量压力、无电子惯性、电阻 Hall 四场；SP 平衡宽度随 S 变化，扰动电阻内层 d_eta 小于 di 而 di 小于 delta_SP。

计算 / 实验细节　线性本征对照 S_L=1e8, di/L=1e-5, 3e-5, 1e-4；非线性岛合并 L=1, S=1e6, di=1e-5 至 1e-3；算法网格引用前作未完整列出。

核实的发现　最快模增长率正比于 (di/L) 的 6/13 次幂与 S 的 7/13 次幂，系数约 3.2（以 Gamma0=2vA/L 归一）；最快波数 kL 正比于 (di/L) 的 1/13 次幂与 S 的 11/26 次幂，系数约 2.9。全局层仍长薄时扰动已出现四极 Bz。非线性增长转折在 di/L 约 2e-4，与内电阻层约 1.8e-4 吻合。

限制与未完成问题　非线性计算只确认转折，作者承认无法精确验证 6/13 指数；gamma»Gamma0, k delta_SP«1 与三层排序限制适用范围；不是非线性最终率公式。PDF 自动日期 2018 与 arxiv2011 不一致，按 arxiv 版本记录。

本报告判断　Hall 先影响撕裂内层再改变全局平衡是重要发现；不能把线性指数和稳定单 X 点视为同一结论。

4.50　E512：2011 年

Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas[92]

A. Zocco; A. A. Schekochihin.

核读范围：arXiv1104.4622v2 全部 28 页，含低 β 排序、完整 KREHM 推导、能量、Hermite 谱及附录 A/B 的二维不变量与线性双层匹配；**图表**：本文无结果图；直接查看页 12/15/24 原版公式，核验能量符号、Hermite 截止和匹配系数，非仅摘要或综述转述.

打开本地 PDF：`papers/E512.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　KREHM 是由 gyrokinetics 作 βe~me/mi≪1 次级展开的流体—动理学模型，不是纯双流体：强导场、低频、k 平行 ≪k 垂直、de 与 ρs 保留，电子 FLR 忽略；离子 gi=0 初值子类，保留 Γ0=I0(b)exp(-b) 极化、ui 平行 0。电子分布扣除密度/流矩后的 ge 保留平行速度结构，修正 Lenard–Bernstein 碰撞，磁扩散率 νei de^2。

计算 / 实验细节　理论及算法方案，无本篇非线性算例网格或新模拟数据。Hermite g0=g1=0、g2=δT 平行/(√2T0)、m≥3 流送耦合相邻阶并受 νm 阻尼。推荐模式数必须越过 mc=[3|k 平行 |vthe/(2√2ν)]^(2/3)，而非固定十矩足够；半碰撞极限 κ 平行 =$vthe^2$/(2ν)，vthe=√(2Te/me)。

核实的发现　ge=0 一般不是动力学不变子空间；平行温度项交换流体/电子自由能但本模型中不独自破坏磁通冻结，破冻结仍由 η 或电子惯性。Wfluid 点 =-Q-Ohmic，He 点 =Q-Dcoll，Q 可正可负而 Dcoll≥0。慢/稳态相混合 Em~m^(-1/2)exp[-(m/mc)^(3/2)] 使 ν→0+ 耗散有限；快速线性增长有 mγ=(|k 平行 |vthe/(2√2γ))^2 截止，若 mγ≪mc 则 Dcoll 随 ν 消失。附录系统给无碰撞/半碰撞单双层撕裂及两尺度匹配，低 β 边界明确。

限制与未完成问题　不能用于一般无导场高 β 电子扩散区；无离子 Landau 阻尼、垂直相混合/离子黏性；极冷离子还需 βe≪$τ^3$ 以免丢失离子碰撞排序。小于 de 的垂直奇异梯度未保证受电子加热通道正则化，可能需额外超扩散；有限加热是条件性理论预测而非本篇已算出的三维湍流事实。原版式 110–112 把定义为正耗散的 Dcoll 写负号，与 83/96 矛盾，本报告依定义重算取正。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章新增从动理学约化到 Hermite 级联/熵产生的学习推导，明确不属于纯双流体；《已解决与未解决的问题》第 2 章提出闭合应同时预测率、层结构及不可逆加热，不能用能量转移替代热化。

4.51　Huang2011：2011 年

Onset of fast reconnection in Hall magnetohydrodynamics mediated by the plasmoid instability[52]

Yi-Min Huang; A. Bhattacharjee; Brian P. Sullivan.

核读范围：1-25（arXiv v2 全部）；**图表**：图 1-11、式 1-6；主要结果图视觉核验；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Huang2011.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维等温、标量压力、无电子惯性、电阻 Hall MHD；HMHD 五点差分/梯形 leapfrog；psi、By 演化保证二维散度。

计算 / 实验细节　S=5e5，L/di=2500, 5000, 10000，对照纯电阻；T=3，导体滑移边界，仅上半域，6400 乘 1024 非均匀网格，最小 dx=1.2e-4L, dz=1.4e-5L；另在 Sdi=100 扫描 L/di500, 1000, 2500。

核实的发现　2500 形成持久单 X 点；5000 经历磁岛触发 Hall、排岛、再拉长到约 500di、再生岛的间歇循环，率.005-.03；10000 未进入 Hall。主 SP 宽大于 di 时，次级薄层仍可触发。较大系统在相同 Sdi 下片更长更宽、开放角更小。

限制与未完成问题　Hall 分支仍由电阻断线；此循环与无碰撞 PIC 连续产岛机制不等同。宽度定义为四分之一峰值全宽，不能与半高半宽直接比（.7di 对应.17di）。相图边界仅统计估计，Sdi 临界随系统尺寸未得到定律；对太阳日冕/磁尾 Spitzer 参数该中间区未必适用。

本报告判断　破除 Hall 必然单 X 点的说法，但不能由形状相像认定动力学机制一致。小系统欧姆项与收敛支持电阻可单独维持 Hall 分支，作者与 Cassak2010 有实质争论。

4.52　L156：2011 年

A Discontinuous Galerkin Method for Ideal Two-Fluid Plasma Equations[135]

John Loverich; Ammar Hakim; Uri Shumlak.

核读范围：arXiv1003.4542v1 全部 40 页；期刊 2011 年 9 卷 240–268，预印本 2010 年；**图表**：图 1–19 及全部算法公式；直接看页 12、32、34、37 的 CFL、磁岛、重联通量及晚期射流结构.

打开本地 PDF：papers/L156.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子/离子各五矩 Euler 方程加完整 Maxwell 与双曲散度清理；保留位移电流、非准中性、电子惯性，无显式电阻粘性，标量压力 γ=5/3。

计算 / 实验细节　矩形 DG 一次/二次基给二/三阶空间精度，局部 Lax 通量、Gaussian 积分、特征 minmod/TVB 限制器、SSPRK3。限制线性系数时高阶系数清零。GEM 质量比 25、c/VA=10、Te/Ti=.2，128×64 与 512×256，dt=.002/.0005，M=0 或 25；另做真实质量比 1836 的 500–50000 格色散激波与解析多模电子波。

核实的发现　粗网格二阶出现持续磁岛而三阶无岛；高分辨二/三阶通量接近，三阶一小岛随后合并，增加耗散也能消岛，因此磁岛与数值耗散不是单调关系。晚期碰撞射流有复杂结构，有限精度和硬件精度能改变磁岛运动方向及局部动量约 10%。源项振荡使稳定时间步与相位准确性不同；激波细小波列可能是真实双流体色散。

限制与未完成问题　无 Landau 阻尼及压力张量闭合；通量一致不证明 X 点非理想电场预算闭合。边界有限磁通导致晚期饱和。预印本有明确量纲/符号排印问题：p12 三阶 CFL 写 c/Δx，正确量纲 Δx/c；能量内能应 p/(γ-1)，Harris 电流应按 curl B/μ0 重算，不能照抄式 5.12。

本报告判断　数值章用作 DG 实现及可复现性案例；比较需要同时报告阶数、限制器、网格、dt 与机器精度，不能用一张磁岛图断言新物理。

4.53　L174：2011 年

Model for Incomplete Reconnection in Sawtooth Crashes[62]

Matthew Beidler; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1111.0590v1，物理页 1–5 全部，含 MAST 估算与文末限制；**图表**：图 1–3、式 (1)–(3)，页 3 的速度交叉、率下降和局地结构视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L174.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维周期平板 F3D，冷离子、绝热电子 γe=5/3、Hall 和电子惯性；高压区起初远离有理面，由重联入流自行带入。并非真实三维环形 m=n=1 锯齿模拟。

计算 / 实验细节　102.4×204.8di，Harris 宽.5di，质量比 25、dx=.05 和.025 对照，D4=2e-5、无显式 η。压力梯度宽 2，p1/p2=5/25，初始密度 1、平均导引场幅 5 并总压平衡；磁种子.01、噪声 2e-5。比较均匀 5/5、25/25 与弱梯度 5/7；χparallel=.08 测试无显著变化。

核实的发现　快重联自身把高压核心带向 X 线，约 t140 梯度到达、t195 电子抗磁速度达到两侧最大电子喷流速度的平均，通量率下降并转负振荡；仍有自由磁能。X 点抗磁漂移、电流层变宽和磁剪切减弱随后出现。均匀压力或梯度不足的对照不停止，支持局地压强梯度的自限制机制。

限制与未完成问题　|v*i-v*e|out>vout 为此模型的判据，实际只验证冷离子，热离子/强传导/三维待检验。后续结构只猜为漂移不稳定性，环形互换模未模拟。MAST v*e≈13.5 与 vout≈14.2km/s 采用推定电子层宽 2rho_e 及间接场/梯度，离子资料缺失；Bh 取 Bphi(1+rs/R0) 的原文表达不是通常正交投影所得的场强，数量一致性不应宣称精确几何验证。

本报告判断　重要新现象是快重联可以输运进能终止自身的压强梯度，不需要耗尽所有磁通。实验比较属于原理与量级相容；不把摘要关于各装置包括 ITER 的外推当作普适验证。

4.54　E471：2012 年

Numerical investigation of a compressible gyrofluid model for collisionless magnetic reconnection[88]

Luca Comisso; D. Grasso; E. Tassi; François L. Waelbroeck.

核读范围：HAL 封面及 PoP19, 042103(2012) 全部 12 页，共 13 页；含 gyrokinetic 来源与能量分析；**图表**：图 1–10、式 1–42；页 7/9/11 直接核验离子速度宽度、密度分布与能量.

打开本地 PDF：`papers/E471.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　四场 Hamiltonian gyrofluid，演化 ni, ui, ne, ue 的正则动量，保留平行离子压缩及 Padé 离子回旋平均；低 β、等温，无 Landau 阻尼。ni 为 gyrocenter 密度，不是粒子密度，准中性通过极化关系保证。

计算 / 实验细节　盒 [-π, π]×[-2π, 2π] 双周期，伪谱 1024×128；Aeq=.1sech^{2}x 的 23 项 Fourier 近似，de=.2, di=2, ρs=.4，ρi=10^-4–.8，Δ'=59.9。质量比 100，电子 β=.08；不同 ρi 按 γLt/重联通量比较。

核实的发现　增加 ρi 使离子平行速度条带变宽，数据提示宽度 ∝ρi，速度及 X 点电流尖峰下降；离子 gyrocenter 密度偏向中性线，电子密度仍偏分离线。热离子磁岛较长且开角较大，高次谐波更强。I±=D±diρi ni 与 G±=F±deρs ne 四个冻结不变量解释两种结构；给出动力学固定正则动量的不变量对应。

限制与未完成问题　ρi 扫描尚不足确立普适宽度定律；di/de=10 并非真实质量比，低 β 使离子平行动量贡献小，不能推广高 β。总能晚期误差 <1.5%，未给全面网格/时间收敛；磁能转至密度/静电扰动能是可逆过程，不能等同温升或非热粒子加速。等温两速度形式仅闭合表示，不是实际分布。

本报告判断　提供比双场更丰富的流体结构与能量分配检验，《理论与数值基础》第 1 章须明确定义 gyrocenter 与粒子密度。

4.55　GuideExp2012：2012 年

Quantitative Study of Guide-Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma[122]

T. D. Tharp; Masaaki Yamada; Hantao Ji; E. Lawrence; S. Dorfman; Clayton E. Myers; Jongsoo Yoo.

核读范围：PPPL-4753 全部 8 页（正文编号 1-5，含封面说明）；**图表**：图 1-7、式 1-3；主要结果图视觉核验.

打开本地 PDF：papers/GuideExp2012.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 外加可控环向导引场；counterhelicity pull，磁场探针测 Hall 项与感应电场，中心 Langmuir 探针测 n/Te。

计算 / 实验细节　Bg/Brec 从 0 到约 1；delta 约 2cm，di 约 5cm，rho_s 约 2.5cm；Hall 项取 X 点上游 3cm、下游 5cm，归一化使用重联分量 Brec 而非总场。

核实的发现　导引场改变四极场形状与幅值，重联率降低比典型局地模拟更强；磁通芯阻碍排气，环向导引场被压缩、堆积，对全局压力平衡产生影响。

限制与未完成问题　正文明确不能把速率降低分成局部 Hall 与全局边界两部分；密度仅中心一点，完整压力平衡/离子流速测量留待未来。所读是 PPPL 预印本，式号图号以此版本为准。

本报告判断　边界可显著控制观察到的导引场依赖；不可当成所有开边界空间重联的普适 Bg 标度。

4.56　L184：2012 年

Observation of explosive collisionless reconnection in 3D nonlinear gyrofluid simulations[36]

A. Biancalani; B. Scott.

核读范围：arXiv1110.4595v2 全部 8 页；**图表**：全部方程和图 1-2；模型页、两幅增长率/能量图视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L184.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GEM 陀螺流体代码（不是 GEM 重联挑战）：低频强导引场、电子惯性、温度矩、Pade FLR 及 Landau 闭合。

计算 / 实验细节　氘质量比约 3704；Δprime rho_s=.75，de/rho_s=.41-4.1；de/Lperp 示例.04；tau_i1 另 0 比较，epshat18350。Nx 最高 2048、Ny512，第三维点数未列；x Dirichlet，y/平行周期；白噪声种子 1/10。beta 扫描同时缩放盒子和片宽；能量源/耗散审计及 x 盒加倍，种子半倍/两倍检查。

核实的发现　非线性增长率比线性增长率提高一个数量级：beta1.6e-3 时.009 对.0008（Lperp/cs 归一）。加速时 X 点分成两个 Y 点，饱和时恢复；岛内次级涡度及分离线尖电流；有限离子温度本组不改定性。

限制与未完成问题　两幅图仅显示能量/增长率；X-Y 拓扑及湍动机制主要文字报告，未在本篇给图诊断或因果剔除。beta 与尺度共同变化，不能称独立 beta 因果扫描。未明确三维是否必需。GE 负只表明净数值能量损失，不能证明数值耗散对磁拓扑和重联率贡献严格为零；仍需 Ohm 残差、系数/网格扫描。

本报告判断　提供小 Δprime 也可爆发加速的数值证据；尺度独立极限和高速流/三维因果仍未解决。

4.57　Shepherd2012：2012 年

Guide field dependence of 3-D X-line spreading during collisionless magnetic reconnection[72]

L. S. Shepherd; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1208.2922v1 全部 9 页，排版日期 2021 非发表年；**图表**：图 1-6；图 3-6 视觉检查，传播方向、阈值和误差核对.

打开本地 PDF：`papers/Shepherd2012.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D 三维等温 Hall 加电子惯性；全初始电流由电子承担。

计算 / 实验细节　51.2×25.6×256di；dx=dy=.05, dz=1（部分.5 检查）；质量比 25；初始半厚.4di。导引场 0 至 3；D4xy2.5e-5，D4z 随导引场用.064/.081/.097，曾加倍检查；电阻 0。局域磁扰动加随机模，Jmax>3.3 定义重联，Hall 电场 >.01 作参照；只拟合斜模相互作用前的时段。

核实的发现　弱导引场主要向电子电流方向延伸；较强导引场约 Bg/B0≥2 呈双向、近导引场 Alfven 速度。Bg2.5 测得两方向 3.0 和 2.9VA0；与载流子速度和导引场 Alfven 速度的最大值模型相符。后期斜向 X 线相互作用，破坏简单的单 X 线传播图像。

限制与未完成问题　阈值选择导致 15%-20% 速度不确定度；弱场反方向零是观测窗口内未分辨，非严格不传播。只验证电子承担全部电流，未验证一般离子分担系数。质量比 25、初始薄片，无自洽薄化。临界场估计用了形成后电子层 de 与 Brec 约.4；后续传播理论强调前方未重联片厚，须区分。

本报告判断　支持受限参数下传播方向的导引场转变；不能直接作为太阳耀斑或真实质量比的定量预报。

4.58　F625：2013 年

Influence of the dissipation mechanism on collisionless magnetic reconnection in symmetric and asymmetric current layers[136]

N. Aunai; Michael Hesse; Carrie Black; Rebekah Evans; Maria Kuznetsova.

核读范围：arXiv:1303.0442v1 本地 12 页全部核读，包括对称/非对称两组数值实验、讨论及参考文献；**图表**：图 1—10、表 I—II 和图注全文核对；另检查物理页 7、10 的布局与图表对应；正文若干颜色、图号和算例字母与图注不一致，结论以参数和曲线实际标记对应，不依赖颜色描述.

打开本地 PDF：papers/F625.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维混合模型：Boris 推进动力学质子，无质量、等温、准中性流体电子；忽略位移电流。Ohm 定律含 Hall、标量电子压强梯度及数值/均匀电阻/超电阻三种非理想处理。电磁场二阶差分、半格错置、预测校正；x 周期、y 封闭导体。

计算 / 实验细节　对称片 λ=0.5di，密度 1、上游 β=1、Te=0.25；250di×50di、2500×500 为基准，部分算例同时改变域和网格。η=0.002 为网格控制组，η=0.014 电阻组，ν=0.0003 超电阻组。非对称 Bx=0.5+tanh、n=1-(S+S^2)/3，两侧 |B|=0.5/1.5、n=1/(1/3)，Bg=1、总温度 1.5、Ti/Te=5。Δy=0.15/0.076/0.05di，Lx=100/150/300di，ν=0.0005；分析限制在相应 Alfvén 返回时间之前。

核实的发现　对称组宏观结构和速率变化较小，网格控制与超电阻率约 0.065/0.06（基准单位），均匀电阻约 0.055。非对称网格控制组电子层反复拉长、数值撕裂成岛、再次拉长，速率随分辨率明显变化；电阻及超电阻局域化电子层、无反复岛生成，后者率较前者高。缩小周期域可使回流加宽电流层、抑制岛或人为维持短 X 线，不能把这种稳态当局部物理机制。

限制与未完成问题　此文检验‘任意非理想项都等价’而没有证明哪种流体闭合等价于真实电子动力学；数值岛不能直接认作自然等离子体岛。无电子惯性/压力张量，超电阻系数也非由微观过程导出。部分分辨率比较同时改变域长；超电阻参数完整扫描尚未完成，作者只报告初步弱敏感性。初态非 Vlasov 平衡，会发出反射波。

本报告判断　必须纳入：Hall 项存在不保证闭合无关或网格无关；与近期分辨率争议及导引场磁岛合并共同组成模型、离散、边界三个层次的对照。

4.59　F672：2013 年

Gyro-induced acceleration of magnetic reconnection[40]

L. Comisso; D. Grasso; F. L. Waelbroeck; D. Borgogno.

核读范围：arXiv1309.1753v1 物理页 1–40 全部，含附录色散关系、图版与表 I；**图表**：图 1–13、表 I；图 6、10、11 和表 I 视觉复核.

打开本地 PDF：papers/F672.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维强导引场低 beta 等温四场 gyrofluid；离子平行流、Padé 环平均、粒子准中性、电子惯性，四组 Lagrangian 不变量；无显式碰撞或 Landau 阻尼。

计算 / 实验细节　sech^2x 磁通平衡 A0=.1, L1，23 个 Fourier 模，Bplane/Bg 最大约.08；双周期 x±pi, y±a*pi；AB3 伪谱最高 4096×512，微尺度滤波。非线性 Ly4pi、ky.5、Delta'59.9；de 由.2 降至.025 且 di=10de, rho_s=2de, rho_i=4de。

核实的发现　热离子且尺度充分分离时出现两次非线性增长率加速，中间停滞；固定 rho_tau=.2236 比较冷热离子，首次加速只在热离子出现。大 k*rho_i 时 phi≈-rho_i^2 ne 保留密度细结构，冷离子 phi=Lap^-1 ne 被平滑，局地 E×B 流可差一个量级。第二次加速伴随出流开口扩大。表 I 以初始最大面内场参照的率由 de=.2 时.2827 降至.05 时.1176、.025 时.1004。

限制与未完成问题　γ_eff=d ln(delta psi)/dt 不等于磁通率；率用初始场最大值作上游参照，非动态层边缘。固定 Delta' 继续 de→0 会进入小 Delta' 并使快阶段消失，不是无限理想极限 0.1。不含电子 FLR/粒子不稳定性；微层不断变薄，到不可解析时停止。一次 x 加倍网格率不变、峰值 ue 变不到 6%，不是所有算例全收敛。正文图 2 参数 rho_s=.1 与图注.2 冲突，待作者输入确认。

本报告判断　双加速的证据来自对照、场结构和不变量关系，不能简化成“热离子使重联更快”；第一个小尺度加速与第二个宏观开口必须分开。

4.60　L189：2013 年

Experimental Study of Two-Fluid Effect during Magnetic Reconnection in the UTST Merging Experiment[127]

Kotaro YAMASAKI; S. Kamio; Koichiro Takemura; Qinghong Cao; T. Watanabe; Hirotomo Itagaki; Takuma Yamada; Michiaki Inomoto; Yasushi Ono.

核读范围：PFR2013 卷 8 文章 2401130 全部 4 页正文、图表与诊断说明；**图表**：图 1–6，直接核验页 2 诊断关系及页 3 势降/磁通/电流的时序和采样几何.

打开本地 PDF：`papers/L189.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　UTST 双球形托卡马克合并实验，磁探针阵列重建 ψ、jt、Et；浮动电势径向扫描与离子 Doppler 谱联系两流体静电势和离子排出。

计算 / 实验细节　典型 Bp=.01T、Bt=.1T，δ 约 50mm，作者引 ρi79mm/平均自由程 120mm；浮动探针 10mm 管/1mm 钨尖，光谱沿 R=.1m 到采样点视线积分。200–205μs 势梯度出现，Er 估 400–800V/m，VA24km/s，C^{2+} 流约 27km/s，估 τacc2.1–4.2μs 与回旋周期 3.9μs 比较。

核实的发现　重联磁通变化加速、电流下降与 X 点附近浮动电势变陡同时出现；含 X 点视线观测到近 Alfvén 径向流。静电加速时间量级与观测相容，提示磁化电子形成电势对离子排出有作用。

限制与未完成问题　浮动电势只有在 Te 空间变化足够小时才可代替空间电势，本文未提供完整同步 Te 修正；势降不能单独量出非准中性或证明 Hall 独占因果。谱线有视线积分/流动展宽，作者明确承认温度受宏观流影响，不能由谱宽直接确定不可逆加热。正文 CIII 与图 6HeII 标注不一致，ρi79mm 与 C 回旋半径 16mm 属不同口径；热化/激波为解释而非直接测量。

本报告判断　实验章分别列直接观测、诊断换算条件和机制推断；比较加速与热化，不能把相关时序写成已证实 Hall 加热定律。

4.61　L190：2013 年

Laboratory Study of Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas[130]

Eric E. Lawrence; Hantao Ji; Masaaki Yamada; Jongsoo Yoo.

核读范围：本地 PPPL-4764 技术报告 16 物理页全部检查；物理页 3—14 为 12 页论文正文、图表和参考文献，另含封面、声明和空白页。实际核读 2012 年 5 月作者稿，对应 2013 年 PRL，未声称已逐字核对期刊终稿；**图表**：图 1—5 及图注全部核对；放大物理页 12 图 4—5 的误差棒、两种归一化和电阻率比较.

打开本地 PDF：`papers/L190.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 部分电离氦实验，测 Hall 四极场、离子喷流与重联电场；不是电子—离子双流体模拟。解释需要离子—中性拖曳和有限设备尺寸。

计算 / 实验细节　pull 重联准稳态约 40μs（约 12τA）；245 通道磁探针阵列覆盖 20cm×16cm，径向 0.6—2cm、轴向 3cm；Mach/Langmuir 探针及移动电流片重建径向剖面。填气 5.5—45mTorr，nn≈0.17—1.4×10^15cm^-3，ne≈2×10^13cm^-3、Te≈6eV；两端 ρtot/ρi 约 8 与 70。放电中中性密度仅在 ±50% 内与填气推断相容。

核实的发现　加中性粒子后离子喷流按 √(ρi/ρtot) 降低，接近按总质量密度定义的 Alfvén 速度；归一 Hall 四极场形状及约 5cm 的峰间尺度、离子喷流通道宽度没有相应扩大。因此按离子 Alfvén 速度归一的率下降，按总密度速度归一则约为常数且量级 1。电子已受中性碰撞影响时仍可保留 Hall 结构，不能把 Hall 等同于严格无碰撞。

限制与未完成问题　边界自由理论预期 Hall 尺度扩大，最高中性密度例预期有效尺度 83cm 超过设备，有限尺寸是候选解释而非已证明原因。中性压力未直接测量；流剖面依赖多发重复，轴对称重建有假设；基准‘ionized’仍含显著中性粒子。归一率约 1 来自本装置和尺度限制，不能用作普适常数。

本报告判断　纳入实验章节和多组分模型适用边界，区分电子—离子双流体与带电—中性双流体，建议显式中性动量和实际边界联合验证。

4.62　L191：2013 年

Nonlinear variational method for predicting fast collisionless magnetic reconnection[37]

Makoto Hirota; P.J. Morrison; Yasutomo Ishii; M. Yagi; N. Aiba.

核读范围：arXiv1301.3196v2 全部 22 页，含附录 A–D 能量积分、流映射和对 OP 理论的检验；**图表**：图 1–9、B1；页 12 图 8 势能指数和页 14 图 9 电阻扫描直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L191.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷离子/冷电子无耗散双场惯性 RMHD，$\psi e=\psi-de^2\nabla^2\psi$ 随不可压缩流冻结；Lagrangian 流映射变分法加直接非线性模拟。

计算 / 实验细节　双周期 $\psi eq=\psi 0\cos(2\pi x/Lx)$，$de/Lx=.01$，$Ly/Lx=4\pi$，$kLx=.5$；y 谱至 200 模，x 均匀差分约 10^4 点。大 Δ' 序 $Lx^3/(8Ly^2)\ll de$。τ0^-1=dekτH^-1，τH^-1=$\alpha^2\psi 0$。

核实的发现　Y 端电流层对应试探映射给线性 $U=-.776\varepsilon hat^2$、$\gamma=.881/\tau 0$；非线性 U 约$-.439\varepsilon hat^3$，故 $\varepsilon hat^{\cdot\cdot}$ 约$.659\varepsilon hat^2$、$\varepsilon dot\propto\varepsilon^{3/2}$，比指数快。数值能量支持该指数而不支持 OP 早期 $\varepsilon^{\cdot\cdot}\propto\varepsilon^4$；附录 D 指出边界积分对极窄子层任意参数敏感，不能闭合能量。弱电阻提高线性率，但 τ0/τe>1 时非线性趋减速。

限制与未完成问题　变分试探族和小中间区近似并非精确非线性解；$de\ll\varepsilon\ll Lx$ 适用，不能把数学有限时间发散当无限能量。细电流尖峰达到网格后终止。F697 后来承认本篇 y 模数和数值黏性漏掉次级 plasmoid。TFTR τ0 约 90μs/τe270μs 仅量级对应，非完整环形锯齿/部分重联验证；加热和逃逸电子是展望。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章适合由能量守恒逐步推导爆发指数，第 1 章必须连同 2017 分辨率修正讲述。

4.63　L193：2013 年

Study of the effects of guide field on Hall reconnection[123]

T. D. Tharp; Masaaki Yamada; Hantao Ji; E. Lawrence; S. Dorfman; Clayton E. Myers; Jongsoo Yoo; Yi-Min Huang; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：作者公开期刊版物理页 1–6 全部；**图表**：图 1–6；图 3–6 视觉复核、测点和归一细查.

打开本地 PDF：`papers/L193.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 氘等离子体导引场实验与有限电阻 Hall MHD；等温初态、总压绝热 gamma5/3，Ti=Te。

计算 / 实验细节　300 多个磁探针，Langmuir 单点密度温度；delta 约 2cm、di 约 5cm、rho_s 约 2.5cm；两种螺度运行加外导引场约 ±3Brec。模拟 25×12.5di，出流周期/入流导体，Harris h=.5di、扰动.05、T0=.125、eta=.005(Sdi200)，峰值测量；网格/步长未列。

核实的发现　导引场改变 Hall 四极结构并减弱 Hall 电场；实验测上游 4cm 和下游 8cm，局地 Hall 项与重联电场随 Bg 同降。长文新增全局约 20cm 导引场压缩，反螺度中局地场约外加值 2 倍，出流背压与率下降相关；约 0.08 降到 Bg/Brec 约 1.5 时 0.02。平板模拟未产生这部分压缩。

限制与未完成问题　必须用局地增强 Bg 才与模拟相近；同/反螺度是不同初始和全局设置，不能拼成单参数扫描。图 3 各面板独立色标，不能从颜色比较幅值。测得 Hall 平衡在 X 点外，非证明 Hall 项支撑 X 点破冻结。导引场背压对速率的因果贡献未定量隔离。

本报告判断　与 2012 短文分开登记；局地 Hall 证据良好，但几何/边界未被验证的限制需要与实验一致性一起呈现。

4.64　Loureiro2013Heating：2013 年

Fast collisionless reconnection and electron heating in strongly magnetized plasmas[103]

N. F. Loureiro; A. A. Schekochihin; A. Zocco.

核读范围：1-6（全部）；**图表**：PDF2-5 页直接视觉核验图 1-5、式 4-6；6 页全文含脚注参考文献，无文内附录。.

打开本地 PDF：papers/Loureiro2013Heating.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　KREHM，流体变量 + 电子 Hermite 动理学；二维周期伪谱，非纯 Hall/有限矩。

计算 / 实验细节　384^2；M=30-500；de=rhoi=rhos=.25a，Lx=2πa、Ly 扫描，主 Δ'a20；νcoll=1/(Δt M^4)，νH=.25(Δx/π)^6/Δt，六阶空间超扩散。

核实的发现　主例重联峰 t22.7τA、耗散峰 29.4τA；电子相混热化沿分离线，M 变化对主重联结果影响较小；大盒峰率约.2vABy/c。

限制与未完成问题　Landau 标签含高阶矩空间超扩散及超碰撞；没有离子不可逆加热竞争。约 60% 初始磁能电子热化不是 Qi/Qe，且对应大盒数值未画出；忽略常规电阻但保留碰撞的形式不一致作者已说明。

本报告判断　模型身份、温度/能量/熵产区别及跨文献判断见独立加热专题；不把本篇单独作为普适分配定律。

4.65　Stanier2013：2013 年

Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak[30]

Adam John Stanier; P. K. Browning; Mykola Gordovskyy; K. G. McClements; M. Gryaznevich; V. S. Lukin.

核读范围：arXiv1308.2855v1 全部 12 页；**图表**：图 1-12、表 I 与模型式 1-5；算法页及图 3-12 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Stanier2013.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MAST 合并二维平面与环形轴对称可压缩 Hall MHD，电子无惯性、标量 pe；pi=pe=p/2，电阻/超电阻热、离子黏性、各向异性热传导。

计算 / 实验细节　L0=1m，B0=.5T、Bp0=.1T、n0=5e18/m^3、Te=Ti10eV，di=.145m，tau0=.29μs。HiFi 四阶 Jacobi 谱元；通常 180×360 单元 (720×1440 有效点)，拉伸最小 dz=.23mm；低超电阻 360×540 单元。Crank-Nicolson 自适应隐式，MHD dt 上限.05tau0、Hall.01；eta1e-5、mu1e-3、超电阻 1e-6 至 1e-10。R .2-2m、Z±2.2m 导体壁；环形无滑移，平面滑移；两绳半径.4m、总电流 268kA，无初始线圈形成过程。

核实的发现　电阻小到约 1e-5 产生磁压堆积、反弹和速率振荡；改变超电阻呈厚片、易生中心岛的中间态、薄层开放 X 三种情形。平面对称性使中心岛滞留并阻塞合并；环形几何破坏对称后岛可排出，合并成嵌套磁面球形托卡马克。Hall 电子平行压缩形成四极样密度结构，叠加环形内侧压缩，产生沿实验诊断弦的双峰密度，外峰随合并消失。

限制与未完成问题　作者增强黏性和超电阻以便计算，eta 热导固定、pi=pe；没有独立 Te/Ti 演化、FLR 和电子惯性。降低超电阻同时改变局地加热和 rho_s，不能只当作几何参数扫描。低超电阻峰率双网格差.2% 只覆盖生岛前时间，未保证后期所有岛统计收敛。模拟每 20tau0 约 5.8μs 与实验.1ms 采样不等，峰密度也不相同；相似剖面是定性解释而非逐时定量匹配。实验初始磁结构无法反演，只估绳宽/总电流；q>1 不等于全面三维稳定性已证明。

本报告判断　对用户关心的新现象特别有用：装置几何能改变岛是否排出、密度诊断呈什么形状；验证必须包括几何和仪器弦位。

4.66　Yoo2013：2013 年

Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma[119]

Jongsoo Yoo; Masaaki Yamada; Hantao Ji; Clayton E. Myers.

核读范围：PRL110 215007 正式版全部 5 页，正文 1–4、参考文献 4–5；PPPL 作者公开 PDF；无文内附录。；**图表**：图 1–4；直接查看 PDF2–4 页，核对电势及误差棒、离子流/电功、谱线拟合与下游温度剖面。PDF 特殊字符提取失真处以页面图像为准。.

打开本地 PDF：papers/Yoo2013.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 近反平行、无外加导引场氦放电实验；浮动电势与电子温度换算等离子体电势，电子动量平衡积分另作一致性检验，与离子光谱/流速比较（2026-11-13 纠正原摘要）。

计算 / 实验细节　从 4200 余次放电按重现性筛选，充气压 4.5mTorr。磁探针径向最高.6cm、轴向 3cm；17 针浮动电势阵列最高.7cm。He II468.6nm 谱用 13 个 Gaussian 处理精细结构；时间分辨 5.6 微秒、空间 3–4cm；Mach 流速用光谱校准。Te≤12eV，电子均程 8–12cm，片半宽约 2cm；X 点经典电阻项约占重联电场 10%；2026-11-13 复查：电势由浮动电势和 Te 换算，电子动量平衡积分是独立一致性检验。

核实的发现　电势井在 X 线附近约 10V、下游约 35V 并变宽；500–800V/m 面内场在小于 di 的尺度上将离子加速至约.5VA。面内场对离子电功在下游局域达 20–50W/cm^3，面外电功约 2–8W/cm^3。Z≈9cm 后流速趋饱和而温度升高；温度横向峰比出流分布窄。电势重建中电子压力梯度不可忽略。

限制与未完成问题　三维和时间变化由跨放电二维扫描近似；离子温度测量有空间平均，忽略精细谱线会高估 15%–25%。下游密度 5–8×10^13cm^{-3} 使离子均程降至 2–5cm，局部碰撞与再磁化可能参与；作者也保留波粒、势阱反弹及装置边界解释，明确未解决唯一热化机制。

本报告判断　把 L272 回引的原实验单独核读，建立测得电势/加速/升温与后续随机加热解释的证据层级。支持能量进入离子的空间路径，不能直接当成某一无碰撞熵产机制已获唯一实验确认。

4.67　Andres2014：2014 年

Effects of electron inertia in collisionless magnetic reconnection[14]

N. Andrés; Luis Martin; P. Dmitruk; Daniel Gómez.

核读范围：arXiv1312.2437v2 1-8 全部；**图表**：图 1-5；式 28、图 4 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Andres2014.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　常密度不可压、标量压力、完整电子惯性准中性双流体，非全 Maxwell；伪谱、无显式电阻 / 黏性。

计算 / 实验细节　周期 2pi×2pi，双 tanh 半厚 2pi*.02, psi 扰动.02cos x, Hall .1；网格 512^2-2048^2；me/mi .015 及 1/1836；总能误差 <1e-8, 初始零两类螺度维持 1e-15。

核实的发现　随分辨率提高理想 MHD 与 Hall 的伪重联趋零，而有限惯性通量趋非零；真实质量比案例峰值接近.1，质量比两值总体趋势相似。

限制与未完成问题　未扫描 Hall 与种子；守恒总能并非所有局地梯度准确的充分条件。真实质量比 de 约.00233，2048 网格 dx 约.00307，不能凭全局通量相近声称充分解析电子层。预印本式 28 右端印为 (2delta-1) 导致物理质量比下右端负，与图 1 实频不相容，报告不照抄。

本报告判断　最强证据是无惯性对照加网格扫描；结果只在其标量不可压模型内支持惯性作用，不排除真实动理学压力张量。

4.68　Che2014Buneman：2014 年

Two-Fluid Description of Wave-Particle Interactions in Strong Buneman Turbulence[107]

H. Che.

核读范围：1-26（全部）；**图表**：PDF7、16-19、21 页视觉核验图 1、6-9 和完整流体方程；所有 26 页含图注/参考文献读完，无附录。.

打开本地 PDF：papers/Che2014Buneman.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　3D PIC 诊断与近似双流体闭合分析；未独立演化验证纯双流体重联，模拟未发展重联。

计算 / 实验细节　mi/me100, w0=.1di=de, Te=Ti=.04miVA^2；盒 1×1×2di，512×512×1024；x/z 周期、y 导电；电子漂移 9VA≈3vte、离子.9VA；|B|≈sqrt26 B0。

核实的发现　Buneman 拖曳和相混把电子漂移能转为平行热，磁能下降伴电子垂直热增长；局地流体矩预算近似刻画 PIC；离子主要协助波交换，弱热化。

限制与未完成问题　Dez(t) 仍需动力学理论/PIC 拟合；同前序 Che2013 运行，非独立验证；无实际重联、无实验比；式 19 为电子平行/垂直比。图 7 约化 PIC 熵增不等于精细 Vlasov 熵增，未熵粗粒化收敛验证。

本报告判断　模型身份、温度/能量/熵产区别及跨文献判断见独立加热专题；不把本篇单独作为普适分配定律。

4.69　E475：2014 年

Numerical comparison between a gyrofluid and gyrokinetic model investigating collisionless magnetic reconnection[41]

O. Zacharias; Luca Comisso; D. Grasso; Ralf Kleiber; Matthias Borchardt; R. Hatzky.

核读范围：arXiv1406.1334v1 物理页 1–29 全部；**图表**：表 I、图 1–11；图 8、11 视觉复核，并核对正文与图上定量差别.

打开本地 PDF：papers/E475.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　等温含电子惯性的四场 gyrofluid，对比 EUTERPE delta-f gyrokinetic PIC（陀螺离子/漂移电子）；无密度温度梯度的强导引场平衡。

计算 / 实验细节　sech^2x 平衡 C=.1、剪切长度 5。流体 1024×128 双周期伪谱/AB；EUTERPE 最多 1024×128，x Dirichlet、y 周期，B 样条有限元/RK4、最多 3e7 markers、最小 dt=.125，de 至少 16 格。表 I 质量比 1836/100、de=.1，rho_s=.3/.2，本文 beta 定义少常规因子 2。非线性 PIC 保留 m=0, ±1；流体初始种子与 PIC 噪声启动不同。

核实的发现　各代码先与各自线性射击本征解核验，再比较模型；线性中间波数仍可差 20%，减小剪切幅度后差约 12%。非线性小 Delta' 的饱和半岛宽、振荡频率吻合较好；ky 约 1.6 时岛宽差约 30%，ky1.9 约 10%，更近边界才趋一致。rho_s=.3 降至.025 时半岛宽约.04 不变；升高 Ti/Te 显著改变振荡频率而岛宽变化较弱。

限制与未完成问题　只验证小 Delta' 非线性，不能直接给 F672 大 Delta' 双加速背书。边界不同，虽在线性局地本征模中影响小；PIC 模滤波限制高次谐波。报告能量误差小于 2.5%，未换算对释放磁能的比例。正文称 Ti 扫描岛宽仅变 5%，但图 11 端点约.040→.049 及.046→.053，目测约 15–25%，不能无保留转述 5%。

本报告判断　高质量模型对照的价值在限定可测量与参数域；流体再现岛振荡频率不等于重建了俘获粒子的完整分布。

4.70　F679：2014 年

Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma[108]

Jongsoo Yoo; Masaaki Yamada; Hantao Ji; Jonathan Jara-Almonte; Clayton E. Myers.

核读范围：所记录版本全部 13 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 5, 8, 9, 10, 11；Figs 5, 9–13; Eqs (1)–(19).

打开本地 PDF：`papers/F679.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文是磁重联实验装置的氦等离子体实验，并以二维全动理学粒子模拟进行对照。电子动量平衡用于解释面内电势，光谱与探针分别约束离子温度和流速；模拟比较有、无离子碰撞的速度分布。文中的“双流体区域”指电子与离子解耦的实验状态，并不意味着所用数值模型是有限矩双流体模型。

计算 / 实验细节　实验气压为 4.5 毫托，磁通芯间距 42 厘米，离子皮肤深度约 8 厘米，无外加导场。4200 次放电约三成通过筛选，每点平均 7 至 15 次；离子光谱的空间、时间分辨率约为 3 至 4

厘米和 5.6 微秒。粒子模拟质量比为 400，初始两物种等温，电子热速为光速的 0.183 倍；离子碰撞频率及自由程相对特征尺度与实验匹配。

核实的发现　面内电场约 700 伏每米，高于约 200 伏每米的重联电场，主要离子增能由面内电势驱动。有序流能小于电势能下降量，下游出现更高离子温度。无碰撞模拟的较大温度包含多束混合；加入实验量级碰撞后，分布更接近麦克斯韦形态。电子能量沉积约 340 千瓦，经典电阻贡献估计仅约 59 千瓦。

限制与未完成问题　实验没有完整测得电子压力张量及热通量，约 300 千瓦的热损失估计具有较大误差，因此异常电子耗散是条件性推断，不能唯一归因于所见波动。二维模拟的部分反向离子束也未被实验空间分辨率辨认。完整网格、时间步和边界细节部分依赖前序方法文献，本次未复核全部前序实现或复算原始数据。

本报告判断　本文把电势加速与下游分布热化联系起来，支持轨道运动、再磁化和碰撞共同作用的解释，为流体闭合提供实验约束。它没有证明只加入霍尔项就能得到正确熵产，也没有给出普适离子与电子不可逆加热比。应把物种电场功、流动能、压力功和热输运分开核算；本次依据正式版全部 13 页及关键图式作出判断。

4.71　L202：2014 年

Fast, purely growing collisionless reconnection as an eigenfunction problem related to but not involving linear whistler waves[59]

Paul M. Bellan.

核读范围：PoP21, 102108(2014) 全部 9 页正文及出版封面，共 10 页；**图表**：图 1–3 与式 1–21；物理页 7 图 3 本征函数、κ 值直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L202.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　均匀密度、离子静止、电子压强各向同性 barotropic 的电阻/惯性 EMHD 线性 Harris 本征问题；两条二阶 ODE 共四阶，偶 Az/奇 Bz 耦合。

计算 / 实验细节　ξ=x/de，ε=de/L；N=500 半域 ξ∈[0, 40]，IDL 两点边值 +Muller 找根，a(0)=-1, a(40)=s(0)=s(40)=0，并调 κ 使 a'(0)=0。导数用一阶差分，未给收敛扫描。主要忽略 $(\mathrm{ky\ de})^2$，ν 归一化 0 或 2，ε=.1–1。

核实的发现　得到纯增长、非传播的局域模，$\gamma=\sqrt{2}\omega wh/\kappa$，κ 为约 5–18 量级；电子惯性/电阻正则化中心，完全略去二者则中心电流奇异。增长时间可以与 whistler 频率同阶，但这不等于存在驱动重联的线性驻 whistler 波。MRX 估 γ 约 10^6 s^-1，理论出流零点宽 1.2cm 仍小于观测 3.3cm。

限制与未完成问题　未计算非线性稳态率。以任意约 10% 种子把 1/γ 比作总重联时间只是量级论证；MRX 离子冻结/均匀 n 及几何近似有限。κ 弱变化只是所扫区间，不能宣称 me→0 普适常率。

文中把一般电阻 MHD 概括成二阶过窄：完整撕裂还需动量方程。J · E>0 表示场对粒子做功，不等于不可逆热化。

本报告判断　用于澄清色散时间尺度与真实波、线性增长率与非线性重联率的差别，同时保留其中心正则性证明。

4.72　Cassak2015：2015 年

Fast magnetic reconnection due to anisotropic electron pressure[6]

P. A. Cassak; R. N. Baylor; R. L. Fermo; M. T. Beidler; M. A. Shay; Marc Swisdak; J. F. Drake; H. Karimabadi.

核读范围：1-5（全部）；**图表**：图 1 各机制消融、图 2 场及欧姆项；图 2 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2015.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件；压力、热流与闭合；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D，电子 CGL 或离子 CGL 对照，独立关闭 Hall 与电子惯性；保留 eta=0.005 与 D4；压力演化省略 E · J 加热项。

计算 / 实验细节　204.8di×102.4di，4096×2048，mi/me=25，Bg=5，n=1，所演化物种初始 p_parallel=p_perp=5，另一种冷；D4=2.5e-5；coherent perturbation .014，velocity noise .04。

核实的发现　eCGL 在无 Hall、甚至无电子惯性对照中仍有开放排气和约 0.06-0.1 率；iCGL 或只把电子各向异性放动量方程则约 0.01 长层；面外四极极性反转。

限制与未完成问题　CGL 压强并不负责 X 点断线，电阻保留；仅某种各向异性状态方程有效，Egedal 闭合的慢结果在文中是私人通信；PIC 一致性提及但未展示图；过强或过弱导引场均转慢。

本报告判断　这是电子压力改变层几何的机制消融证据，不能称为任意各向异性都快或无电阻无 Hall 的重联证明。

4.73　F644：2015 年

Two-fluid numerical simulations of turbulence inside Kelvin-Helmholtz vortices: Intermittency and reconnecting current sheets[91]

C. Rossi; F. Califano; Alessandro Retinò; Luca Sorriso-Valvo; Pierre Henri; Sergio Servidio; F. Valentini; A. Chasapis; L. Rezeau.

核读范围：物理页 1–10 全部，含 HAL 与期刊封面，正式正文 122303-1 至 8，2015 年；**图表**：图 1–8、表 I、方程 1–10；谱图 3 与虚拟穿越图 8 直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/F644.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　实际是 2.5 维 Hall MHD，非三维；准中性无位移电流、无质量电子，双物种标量绝热 γ5/3；欧姆律仅-ue×B-∇Pe/n，无电子惯性/显式电阻/非对角压力。

计算 / 实验细节　初始剪切 uy=tanh[(x-Lx/2)/6]，B=(0, sin0.02, cos0.02)，n=1, Ti=Te=0.5；域约 400×402di，4096×8192，dx≈0.1, dy≈0.05；RK3、紧致差分、y 谱滤波与 x 六阶滤波，y 周期 x 透明边界。t1000 在 60×60di 局部涡内区用 Hanning 窗 FFT 与 PVI，谱滤波从 kdi>3 主导。

核实的发现　KH 涡破碎自发产生间歇薄片，面内谱从各向异性趋于各向同性；磁谱 MHD 段约-1.8、次离子段约-3.8 但后者区间很窄。磁增量胖尾/平坦度随尺度增强，高 PVI 集中在约 0.5–1di。抽选局部片有 X 形磁通、双侧电子入流与喷流；强导向场约 5 倍重联场且稍非对称，四极 Hall 场不明显。

限制与未完成问题　声称 R≈0.1–0.3 来自场角/流速纵横比代理而非 dψ/dt 或 X 点非理想电场；湍流非定常使稳态公式及所谓下界解释不严格，表 I 数值和文中比值也非逐项一致。二维标量电子方程缺显式物理断线项，磁拓扑改变需要数值滤波/耗散，未给非理想预算，不能据此证明真实电子耗散机制。无电子加热或熵产生诊断。局部 60di 窗口、kdi1–3 短区间不支持普适谱指数。

本报告判断　适合展示 KH 湍流中多薄片/间歇性与虚拟航天器诊断；不能把其高纵横比直接当精确普适快重联率，亦不宜把流体能量变化等同不可逆动理学加热。

4.74　F674：2015 年

Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma[109]

Masaaki Yamada; Jongsoo Yoo; Jonathan Jara-Almonte; W. Daughton; Hantao Ji; Russell M. Kulsrud; Clayton E. Myers.

核读范围：所记录版本全部 11 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 6, 7, 8, 9；Figs6–8, TableI, Eqs(2)–(6).

打开本地 PDF：`papers/F674_published.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文通过磁重联实验装置的局部测量建立有限控制体能量收支，并与装置几何下及开放边界下的全动理学粒子模拟比较。分别积分电子和离子的电场功，再区分有序流能、热储能与边界输运。它是实验能量预算和动理学对照研究，不能列为霍尔流体独立预测温度比例的数值证据。

计算 / 实验细节　本次读取 2015 年正式版 11 页，保留的 2014 年预稿按同一论文处理。开放粒子模拟采用真实质子质量比 1836，初始离子与电子温度比为 5，背景密度比为 0.23，背景电子温度

比为 0.76。模拟盒为 20 乘 20 个参考离子皮肤深度，网格为 5120 乘 5120，每种粒子约一百亿个；电流片半宽为 0.5 个参考离子皮肤深度。

核实的发现　图 7 给出离子和电子电场沉积率分别为 0.71±0.15 与 0.35±0.06 兆瓦，约为二比一；两物种的热能变化项却分别约为 0.27±0.10 与 0.26±0.10 兆瓦。后者还包含热储能变化和边界焓流差。表一改变控制体后，离子和电子占输入磁能的份额也发生变化，说明该比例与统计区域有关。

限制与未完成问题　预算中的热损失具有较大误差，部分离子损失只给出上限；输出能流、边界条件和采样尺度都会影响份额。粒子模拟虽然包含真实质量比，也未覆盖任意导场、等离子体压强、三维湍流及宏观装置。本文承接 2014 年实验成果，不能把两篇文章当成相互独立的复现实验；原始数据和模拟代码未在本次复算。

本报告判断　常被引用的二比一是物种电场能量沉积率比，既不是离子与电子温度比，也不是两物种不可逆熵产生热比。本文证明在指定实验及控制体内可以建立有用的分物种能量预算，但没有提供普适加热闭合。应同时报告有序流动、热储能、焓流和热损失，不能只摘取一个比值作为霍尔模型的普遍预测。

4.75　L213：2015 年

Electron-scale nested quadrupole Hall field in Cluster observations of magnetic reconnection[116]

Neeraj Jain; A. Surjalal Sharma.

核读范围：期刊正式版 719–724 全部 6 页，正文 719–723、参考文献 723–724；无文内附录。旧 arXiv10 页版本保留，主索引改为正式版。；**图表**：图 1–4，直接比较图 1 模拟嵌套四极、图 2 观测与图 4 虚拟穿越；核对 L1–L4 各分量过零次序。.

打开本地 PDF：`papers/L213_published.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子惯性 EMHD 模拟与 Cluster 单次电子尺度穿越对照；离子固定的早期电子动力学，不含电子动理学压力各向异性。

计算 / 实验细节　归一化长度 de、时间 Ωce^-1；图 1 比较 45 和 145Ωce^-1，早期次级点约 x=±16de。与 2001-10-01 磁尾 SC4 事件比较时取 B0=10nT、de=20km。模拟片半厚约 7de，观测 3–5de；采用约 20 度量级不确定性的法向坐标。本文未完整列出网格/时间步/收敛，依赖 2009 年前序方法论文。

核实的发现　主 X 点出流与较弱邻近 X 点入流相互作用，形成不直接围绕某个 X 点的新外四极；原四极扩展并嵌在其中。三点同强度的对照不产生同样嵌套，因此多个 X 点本身不是充分条件。模拟虚拟轨道可重现观测多个磁分量的过零次序和电场双极形；较弱外极约为主 Hall 峰的 30%。

限制与未完成问题　单航天器不能唯一分离空间与时间；未穿越 X 点，法向场约 1nT、坐标误差可达 20 度。观测片宽与模拟也非精确一致。固定离子模型的晚期外推没有在此直接检验；不能凭磁场形貌唯一认定机制，不能称直接拍到了完整嵌套二维结构。

本报告判断　与 L283 尘埃多物种嵌套四极形成关键对照：相似磁场图样可有不同尺度和生成机制；与 F703 谱线积分、L119 局部场测量共同说明需要合成观测和误差传播。

4.76　L214：2015 年

Explosive magnetic reconnection caused by an X-shaped current-vortex layer in a collisionless plasma[38]

Makoto Hirota; Yuji Hattori; P. J. Morrison.

核读范围：arXiv1503.06865 全部 26 页，完整内外区匹配、能量推导及参考文献；**图表**：图 1–11 及式 1–64；页 9/12/23 直接核验局域 X 层、能量和 7/4 拟合.

打开本地 PDF：`papers/L214.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷离子、有限电子温度双场惯性 RMHD；$\psi\pm=\psi-de^2\nabla^2\psi\pm\rho sde\nabla^2\varphi$ 分别冻结。专门取 de=ρs，四项正定总能守恒。

计算 / 实验细节　双周期余弦平衡，双方向 Fourier 谱 +RK4，最小 de=ρs=.005Lx 用 8192^2 波数网格；扫描 Ly/Lx 及 de，特征例 ky/α=.171。大 Δ' 近似 LxΔ' 约 $16(Ly/Lx)^2$。

核实的发现　所扫线性不稳定解分为 ρsΔ'≲.65 早饱和与 ≳.65 在 ε>ρs 后加速。非线性 X 电流/涡量层在局部生成，长度约 Lx，不由初始线性波长单独决定；磁能主要转入离子平面流能。匹配得局域岛位移 σdot=σ^2/(ly0τH)，外部测量位移 ε 满足 σ∝ε^3/4，从而 εdot∝ε^7/4，快于全局 kink 型对应解。

限制与未完成问题　.65 阈值、ly 约.5Lx 和 7/4 依赖本平衡、de=ρs 及试探几何；最优 ly 落在所设 Δ'c=100/Lx 近似域下界，不能当无约束全局最优化定理。薄层能量小不表示可先令 de=0 消除重联。ET 是约化扰动能，不是自洽热化。无动理学/Landau 阻尼，de≠ρs 推广本文未验证。

本报告判断　新增发现是局域非线性 X 层与外部位移的关系，而非仅重复快重联；《理论与数值基础》第 1 章应区分 σ 和 ε，避免混淆 2 和 7/4 指数。

4.77　L216：2015 年

Fast magnetic reconnection with large guide fields[4]

A. Stanier; Andrei N. Simakov; L. Chacón; W. Daughton.

核读范围：物理页 1–10 全部；1–2 封面、3–7 正文、8–10 图版；**图表**：图 1–3；物理页 5 的离散模型、图 1 和图 3 视觉核对.

打开本地 PDF：papers/L216.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　强导引场、低 beta、冷离子、等温电子约化两场；电子惯性 de 和声回旋半径 rho_s；电子超电阻与离子黏性有限，非零耗散支持准稳态 X 点电场。

计算 / 实验细节　岛合并四种两流体参数保持 h=max(de, rho_s)=.01，对比无两流体项；eta_H 扫描约 1e-11 至 1e-8，mu/eta_H=1e4。Harris 半盒 Lx/Lx0=.5–8，Lx0=100h；只改变出流方向长度，入流盒宽与初始片宽固定。

核实的发现　de>rho_s、无快速色散波时仍出现对 eta_H 近乎不敏感的速率。测得耗散层边缘 Bx 约随 delta/h 线性减小，delta<rho_s 后微观层长 w 约随 delta/rho_s 缩短；外层 Bxh 和 wv 近乎不依赖 eta_H。统一标度 delta~sqrt(eta_H*wv/Bxh)/h、Ez~Bxh^2*h/wv。局地归一 Harris 率在 16 倍出流长度扫描中无明显系统下降。

限制与未完成问题　三条离散方程不能独立选出全部五个层参数；Bxh、wv 仍需外部供给。系数有约因子 2 变化，厚度预测仅量级精度。尺寸独立不等于任意几何自相似放大。未证明全局层长为何被限制，不能把有限超电阻删成零后仍称稳态破冻结。

本报告判断　与 Rogers2001 构成直接反例链：快速色散波不是所测试低 beta 快重联的必要条件；应检查局地上游场和层长而非只比较最终 0.1。

4.78　L217：2015 年

Fluid vs. kinetic magnetic reconnection with strong guide fields[5]

A. Stanier; Andrei N. Simakov; L. Chacón; W. Daughton.

核读范围：arXiv1505.03794v1 物理页 1–17 全部；自动排版日期不作为出版年；**图表**：图 1–19 及式 1–22；图 11/12、18/19 视觉复核，全部图注核读.

打开本地 PDF：papers/L217.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　补全 L216 的约化流体与 VPIC 对照；陀螺黏性抵消使电子惯性中的平流速度为 E×B 速度 v，不是含抗磁修正的磁通输运速度 vs。

计算 / 实验细节　PIXIE2D Newton–Krylov/物理多重网格，二阶中心差分、对流 QUICK，CN 或 BDF2、X 点集中网格；未列逐算例格点与步长。无色散波的局地对照 VPIC 质量比 15.2、Bg17.4、vthe/c=.0625、omega_pe/Omega_cex=10、Ti/Te=.25；有色散波质量比 380.3、Bg12、vthe/c=.308、Ti/Te=.1、每格 16000 粒子。尺寸扫描另用 vthe/c=.25 及 omega_pe/Omega_cex=2.5 并作相对论 Alfven 归一。

核实的发现　流体与 PIC 的速率及宏观层长接近，有色散波案例峰值相差不超过约 10%；PIC 早期出现小岛/电子射流扭曲，流体未出现。无色散波的大盒更易产生二次岛，但小盒无岛也快，二次岛不是必要条件。固定 de 降低 rho_s 与固定 rho_s 增大 de 的双向扫描说明速率主要联系 h=max(de, rho_s) 及启动期间上游场变化，不能将与 beta 的相关性归因于色散分支消失。

限制与未完成问题　尺寸率用 4h 上游场、入流跨盒 Alfven 时间窗平均，并排除末 25% 磁通耗尽时段；不等于全时程一致。大盒 PIC 噪声改变生岛史。初始片宽、局地/初始场归一影响结论。图 14 与图 15 黏性设置不同，不能混用。层长自选机制仍未解决。

本报告判断　这是有参数、形态和归一控制的支持证据，同时清楚界定“率吻合”与“电子结构一致”的差别。

4.79　Ng2015：2015 年

The island coalescence problem: Scaling of reconnection in extended fluid models including higher-order moments[25]

Jonathan Ng; Yi-Min Huang; Ammar Hakim; A. Bhattacharjee; Adam John Stanier; W. Daughton; Liang Wang; Kai Germaschewski.

核读范围：1-8（全部）；**图表**：图 1-6 文字及图注；主要结果图已视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Ng2015.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电阻 MHD、Hall MHD 电阻 / 超电阻、十矩局地松弛对照 PIC；Fadeev 岛合并。

计算 / 实验细节　epsilon=.4, nb=.2n0, Lx×Lz=4piλ×2piλ, x 周期, z 导体 / 反射；mi/me=25，Ti=Te，beta=1；平均窗 0-1.5tA，模拟至 2.5tA。Hall eta=.009 或 etaH=1e-4 及 eta=1e-5；mu=.01。

核实的发现　Hall 区峰值 / 平均率对系统尺寸仅弱敏感，约 λ^-0.2 至 ^-0.25；十矩调低 ki 到 1/(3di) 改善小系统离子压力支撑，但大系统次级岛不断抛出，合并完成且缺少 PIC 弹回。

限制与未完成问题　本文比较 PIC 平均率约 λ^-0.8；引言早期研究的 ^-0.5 不可混用，盒子宽高比不同。十矩 ki 是可调参数，出现 PIC 中没有的次级岛；本文不是十矩全面成功的证据。

本报告判断　必须比较同几何、同平均窗；Hall 率可高 2-3 倍。

4.80　Numata2015Heating：2015 年

Ion and electron heating during magnetic reconnection in weakly collisional plasmas[104]

Ryusuke Numata; N. F. Loureiro.

核读范围：1-18（全部）；**图表**：PDF3、5、10、11、14、17 页直接视觉核验式 2.1-2.5、表 1、图 5-7/11-12 及附录 A 收敛图 A1。.

打开本地 PDF：papers/Numata2015Heating.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　双物种电磁 δf 陀螺动理学 AstroGK，2D 位置 2D 速度；不是流体模型。

计算 / 实验细节　Lx3.2πa, Ly2.5πa, Δ'a23.2, ky a.8；me/mi=.01, Ti/Te1, rhoi/a.25, rhoe/a.025；β=.01, .03, .1, .3, 1 时 de/a=.25, .14, .079, .046, .025；Nx256 Ny128(β1 时 Nx512)，Nλ=NE64；νii=νee=νei 是人为正则化选择。

核实的发现　低 β 电子相混熵产主导且晚于重联；β1 时部分晚期 Di/De 达量级 1；离子熵产集中次级岛内部，电子更多分离线/边缘；离子有平行和 FLR 垂直相混。

限制与未完成问题　瞬时 Di/De 不是积分普适 Qi/Qe；β 扫描连带 de 变化；人工相等碰撞率、低质量比、强导引排序；附录主要验证电子速度网格，作者承认应补离子分辨率；未实验定量匹配。

本报告判断　模型身份、温度/能量/熵产区别及跨文献判断见独立加热专题；不把本篇单独作为普适分配定律。

4.81　Tanabe2015MAST：2015 年

Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak[111]

H. Tanabe; T. Yamada; T. Watanabe; K. Gi; K. Kadowaki; M. Inomoto; R. Imazawa; M. Gryaznevich; C. Michael; B. Crowley; N. J. Conway; R. Scannell; J. Harrison; I. Fitzgerald; A. Meakins; N. Hawkes; K. G. McClements; T. O' Gorman; C. Z. Cheng; Y. Ono; The MAST Team.

核读范围：所记录版本全部 5 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 2, 3, 4；All Figs1–5; experimentgeometry, Te/ne/Titomography, timeevolution, guidefieldscan.

打开本地 PDF：papers/Tanabe2015MAST.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文是球形托卡马克的强导场双环合并实验，以汤姆孙散射测量电子温度和密度，以离子多普勒层析重建温度空间分布，并与已有双流体模拟比较。实验同时讨论电子与离子的碰撞能量交换、各向异性热输运及封闭磁面约束。论文自身不进行独立霍尔模拟，温度结构的符合是对具体模型解释的实验约束。

计算 / 实验细节　环向导场约为 0.3 至 0.8 特斯拉，重联场约为 0.07 至 0.15 特斯拉；离子皮肤深度约 0.1 米，离子回旋半径小于 0.01 米。电子诊断分别为 300 和 130 通道，空间分辨率约 15 与 10 毫米；离子诊断为 32 弦碳离子光谱层析。二维剖面组合多个放电脉冲和测量位置，重联场依据合并后磁平衡重建估计。

核实的发现　电子在重联中心附近形成宽约 2 至 5 厘米的热点，温度在小于 1 毫秒内由约 10 升到 200 电子伏；离子温升分布在出流及下游停滞区。经过约 4 至 10 毫秒的两物种能量交换时间，两个温度剖面均形成三峰。更高导场使中心电子热点更尖，但所测下游离子温度基本不变，与较弱导场机制的趋势不同。

限制与未完成问题　原文明确指出缺乏直接磁探针测量限制了热点成因的判别。黏性、压缩阻尼与输运解释依赖模型，温度图并不是完整局地功率或熵产预算；杂质离子温度与主离子温度的对应也依赖诊断和碰撞条件。全部二维点并非单次放电同时测得；独立诊断论文、学位论文和原始脉冲数据未在本次重新分析。

本报告判断　这是双温流体建模线的重要实验支撑：原文直接引用 L223，并将下游温升与含碰撞黏性耗散的双流体结果联系。但热点位置相似不足以唯一验证闭合，强导场下约束增强和驻留时间延长也会改变最终温度。该文支持具体装置中的局部加热研究，没有给出普适物种分配比；正式版 5 页及全部五幅图已核读。

4.82　Wang2015：2015 年

Comparison of multi-fluid moment models with particle-in-cell simulations of collisionless magnetic reconnection[68]

Liang Wang; Ammar H. Hakim; A. Bhattacharjee; K. Germaschewski.

核读范围：1-15（arXiv v3 全部）；**图表**：图 1-10 及式 20-24、36；图 4、8-10 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Wang2015.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　五矩和十矩全 Maxwell，局地 Hammett-Perkins 松弛；k0e=k0i=1/de 为 targeted，10^4/de 近五矩。

计算 / 实验细节　主 Harris 例 Lx×Ly=100×50di, a=.913di, nb=.3, Ti/Te=5, mi/me=25, vA/c=1/15, 扰动.1；流体 4095×2047（约 8 格/de），PIC5760×2880（约 12 格/de），每物种 2.7e9 粒子。另有 mi/me=25, 100, 256, 400 质量比扫描。

核实的发现　图 4 通量时间史明显不同；同重联磁通下 targeted 十矩的 X 点附近电子流和非对角压强较接近 PIC，五矩及强松弛出现 PIC 没有的磁岛链。质量扫描给出电子层长约 (me/mi)^(3/8)、厚约 (me/mi)^(1/3)。

限制与未完成问题　对比结构常取不同时间（图 10 PIC75、流体 132.5）；Pxy 峰值 PIC 约.024 对流体.006，标量化仍偏强；下游欧姆项峰位不一致、抵消不足。真实质量比层长 12-17de 和厚.4-.6de 是外推，不是直接计算；无完整热流张量检验。

本报告判断　能复现部分局地压力支撑，不能写成重联全过程或所有压力分量定量吻合；局地闭合参数仍需选择。

4.83　Andres2016：2016 年

Influence of the Hall effect and electron inertia in collisionless magnetic reconnection[19]

N. Andrés; P. Dmitruk; Daniel O. Gómez.

核读范围：arXiv1509.01169v1 1-8 全部；**图表**：式 15-16 与图 4-6 视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Andres2016.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　同常密度不可压惯性 Hall 双流体，无显式耗散；提出准稳态局地量纲标度。

计算 / 实验细节　周期 2pi 方盒, 2048^2, me/mi=.015, Hall λ=.07 至.16 步长.01 共十组，初始片厚 2pi*.02、psi 扰动.02cos x；另 λ.1 比较 me/mi .015 与.15。

核实的发现　电流拟合厚度 delta 约 (1.3±.3)lambda_e^(1.06±.07)；固定设置中 Bin 约.25-.3、半长约.45-.6 变化弱；准稳态率 r 约 (.11±.07)λ^(.98±.03)，增 Hall 时峰值提前。

限制与未完成问题　只是 2.3 倍参数窗；取 delta 与 Bin 近恒定时段，非严格稳态；局地改用 B0=Bin, L0=Delta 才写 r=λ，实际原归一化系数约.11。预印本式 15 惯性旋度项符号、式 16 两等号不一致；严格对称 X 点若停滞且稳态，标量压力无电阻模型不能用稳态对流惯性独自支撑 Ez。

本报告判断　数值有限窗线性趋势可记录；稳态 X 点解析推导需保留时间惯性或澄清局地估算位置，不能直接推广普适长度规律。

4.84　E448：2016 年

Laboratory Observation of Resistive Electron Tearing in a Two-Fluid Reconnecting Current Sheet[124]

Jonathan Jara-Almonte; Hantao Ji; Masaaki Yamada; Jongsoo Yoo; W. Fox.

核读范围：OSTI 作者稿全部 5 页；**图表**：图 1-5；图 2-5 视觉核对，含误差带与统计定义.

打开本地 PDF：papers/E448.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 碰撞氩等离子体，亚离子电流片，测得 Hall 场；电子惯性可忽略，Spitzer 电阻破坏冻结。

计算 / 实验细节　上游 n 约 5e19/m^3、Te3eV；片内 2e20/m^3、Te4eV；de.5mm< 平均自由程 2mm< 半厚 9mm«di20cm。约 400 探针，最佳径向 6mm、流出方向 3cm；O/X 插值加 Poincare-Hopf 绕数、时间过境校验。200 放电、约 500 形成事件；每放电 6.4μs 时间窗，Alfven 时间 8.8±3μs。

核实的发现　S 不足 100（主要图约 10-50）即有单磁岛及链；平均岛数和片长宽比随 S 增大。超过 3/4 形成事件电场增强；平均一个岛对应全球归一化率约 10% 增加；无岛时已有.1-.2 快速率。长薄、强 Hall、电子仍碰撞的电流片没有自动变成 de 宽的开放 X 形。

限制与未完成问题　未完成含实测密度剖面、压缩性、Hall 四极场与有限长宽比的二维本征计算，故抵触的是不适用的单流体阈值，未唯一证明具体电子撕裂机制。径向分辨率仅约半厚的 2/3，不能据此确定电子子层；岛数有大方差，电场增强是统计关联。三维结构未解决。

本报告判断　非常适合检验可压缩电阻 Hall 模拟：需复现实验平衡与驱动，不能把 Hall 效应与无碰撞等同。

4.85　F611：2016 年

Hybrid simulations of magnetic reconnection with kinetic ions and fluid electron pressure anisotropy[65]

A. Lê; W. Daughton; Homayoun Karimabadi; J. Egedal.

核读范围：LANL 接受稿全部 18 个 PDF 物理页：第 1 页机构封面，稿件编号 1–17 页；正文 1–15 页、参考文献 15–17 页；无文内附录。；**图表**：图 1–7、式 1–17；直接查看电子层、各向异性、两组率曲线和 Hall 场剖面，特别是图 7 时间对齐说明。.

打开本地 PDF：`papers/F611.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　H3D 混合模型：PIC 离子、无质量准中性电子，保留 Hall、各向异性电子压力及电阻/超电阻。旋转对称压强状态方程在弱俘获等温与强俘获 CGL 极限间插值；与等温混合和全 PIC 比较，不是完整电子动理学或十矩。

计算 / 实验细节　force-free 与 Harris 两种初值；40×20di 域、混合 1024×1024 格、全 PIC5120×2560 格，每动理学物种约 400 粒/格。PIC 质量比 400、ωpe/Ωce=2，x 周期、z 导体反射；片半厚 di、Ti/Te=5、βe=.1；导场比分别.3 和.2。率在 X 线周围边长 2di 方盒平均；Harris 混合种子更大并按初始已重联磁通作时间平移。

核实的发现　加入各向异性后复现跨数个 di 的延长电子电流层；等温电子没有同样长层。Fe=μ0(pe∥-pe⊥)/B^2 在 force-free 例峰值约.7，Harris 长层处大于约.5。Harris 的 X 线附近面外磁场增强至背景的约 1.5–2 倍，图 6 剖面存在双峰而非中心单峰。三种模型后期率仍接近，早期增长史不同。

限制与未完成问题　Harris 闭合需要沿二维磁通标签追踪上游值，并额外修改归一化密度以避免中心出现非物理各向异性；不是任意几何自动适用的本地状态方程。无导场的非旋转对称压力、复杂三维非局域闭合未解决。本稿未列出 η、ηH 的具体取值及独立收敛扫描。PIC 质量比 400 使部分电子仅边缘磁化，层长比混合短。

本报告判断　提供相近总率仍需检查层长和 Hall 场的直接对照。与 Cassak2015 并列时，应区分两种电子状态方程；作者明确这里的插值闭合本身没有产生无 Hall 快速支。新增推导放《理论与数值基础》第 1 章，缺失计算输入明确留空。

4.86　L210：2016 年

"Ideal" tearing and the transition to fast reconnection in the weakly collisional MHD and EMHD regimes[137]

Del Sarto, Daniele; Fulvia Pucci; Anna Tenerani; Marco Velli.

核读范围：arXiv1511.00035v1 物理页 1–15 全部，含附录 A 与表 I；PDF 自动日期 2018 与上传年不同，期刊年另核对；**图表**：图 1–3、表 I、式 1–22 与 A1–A3，图 2 两种归一化增长谱直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L210.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　两场惯性 RMHD 与惯性 EMHD 两个极限；随后加入 $\rho\tau^2=\rho s^2+\rho i^2$ 有限拉莫尔修正。本文明确没有解中间全 Hall 介导体制；无完整非线性模拟。

计算 / 实验细节　解析边界层加数值线性本征求解，Harris 平衡及一般 Δ'∝k^-p。全局 $\varepsilon d^*=(de/L)^2$，RMHD 时钟 L/VA，EMHD 时钟 $L^2/(di\ VA)$；临界长宽比需足够容纳最快模，通常 L/a≥ 约 20。图 2 扫 εd* 至 10^-12，临界峰约 0.39 和 0.37 各自逆时钟。

核实的发现　电子惯性小仍可在足够薄片上得到宏观时间的增长。Harris 惯性 RMHD 有 a/L≈(de/L)^2/3；EMHD 解析指数对 εd* 为 5/28，数值约 3/16，两者应区分。ρτ≫de 时 Harris 得 a/L≈(de/L)^1/3(ρτ/L)^1/3，较冷极限容许更厚临界片。对次级拉长薄片重新归一化，提出解释非线性阶段增长加快的候选机制。

限制与未完成问题　'理想'是宏观增长时间而非 η=de=0 的拓扑变化，且增长率不等于非线性归一化重联电场。EMHD 解析大 Δ' 关系借自特定分段平衡，有限 de/di 尺度分离不足会破坏渐近。次级爆发解释未以本文非线性模拟验证；忽略沿层流动的稳定性影响。忽略电阻须 $\eta m \ll \gamma de^2$，正文讨论正确而结论段反向不等号不可照抄。部分 k 重归一化符号和表 I 有印刷问题，报告自洽重推，不沿用不明缩放。

本报告判断　适合《理论与数值基础》第 1 章完整教局域/全局时间与小/大 Δ' 匹配，突出触发阈值而非承诺普适速率；保留 RMHD、EMHD 和全 Hall 三个范围区别。

4.87　L223：2016 年

Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona[96]

P. K. Browning; S. Cardnell; M. Evans; F. Arese Lucini; V. S. Lukin; K. G. McClements; A. Stanier.

核读范围：PDF 1–16: all body, methods, results, discussion, figures/captions, references; no internal appendix；**图表**：Direct PDF visual: Eq.1–5 and definitions (pp3–4), Fig.3 (p7), relaxation equations/Figs.4–8 (pp9–10, 13–14); remaining figure captions read in full text.

打开本地 PDF：papers/L223.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　采用二维直角和紧环径比轴对称环面 Hall MHD 描述同向电流磁通绳合并，保留电子漂移、电子标量压力、电阻、超电阻及热传导。前列方程仍演化总压，图 3 才给独立离子、电子温度的初步扩展：离子由黏性供热，电子由电阻和超电阻供热。后半篇的 Taylor 弛豫计算只估计磁能释放，不能混作物种加热模拟。

计算 / 实验细节　基准密度 5×10^{18} m^{-3}、长度 1 m、磁场 0.5 T，初始 Ti=Te=10 eV，归一化离子惯性长度 0.145。典型电阻 10^{-5}、离子黏性 10^{-3}、平行电子热导 0.1、垂直离子热导 10^{-7}；图 3 超电阻 10^{-8}。使用 HiFi 及前序模型，但本文没有报告该两温加热图专用的网格、时间步或收敛检查，完整两温方程亦未列出。

核实的发现　图 3 的初步两温环面计算产生下游离子双热峰，峰值可达 keV 量级，与早期 MAST 高驱动观测有定性联系；电子热源主要跟随超电阻涉及的电流梯度，分布不同于离子。中心或空心电子温度与岛排出的联系仍是初步解释。弛豫模型另得到几何相关磁能释放及近似极向磁场平方标度，但不能给出热量物种比例或空间分布。

限制与未完成问题　超电阻是自由模型参数，并直接影响电子加热位置；有限标量闭合不描述完整粒子分布或非热尾。离子热峰高于后来较低驱动实验，实验比较仍属初步，不能称为加热比例定量验证。Stanier2014 学位论文、源代码和独立数据未核读，本文也未给两温热图的专门收敛证据；没有推导普适 Qi/Qe。

本报告判断　本篇直接证明两温 Hall 扩展能够在指定耗散、传导和几何条件下计算离子与电子局地热图。证据应表述为“模型能做条件性热预算和实验比较”，不能表述为“Hall 项本身提供不可逆热化”或“物种分配已经普遍解决”。同时必须区分前列总压方程、后续初步两温计算和独立磁能弛豫估计三种证据。

4.88　L224：2016 年

A two-fluid study of oblique tearing modes in a force-free current sheet[78]

Cihan Akçay; W. Daughton; V. S. Lukin; Yi-Hsin Liu.

核读范围：arXiv1601.07220v1 全部 9 页，附录 A1–A10 及参考文献完整；**图表**：图 1–4、表 I、超电阻阈值式 7，图 1 斜角峰与图 2–3 耗散扫描直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L224.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　HiFi 全双流体准中性模型，等温电子/绝热离子、电子惯性、标量压力加简单运动黏性，无陀螺黏性；与 VPIC 对照。通过旋转无力平衡逐个选斜模，实际算二维线性过程，不是三维多模非线性湍流。

计算 / 实验细节　无力片 λ=0.5di，域 2π×2πdi，mi/me=100 并部分试 400；bg=1, 2.5, 4, 10，βe=.09, .025, .01, .02，Ti=Te。η=0, ηH=10^-7，扫描 4×10^-8–10^-3，μ=κ=10^-4 并部分扫描。HiFi 三/四阶谱元非均匀格 de 内 8–11 点，BDF2；沿片周期、法向导体滑移壁。只演化扰动而冻结平衡，排除超电阻改变初始梯度。

核实的发现　强导向场中最快线性撕裂偏离片中心：bg10 时 θ≈3–4°，增长约正向模式两倍；双流体和 PIC 均有此趋势。两流体绝对率较 PIC 低 25–30% 或某些角度近两倍。提高 ηH 使斜角峰移回 θ=0，改变不稳定模式选择；ηH≤ 约 10^-7 增长趋于收敛，与 $\eta H_{crit}=\gamma de^2 w^2$、$w=de^2\Delta'/(2\sqrt{\pi})$ 相符。早期 Eparallel 主要由 ∂tve 支撑，离开共振层超电阻贡献增加。

限制与未完成问题　简化两流体/动理学边界层理论均给过平的斜角谱，不能准确预报增强；附录提出平衡电流梯度 j' 修正但未解完整本征问题。两流体理论与动力学理论 $\sqrt{(2/\pi)}$ 系数差不能解释所有角度误差。电子恒温丢失超黏热，作者称该参数下可忽略但无完整能量图。w 仅约 0.17–0.4de，单报 de 格数不能替代内层收敛；无三维线绑边界或非线性验证。印刷动量通量质量权重等不直接抄为通用方程。

本报告判断　高价值模型比较：可复制斜模优势，却不能视为全谱/加热完全等效；尤其应在数值章强调耗散对‘最强模式是否斜向’的定性影响。

4.89　L227：2016 年

Magnetic reconnection and modification of the Hall physics due to cold ions at the magnetopause[117]

Mats André; W. Li; Sergio Toledo-Redondo; Y. V. Khotyaintsev; Andris Vaivads; Daniel Bruce Graham; Cecilia Norgren; James L. Burch; Peter Lindqvist; Göran T. Marklund; R. E. Ergun; R. B. Torbert; Werner Magnes; Christopher T. Russell; Barbara L. Giles; Thomas Earle Moore; M. O. Chandler; Craig J. Pollock; D. T. Young; L. A. Avanov; J. Dorelli; Daniel J. Gershman; W. R. Paterson; B. Lavraud; Y. Saito.

核读范围：HAL insu-03669467v1 共 9 页（封面 1 页 + 正式期刊 6705–6712 全部 8 页）；正文及参考文献。；**图表**：图 1–4，关键为图 3 分布和图 4 四星 Ohm 预算；直接查看 PDF6/7 页。.

打开本地 PDF：papers/L227.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2015-11-12 MMS 日下点磁层顶分离面观测；热、中温、冷离子与电子的多组分广义 Ohm 关系，不是普通单离子双流体模拟。

计算 / 实验细节　四星间距约 10km，电子/离子分布 30/150ms；分离面宽 70–100km、移动 70–80km/s；冷离子约 50eV，ρc 约 25km，电子约 1km，中温/热离子约 100/320km。正常场约 10mV/m，部分短脉冲 >20mV/m。

核实的发现　热离子已去磁时，冷离子仍与电子共同 E×B 漂移而部分抵消 Hall 电流；冷离子占一半附近 Hall 与冷离子漂移项相当，电子压强散度另供 2–3mV/m，合计支持约 10mV/m 法向场。

限制与未完成问题　单事件的分离面正常电场预算，不是 X 线重联电场测量；最终 E 使用 E · B=0 重建、Ex 加 2mV/m 校准，未采用轴向探针最终场；压力散度和 curlometer 为空间平均。不能从此推出普遍重联率抑制量或局部不可逆加热。

本报告判断　扩充两尺度图像为温度分群多尺度；单一离子标量压强闭合不能保留冷/热离子不同磁化状态。

4.90　L230：2016 年

Role of electron inertia and reconnection dynamics in a stressedX-point collapse with a guide-field[60]

Graf von der Pahlen, J.; D. Tsiklauri.

核读范围：arXiv1608.01397 全部 11 页，包括方法、二维 Ohm 分解、三维结构、分布函数及参考文献；**图表**：图 1–8；页 4 参数、页 6 图 3 Ohm 平衡、页 8 图 5 三维涡管直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L230.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　EPOCH 相对论电磁 PIC，属于两流体闭合的动理学对照，不能列为 Hall MHD 模拟。受压 X 点 α=1.2，平面开放边界吸收粒子/辐射场，z 周期；Bg=0–.6BP。

计算 / 实验细节　mi/me=100，Te=Ti=6×10^7K；2.5D400^2、Δ=λD、500 粒子/格；3D200×200×100、Δ=2λD、200 粒子/种/格；盒约 4di、z 长一半，至 tωpe=500。正文 n=10^16 m^-2 为单位笔误，按体密度 m^-3 解释；其 B0=.03207T 与 VAe=.1c、n=10^16 不一致，后两者应给.003207T，不能无核对搬作太阳量级。

核实的发现　Bg 增大先延迟启动；.6BP 时磁岛和第二 X 点出现，移动 X 点处对流惯性 ve, x∂xue, z 显著支撑重联电场，短时率超过低 Bg。三维出现两侧反向倾斜的电子涡管，约 ±16°；平面貌似逆流移动实为倾斜管沿 z 运动投影。高 Bg 电子分布形成并随后平坦化的尾部凸起。

限制与未完成问题　图 3 高 Bg 惯性、压强及时间惯性存在强局部抵消，不能说压强项处处消失。三维未算完整 Ohm 平衡或磁连接重联率，只比涡管/电流结构；Q>0 不是重联证据。文中斜模条件 k×B=0 为笔误，应为 k · B=0。四 di 小盒、开放边界、质量比/三维网格限制外推；导向场数值阈值依赖所用 BP 定义。

本报告判断　为流体模型需保留全对流惯性提供反例和检验目标；三维结构、非热分布不应冒充 Hall 流体已预测结果。

4.91　F697：2017 年

An Explosive Scaling Law for Nonlinear Magnetic Reconnection and Its Insensitivity to Microscopic Scales[39]

Makoto Hirota.

核读范围：PFR12, 1401010(2017) 全部 8 页，含太阳量级外推与全部结果；**图表**：图 1–8 及式 1–23；页 3/6/7 直接核验冷等离子体岛链、热离子/电子及电阻扫描.

打开本地 PDF：`papers/F697.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　低 β 强导向场简化 gyrofluid，Padé 极化 ne-ni0=∇^2(1-ρi$^2\nabla^2$)^-1φ，电子惯性及有限 ρs；电阻只作用 ψ-ψeq，人为维持背景。

计算 / 实验细节　双周期余弦片，Fourier 谱 +RK4，4096^2 并以 8192^2 复核 plasmoid；de/Lx=.005–.01、ρs 或 ρi 同阶，Ly/Lx=5.24/5.84，η=0, 2, 4de$^2\gamma$L0。

核实的发现　把 2015 局域 X 层 εdot∝ε^7/4 和磁能释放率 ∝(-δW)^4/3 延伸至热离子或热电子及有限电阻例；固定非线性幅度时速率弱依赖微尺度。冷 ρs=ρi=0 出现间歇 plasmoid，能量释放有波动且低于该拟合。作者明确承认 2013 工作 200 个 y 模及数值黏性漏掉次级岛，是分辨率改变现象判断的直接实例。

限制与未完成问题　不是全部四参数扫描或普适最快率证明；启动门槛/总时间仍依赖 δin，τrec∝δin^-3/4。磁能大部转为流能不等于加热。太阳示例取 VA=2.2×10^8m/s 约.73c、重联场.1T 大于导向场.01T，已超出非相对论强导向约化模型的可靠排序；.3 小时只能作为示意外推，非观测验证。

本报告判断　与 L191/L214 形成完整证据链，展示率的微尺度不敏感和启动时间敏感可以同时成立。

4.92　F798：2017 年

Extended MHD modeling of tearing-driven magnetic relaxation[84]

Joshua Paul Sauppe; Carl R. Sovinec.

核读范围：本地作者稿 13 页全部核读，包含模型、参数、连续松弛事件、模态分解、动量通量、限制和参考文献；引用的独立 2016 附录收敛材料未单独核读；**图表**：图 1—16 和表 I 全部核对；放大页 7 的 Hall/MHD 发电机竞争、页 11 的 Maxwell 与边界应力通量.

打开本地 PDF：`papers/F798.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　NIMROD 三维圆柱 RFP 扩展 MHD；比较普通 MHD、Hall 加简化电子惯性、再加一阶 Braginskii 离子回旋黏性。电子惯性主要限制 whistler 时间尺度，本研究测得它对碰撞 less 重联作用很小。固定离子/电子温度份额、忽略 Ohmic 和黏性加热，不能作完整热预算。

计算 / 实验细节　R/a=3，r-z 面 120×64 个双五次谱元，方位 Fourier m=0—5、轴向周期；r=a 无滑移、法向 B 固定、n/T Dirichlet，散度清理和小密度扩散。S=20000，比 MST 约低两数量级，Pm=1、χ/ν=0.1、β 轴心 0.1、di/a≈0.17、Ti=Te、电子质量增大 5 倍。无初始轴向/角向流，力自由顺磁箍缩，加小磁流扰动；跟踪多个松弛事件。

核实的发现　首次准单螺旋态崩解时 Hall 与 MHD 发电机共同展平电流；后续多螺旋事件中 Hall 项可反向抵消部分 MHD 项，净效应仍展平。主 m=1, n=6 贡献下降、n=5/7 增强与反向 Hall 相关。对应 Lorentz 力先于 Reynolds 响应，后者通常抵消前者；后续事件核心电流和速度改变量同向，与 MST 集合观测方向更一致。总磁松弛相近但动能响应不同；径向 Maxwell 应力输运动量占主导。

限制与未完成问题　不能把局部 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$H=0 误用为平均 Hall 发电机无效；该项在平均磁场方向的相关投影可非零。净轴向/角向动量主要来自模拟壁面的黏性/回旋黏性耦合，并非已解释实验自发转动源。遗漏平衡 pinch 流造成约 10% 到 22.5% 的特定动量通量误差，作者明确承认。少数事件不足统计比较，压力、电阻剖面简化且 S 偏低。

本报告判断　纳入直接扩展 MHD 的新现象：Hall 效应能协助也能阻碍磁松弛，不能一概表述为 Hall 必然加速；区分局部重联率、平均发电机与全局动量输运。

4.93　L236：2017 年

Fast Magnetic Reconnection: "Ideal" Tearing and the Hall Effect[53]

Fulvia Pucci; Marco Velli; Anna Tenerani.

核读范围：arXiv1704.08793v1 全部 7 页；**图表**：式 1-21、图 1-7；图 1-7 视觉核查.

打开本地 PDF：`papers/L236.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压缩均匀密度电阻 Hall MHD，Harris 反平行平衡；无电子惯性及压力。线性二维本征问题。

计算 / 实验细节　六阶两点本征方程、Lentini-Pereyra 算法；主要局地 Sa=1e5-1e8，di/a<1；未列完整网格/求根容差。以 Ph=(di/a)Sa^(1/4) 表征 Hall 层；数值拟合大 Ph 增长指数 zeta=.564±.007。

核实的发现　Hall 中间层变宽而内电阻层变薄；保留 Hall 对外内匹配的修改后，数值增长指数与朴素 2/3 估计不同。由拟合得到临界 a/L 约 S^(-1/3)(h sqrt(S))^.29，使全局 Alfven 时间的最大增长为约.41。

限制与未完成问题　指数.29 来自有限范围拟合，不是严格解析指数；要求 di/a<1 且全局 h 约 S^(-1/2) 至 S^(-.27)。ideal 指增长不随 S 减慢，并非电阻严格为零；未求非线性磁通率、动态片形成或三维斜模。原文 beta 误差传播写成 3 倍 zeta 误差不符合其式 19 导数；本报告只引用近似指数，不沿用该误差估计。

本报告判断　提供 Hall 改变破裂临界长宽比的线性证据；不能直接据此宣称真实动态电流片必在该宽度断裂。

4.94　L238：2017 年

Hall-mediated magnetic reconnection and onset of plasmoid instability[50]

G. Vekstein; K. Kusano.

核读范围：arXiv1704.06540 全部 21 页，强迫重联线性过程、次级撕裂推导及参考文献完整；**图表**：无数据图；式 1–47 逐段，页 14、18–19 公式直接视觉核验，区分归一化 di 和实际 di.

打开本地 PDF：`papers/L238.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压电阻 Hall MHD、无黏性无电子惯性；撕裂稳定的无力 Taylor 问题，B=(0, B0sinαx, B0cosαx)，导体壁 ±a 发生小 δcosky 形变，αa 约 1 且远离 π/2 失稳。

计算 / 实验细节　纯解析标度，没有模拟/网格。S=aVA/ηm≫1, d=di/a≪1，β>S^-2/5 容许不可压近似；通量用 B0δ 归一化。保留 ε=αa 和 ka 时两阈值 d1≈S^-1/3(εka)^-1/3、d2≈S^-1/5(εka)^-1/5。

核实的发现　区分 Hall 开始影响与 Hall 控制整个重联的两个阈值：d<d1 按 MHD 耗时 S^3/5；d1<d<d2 先 Hall 后回 MHD，虽然片厚已远小于 di；d>d2 全程 Hall，耗时 S^1/2d^-1/2。原因是理想 Hall 外层随时间缩窄至电阻层。Hall 可使次级撕裂增长更快却使最快波长更长、初生岛更少；在 Hall 电阻演化阶段另开多岛通道，区别于 MHD 流动停止后的 Rutherford 过程。

限制与未完成问题　条件 δlayer<di 不是普适充分判据，但本文结论针对小幅、受迫、特定时间序列，不能否定自发非线性 Hall 转换。所谓 Hall 快仍含 S^1/2，非 η 无关。次级岛仅估计 γ× 片寿命 >1，未积分时变增长、初始噪声及非线性岛竞争；无模拟验证。近边界稳定阈值的能量发散需非线性修正，不在主推导内。

本报告判断　重要的是双阈值、Hall 到 MHD 的反向转换可能性，以及‘增长更快 ≠ 岛更多’；为报告的不确定性与待验证方案提供可检验标度。

4.95　L241：2017 年

The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence[29]

Adam John Stanier; W. Daughton; Andrei N. Simakov; L. Chacón; A. Lê; H. Karimabadi; Jonathan Ng; A. Bhattacharjee.

核读范围：本地 12 页全部核读，包含模型、导引场扫描、系统尺寸扫描、镜模判别和参考文献；本地为 arXiv:1611.05933v1 作者稿，页首另有 2018 排版日期，不据此改动 2017 期刊年份；**图表**：图 1—10 及图注逐项核对；另放大查看物理页 4 的图 1、页 8 的图 6—7；未取得补充动画，动画不作为独立证据.

打开本地 PDF：`papers/L241.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维磁岛合并；比较 VPIC 全动力学、动理学离子/无质量等温电子混合模型、标量压力 Hall MHD 和双种 10 矩模型。Hall MHD 使用有限体积、BDF2、全隐式预条件 Newton–Krylov；10 矩使用局部隐式分裂与有限体积波传播，热流散度以各向同性松弛闭合。

计算 / 实验细节　Fadeev 平衡 ε=0.4，背景密度 0.2n0，Ti/Te=1，x 跨度 2πλ、y 跨度 4πλ；x 导体/粒子反射、y 周期，扰动 0.1B0。PIC 质量比 25、ωpe/Ωce=2。Hall/混合 η=10^-5 μ0 di VA0，ηH=10^-4 μ0 di^3 VA0；Hall 黏性 0.01 mi n0 di VA0。10 矩 ke=1/de、ki=1/(3di)。扫描 λ/di=5—25，另讨论 50；Bg/Bm=0—5.66，Bm=0.353B0。速率以 Bm VAm 归一，平均窗口 1.5 全局 Alfvén 时间；正文没有完整列出各算例网格和粒子数，不能据本文单独复现所有算例。

核实的发现　λ=5di 时，Bg 从 0 增至 B0（2.83Bm），PIC/混合峰值率分别增加约 51%/53%，Hall MHD 反降约 13%；强导引场下速率、喷流和堆积场相近。零导引场 PIC 喷流约为 Hall 的 1/7，主要由离子非旋转对称压力应力限制。平均率随尺寸在零导引场 PIC 约 λ^-0.8、Hall 约 λ^-0.25；Bg=B0 时四模型指数聚集于-0.27 至-0.33。强导引场 PIC 会生次级岛，而 Hall 仍为开放 X 形，却可有相近平均率。大尺度零导引场堆积区出现与镜模相容的斜向、随磁岛近静止的磁峰/密度凹陷。

限制与未完成问题　镜模进一步抑制重联的因果作用仍是猜测：色散计算用均匀双 Maxwell 假设，实测为非线性饱和阶段。10 矩闭合长度由小尺度动力学结果校准，零导引场较大系统会产生 PIC 中没有的岛。Bg=B0 的定量一致不表示压力分解一致；实际电流片宽度仍不同。质量比 25、二维、有限尺寸扫描，不能把指数或导引场阈值当普适定律。

本报告判断　纳入导引场促进重联、平均率与局部峰值区分、不同模型相同速率但不同拓扑、10 矩闭合失真四条主线；作为 Hall MHD 适用边界的直接比较证据。

4.96　Ng2017：2017 年

Simulations of anti-parallel reconnection using a nonlocal heat flux closure[26]

Jonathan Ng; Ammar H. Hakim; Amitava Bhattacharjee; Adam John Stanier; W. Daughton.

核读范围：1-5（全部）；**图表**：图 1-5 文字及图注；主要结果图已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Ng2017.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　全 Maxwell 十矩；非磁化三维 Hammett-Perkins 热流 Fourier 闭合，chi=sqrt(4/(9pi))；有限体积输运、局地隐式源与 FFTW。

计算 / 实验细节　Fadeev 岛、epsilon=.4, nb=.2, Lx×Lz=4piλ×2piλ, mi/me=25, vt, e/c=.35, Ti=Te, beta=1, ωpe/Ωce=2，10% 磁扰动；平均 0-1.5tA。

核实的发现　非局地闭合得到 1.20di 片宽，PIC1.15di，Hall .18di；离子压力支撑区与速度、非旋转对称度改善；平均率 λ^-0.45 比局地 ^-0.2 更接近 PIC^-0.8。

限制与未完成问题　仍未复现 PIC 尺寸标度，离子非旋转对称度偏低；次级岛影响速率；电子各向异性偏弱；非磁化闭合不应直接外推强导引场。Langmuir 阻尼测得.044ωpe，精确 Vlasov .034ωpe，存在约 29% 误差。

本报告判断　成功是特定离子结构改善与减少调参，不是所有动力学完全重现。

4.97　Yoo2017Heating：2017 年

Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma[110]

Jongsoo Yoo; Byungkeun Na; J. Jara-Almonte; Masaaki Yamada; Hantao Ji; V. Roytershteyn; M. R. Argall; W. Fox; Li-Jen Chen.

核读范围：所记录版本全部 18 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 7, 8, 10, 12, 14, 15；Figs4, 5, 8, 10, 11; Table1; Eqs5–10；2026-11-13 纠正定位：本地 PDF 图 10、11 在第 15 页，式 (10) 在第 14 页，图 8 在第 12 页。.

打开本地 PDF：papers/Yoo2017Heating.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文研究两侧密度不同的磁重联实验，并使用二维和三维全动理学粒子模拟解释电子加热及物种能量收支。实验重点测量低密度侧分离面附近的电场、温度和波动；模拟比较温度矩与速度分布形状的变化。因此它既约束空间非对称条件下的能量分配，也检验分布趋于麦克斯韦形态是否必然伴随额外净增能。

计算 / 实验细节　实验两侧密度比约为 8，重联磁场分别约为 145 与 168 高斯，残余导场小于重联场的一成，离子皮肤深度约 7.5 厘米。粒子模拟质量比为 900、密度比为 10，初始两物种等温，高密度侧热压与磁压比为 0.5。二维盒长为 10 乘 10 个离子皮肤深度、网格 1024 平方；三维第三方向长 3 个离子皮肤深度，增加 320 层网格。

核实的发现　低密度侧分离面具有增强的电子加热。图 10 中电子和离子沉积率分别为 0.35±0.07 与 0.44±0.09 兆瓦，占输入磁能约百分之二十五和三十一；两物种热能变化项均约 0.30 兆瓦。二维与三维模拟温度剖面相近，三维电子分布却更接近麦克斯韦形态，说明分布热化与净能量增长可以表现不同。

限制与未完成问题　实验波动与温升的相关系数约为 0.29，显著性水平约为 0.086，不能确立低混杂漂移波的强因果作用。模拟的电子温度、频率比和有限盒尺度与实验仍有差异。正文温度矩定义及表格密度单位存在排印疑点，应按标准定义和正文量级核对，不能据此反推代码错误。原始数据入口已记录，但本次未重新分析。

本报告判断　非对称实验下两物种沉积率相近，直接限制了对称实验约二比一结果的外推。三维波动可能促进分布散射而不显著增加温度，这提示流体闭合应分别接受能量预算和分布诊断检验。本文支持针对具体条件研究物种分配，但未建立跨装置、跨采样位置的普适比例；正式版 18 页及能量收支图已完整核读。

4.98　E553：2018 年

Using the maximum entropy distribution to describe electrons in reconnecting current sheets[93]

Jonathan Ng; Ammar H. Hakim; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：arXiv1808.07822v1 全部 6 页，含最大熵闭合推导与全部重建结果；**图表**：图 1–5，直接核验页 3 采样位置、页 4 图 2–4 的上游平顶、X 点三角形、Grad 负值区域.

打开本地 PDF：`papers/E553.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　从 PSC PIC 数据取矩，最大熵 f=exp(α · m) 重建 5/10/14/21 矩分布，并对照 Grad20；不是演化高阶矩的流体重联模拟。固定目标矩 U 时最小化 h(α)-α · U，Hessian=<mm^{T}f> 正定给对称双曲结构；14/21 含 $|v|^4$ 确保可积性，但并非所有物理可实现矩都在该指数族的参数域内。

计算 / 实验细节　反平行 Harris PIC 质量比 25、ωpe/ωce2、Ti/Te5；tωci20，上游/X 点/下游 1.7di 处边长 2.5de 采样盒，各约 10000 粒子，Newton 迭代求 α。分布以动量表示但使用非相对论 p=mev 闭合。

核实的发现　十矩捕获上游各向异性，十四矩的四次矩补平顶；X 点及排出区须 21 矩才近似三角形，仍丢失双峰与多次穿越轨道细节。Grad20 产生负分布，最大熵保持正性；增加矩数改善分布误差但计算代价大。

限制与未完成问题　未做 21 矩时演、稳定性或重联率验证；重建所用矩直接来自 PIC，不能把拟合成功当预测成功。PIC 噪声影响误差，Grad 比较使用 |f| 进入 Hellinger 式但未说明重归一化，非严格同类概率距离；作者 H 定义相当常用平方距离。闭合无粒子捕获历史信息；速度积分加优化每时步昂贵。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章推导约束熵极值和矩系统双曲性，《已解决与未解决的问题》第 2 章明确高阶矩的可实现性、计算成本以及分布细节的不足，避免把闭合论文算作新流体模拟现象。

4.99　L244：2018 年

A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia[70]

E. Tassi; D. Grasso; D. Borgogno; T. Passot; P. L. Sulem.

核读范围：HAL02049658v1 封面及正文 1–26 全读；物理页 1–27；**图表**：式 2.1–4.21、Hamiltonian/Casimir 推导及图 1–7；阻尼算子、图 3–6 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L244.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合；电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　从 Scott 型 gyrofluid 按 epsilon 低频、delta^2=me/mi、beta_e~delta^2 约化为六场；含离子 FLR、电子双温、电子惯性和非局地 Landau 闭合。实际重联只算冷离子、Ni=Tperpi=0、Tperpe 恒零的子模型。

计算 / 实验细节　delta=.1, beta_e=.05, lambda3；线性半盒 Lx46, Ly24pi, Lz96pi；非线性 ky1/12, kz1/48，Ly12pi, Lz48pi。显式 AB3、y/z 并行；非线性热流刚性使步长至多缩小 100 倍，改用单螺度坐标 y*=y+(kz/ky)z 的等价二维推进。全文未列具体格点数及绝对步长。

核实的发现　Landau 算子用局地平行梯度和磁场方向二阶空间平均的 Fourier 分母，非简单固定 k0 扩散。阻尼降低平行温度扰动、线性增长率，高 m 斜模可稳定；同一 gamma*t 上岛面积曲线相似，意味着真实时间中发展变慢，而非未受影响。饱和岛大小近似不变，细密度/电流/温度结构变平滑。闭合去除自由能，未出现动理学参考中的重联—加热延迟。

限制与未完成问题　斜单螺度不是多螺度三维湍流；没有热离子完整六场非线性验证。无 Landau 时数值能损约总能量.2%，却约为同期磁能释放 20%，不可忽略。未出现延迟可能是闭合过度耗散，作者提出高阶闭合问题。自由能损失解释为未解析相混合/电子加热，非直接分布函数测量。

本报告判断　给出可推导、可检验的闭合成功与失败并存例子；必须同时检验时序、饱和、能量预算，不能以一项吻合宣称动理学等价。

4.100　L250：2018 年

On the Hall-mediated resistive tearing instability of highly elongated current sheets[49]

Grigory Vekstein.

核读范围：arXiv1811.11401 全部 18 页，全部常 ψ/非常 ψ 体制及两张参数分区图；**图表**：图 1–2 与式 1–67；页 10/13 非常 ψ 公式及页 17/18 分区图直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L250.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电阻 Hall MHD，冷离子而电子热压提供可压缩响应，无黏性、无电子惯性；Harris 无力平衡 By=B0tanh(x/L), Bz=B0sech(x/L)，二维线性渐近分析。此文 L 是平衡片厚尺度，不是沿片总长。

计算 / 实验细节　S=LVA/ηm≫1, d=di/L≤1，k 以 1/L 归一化，β=4πΓP0/B0^2，与常用 8πP/B^2 不同。Δ'L=2(1/k-k)，外层准静态要求 γτA/k<1；极低 β 由惯性承担压缩的区域未纳入主分区。无数值计算/网格。

核实的发现　统一常 ψ 的 MHD、压缩控制 Hall、近 EMHD 三支和非常 ψ 的新增两支。非常 ψ 高 β 有 γτA≈kd、δ/L≈S^-1/2(kd)^-1/2；低 β 有 γτA≈β^1/2kd、δ 再乘 β^-1/4，增长式不显含 S 但断线仍依赖有限 η。β≥1 全谱最快模在 d>S^-1/4 后移向更长波：设 Z=dS^1/4，kmax≈Z^-1/3S^-1/4、γmaxτA≈Z^2/3S^-1/2。

限制与未完成问题　这是渐近比例和体制图，未求数值系数/完整本征函数，也未验证非线性快率。固定 k 体制内的 S 独立不是对任意 S 取极限：S 变化会跨过常 ψ 界线；高 β 最快增长仍含 S^-1/3 d^2/3。须检验沿片长度容纳更长最强模、外层准静态和 δ>de；d→∞ 不能简单外推，外层惯性会改 Δ'。结论中的太阳/磁尾量级仅示例，不是观测事件验证。

本报告判断　可与 L122 比较说明为何保留 Δ'、β、波长与外层匹配至关重要；适合《理论与数值基础》第 1 章教学用的分支匹配和第 1 章‘Hall 增加增长却减少初生岛数’条件化结论。

4.101　L251：2018 年

On the role of system size in Hall MHD magnetic reconnection[28]

Christopher Bard; J. Dorelli.

核读范围：arXiv1710.03612v1 全部 5 页；**图表**：图 1-7 全部视觉核查.

打开本地 PDF：papers/L251.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维可压缩 Hall 有限体积；不含显式电阻与电子惯性，以网格尺度控制数值磁耗散。

计算 / 实验细节　Fadeev 平衡 epsilon.4；Lx=4pi lambda、Ly=2pi lambda，x 周期、y 导体。lambda6.04-25.46di，网格.033-.2di，部分至.012di；最大 95.37di 用.1 与.04di。初始 T 常数，p=.5(1-epsilon^2)/den^2+.5p0，扰动磁场.1。

核实的发现　网格细化到约.04-.05di 出现从长薄层到开放双尺度层的转变；中间细度可既有开放排气又有磁岛弹回。lambda14.48 时.025di 可消除弹回，但最大系统两种网格均弹回并产生次级岛；快峰值并不保证快速完成合并。

限制与未完成问题　细化同时改变数值电阻与可解析色散尺度，不是固定物理耗散下的收敛扫描。没有证明物理双稳态或普适.1 极限；与 PIC 次级岛差别归因离子陀螺黏性只是待检验解释。文末速率与 lambda 正比表述和正文下降趋势不一致，应查图与具体平均窗。

本报告判断　重要证据是 Hall 模型也能出现弹回；模型差异和离散耗散差异不能混为一谈。

4.102　L256：2018 年

Temperature gradient driven heat flux closure in fluid simulations of collisionless reconnection[66]

F. Allmann-Rahn; T. Trost; Rainer Grauer.

核读范围：期刊 PDF1-16 全部；**图表**：图 1-10 及表 1；图 1、3-6、8-10 与表 1 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L256.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　全 Maxwell 十矩、对压力偏离各向同性的部分作 Laplacian 闭合，不是直接扩散完整温度；以 Vlasov 热流高阶矩作对照。

计算 / 实验细节　GEM 质量比 25、256×128 基准及 1024×512 加密；另流体质量比 400/1836。k0s 分别为 GEM3/ds、100×50di WHBG 的 1/(3ds)、岛合并 1/(2ds)；不是一组参数全场景。岛 lambda5/10/15/25di，两套网格 512×256 到 2048×1024。

核实的发现　原松弛闭合的热流散度形状和符号在某些区域错误；梯度闭合改善上游假热流与电子非对角压力。岛合并平均 0-1.5tA 率标度约 lambda^(-.73)，出现反弹且无二次岛。表 1lambda5 至 25 平均率.180→.052；两套网格差小。GEM 高分辨梯度流体后期斜率近 Vlasov，但启动仍迟；高分辨局地松弛反而更慢。

限制与未完成问题　k0 按与动理学一致调节，尺寸标度也依赖 k0；不能宣称无参预测。实际质量比只展示流体结构，不是同质量比完整动理学验证。显式 Laplacian 子循环中不交换块边界、不更新速度密度，作者承认块边界误差。GEM 温度条件缺常规 1/2，岛平衡坐标与边界文字不一致，复现需输入核对。

本报告判断　重要改进是直接检查热流矩再验证非线性反弹；其成功同时有问题相关的校准与数值限制。

4.103　Yamada2018：2018 年

The two-fluid dynamics and energetics of the asymmetric magnetic reconnection in laboratory and space plasmas[120]

Masaaki Yamada; Li-Jen Chen; Jongsoo Yoo; Shan Wang; W. Fox; Jonathan Jara-Almonte; Hantao Ji; W. Daughton; A. Lê; James L. Burch; Barbara L. Giles; M. Hesse; Thomas Earle Moore; R. B. Torbert.

核读范围：期刊 PDF1-11 全部；未核读补充电影；**图表**：图 1-8 与表 1-2；PDF4、8-10 页视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Yamada2018.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 氦放电与 MMS2015-10-16 观测，辅以 VPIC 全粒子模拟；不是双流体流体求解器。

计算 / 实验细节　密度比约 10，无显著导引场；MRX 电子流由 Ui-J/(en) 反演。VPIC40di×20di，4200×2100，mi/me100，omega_pe/omega_ce2，400 粒子/格/物种约 70 亿总粒子；t=96/omega_ci 在 2.5di×3di 盒积分能量。

核实的发现　强不对称时 Hall 四极接近双极，电子与离子停滞点、X 点分离；电子停滞点偏移 5-10de，离子约 0.3-0.5di。电子能量转移集中于电子停滞点且垂直电功主导；离子被偏向低密度侧的势阱加速，MMS 有反向离子束而实验较热化。表 2 非对称 MRX 入射磁能归一化后出射磁能.44、离子.31、电子.25；PIC 分别.43/.32/.25。

限制与未完成问题　MMS 有限轨迹不能检验全局能量分配；电场滤除高于离子回旋频率成分，不能用此排除高频能量交换。作者未找到波幅与率的确定关系。MRX 电子速度是推算；模拟二维且质量比 100。方法段将 X 写周期、Z 写导体/反射，与 X 为片法向及单 tanh 初值需澄清，复现前应查输入文件。

本报告判断　支持跨尺度两种粒子解耦形态及近 X 点能量转移图样；不能据此宣称 Hall 项本身耗散，或五矩/十矩闭合已被验证。

4.104　Yoon2018Heating：2018 年

Fast Ion Heating in Transient Collisionless Magnetic Reconnection via an Intrinsic Stochastic Mechanism[100]

Young Dae Yoon; Paul M. Bellan.

核读范围：所记录版本全部 7 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 2, 3, 4, 5, 6；All Figs1–3; Eqs2–17.

打开本地 PDF：papers/Yoon2018Heating.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文由二维电子磁流体模型生成重联电磁场，再在场中独立积分测试离子轨道。电子惯性保留，冷电子或正压条件使电子正则涡量冻结，而磁场仍可重联；离子背景在流体计算中固定。因此离子速度展宽来自附加的粒子轨道计算，并非一个自洽双温流体方程组直接演化出的离子与电子温度。

计算 / 实验细节　电子流体取恒密度和扰动哈里斯电流片，200 乘 600 个网格点覆盖 30 乘 120 个电子皮肤深度，演化至 580 个电子回旋逆频率。6000 个测试离子初始静止，比较冻结早期场与随时间增长的场。图示质量比为 10，另报告 20、50、100 的定性相似结果；有限初温例的热速为电子皮肤深度与回旋频率乘积的百分之一。

核实的发现　增长的电子流体场使测试离子轨道分离、相空间混合和流出速度方差增加，而冻结早期场主要形成有序运动。近似分析指出，入流方向电场变化尺度小于离子皮肤深度时可出现失磁化，出流方向也容易满足判据。用磁重联实验的场强和尺度估计得到约 14.6 的失磁化参数，与快速离子增能在量级上相容。

限制与未完成问题　测试离子不反过来改变电场，分布保持非麦克斯韦形态，也未计算碰撞熵产。电子非正压张量被舍弃，单凭准中性不能普遍忽略密度梯度；原文局地等离子体压强参数的表达也不能直接充当定量闭合。最终加热量、质量比与时间标度仍待研究，原始流体实现部分依赖前序方法论文，本次未重新运行。

本报告判断　这是流体生成场能够帮助研究离子局部增能的直接例子，但应明确其电子磁流体加测试粒子的混合方法身份。它说明霍尔尺度电势可能触发轨道失磁化和速度展宽，尚未解决电子温度、自洽离子反馈及不可逆热化比例。与实验的量级一致不能排除碰撞或波粒作用；本文全部 7 页及三幅图已核读。

4.105　F659：2019 年

Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent: Implications for Dipolarizing Flux Bundles and the Dawn-Dusk Asymmetry[76]

Yi-Hsin Liu; T. C. Li; M. Hesse; W. J. Sun; J. Liu; J. Burch; J. A. Slavin; K. Huang.

核读范围：arXiv:1901.10195v1 全部 9 页，含正文 1–8 页、参考文献 8–9 页；无文内附录。实际阅读版本是预印本，不冒充 12 页正式版。；**图表**：图 2–9；直接查看 PDF3–7 页，比较不同色标的 Bz 与离子喷流、图 8 完整欧姆预算和电子漂移分解。.

打开本地 PDF：papers/F659.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维全 PIC 动理学对照；厚电流片夹住薄片以限制 X 线沿电流方向的延伸。Hall 输运是解释机制，并非一项独立 Hall 流体模拟。

计算 / 实验细节　薄/厚半宽 0.5/4di，过渡 S=5di，nb=.3n0；薄片长度 31、12、8.4、4di。域 32×64×16di、768×1536×384 格，mi/me=75、ωpe/Ωce=4。x/y 周期，z 导体/粒子反射；固定离子漂移以降低过渡处惯性失衡，厚区 Ti/Te=5。率为对称中面重联磁通变化除薄片长度。

核实的发现　同一 X 线分为电子漂移侧活跃区与离子漂移侧受抑区；薄片长度小于约 10di 时率和喷流显著下降。电子沿电流反方向搬走 Bz，削弱出流驱动和进一步变薄；受抑长度约为电子漂移速度乘变薄时间。长例 tΩci=12 局地非理想电场约.12，而沿线积分再除 31di 约.068；二者不是同一种率。活跃区主要由非对角电子压力散度支撑断线。

限制与未完成问题　10di 是所用初值和参数下的尺度估计；没有本篇质量比扫描。初始状态非严格三维动理学平衡；反平行、有限周期盒与人为厚片限制外推。沿线对流惯性闭积分为零是对称/周期下的结果，密度加权压力梯度积分小不是一般恒等式。与早期双流体受抑区层形不同尚待解释；行星晨昏差异仅为机制候选。

本报告判断　连接 GEM 局地快率、早期有限长 X 线、传播和全局几何：Hall 输运可帮助二维排气，也能在第三方向搬走维持某区域重联所需的磁通。不要把 PIC 中的压力破冻结改称 Hall 项直接断线。

4.106　F743：2019 年

Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection[101]

Young Dae Yoon; Paul M. Bellan.

核读范围：所记录版本全部 5 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 2, 3, 4；All Figs1–5; Eqs1–6.

打开本地 PDF：`papers/F743.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文先分析哈里斯平衡中的电势及有限导场对离子失磁化区域的影响，再用自洽全动理学粒子模拟检验温度与判据的空间联系，并跟踪测试离子的轨道和伪磁矩。它是前序电子流体加测试粒子机制的动理学验证，保留完整粒子分布，不能计作霍尔流体独立求解分物种热方程的实例。

计算 / 实验细节　二维双哈里斯电流片采用周期边界，半宽等于离子皮肤深度，背景密度为峰值的 0.2，两物种初始等温，质量比为 100。1024 乘 2048 网格覆盖 40.96 乘 81.92 个离子皮肤深度，每格 100 至 600 个粒子，光速与阿尔芬速度比为 20。导场比扫描零、0.1、0.3、0.5；混合离子例含一成质量比 500 的重离子。

核实的发现　电场梯度失磁化判据满足的区域与离子中心二阶矩温度增强区相关，在所考察范围内二者随导场增加而减弱。较高质量电荷比离子更容易满足判据并升温；跟踪轨道显示相邻粒子分离及伪磁矩跳变。静态哈里斯解给出导场和电流片宽度的阈值趋势，但作者明确不把该阈值直接等同于演化重联的精确边界。

限制与未完成问题　图 5 仍有判据不能解释的额外平行温升，作者将其留作后续问题。有限时间内两条轨道分离和高温区对应不是完整熵产预算；本文未进行广泛三维、压强比、质量比及数值收敛扫描。电场梯度判据也没有给出电子能量变化，因而不能从这组模拟直接推出一般的离子与电子不可逆加热比例。

本报告判断　该研究加强了低至中等导场条件下随机离子增能机制的证据，并说明不同质量电荷比可造成选择性加热。然而机制的有效参数范围、其他并存增能过程及定量能量份额仍需检验。后续 L272 使用了这里的粒子证据，不能重复计作独立验证；本次完整核读正式版 5 页并直接检查全部五幅图和关键公式。

4.107　L243：2019 年

A GPU-enabled implicit Finite Volume solver for the ideal two-fluid plasma model on unstructured grids[138]

Alonso Asensio, Isaac; Alvarez Laguna, Alejandro; Mohamed Hassanine Aissa; Stefaan Poedts; Nataly Ozak; Andrea Lani.

核读范围：arXiv1809.02532v2 全部 23 页，含代码清单 1–4 与完整性能表；正式期刊 2019 年 CPC239 卷 16–32 页；**图表**：图 1–9、表 1–11；直接核验页 18 图 7/8 及页 20 性能图 9、表 10/11.

打开本地 PDF：`papers/L243.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　五矩理想双流体 +Maxwell+ 双曲散度清理共 18 变量，COOLFluiD 非结构有限体积；二阶最小二乘重构、Venkatakrishnan 限制器，流体 AUSM+up、场改进 Rusanov，BDF2 全隐式 Newton、数值差分 Jacobian、GMRES/Jacobi。

计算 / 实验细节　每 GPU 线程一个单元并计算通量/源项及 Jacobian，CSR 装配与 PARALUTION 避免主机往返；边界等仍在 CPU。波测 N64/128/256、CFL1/2/5；GEM 双电流片全周期 256^2/512^2、mi/me25、Te/Ti.2、γ5/3，tΩci25 用 10000 步即 dtΩci.0025，P100 完整计算 49 小时 16 分。

核实的发现　GPU 与同算法 CPU 磁通曲线吻合，空间二阶通过波误差测量。仅装配移至 GPU 约 3–4 倍，512^2 P100 总加速 14.23 倍；小问题 PARALUTION 可能反而变慢。大网格主要耗时仍在 Jacobian 装配，完整耦合矩阵显存限制某些组合。

限制与未完成问题　14.23 倍相对本机单 CPU 核心，换更快 K40 主机 CPU 基准约 8.15 倍，不能解释为相对现代多核集群加速。PETSc3.9/PARALUTION1.1 性能为当年版本；波及同代码 CPU 对照不证明压力闭合和电子扩散区正确。GEM 部分尺度和时间步细节委托前作，本文非完整独立复现说明；无网格收敛的局部 Ohm 预算。

本报告判断　报告明确区分全隐式、矩阵装配、物理精度与 GPU 加速，并标注硬件和比较基准；不把性能论文作为新重联物理发现。

4.108　L247：2019 年

High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena[99]

Z. Li; D. Livescu.

核读范围：PDF1–44: entire text and references including Appendix A plasma transport, B quasineutrality, C single-fluid limits.；**图表**：Direct visual Eq15–19 (p11), identical-temperature restriction (p16), Figs1, 3, 4, 7, 9, 10, 11 (pp18, 21, 25, 27, 35), AppendixA EqsA1–A9, A15–A19 (pp31, 33). All other figures/captions read in text..

打开本地 PDF：`papers/L247.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　构建准中性、忽略电子惯性与位移电流的 Braginskii 两流体方程，保留独立物种内能、磁场方向相关黏性和热流、摩擦、热力、电阻加热及温度交换；附录列出输运系数和单流体极限。但第 IV 节明确四项实际演示均强制 Ti=Te，并删去独立离子能量演化，实际测试的是单温扩展 Hall 系统，不能当作两温分配验证。

计算 / 实验细节　波测试用 384 点；激波 Rei 为 6.3×10^3 和 2.3×10^4。重联 di/L=1、Rei 约 124–850、Rem 约 58–890，主例 426/112；参考长度 10 m、密度 10^{15} m^{-3}。CFDNS 用六阶紧致差分和物理输运；主例约 256×512 收敛，以 768×1536 为参考，观测阶数 6.58。正文未给具体时间步，另有更高 Re 和激波网格扫描。

核实的发现　在所选物理输运系数下，波色散、激波和重联基准得到高阶网格收敛；局地共同温度图显示磁能转化及热扩散的重要性。激波误差阶数约 6.08–6.14，重联磁通在所试较大黏性和磁雷诺数处趋于弱敏感。论文提供了完整物种热方程及物理正则化的实现路径，但没有给出独立 Ti/Te、交换过程或加热比例的验证结果。

限制与未完成问题　最重要边界是所有验证算例固定 Ti=Te，不能从完整方程形式推断已演示双温预测。经典碰撞输运在冠层扩散层可能不满足局地平衡排序；磁通及饱和时间随网格或 Re 收敛，也不能证明微观热化和物种分配正确。零电子惯性等约化排除相关电子尺度；原始输运推导、CFDNS 源代码及独立双温测试未复核，也无实验温度比对照。

本报告判断　应将本篇用作能量方程、各向异性输运和数值收敛的方法证据，尤其支持区分物理输运与隐含数值耗散。作者关于高 Re 宏观结果可代表无碰撞重联的讨论，只由其实际磁通等指标检验，不能扩张为无碰撞加热闭合获验证。全文 44 页含附录均已读；正式出版年为 2019，2018 是预印本日期，两者不是独立文献。

4.109　L262：2019 年

Fast Magnetic Reconnection: Secondary Tearing Instability and Role of the Hall Term[54]

E. Papini; Simone Landi; L. Del Zanna.

核读范围：arXiv1906.06779v2 全部 14 页；**图表**：表 1 与图 1-9 正文、图注；图 2-9 及模型/算法页视觉核查.

打开本地 PDF：papers/L262.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维可压缩电阻 Hall MHD，Gamma5/3 含欧姆热，无电子惯性与电子压力张量。

计算 / 实验细节　力自由 B=(0, tanh(x/a), sech(x/a))，rho1、beta.5，a/L=S^(-1/3)。x±20a 自由流出、y 周期 Ly=100pi a；10 随机相位模，势种子 1e-6。y Fourier、x 四阶紧致差分、RK3、标量磁势保持无散；线性 1024×128，非线性 4096×512。全局 S1e5-1e8；Hall 非线性 S1e6、di/原始内层 =.2/1.4/3。

核实的发现　自发次级片厚度约初始的.1-.15，在形成阶段局地 a*B*/eta 近常数，近压强平衡。高局地 S 约 >3e4 时长宽比接近 S*^(-1/3)，较低值更接近 SP；次级增长 2.3 对初级.48，以同一全局时钟计。原始 Hall 弱到不改初级增长时，次级增长仍增 17%；较强一组近加倍。再强 Hall 时未见次级片；局地重标度后增长仍 O(1)。

限制与未完成问题　gamma_rec 是平均对数磁通增长或 Bx_rms 指数拟合，不是 E/(BVA)；末期非线性喷流不能由线性增长系数推出。Hall 算例的次级长宽比并不吻合 Pucci2017 拟合标度，原文明确承认；参数样本有限。强 Hall 次级片消失可能来自快速破裂、X 几何，也可能分辨率不足，未唯一确定。原文最快波数正 1/4 及末段内层正 1/2 的印刷符号不能照抄；应为相应负幂。

本报告判断　最重要的是弱初级 Hall 能在递归次级层变强；它同时展示现象增长快与理论标度未验证可以并存。

4.110　L263：2019 年

Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations[55]

Chen Shi; Anna Tenerani; Marco Velli; San Lu.

核读范围：arXiv1906.05961v2 全文 1-13 页；版面自动日期 2021 不改期刊 2019 年；**图表**：图 1-8 正文图注；图 2/4-8 与模型页逐图视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L263.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛；电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2.5D 可压缩标量绝热 Hall MHD，显式均匀电阻；无电子惯性、电子压力项、压力张量或欧姆热反馈。

计算 / 实验细节　双周期 8×.8，双 Harris 片，rho∞=T=B=1，a0=.02；4096×2048、dx.00195/dy.000391，eta1e-5、S1e5。谱微分、显式 RK3；相同随机相位 1-128 模种子；di=0/.001/.002/.003/.004/.005/.01 七组。种子幅度、去混叠和过滤细节未列。

核实的发现　递归生岛、开放 X 点持续喷出次级岛、较强 Hall 开放无次级岛三种情形。Hall 增大使启动提前、排气角约 10 至 28 度。固定归一化磁通斜率.032 至.058；MHD 晚期.034 高于最弱 Hall.032，不是 Hall 组在任意时段总更快。面内电流的电阻耗散占比由 40% 趋 55%，平行占比约 45%；这是 eta $Jperp^2$ 而非 Hall 项直接做功。中心线 By 谱由浅段约-.8 及陡段-2 转为近单幂-2.22；Ez 谱不同且小尺度 Ex 可占主导。

限制与未完成问题　高阶最细片已到网格尺度；X 点半长高 di 收敛到约.007 仅 3-4 个 dx，作者承认可能分辨率限制。没有独立网格/eta 扫描，速率上限.06 不宜普适化；谱是固定中心线和不同时间窗，不等于体积各向同性湍流谱。绝热压力不接收 $etaJ^2$，所以“耗散”是磁能移除诊断，不是自洽粒子加热分配。波数用周期频率 N/L 约定，角波数需乘 2pi；没有 3D 及压力各向异性。

本报告判断　补强 Hall 既能提前次级增长又能改变后期岛产生的证据；所谓 Hall 抑岛需明确阶段、几何、耗散和分辨率。

4.111　L264：2019 年

Statistics of magnetic reconnection and turbulence in Hall-MHD and hybrid-PIC simulations[90]

Emanuele Papini; Luca Franci; Simone Landi; Petr Hellinger; Andrea Verdini; Lorenzo Matteini.

核读范围：Nuovo Cimento42C, 23（2019）正式会议论文，物理页 1–4 全部；不是同组 2018 arXiv1810.02210 长文；**图表**：图 1–2 的统计、色标和谱全部视觉核验；页 3.

打开本地 PDF：`papers/L264.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维可压电阻黏性 Hall 伪谱与 CAMELIA 动理学离子/无质量等温电子混合比较，另关 Hall 的 MHD；面外均匀平均场、自由衰减 Alfvén 扰动。

计算 / 实验细节　256^2di 方盒、2048^2 网格、全周期，kinj di≈.2、初始 δBrms/B0≈.24、beta2，Hall 模型 η=ν=.001，2/3 滤波。成熟比较时刻 MHD180、Hall150、混合 200 离子时间；详细推进、粒子数量和事件算法需另文。

核实的发现　Hall 与混合磁谱在流体到亚离子范围接近，约-5/3 接-3；离子速度谱仅大尺度相近，密度谱幅值因 Hall 绝热声速而偏移。平均重联时间 MHD/Hall/混合约 9.6/12.2/4.3 离子时间，故磁谱相同不等于事件率相同。首批重联同时小尺度非线性时间骤减，随后 20–30 时间单位向较大尺度扩展，作者解释为磁岛合并。

限制与未完成问题　γrec/Ωi 为频率型指标，本短文未完整定义事件追踪与误差，不能将图中.08 直接当 Ez/(BVA)。单一二维初值与参数，成熟比较时间不同；能量跨尺度跳转根据时序和谱代理推断，不是完整分尺度能流因果预算。离子加热与分布未被流体磁谱吻合验证。

本报告判断　保留其会议论文身份；价值在跨模型同时给谱与事件统计，揭示两类指标并不等价。与电子独有重联的谱相似问题互补，不作为新独立大规模实验。

4.112　TenBarge2019MMS：2019 年

An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing[105]

J. M. TenBarge; J. Ng; J. Juno; L. Wang; A. H. Hakim; A. Bhattacharjee.

核读范围：1-17（全部）；**图表**：PDF5、6、9、10、11 页直接视觉核验式 12、图 1/6-10；17 页全文及 13 图图注读完。正式 HTML 新增第 14 图未视觉核验。.

打开本地 PDF：papers/TenBarge2019MMS.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　两物种全 Maxwell 五矩/十矩 Gkeyll，局地 Hammett–Perkins 型压力松弛；直接有限矩流体证据。

计算 / 实验细节　mi/me100, c/vAs500；2D40.96×20.48di, 2048×1024；3D40.96×20.48×10.24di, 1024×512×256；周期双片；Bg/Bsx.099, Bmx/Bsx-1.7, Tem/Tes12.3, Tim/Tis5.63；k0s ds=.1，种子.1，磁噪声.0005。

核实的发现　图 1 直接给离子/电子热能和流能，十矩 2D/3D 全域预算相近、离子热增量较大；电子各向异性峰约 2.5 近 MMS 幅度但位置在磁鞘侧而观测在磁层侧；局地闭合抑制 LHDI，剪切/kink 仍出现。

限制与未完成问题　热能增量不是物种熵产 Qi/Qe；五矩过快 LHDI 并明显总能损失，不可信作分配预测；未给网格/质量比独立收敛；nm/ns=16.7 与低密度磁层文字冲突，l0=2π/k0≈d 与 k0d=.1 冲突；不静默修正输入。

本报告判断　模型身份、温度/能量/熵产区别及跨文献判断见独立加热专题；不把本篇单独作为普适分配定律。

4.113　F792：2020 年

Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent[77]

Kai Huang; Yi-Hsin Liu; Quanming Lu; Michael Hesse.

核读范围：GRL47 e2020GL088147 正式版全部 10 页（正文 1–8、参考文献 8–10）；从 USTC 作者公开目录取得。旧 5 页预印本保留，但本次判断以正式版为准。；**图表**：图 2–5 及式 1–3；直接查看 PDF4、6、7 页，核对活跃长度定义、动量预算、梯形重叠模型及拟合参数。.

打开本地 PDF：papers/F792_published.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维 VPIC 动理学参数扫描与简化几何模型；延续 F659 的有限长薄片装置，量化 Hall 磁通输运造成的受抑区。

计算 / 实验细节　32×64×16di 域、640×1280×320 格、每物种超过 2.6×10^10 粒子；mi/me=25、c=20VA、上游 β=.3，δBz=.05B0。薄片长度 40、30、20、15、10、9、7.5、5di；半宽/过渡同 F659。活跃区定义为 δ<2de, local；率按整个薄片长度或活跃长度分别归一。

核实的发现　有活跃区的算例按 Lact 归一后率约 O(.1)，按整个 X 线长度归一则随其缩短下降。Jy 与 Bz 沿电流方向错位，使其乘积和离子出流驱动力降低。梯形模型给短活跃区 Vmax∝Lact/(2Ltrans)；图 5 用 R*=.15、Vm=.75VA、Ltrans=4di 及由模拟拟合的 Lsupp 得到主要趋势。

限制与未完成问题　R 与 R* 的比值本身来自定义，预测内容在 R* 近恒定和 Lsupp 模型，不能把恒等变换当独立理论验证。拟合使用本组数据，不是无参数预测。7.5、5di 例没有活跃区，仍有种子引发的短暂率/喷流，零输出模型解释不了；9di 例存在长瞬态。作者明确未严格建立最大喷流与总率的定量联系。导引场、高 β、斜模与不同离子转向解释尚待检验。

本报告判断　将 F659 的现象发现推进到可检验标度，同时保留拟合、瞬态和诊断定义；与 F659 属于同一研究序列，不能充当两套独立跨模型复现。

4.114　Kaptanoglu2020：2020 年

Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment[97]

A. A. Kaptanoglu; T. E. Benedett; K. D. Morgan; C. J. Hansen; T. R. Jarboe.

核读范围：PDF 1–35: all body, methods, results, conclusions, references and appended repeated/enlarged figure pages; no internal appendix.；**图表**：Direct PDF visual: Eq.1–13/Table I (pp3–4), Figs.2–4 (pp7–9), Figs.5–13/scan results (pp11–17); overview of appended repeated images pp19–35. Key Ti/Te map and heating power plot inspected. Some noncentral scan figures reviewed at contact-sheet scale..

打开本地 PDF：papers/Kaptanoglu2020_accepted.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　在 PSI-Tet 和 NIMROD 中采用三维两温 Hall MHD，独立演化 Ti、Te，欧姆定律保留 Hall 漂移及增强电子质量的简化电流时间导数惯性项。电子温度随电子流对流和压缩；电子得欧姆热、离子得黏性热，两者通过库仑交换及各向异性热传导联系。闭合仍是标量压力、Spitzer 电阻和常数各向同性黏性，另有人工粒子扩散。

计算 / 实验细节　注入频率 14.5–68.5 kHz，边界密度 0.75×10^{19} m^{-3}、温度 3 eV，黏性 550 m^2/s、扩散 250 m^2/s，有效质量比 100。PSI-Tet 用 103887 四面体、2.8 cm 三阶单元，等效 9 mm，Crank–Nicolson 步长 ≤40 ns；NIMROD 用 1.8 cm 四阶极向单元和 11 环向模。两代码注入器几何不同，另扫描壁温、密度、扩散和增强质量。

核实的发现　独立两温改变了单温模型的温度、密度与电流演化；较高驱动频率下离子明显热于电子。图 4 显示两物种相似的大尺度空间结构，但温度幅度不同；图 3 列各物种热源、交换和壁面热流，积分范围包括注入器。作者称与离子 Doppler 和初步 Thomson 数据定性一致，但明确未做严格定量验证。压缩功也不能全部视为不可逆热量。

限制与未完成问题　温度依赖壁面条件和人工扩散，尚未达到对扩散系数不敏感的收敛极限；真实驱动电路、中性/原子/辐射过程及更真实黏性仍缺失。已有勘误 DOI10.1063/5.0032632 经元数据确认，但更正全文未取得；本次只保证 35 页接收稿完整核读，不宣称掌握更正后的全部公式或精确比值。两个代码的差异也不全来自两温处理。

本报告判断　这是本分支取得的最直接装置尺度两温 Hall 实例，证明可同时计算独立温度、局地热图和带输运损失的物种预算。但结果受驱动、边界与耗散闭合约束，且部分功率来自注入器反转过程，并非仅重联 X 点。应采用定性和条件性结论；未核勘误、人工扩散敏感性及缺失电路模型使其不能支持参数无关的 Qi/Qe 或精密实验验证。

4.115　L267：2020 年

Electron-Only Reconnection in Plasma Turbulence[85]

F. Califano; Silvio Sergio Cerri; M. Faganello; D. Laveder; Manuela Sisti; Matthew W. Kunz.

核读范围：arXiv1810.03957v3 全部 12 页；**图表**：所有图注与正文；图 2、3、5、6、8 视觉核对.

打开本地 PDF：`papers/L267.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维三速度维混合 Vlasov：动理学离子、等温惯性电子，非纯电子—离子双流体，作为比较证据。

计算 / 实验细节　20pi di 方盒、1024^2，dx=.0614di 约.74de；质量比 144，beta_i1、Te=Ti。离子速度 51^3 点覆盖 ±5vthi，存在高波数谱滤波。初始磁扰动 rms.15；A 注入.1<=kdi<=.6，B 至.3；另.21 幅值比较只文字报告。

核实的发现　小尺度注入 A 中重联主要为电子独有喷流，发展后仍无对应离子喷流；大尺度注入 B 产生离子参与的长重联层。两组能谱相似但重联类型不同；手选重联层 A 约 3.5di、最长 8-9di，B 多数大于 10di。电子广义磁通与普通磁通解耦；两组厚度都在约 3de。

限制与未完成问题　自动统计 7182/460 个电流峰并非都在重联；人工确认重联层样本小。de 只有约 1.36 格，作者也承认临界分辨率与滤波可能改变广义磁通；欧姆式省去 de^2 grad div E。等温电子不能预测电子加热，J · Eprime 也包含体流能转换；未建立普适注入阈值。

本报告判断　提出湍流注入尺度选择电子独有重联的可检验机制；不是 Hall MHD 已准确替代动理学的证明。

4.116　L268：2020 年

Oblique Tearing Mode Instability: Guide Field and Hall Effect[79]

Chen Shi; Marco Velli; Fulvia Pucci; Anna Tenerani; Maria Elena Innocenti.

核读范围：arXiv2007.00607v3 全部 11 页，含全部本征值扫描和讨论；**图表**：图 1–7、式 1–14；页 8/9 增长率、频率及本征函数图直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L268.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　均匀密度不可压缩电阻 Hall MHD，无电子惯性/黏性；Harris 反向场与常量导向场，压力平衡；旋转坐标后求复本征值。

计算 / 实验细节　S=aVA/ηm=10^4，di/a=0–1，Bg/B0=0–100。SciPy 四阶残差控制配点法，y∈[-15, 15]，远场指数衰减；未公布固定网格数/容差及完整收敛扫描，忽略背景电阻衰减。

核实的发现　固定较大 kx 时强导向场可使斜模比平行模快约 5%，但完整 (kx, kz) 扫描的全局最快模仍 kz=0，只要沿重联场方向可容纳足够长波。Hall 斜模有实频率及传播；导向场使频率随 kz 非单调并抑制法向振荡。最大频率相速度随 di 近线性，最大频率与最大增长位置不同。

限制与未完成问题　仅线性本征问题；相速度不是非线性 X 线前沿速度。L224 是惯性无力片固定波数，两文不能直接互相否定。沿片有限长度排除长波可能改变优势；本文未实际求解线绑定边界，无电子压强张量/热化。

本报告判断　用于区别固定波数斜模优势和全谱最快模。作者名核为 Chen Shi（时辰）。

4.117　Ng2020：2020 年

An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities[27]

Jonathan Ng; Ammar H. Hakim; Liang Wang; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：1-8（作者稿全部，含附录 A）；**图表**：图 1-7、式 4-6、附录 A；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Ng2020.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　十矩全 Maxwell 温度梯度热流，与局地各向同性化和非局地无磁化闭合比较；FV 输运、局地隐式源、超时间步抛物子步。

计算 / 实验细节　Fadeev 与 Ng2015 同系；lambda5di 用 640×320，同 dx 扫描系统尺寸，mi/me25, k0s=1/ds；导引场 0-.4-1-2 等。LHDI 另例 mi/me36, Ti/Te10, L=rhoi, vt, e=.06c, 盒 6.4L×12.8L, 模数 8。

核实的发现　平均率随岛尺寸下降可接近 PIC 约 lambda^-0.8；岛合并最大率随 Bg 升到 1 先升后降，不能套用 Harris 片单调下降。离子宽层及非旋转对称度改善。相同 k0=1/ds 可同时激发重联与 LHDI。

限制与未完成问题　LHDI 增长率默认 1.33Ωci、调 k 为 ky 后.86，动力学 1.1，局地闭合.34，非局地.84；仍非完全吻合。电子各向异性空间结构仍不准、跨场热流过大；未研究 LHDI 对重联的非线性作用。附录指出零热流、无碰撞的对称稳态停滞点会驱动不物理 Pxx 趋零。

本报告判断　梯度闭合并非更高阶就自动正确；改善来自 $k^2/|k0|$ 的尺度选择，仍有自由参数和磁化缺失。

4.118　E552：2021 年

Fluid simulations of three-dimensional reconnection that capture the lower-hybrid drift instability[67]

F. Allmann-Rahn; S. Lautenbach; Rainer Grauer; R. D. Sydora.

核读范围：arXiv2008.06440v3 1-20 全部，对应 2021 年期刊；**图表**：图 1-9；闭合式、图 4、6-9 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/E552.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　全 Maxwell 五矩与十矩比较；压力偏离各向同性的梯度闭合 chi3, k0s1/ds；Vlasov 用于二维电流片不稳定性对照。

计算 / 实验细节　CWENO+RK3，Maxwell FDTD，Laplacian 二阶中心，每子循环交换压力边界，三维用 8 次；压力对角下限。三维 100×25×6di、2400×600×150、mi/me100, c/VA30，Harris a.5, nb.2, Ti/Te5；磁通种子.1、电子密度噪 1e-8。独立静电 LHDI nb.001、Ti/Te10、a 约.67、质量比 36/100/250 至流体 1836。

核实的发现　静电 LHDI 质量比 100 时 Vlasov/十矩梯度/五矩/十矩松弛增长率 2.2/2.4/3.2/.67 Omega_i；最快模随质量比变化，固定单一模比较会误导。电磁支 Vlasov 约.41、流体.21，均出现超过 B0 的磁扰动及强 kink。三维较二维启动早、后期片变宽，出流湍动强而电子层相对适中；密度噪 1e-10 至 1e-2 使 LHDI 启动约 30→4 Omega_i^-1。

限制与未完成问题　高质量比无同参数 Vlasov 验证；电磁支结构、启动与增长仍不同，异常高饱和原因未解释。CSSI 只是形态相似的候选，未确诊。三维率是 z 平均电场代理；电子 de 约 2.4 格，未给全三维网格收敛。对角下限不等于完整压力正定保证；印刷 Lap 约 $+k0^2$ 应理解为负号 Fourier 符号。

本报告判断　该工作同时检验重联与不稳定性并强调噪声/启动竞争，优于仅比较峰值；但不能把 3D 形态相近称为完整动理学等价。

4.119　Finelli2021：2021 年

Bridging hybrid- and full-kinetic models with Landau-fluid electrons. I. 2D magnetic reconnection[106]

F. Finelli; S. S. Cerri; F. Califano; F. Pucci; D. Laveder; G. Lapenta; T. Passot.

核读范围：1-17（全部）；**图表**：PDF3-4、9、11-14 直接视觉核验式 6-8、图 3-8，全文图注均读。.

打开本地 PDF：`papers/Finelli2021.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　混合 Vlasov 动理学质子 + 旋转对称各向异性 Landau 流体电子 (HVLF)，对照等温 HVM 及 iPIC；不是纯双流体。

计算 / 实验细节　24π×12πdi，1024×512，质子 51^3 速度 ±6.4vthi；质量比 100，Bg/B0.25，βp1，Te/Ti.25；Δx.074di=.74de，初始 ρe.035di；Δt 流体.005Ωp^-1 且 3 电子子步，PIC.2ωpi^-1=.2Ωe^-1，每物种约 7000ppc。

核实的发现　HVLF 较等温电子更接近 PIC 的重联率、电子喷流、局地各向异性和对离子反馈；firehose/mirror 的限制部分保留。

限制与未完成问题　没有电子 FLR/回旋不稳定性和完整俘获；沿弯曲场线热流近似；初始 ρe 空间未充分解析，存在少量 PIC 数值冷却；原文把详细能量分配留待后续，无不可逆 Qi/Qe/实验事件验证。

本报告判断　模型身份、温度/能量/熵产区别及跨文献判断见独立加热专题；不把本篇单独作为普适分配定律。

4.120　L272：2021 年

How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection[95]

Young Dae Yoon; Paul M. Bellan.

核读范围：Physics of Plasmas28 022113 正式版 10 个 PDF 物理页（含出版封面），正文编号 1–8、参考文献 9 页；无文内附录。Caltech 作者库下载，替换主链接，旧 16 页稿保留。；**图表**：图 1–7、式 1–48；直接查看试粒子轨道/能量、Harris 阈值、PIC 场和温度图，核对式 18–20 的系数。.

打开本地 PDF：papers/L272_published.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子正则涡量/低压或正压流体推导、给定场 Boris 试粒子和 SMILEI 全 PIC 对照；研究 Hall 电场的离子轨道效应，不是 Hall 流体独立计算的不可逆加热。

计算 / 实验细节　波场 1000 试粒子，ω/Ωc=.4、α=.5 或 1.5；倒抛物势 10000 试粒子，α=.4 或 1.04。PIC 初始半厚 di、mi/me=100、Bg/Brec=0, .1, .3, .5；域、网格与粒子数指向 2019 前序文献，本篇未列全。图 6/7 明确复用 2019 结果，非独立新一轮验证。

核实的发现　给定强电场梯度可使轨道间距与能量展宽增长；PIC 中较大梯度指标区域与离子高温区大致对应，增加导引场使范围和程度减小，.5 例强效应受抑。Harris 近似给出与片厚及导场有关的阈值；高质量电荷比更易满足其指标。提供 Hall 几何—轨道—温度的可检验联系。

限制与未完成问题　J · (J×B)=0 仍成立，分物种电功非零不等于总 Hall 耗散。图 1/2 的 TE 按文中定义是粒子能量分布标准差，非通常的中心速度二阶矩温度；线性倒抛物系统的指数分离也不足以单独证明混沌或熵增。原文由准中性直接采用不可压缩需另加假设；式 18/19 按其 α 定义少 1/4，与式 20 不一致，报告从运动方程复算而不推断代码错误。强导场、高 β 和三维可由其他机制主导，作者也承认。

本报告判断　保留场结构与轨道失磁化的证据，降低其普适热化措辞的强度。与 Yoo2013 原始实验并读：实验确证面内场加速与下游升温，但未唯一判定微观热化机制；与 E512 并列区分速度空间展宽、压力内能和碰撞熵产。

4.121　L275：2021 年

Scaling theory of three-dimensional magnetic reconnection spreading[73]

Milton Arencibia; P. A. Cassak; M. A. Shay; E. R. Priest.

核读范围：arXiv2108.00294v1 全部 15 页，含完整方法、讨论与参考文献；**图表**：图 1-7 与表 I-III；公式 1、2、5-8、17，图 3-7 及表 I/III 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L275.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维 F3D 准中性冷电子 Hall 惯性系统与电阻 MHD 对照；离子绝热，初始电流全由电子承担。

计算 / 实验细节　102.4×51.2×256, dxdy.05, dz1, 周期；质量比 25, n1, Ti1-1.5；初始厚度 1, 另.5/2/3。导引场 0 或 3；Hall 电阻 0, MHD 电阻.004 且片厚.32。D4xy1.6e-5；D4z 无导引场.16、有导引场.64；dt.02/.01。磁扰动.005、z 半长 15（9/12/30 检查）、噪声 1e-5；重联代理为距 X 点 ±2di 处平均 |By| 超过.04。

核实的发现　Faraday 方程的 Ex 沿 z 梯度解释前方是否生成正确极性的 X 型 By：反平行主要 Hall 输运，强导引场主要场线弯曲驱动的整体流。表 I-III 直接比较电场梯度/By 变化及磁张力/流加速，量级与符号一致而非逐点精确。w0=2 矩形域持续扩展、速度-.51VA；同厚方域只移动不伸长。压力种子磁声脉冲约 1.75VA 双向，重联-.92VA 单向。

限制与未完成问题　研究主要核对早期 By 拓扑的传播，稳定快重联有延迟（例 z=-45，扰动约 t60 到、快重联约 t170 起）；厚度均匀才可抵消统一延迟。方/矩形域差别归因自由磁能不足仍为单组假说，未做能量因果扫描。MHD 反平行仅在 t≤200 无可分辨传播，理论仍有电阻扩散。v1 式 1/2/7 符号与文内电子-z 方向不一致；式 17 将两个 y 偏移平方放在同一指数，会变成中心峰乘 exp(-16)，不是声称的两侧压力峰。需核对实际输入，不断言代码错误。

本报告判断　新意是把不同传播机制统一到可检验的电场梯度，并暴露域形状和启动种子问题；报告从正确 SI 方程重推符号，不照抄 v1 公式。

4.122　E474：2022 年

Gyrofluid analysis of electron β e effects on collisionless reconnection[89]

Camille Granier; D. Borgogno; D. Grasso; E. Tassi.

核读范围：arXiv2110.03052v1 全部 30 页，含完整 Hamiltonian 约化和附录双内层匹配；期刊登记 2022，所读预印本 2021；**图表**：图 1–13、表 1 及全部附录；页 10/17/20/23 直接核验修正色散、非线性双加速、能量和密度.

打开本地 PDF：`papers/E474.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　有限 βe、电子 FLR 及 B 平行扰动的双场 Hamiltonian gyrofluid；冷离子主分析，Ni=Ui=0 在 Hamiltonian 子代数层约化；quasistatic 等温闭合，2D 取自 3D 的形式极限。G10e(k)=exp(-k^2βe de^2/4)。

计算 / 实验细节　伪谱、三阶 Adams–Bashforth、短尺度数值滤波，最高 2880^2；Aeq=λsech^2(x/λ) 的 61 项谱近似，非线性盒 [-1.5π, 1.5π]×[-π, π]，Δ'=14.31，mi/me=100，de=.06–.1，βe=.1–1.5。线性另扫弱 Δ'、βe 至 2 及不同质量比。

核实的发现　βe→0 常 ψ 双内层匹配新增 γ^2 修正：γ=2ky deρsΔ'/(πλ)+γ^2deπλ/(4kyρs^2)，在 ρe≪γde/(kyρs)≪ρs 且常 ψ 成立时改善数值拟合。固定 de, ρs 升 βe 稳定；固定质量比/de 升 βe 同时升 ρs，可先促进再抑制。高 β 非线性出现减速间隔及第二次超指数阶段；电子密度有嵌套四极和较平缓梯度，正则不变量仍细丝化。

限制与未完成问题　有限 βe 不是单独电子温度开关；γ 是对数通量增长率不是归一化重联电场。可靠能量段限定总能数值损失 <1%；X 点移动引起部分增长率振荡。Epe=ρs^{2}Ne^2/2 是密度扰动能，不能作真实温升。准静态闭合在严格 kz=0 不直接成立，作者取形式极限；冷离子/质量比/滤波使高 β 空间应用有限。预印本式 3.1 的 ρe^2 系数与 G10e 定义差 2，应由指数直接展开得 ρe^2/2。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章补充参数关联 ρe=de√(βe/2)=ρs√(me/mi)，第 1 章按固定变量比较相反趋势，并将新修正只用于其常 ψ 有效域。

4.123　F589：2022 年

First-principles theory of the rate of magnetic reconnection in magnetospheric and solar plasmas[139]

Yi-Hsin Liu; P. A. Cassak; Xiaocan Li; Michael Hesse; Shan-Chang Lin; K. J. Genestreti.

核读范围：arXiv:2203.14268v1 全部 10 页，含方法、讨论和参考文献；式 1–18 核验。；**图表**：图 1–4 及对应预算；直接查看 PDF4、5、6 页的相空间图、几何示意与公式。.

打开本地 PDF：`papers/F589.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　低 β 反平行准稳态 Hall 能量输运及压力亏损理论，以二维全 PIC 检验；不是独立 Hall MHD 模拟。Hall 项总功为零，但单物种仍可从 Hall 电场获能。

计算 / 实验细节　VPIC76.8di×38.4di，12288×6144 格，约 150 亿宏粒子，mi/me400，Ti/Te1，背景 β=.01，ωpe/Ωce4，初始半宽 di，背景密度等于片峰密度；x 周期，z 导体/粒子反射；磁扰动.03Bx0；Ohm 预算平均.085Ωci^{-1}。

核实的发现　Hall 场使入流电磁能转向排气而不在 X 线堆积，压力亏损由磁张力补偿而开放排气。反向离子束建立 Pizz，预测压力增量为离子到电子尺度磁压差的 2/3。相似张角假设给 Bxe^2/Bxi^2≈sqrt(me/mi)，基本模型率.172(400)、.157(1836)，引入外流热压修正约.075 更接近该算例。

限制与未完成问题　稳定单 X 线、低 β、反平行、近不可压、相似张角和 Alfvén 外流是关键假设；总 Hall 功为零不能单独保证压力亏损。基本率.172 不是与模拟.075 精确一致。页 7 写 Li/dm≈Slope，按几何及式 16 到 17 应为其倒数。一般 3D、强导引场、高 β 和全局尺度不由此证明。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章补充压力、张角和率的推导；与 F600 对照，区分局部准稳态机制与全局磁通处理率。

4.124　L283：2023 年

Discovery of double Hall pattern associated with collisionless magnetic reconnection in dusty plasmas[118]

Shu-Di Yang; Liang Wang; Chuanfei Dong.

核读范围：arXiv:2206.08553v2 接受稿 6 页全文核读，包括三物种方程、初值、磁场产生项、速率与参考文献；**图表**：图 1—6 及图注全部核对；放大物理页 3 的嵌套反号四极场和闭合电流图.

打开本地 PDF：papers/L283.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维 PSC 全动力学三物种 PIC：电子、正离子、负尘埃；不是常规电子—离子 Hall MHD 数值结果。用分尺度的三流体动量解释内外两套 Hall 电流。

计算 / 实验细节　32di0×16di0，1000×500，x 周期、z 导体壁，Harris 半厚 di0、扰动 0.15B0di0；mi/me=100、md/mi=16、Zd=1、nd/nb=5、nb/n0=0.1、Ti/Te=5、Td/Te=1、VAe0/c=0.5、Δtωpe0≈0.22；每种约 7.5×10^7 数值粒子。尘埃带电量和质量固定；为准中性增加了离子背景密度。

核实的发现　在清晰的电子、离子、尘埃尺度分离下，内侧传统 Hall 四极结构外出现极性相反的四极结构；后者较晚建立，内层随后收窄。尘埃流向片心聚集再随喷流排出，晚期含尘例重联进展和速率低于无尘例。外侧正离子/电子的有效正电流与较慢负尘埃形成反号闭合。

限制与未完成问题　单组缩减质量和电荷参数，未扫描真实尘埃质量/充电演化/碰撞/三维；加入尘埃同时改变离子密度与总质量，不能说严格只改变一个物理因素。尘埃聚集促成颗粒生长仅是设想，未模拟凝聚。原稿 di0 定义误排成等离子体频率量纲，扰动坐标也与 xz 几何不一致；不直接抄录。没有实验中已观测到本研究双 Hall 图样的证据。

本报告判断　纳入新的嵌套反号 Hall 现象，明确它是需要三物种扩展的边界证据，不能算作标准两物种 Hall MHD 已解释的现象。

4.125　L294：2023 年

Three-Dimensional Magnetic Reconnection Spreading in Current Sheets of Non-Uniform Thickness[75]

Milton Arencibia; P. A. Cassak; Michael A. Shay; Jiong Qiu; S. M. Petrinec; Haoming Liang.

核读范围：正式期刊纠正版全部 15 页，页 15 勘误仅涉及参考文献与图 4 图例；非仅 arXiv 摘要；**图表**：图 1–5、表 1、式 1–21；图 4–5 及表 1 直接视觉检查，重算式 16 的磁尾时间.

打开本地 PDF：papers/L294.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无导向场三维 Hall 加电子惯性 F3D；冷电子、绝热离子，均匀密度与渐变片厚；研究沿初始电子载流方向的 X 线扩展。

计算 / 实验细节　盒 102.4×51.2×256di，格 0.05×0.05×1di，dt=0.02，质量比 25；双周期 Harris，全周期，只扰动上层，幅 0.005、沿 z 半长 15di，噪声 10^-5。w1=0.75–2.5、w2=1.25–2 等 13 组表列参数；变化宽度参数 4 并试 8、12。D4xy=1.6×10^-5、D4z=0.16，文中称做过系数试验。起始快重联由两侧电子层边界平均 |By| 超过 0.04 判定。

核实的发现　薄到厚时 By 扰动保持窄束，仅内嵌磁场 Bup≈B0w1/w 参与，扩展速度 vs≈VA di w1/w^2，带起始厚度记忆；厚到薄为 VA di/w，无该记忆。拟合斜率 0.919±0.082、截距 0.044±0.041 支持标度。w1=1, w2=2 过渡耗时约 20，与积分预测 19 接近；加倍/三倍过渡宽度时间相应增加。

限制与未完成问题　嵌入对 vs 的代换作者明确称半经验；要求渐变、By 先传播后片塌缩，近似忽略 ΔJ 项。主要证据是场阈值传播，非完整三维电压诊断。无导向场、非对称、电子漂移波、全局曲率；不能直接定量解释所有耀斑/磁层顶。表 1(0.75, 2) 预测 0.19 实测 0.26 却写偏差-27.9%，不应照录。按页 11 给出的 di=720km、VA=1400km/s、Δz=133di、w2=8.9di、w1=0.89–3.5di、α=2 代式 16，本调研重算约 10.0–23.5min；原文 2.5–23.6min 下限未复现。

本报告判断　可靠新现象是传播速度的路径记忆和方向不对称，不是快率统一公式。报告给出积分推导并标识应用数值复算差异，避免把作者定性观测联系升级为验证。

4.126　Yoon2023PhaseSpace：2023 年

Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection[102]

Young Dae Yoon; Paul M. Bellan; Gunsu S. Yun.

核读范围：所记录版本全部 9 个 PDF 物理页；正文、方法、结果、讨论、图表、参考文献及适用文内附录均核读。；**图表**：直接查看 PDF 物理页 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8；All Figs1–7; Eqs1–5 and AppendixEqA1.

打开本地 PDF：papers/Yoon2023PhaseSpace.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　本文采用二维空间、三维速度的全动理学粒子模拟，结合正则动量守恒和有效势分析离子相空间结构，再以蒙特卡罗测试粒子计算最大李雅普诺夫指数。温度由粒子分布的中心二阶矩得到，能够区分多束有序运动与速度分布展宽。它提供动理学机制诊断，并不是有限矩霍尔流体温度闭合的模拟。

计算 / 实验细节　反平行哈里斯片初始两物种等温，半宽等于离子皮肤深度，质量比 100，阿尔芬速度为光速的 0.025 倍。1024 乘 8192 网格覆盖 51.2 乘 409.6 个离子皮肤深度，每格 200 至 1000 个粒子；流出方向周期、入流方向开放。200 个测试离子在冻结的粒子模拟场中演化，以贝内廷算法计算最大指数，并舍弃最初 100 个逆离子等离子体频率的暂态。

核实的发现　较高温度矩可以由互相分离的冷束叠加造成，各束自身温度甚至低于上游。作者区分入流、拾取状、单阱与双阱四个运动阶段，用相空间分布解释各方向温度。单阱阶段测试粒子的平均最大李雅普诺夫指数为正，为混沌混合提供较直接证据；附录逐项积分电场和磁力贡献，说明不同阶段的加速来源。

限制与未完成问题　最大指数来自冻结场和有限时间；实时演化场只报告定性相似，没有展示相同校准的指数计算。二维反平行几何及缩小质量比限制外推范围。第 5 节明确把磁能转为离子能的精确份额、有序多束与随机展宽的相对份额及其时空变化列为未决问题，也没有给出两物种不可逆熵产生热的统一预算。

本报告判断　相较早期仅展示相近轨道分离，该文更清楚地区分有序增能、中心矩温升和混沌展宽，因此适合约束流体模型应保留哪些信息。不过其进展属于机制辨识，不能表述为已解决普适离子与电子加热比。论文全部 9 页、附录及七幅图均已核读；其中对 L272 的年份误写按正式发表信息纠正为 2021 年。

4.127　Huang2024：2024 年

Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection and turbulence in Hall magnetohydrodynamics[83]

Yi-Min Huang; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：1-11（arXiv v2 全部）；**图表**：图 1-9；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Huang2024.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维可压 Hall MHD，标量绝热压力、pe=pi、无电子惯性，电阻黏性超电阻；压力方程不含显式耗散加热。

计算 / 实验细节　立方盒、两磁通管合并，h=.01L, Bg 约 Brec, 初始 pi=pe=1, rho=1, gamma=5/3；S=2e5, Pm=1, di/L=.002 或.001；etaH=1e-13；网格 2000×1000×2000（40 亿格），中心 dy=1e-4L；x/y 导体滑移, z 周期。

核实的发现　同参二维均趋单 X 线；三维 L/di500 也趋准二维，1000 保持自生湍动与多重联点。单 X 线例通量率与磁能下降更快，Hall 湍动态快于电阻 MHD 但慢于单 X 线。中面涡各向异性近尺度无关，远离中面大涡部分恢复 GS 标度。

限制与未完成问题　三维率取 z 平均场的二维 X 点磁通，是代理诊断，不是全部 3D 连通性。亚 di 尺度不足，k^-11/3 只是参考线，未确证幂律。结构函数限于 x-z 切片，不能直接与全 3D 采样比较；仅两组 di/固定 S。

本报告判断　三维自由度可保留湍动但非必然加速。Petschek 相似仅几何，不证明慢激波机制；闭合与真实电子物理仍未检验。

4.128　E473：2025 年

GREENY: A Full-F 2D Gyrofluid Reconnection Code[42]

F. F. Locker; Markus Held; Tobias Stocker-Waldhuber; Alexander Stürz; M. Rinner; A. Kendl.

核读范围：arXiv:2502.10219v1 全部 17 页核读，包含 Full-F/δF 方程、算法 1、制造解、守恒检查、全部算例和参考文献；独立补充文件和期刊修订全文尚未取得，不宣称核读这些材料；**图表**：图 1—10 和表 1—3 逐项核对；另放大检查页 9 制造解误差、页 12 形态比较、页 13 超黏性扫描、页 14 岛/涡示例.

打开本地 PDF：papers/E473.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GREENY 低 β 二维等温强导引场 gyrofluid，演化全密度及电子/离子平行正则动量，保留离子 FLR，忽略电子 FLR 与曲率。Full-F 不表示任意磁扰动、任意 β 或完整速度分布。发表于 CPC 的版本另登记 F802，SSRN 为 F803，属于同一研究的版本线索。

计算 / 实验细节　Arakawa 括号、Karniadakis 多步；起步用后向 Euler 初始化历史状态，FFT 或有限差分空间算子。极化方程 PCG/迭代 Teague/SOR；该 v1 的 Ampère SOR 保留变密度但省离子 gyroaverage，直接 FFT 保留 FLR 但冻结密度以避免卷积，不能同时宣称该实现完整 Full-F 与完整 FLR。制造解 SOR 误差 h^2，FFT/PCG/Teague 示例 h^4。典型 1024^2、32 点/ρs；β=10^-5—10^-2 形态扫描，近边界 Δ'box=0.15、β=0.005 扫描超黏 ν=10^-12—10^-6。

核实的发现　小 β 例更长的 Y 形片，较大 β 例更开放 X 形；暖离子电流驱动长宽比 2 的例出现双岛；同向平行电流吸引也可因共转涡形成的涡量层推迟合并。超黏性可改变前期多岛/合并和起始时刻：过强抹平扰动、过弱出现格点颗粒噪声；主峰部分重合不能替代全时序与能量收敛。所谓 rate γ=dln|δA|/dt 是增长率，不是归一重联电场。

限制与未完成问题　v1 多处排版/说明矛盾：图 6 正文和图注左右对应相反；图 7 正文称主事件形状/起始无直接联系，图注和结论又强调超黏性影响，故只保留有条件的数值敏感性结论。能量式磁能写在种类求和内、势能系数等需从一致方程重新推导。制造解阶数不是全部非线性算例已收敛的证明。期刊修订可能更改求解器，本文限制只指实际核读 v1。

本报告判断　纳入数值实现和 Full-F 适用边界；与 L314 串联时保留版本区别。按一项研究计数，不把预印本、SSRN 和期刊版算三篇。

4.129　F606：2025 年

Can plasmoid-mediated reconnection occur in collisionless systems?[56]

Keita Akutagawa; Shinsuke Imada; Munehito Shoda.

核读范围：arXiv:2507.11904v1 全部 13 页，含附录 A 分辨率对照和全部图 1–22。；**图表**：表 I/II、图 1–22；直接查看 PDF12 页图 22 的粗细网格差异。.

打开本地 PDF：papers/F606.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　KAMMUY 2.5D 全 PIC 与独立电阻 MHD 对照；非 Hall MHD 参数扫描。PIC 用 Yee/Leapfrog 及 Langdon–Marder 修正；MHD 为 HLLD、二阶 MUSCL/RK 和 upwind CT。

计算 / 实验细节　PIC 主扫描 mi/me=1、2、4、8、16、32；δ=2di，100di×50di，另对 4/16 用 200di×100di；Δ=.1de、dt=.05/ωpe，片内 100ppc、背景 20ppc，Ti/Te=1，ωpe/Ωce=1，背景 β=.04。附录另有 mi/me100 但仅 Δ=.5de 的粗网格例。MHDη=.001、Δ=1/16，背景 β=.25。

核实的发现　主扫描 1–8 形成次级磁岛，16/32 未形成；磁岛出现不伴随 PIC 全域能量转化增强，MHD 磁岛阶段则增强。部分移动次级 X 点处压力张量与惯性项相抵、电子非理想场很小。把 16 质量比的网格从.5de 细化到.1de，原有磁岛消失。

限制与未完成问题　没有真实质量比 1836 的充分分辨模拟；不产生磁岛的外推依赖 EDR 长约 20de 和相关片宽约 di，不能当作普遍定理。De>0 不等同于不可逆耗散，局部 X 点非理想场/全域能量转化/重联率不应互换。PIC 与 MHD 参数不同。原式 4 相对 E*=E+ve×B 的电子电荷符号有疑点，报告采用标准负号，不照抄。

本报告判断　纳入磁岛是否促进重联的条件性反例及分辨率检验；不把作者关于 1836 的推测改写成直接观测结果。

4.130　F703：2025 年

Quadrupolar density structures in driven magnetic reconnection experiments with a guide field[129]

Thomas W O Varnish; Joe M. Chen; Simran Chowdhry; Rishabh Datta; George V. Dowhan; Lansing S. Horan; Nicholas Jordan; E. R. Neill; Akash P. Shah; Roman V. Shapovalov; Brendan J. Sporer; R. D. McBride; Jack Hare.

核读范围：arXiv:2412.02556v1 全部 12 页，含附录 A–D 的零点校准、对称性、几何和视线积分模型；期刊年份 2025。；**图表**：图 1–9，关键对照为图 4/5 实测、图 8 电阻 MHD、图 9 规定密度模型；直接查看 PDF4/8/9 页。.

打开本地 PDF：`papers/F703.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MAIZE 脉冲功率双倾斜碳丝阵实验；GORGON 三维电阻 MHD 作为对照；Hall 解释用既有二维结果启发的规定四极密度模型，不是本文完成的自洽三维 Hall 计算。

计算 / 实验细节　峰值约 500kA、上升 200ns，倾角 0/22.5/45 度给 Bg/Brec=0/.4/1；阵直径 10mm、高 16mm、间距 22mm；1064nm、2ns 双视线干涉，di 估约.5mm，观测跨 20mm 约 40di，β 约 1。GORGON100 微米、480×400×280 格。

核实的发现　导引场增加时密度图出现四极增强/减弱区，230 与 325ns 不同炮次有相似形态；单纯扭曲几何和电阻 MHD 投影无该四极结构，加入四极密度后能定性再现两视线图。

限制与未完成问题　没有直接测出层内 Hall 磁场、温度、完整流速或局部 Ohm 预算，二维视线积分不能唯一重建 3D。GORGON 密度高 2–3 倍原因未定。零点依赖烧蚀不随倾角变等假设；正文与附录对 b=0 零条纹视线的描述不一致。有 Hall 特征不等于无碰撞；密度团块没有磁诊断不能直接叫磁岛。

本报告判断　作为大范围、β 约 1 的导引场密度形态证据纳入，并提出带合成诊断的三维 Hall/双流体检验；不把几何拟合说成模型已验证。

4.131　F741：2025 年

An analytical model of "Electron-Only" magnetic reconnection rates[87]

Yi-Hsin Liu; P. S. Pyakurel; Xiaocan Li; Michael Hesse; Naoki Bessho; K. J. Genestreti; Shiva Bikram Thapa.

核读范围：本地 10 页作者稿全部核读：正文、逐步速率推导、Methods、参考文献和数据说明；核对期刊入口 Communications Physics 8, 128(2025)，未把作者稿当作排版定稿；**图表**：图 1—5 及图注全部核对；特别放大页 6 图 5 的模型/PIC 比较与局部归一化差异.

打开本地 PDF：`papers/F741.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子单独重联的准稳态多尺度解析模型，由二维 P3D PIC 验证；不是完整双流体数值计算。令离子电流远小于电子电流，把电子 Lorentz 力写成磁张力与磁压；面内 Hall 电场减速电子，下游离子反压通过经验函数加入。

计算 / 实验细节　真实质量比 1836，Bg=-8Bx0，βi=3.54、βe=0.35（按总场），Ti/Te≈10，双 Harris 片半厚 0.06di；域 Lx/di=1.28、2.56、3.84、5.12、7.68，最小域 Lz=2.56di，其余方形。周期边界，Δ=0.21de，Δt=2.5×10^-5 Ωci^-1，6000 粒子/单元，c=300VAi0。作者稿关于 ρi/di 在讨论和方法分别写 1.23、1.33，未取为精确校准值。

核实的发现　电子峰值喷流和决定磁通输运的远下游平台速度不同。Lx=2.56di 例峰值约 0.15VAe0，但平台仅 1.7VAi0≈0.04VAe0。模型给 $U/VAi0=(di/\delta 0)\sqrt{[(1-s^2)(1-f)/(2+(de/\delta 0)^2)]}$，f=sech(Lx/1.28di)，δ0≈Lx s/4；由连续性和压力亏损几何联立求 s 及 R≈sU/VAi0。周期小系统反压把全局离子归一率约束到 O(1)，去掉反压时作者给出约 4.28 的可能上限。

限制与未完成问题　f 的函数形式和 1.28di 参数是启发式选择，几何 L0≈Lx/4 亦为近似；多数比较误差在约因子 2 内。图 5f 局部电子归一理论约 0.4—0.5，而固定 z=de 测量约 0.1；作者以局部 Bx 取点差一倍解释四倍率差，并非无参数精确吻合。4.28 是开放系统预测而不是本文周期模拟测得。模型不处理显著离子电流、三维、强驱动和完整瞬态；'无离子喷流'不等于离子压强毫无影响。

本报告判断　纳入《理论与数值基础》第 1 章速率推导和第 1 章电子单独重联；明确区分 EMHD 近似、PIC 证据、经验反压参数、峰值/输运速度及两种归一化。

4.132　F788：2025 年

Magnetic reconnection, plasmoids and numerical resolution[57]

García Morillo, José María; Alexandros Alexakis.

核读范围：先读 arXiv:2406.08951v1 全部 8 页，再下载并全文核对 JFM1007 R3(2025) 正式版全部 10 页；以正式版为判断依据。；**图表**：图 1–5、表 1，直接查看正式版 PDF7 页电流谱/重联率图；比较正式版新增讨论。.

打开本地 PDF：papers/F788_published.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压电阻 MHD Orszag–Tang 涡；非 Hall 或双流体模拟，是数值误差对照。GHOST 伪谱、RK4、2/3 去混叠、双周期 2π 方域，$\nu=\eta$。

计算 / 实验细节　初始磁能.5、动能.125，k<16 随机相位扰动占总能量.25%；N=1024–32768，最高充分分辨例 $\eta=5\times10^{-6}$、SL 约 5.4×10^{5}；比较均方电流峰值时刻 t 约 1.9，率以区段平均入流速度/局部 Bmax 定义。

核实的发现　本初值与采样阶段，充分分辨时未见磁岛且率近 SP 标度；欠分辨时出现磁岛、虚假的近 S 无关快率和高波数谱堆积。正式版强调电流谱峰/截止值 ≥10 仅是本设置经验判据。

限制与未完成问题　不能推出所有磁岛均为数值伪影；正式版明确有限片寿命、扰动衰减、对流流出与初值形状都可限制磁岛长到非线性幅度。不是静态无限长 SP 层线性理论的直接证伪。文中笼统称有限元指数收敛不适用于任意固定阶有限元。

本报告判断　补充局部电流谱和拓扑收敛要求；与 Hall/双流体磁岛结果对照时保留模型差异。新版讨论比 v1 更审慎，索引改指正式版。

4.133　L296：2025 年

A scalable multidimensional fully implicit solver for Hall magnetohydrodynamics[140]

Luis Chacón.

核读范围：2025 OSTI 接收稿封面及正文/附录全部 29 页（正文 1-28）；2024 arXiv v1 全部 25 页亦读，用于版本核对；**图表**：图 1-4、表 1 全部视觉核验；模型式 5/6 与附录 A-C 逐式检查.

打开本地 PDF：papers/L296_accepted.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　可压缩 Hall 流体，固定 Ti/Te 温比，p 由加权速度 vstar 输运。接收稿改用 de^2 De(j/rho) 惯性以匹配 v≈vi 下能量；不是精确有限质量双流体。全部实际测试 de=0。

计算 / 实验细节　二阶单元中心有限体积、矢势兼容 curl；波用 Crank-Nicolson、GEM 用 BDF2。Newton-FGMRES 与物理块 Schur、多重网格 V(3, 3)、阻尼 Jacobi .7；EMHD 内层 GMRES 最多 10 次或残差降至.1。GEM256^2 拉伸网格，最小 dx.02/dy.05，dt.05、di1、eta.005、nu_i.05、nu_e1e-4、kappa.02、温比 5。弱扩展 32^2 单 MPI 至 4096^2/16384MPI，dt.01、100 步。

核实的发现　Hall 电子块与离子流动块分离的预条件降低刚性求解迭代；波相位和 HiFi GEM 能量曲线吻合，多数非线性阶段接近，末期约 1% 差。16384 倍问题规模时总时间 132 至 1130 秒，2-3 次 Newton/外层 GMRES 每步；隐式步比显式 CFL 最高 8400，实际速度最高 75 倍，粗网格反而慢 25 倍。

限制与未完成问题　弱扩展而非强扩展；nu_e 随细网格由 1e-4 降至 6e-9，非固定物理参数收敛。性能段总时长 1，早于 GEM 非线性启动约 20。附录平滑分析仅均匀周期、无背景电子流、de0、刚性及足够网格黏性条件；不是一般异质三维证明。理论能量含电子应力而实现动量忽略它，GEM 另以 v 替 vstar 匹配 HiFi；形式定理与实际算例须分开。密度初值印刷为 sech 而非与 tanh 平衡相容的 sech^2；热能定义多写 1/2，不能机械照抄，未核代码不判实现错误。

本报告判断　解决大时间步求解成本的重要方法证据；没有验证有限 de、全三维或任意高 S 新物理。预条件中的近似不能当成实际残差删除物理项；接受稿与 v1 必须区分。

4.134　TS6FEC2025：2025 年

The scaling of the ion heating and electrostatic potential in spherical tokamak[112]

T. Ahmadi; Y. Ono; H. Tanaka; H. Tanabe.

核读范围：PDF1–8 all manuscript, methods, results, summary, references; no appendix.；**图表**：All Figs1–7 visually inspected on pp2–6 and Eq1 p2 / heating definition p7 checked directly. Key graph axes/offsets read from image..

打开本地 PDF：papers/TS6FEC2025.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2025 年 IAEA 会议预稿结合 TS-6 实验、解析标度与 VPIC 动理学模拟。导言提及双流体 Hall MHD，但正文没有独立 Hall 方程、闭合、网格或结果，不能计为 Hall 加热模拟。实验 Ti 由中性 Doppler 层析及离子—中性松弛假设推断，电势由浮动电势和电子温度反演；PIC 采用约化质量比，需要与实际诊断量仔细区分。

计算 / 实验细节　实验重联场约 0.014–0.03 T，典型导向场 0.15–0.16 T，场强比约 4–9，并比较氢与氩。PIC 质量比 200、电子等离子体与回旋频率比 2、初始 Ti=Te、每格每物种 200 粒子，演化约 50 个离子回旋时间。x 周期，y/z 导电且反射粒子；网格/步长文字缺关系符号，未报告实际总格数及质量比、粒子数收敛。

核实的发现　作者报告四极电势与下游 Doppler 温度及软 X 射线的时空关联，提出电势差随重联场和导向场乘积变化，以及导向场调节离子增能的趋势。所谓实验与模拟约 20% 以内的差别指 PIC 电势幅度，既不是 Hall 结果，也不是离子/电子热分配误差。这些是已核读会议稿的主张，尚不能据此独立确认普适不可逆热化机制或加热比例。

限制与未完成问题　无完整物种热预算；PDF7 的 PIC 温升写成 mi[〈v^2〉-〈v^2〉$_0$]/2，未明确扣均流，可能混入有序能量。浮动电势转换假设不充分，图 3 电势拟合有 427 V 截距，图 4 误差较大，图 2 色标与温升叙述也需澄清。时间关联不唯一确定因果，缺原始反演、合成探针和数值收敛；未确认正式期刊版本，不接受其普适或反应堆外推结论。

本报告判断　该 8 页会议稿适合作为近期实验与 PIC 线索，以及“必须核全文才能确认模型身份”的边界例。即使标题、导言或摘要提 Hall，只有实际报告的模拟和诊断才构成证据；电势相符也不等于热量、熵增或 Ti/Te 相符。应保留作者主张与综述判断的距离，继续核查诊断反演和扣除均流后的内能，而不能据此宣称 Hall 加热比已获验证。

4.135　Closure2026：2026 年

Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure[69]

K. Bradshaw; A. H. Hakim; James Juno; J. Pawlak; Jason M. TenBarge; A. Bhattacharjee.

核读范围：1-23（arXiv2602.16960v1 全部，含附录 A）；**图表**：图 1-11、附录 A1 及式 A1-A12；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Closure2026.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　Gkeyll 三维非对称十矩；温度梯度闭合与局地闭合对照；顶点对称热扩散和 alpha=.75 限制器。

计算 / 实验细节　盒 40.96×20.48×10.24di，全周期双电流片，1152×576×288，mi/me100, c/vA200, Bg/Bsx=.099；nm/ns=.062, Bxm/Bxs=-1.696, Tem/Tes12.3, Tim/Tis5.63；k0αdα 约 1，磁噪声.0005，psi 种子.1。

核实的发现　梯度闭合出现约 5Ωci^-1 内 LHDI、约 20 后 kink 与通量绳/次级岛，局地同参不出现；三维率先峰后降，压力张量支撑 X 点非理想场。梯度闭合成本约 3 倍。

限制与未完成问题　温度各向异性峰值侧别与 MMS/PIC 不符，非旋转对称度与各向异性区域过宽，作者认为背景跨场扩散产生不物理各向异性。独立 2D Vlasov 对照 kink 仅数个离子周期出现，流体需数十周期，且遗漏小尺度模。正文未给质量比/网格独立收敛序列。

本报告判断　证明某些先前受抑制的横向不稳定性可在十矩中出现，不是准确恢复全部三维动理学。建议的磁场方向热流及弱各向同性化仍为未来改进。

4.136　F600：2026 年

System size dependence of collisionless reconnection rate[31]

Yi-Min Huang; Naoki Bessho; Li-Jen Chen; Judith T. Karpen; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：arXiv:2604.18787v1 全部 6 页；正文、方法、结果、讨论及参考文献。正式 PRL 入口另存，未把期刊版当作已读版本。；**图表**：图 1–4；直接查看 PDF3 页图 1 平均区间及 5 页图 3/4。.

打开本地 PDF：papers/F600.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2D Harris 片，WarpX 全 PIC 与 HMHD 双温 Hall 流体对照；流体用超电阻破坏冻结，电子和离子分别推进绝热温度。

计算 / 实验细节　Lx=25.6ℓ、Lz=12.8ℓ、δ=.5ℓ，固定 δ/L；背景密度.2n0、Te/Ti=.2、质量比 25。PIC ℓ/di=1–30，20 格/di，每物种平均 250 粒/格，ωpe/ωce=2；Hall 到 100，$di^3VA/\eta H=10^4$、diVA/ν=100，中心 Δx=.1di、Δz=.02di，上下对称半域；离子初始噪声 10^{-3}VA。

核实的发现　保持宏观形状并以初始 B0VA 归一化、相同重联磁通比较，尺寸增大使全局率降低和排气张角缩小。尺寸增 30 倍 PIC 平均率降约 2.6 倍，增 100 倍 Hall 降约 3.4 倍。Hall 小尺寸近 ℓ^(-1/3)，大尺寸变缓；PIC 持续产磁岛，Hall 进入单 X 点；Hall 波列未见于 PIC。

限制与未完成问题　不是任意初始条件下的普适幂律；大尺度是否平台未定，质量比 25、二维、闭合和超电阻限制外推。PIC ℓ=10 重复例率差 12%。v1 页 4 写平均磁通.05–.3，但图 1 阴影明确约.5–3；精确平均区间需作者澄清，不能默默纠正文献。

本报告判断　补入全局重联率的尺度依赖争议；要求同时报告 δ/L、归一化、比较磁通阶段及统计区间。Hall 和 PIC 趋势相同不等于细结构相同。

4.137　F635：2026 年

Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection[71]

Madox C. McGrae-Menge; Jacob R. Pierce; Maria Almanza; Alexander Velberg; Nathaniel Barbour; W. Dorland; Nuno Loureiro; Frederico Fiúza; E. P. Alves.

核读范围：arXiv2607.07106v1 全部 10 页；公开三个输入文件已下载核对关键设置；**图表**：图 1-6 全部视觉核查；特别核对图 4 最佳时间指标、图 5 独立色标.

打开本地 PDF：papers/F635.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2026 预印本：固定离子背景，两个电子十矩流体；对照单电子十矩及 OSIRIS PIC。不是通常电子—离子双流体。

计算 / 实验细节　48de×64de 双周期，480×640；力自由双层半厚 de，Brec=.5、Bg/Brec=.1、beta_rec=.1。PIC 每格 625 粒子、二阶形函数、dt=.066667/omega_pe；流体 Gkeyll 分维有限体积 CFL2/3、k=.1/de 各向同性松弛。两电子群按片上下来源标记，tanh 分配宽 de、密度下限.03n0；初始速度相同。Zenodo 输入中 plasmaBetae0=.3 等旧声明不参与实际温度初始化；实际 vth=.111803 与 Brec=.5 给 beta=.1。

核实的发现　两群相对漂移与不同压力可重建总三阶中心矩的大部分结构，改善单流体的密度空洞与局部压力堆积；热流符号/形状更接近 PIC。在示例中单群内部热流对局部 Qxxx 贡献约 4%；但双流体重建热流幅度仍偏高。

限制与未完成问题　图 4 是每个 PIC 参数算例在时间内取最大相似度，非双流体全参数性能或时间平均；图 5 流体色标不同，不能直接认定幅度一致。高 beta 时人为分群梯度引发自由膨胀，晚期同群再度多束化；三维、动态分裂和离子耦合均未验证。156 倍是按粒子相空间变量数与 20 矩的表示压缩估算，不是实测运行加速。仍有弱松弛而非严格 Q=0。

本报告判断　有价值的新方向是利用来源分群减少每群的闭合负担；不能推成单电子流体在数学上不可能表达这些矩，或热流闭合已解决。

4.138　F655：2026 年

Secondary Electron-Only Reconnection Driven by Large Scale Ion-Coupled Reconnection and Electron Kelvin-Helmholtz Instabilities in Hybrid Simulations of Solar Wind Turbulence[86]

Joaquín Espinoza-Troni; Giuseppe Arrò; F. Califano; Julia E. Stawarz; Pablo S. Moya.

核读范围：arXiv:2605.11139v1 全部 17 页核读，包括主文、附录 A 入流归一化、附录 B 早期聚类和参考文献；作为 2026 预印本证据；**图表**：图 1—11 及图注全部核对；放大物理页 5 的次级电子喷流、页 8 的剪切阈值和涡链、页 11 的聚类分布.

打开本地 PDF：`papers/F655.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维空间、三维速度的 Eulerian hybrid Vlasov-Maxwell：动力学离子、有限惯性等温流体电子，准中性、含 Hall 与惯性电场椭圆求解；没有电子压力张量或电子温度演化。

计算 / 实验细节　周期域 100πdi 见方、3072^2 空间网格、51^3 离子速度网格 [-5vthi, 5vthi]；质量比 100、Ti/Te=1、βi=1、δBrms/B0≈0.28，初始波数 k/k0=1—6，约 50di 注入尺度的自由衰减湍流，dt=0.01Ωi^-1，格点尺度电磁滤波。由这些数直接算 Δx/de≈1.023，电子惯性长度仅约一个网格，本文未给独立网格/滤波收敛组。

核实的发现　展示两条生成次级电子单独重联的路径：大尺度离子耦合重联喷流挤压/合并磁岛；电子剪切形成 Kelvin–Helmholtz 相容涡链再扭曲磁场。次级例电子喷流约 5VAi, in、没有相关离子喷流，局部 De 峰比主重联例高约十倍；这不是总加热或总重联率十倍。剪切例 kde≈0.14、波长 4.4di，速度跃迁大于基于 whistler 恢复力的估算阈值。HDBSCAN 晚期 516 片中约 69% 厚度 <di 且长度 <5di，算法本身没有判别这些片是否实际重联。

限制与未完成问题　预印本、二维、单次湍流实现、有限注入尺度、约一格/de 和滤波均限制电子尺度定量结论。69% 是电流片比例而非电子单独重联事件发生率；50.2% 片的 | 平均 De| 超过全域标准差也不等于不可逆耗散比例。X 点速度被取为当地 E×B/B^2，非理想区此等同不普遍成立，应与磁通鞍点轨迹核对。页 6 把 VAe/VAi 质量比平方根写反，附录 A 的主事件时间 360.7 与正文 320.7 不一致。EKHI 用饱和波长回估阈值，支持相容性但非完整线性本征模证明。

本报告判断　纳入两条重要的跨尺度生成路径，但标为待收敛和三维验证的候选机制；不把作者关于耗散/太阳风普遍性的较强表述直接升级为结论。

4.139　L312：2026 年

Cross-scale observations of expanding bifurcated current sheets in fast magnetic reconnection[126]

Jongsoo Yoo; Masaaki Yamada; Tongnyeol Rhee; Hantao Ji; Ari Le; Tai Phan; Sung Hyun Son; A.B. Robbins.

核读范围：2026-11-04 Article in Press 全文 1-15 页（含 Methods）；下载 49 页透明同行评议文件，但不计为已逐页核读；**图表**：图 1-9 全部图注；图 3/4/6-9、表 1 及式 1-9 视觉/数值核验.

打开本地 PDF：`papers/L312.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 实验、MMS/PSP 事件与 VPIC 全动理学对照；使用双流体电子动量分析，不是 Hall MHD 数值计算。

计算 / 实验细节　MRX 氢气 3.5mTorr，320-340μs，约 250 个有清晰 EBCS 的重复放电平均，di2.5cm；高分辨一维探针 z6di。MMS2017-06-19、PSP2021-04-29 各一例。小 PIC20×20di/1280^2、mi/me1836、Ti/Te5；大 PIC200×40di/4032×800、mi/me100、Ti/Te1、初始半厚 5di，开放流出，均 ωpe/ωce2、2000 粒子/格。MRX 几何 PIC30×60di、200×448、质量比 25、ωpe/ωce1、200 粒子/物种/格、dtωpe.24。

核实的发现　沿分离线延伸的双峰电流、电势井、离子加速和排气密度增强在三环境出现；MRX 两侧片厚拟合.29/.70di，MMS 排气约 20di，PSP 约 4000di 且边界约 20di。MRX 电势估算 12/6V 与测量 11/5V 近；MMS 估算 6/5kV 与测量 5/7kV 量级近；PSP 电场不确定无法检验。低 beta .012 大岛破坏长程边界，.12/.36 局部延伸，1.2 大域保持至边界。MMS 扣除上游温度后的焓流占优，PSP 体流能流占优。

限制与未完成问题　主数值为 PIC，不能证明任意 Hall/五矩闭合均能重现。实验按 EBCS 明显事件挑选，两个空间个例及假定 Ti=Te 的实验 beta 不构成普适阈值统计。漂移电流吻合只在强 Ex 分离线时窗；下游距离由几何长宽比推断；1D 磁梯度诊断在多维区失效。式 4 的 Delta B^2 应由磁压差积分理解；原文式 1 交叉项符号需连同坐标手性核查。PIC 大/小盒同时改变质量比和温比，未给独立网格/质量比收敛；代码公开但自定义分析需索取。2026-11-10 访问其 Figshare API 返回 404，不能声称已取得源数据。

本报告判断　新实验对照目标是分离线电流层的宏观延伸和能量分配差异；势井标度可用 Hall/双流体检验，低杂波、束分布和准确加热仍需张量/动理学及 3D。

4.140　L313：2026 年

Electron inertia and magnetic reconnection[94]

Allen H. Boozer.

核读范围：arXiv2509.14400v5（2026 年 1 月）全部 7 页及参考文献；**图表**：全部式 1–37；图 1 及页 2/3/5 公式直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L313.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　离子静止、j=-en ve 的电子惯性理论，略去电阻、电子压强和黏性；定义 B*=B+curl(me j/(ne^2)) 并证明理想输运。一般离子流动不能只靠选取参考系消除。

计算 / 实验细节　无新数值/实验数据。恒密度、忽略位移电流时 B*=(1-$de^2\nabla^2$)B；量级例 n=10^20 m^-3、de 约 0.5 cm、qR 约 20 m。

核实的发现　B 可以重联而电子正则涡量 B*=B-(me/e)curl ve 满足 ∂tB*=curl(ve×B*)。给出三维直接推导；讨论三维混沌理想拉伸下弱非理想性的对数时间敏感性。

限制与未完成问题　要求光滑电子流及所设闭合；图 1 借用既有理想混沌流结果。三维并非必然混沌，10–100 个对流时间不是普适率定律。导引中心估计不能推广到非磁化电子薄层。页 2 引言 Voigt 符号与最终式 35 不一致；式 34 位移电流项漏 c^-2，35 恢复。报告直接取旋度推出电子冻结，不沿用式 30 的速度表述。

本报告判断　《理论与数值基础》第 1 章区分磁场和正则涡量拓扑、可逆惯性与不可逆加热。属理论澄清，不能当作普适快重联机制的数值验证。

4.141　L314：2026 年

Gyrofluid magnetic reconnection beyond the δF approximation[43]

F. F. Locker; M. Rinner; Markus Held; A. Kendl.

核读范围：arXiv:2603.06234v2 全部 22 页，含附录 A 内外层推导；正式 2026 期刊另有入口。；**图表**：图 1–13、表 I–III；直接查看 PDF6 页 Δ’ 算例，14/15 页 de 扫描与 17 页长宽比扫描。.

打开本地 PDF：papers/L314.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GREENY 二维低 β、等温 Full-F 陀螺流体，演化全密度和正则平行动量；保留离子 FLR 和非 Boussinesq 任意波长极化，电子 FLR 略去，磁扰动仍小；不是全 f 动理学或任意 β 模型。

计算 / 实验细节　方域 $32\rho_s$、1024^2，Arakawa+ 四阶超扩散，$\nu 10^{-6}$–10^{-8} 并与迎风对照；例 Fig4 β=.005、τi=1、m=1；mi/me1836，长宽比到 16；初始电子/离子载流分别比较。de 扫描通过 β 等参数变化，不能把全部范围视为同一低 β 物理区间。

核实的发现　任意波长极化相对 LWL 在展示算例中较快；线性算子非正规，存在暂态放大可能；非线性快速增长同时出现谱展宽，不能等同线性暂态。离子初始载流时率通常比电子载流慢约 10 倍；长域多 X 点处于不同重联阶段；τi 主要改变局部形态，未见主磁岛数随 τi 系统增加。

限制与未完成问题　非正规性分析使用简化平衡和选定变量范数，不能用条件数或 1/ε 直接当物理能量增长量。v2 式 42 后 k=1 却给 Δ’=14.3108，与 2(1/k-k)=0 矛盾；有符号 μe 为负，de 公式应取其绝对值。图 11/12 轴标签写 de^2，图注却写 de 且行列方向相反，参数解释不唯一；若按极小 de 且固定真实质量比理解，会超出低 β 排序。未经原始输入澄清不作定量跨区间比较。引言将 F788 欠分辨增加磁岛表述为抑制磁岛，方向相反。附录存在积分上下限排印疑点，不能当作无误教材照抄。

本报告判断　纳入 Full-F 极化、暂态放大、多 X 点不同步等候选新现象，同时单列归一化、排序和算式审计；《理论与数值基础》第 1 章教学推导采用自洽范数与符号，不盲抄原式。

4.142　未完成核读的候选：不据此作内容结论

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E407 / 1973	Tearing mode instabilties of a rotating plasma with Hall effect.	未获匹配全文
L001 / 1978	Drift-tearing modes in a tokamak plasma	未获匹配全文
E409 / 1981	Hall current effects on tearing modes in rotating reverse field plasmas	未获匹配全文
L002 / 1983	Hall current effect on tearing mode instability	未获匹配全文
E391 / 1983	Hall current effect on tearing mode instability. [possible cause of magnetic field reconnection in space]	未获匹配全文
L003 / 1988	On the theory of steady state reconnection	未获匹配全文
F781 / 1989	Direct implicit simulation of collisionless magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E544 / 1989	Magnetic reconnection simulation using the 2.5 D electromagnetic direct implicit code ”AVANTI”.	未获匹配全文
E499 / 1990	Sawtooth reconnection	未获匹配全文
L004 / 1990	Steady magnetic field reconnection	未获匹配全文
E516 / 1991	Collisionless m=1 tearing mode	未获匹配全文
E501 / 1991	Collisionless reconnection and the sawtooth crash	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E458 / 1991	Electron inertia and lower-hybrid fluctuation-driven modified low-m tearing modes	未获匹配全文
E528 / 1991	Sheared field tearing mode instability and creation of flux ropes in the Earth magnetotail	未获匹配全文
L005 / 1992	Magnetic reconnection in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E403 / 1993	Modification of short scale-length tearing modes by the Hall field	未获匹配全文
Waelbroeck1993 / 1993	Onset of the sawtooth crash	未获匹配全文
E510 / 1993	Pressure gradient turbulent transport and collisionless reconnection	未获匹配全文
F719 / 1993	The theory of the early nonlinear stage of m =1 reconnection in tokamaks*	未获匹配全文
E489 / 1994	Observation of anomalous slow-mode shock and reconnection layer in the dayside magnetopause	未获匹配全文
Biskamp1995 / 1995	Ion-Controlled Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E511 / 1995	Macro-particle simulations of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E538 / 1995	Nonlinear dynamics of the m=1 kink-tearing instability in a modified magnetohydrodynamic model	未获匹配全文
F768 / 1995	Whistler dominated quasi-collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F782 / 1996	Magnetic field reconnection in collisionless plasmas	未获匹配全文
E531 / 1996	Magnetic reconnection in collisionless regimes with reversed shear	未获匹配全文
F769 / 1996	Reconnection of magnetic field lines near critical points	未获匹配全文
L008 / 1997	Breakup of the electron current layer during 3-D collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L009 / 1997	Collisional and collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F710 / 1997	Comment on “Collisionless m=1 reconnection in tokamaks” [Phys. Plasmas 3, 2411 (1996)]	未获匹配全文
E506 / 1997	Particle simulation study of collisionless driven reconnection in a sheared magnetic field	未获匹配全文
L010 / 1997	Three-dimensional HALL-MHD simulations of magnetopause reconnection	未获匹配全文
L012 / 1997	Undriven magnetic reconnection in magnetohydrodynamics and Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E325 / 1998	Collisionless Hall Magnetohydrodynamic Reconnection	未获匹配全文
E518 / 1998	Fast reconnection due to localized anomalous resistivity	未获匹配全文
L013 / 1998	Forced magnetic field line reconnection in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
F706 / 1998	Hamiltonian vortices and reconnection in a magnetized plasma	未获匹配全文
E345 / 1998	Influence of the Hall effect on the reconnection process in helical geometry	未获匹配全文
L014 / 1998	Invariants and Geometric Structures in Nonlinear Hamiltonian Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E505 / 1998	Kinetic quasi-viscous and bulk flow inertia effects in collisionless magnetotail reconnection	未获匹配全文
F676 / 1998	Magnetic Reconnection Studies on SSX	未获匹配全文
E481 / 1998	On the kinetic structure of the magnetotail reconnection layer	未获匹配全文
E525 / 1998	Reconnection via the Tearing Instability	有 PDF，待核读
E502 / 1998	Structure of the dissipation region during collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F779 / 1999	Collisionless magnetic reconnection in the presence of an external driving flow	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L015 / 1999	Difference Between the Ion Gyroviscous Effect and Hall Magnetohydrodynamic Effect in the Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L016 / 1999	Impulsive reconnection dynamics in collisionless laboratory and space plasmas	未获匹配全文
L017 / 1999	Modified Magnetohydrodynamic Model of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E428 / 1999	Numerical Study of Two-Fluid Effects on Magnetic Reconnection in Merging Spheromaks	未获匹配全文
E418 / 1999	Sudden disruption of a thin current sheet in collisionless Hall magnetohydrodynamics due to secondary tearing and coalescence instabilities	未获匹配全文
F647 / 1999	The diffusion region in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E500 / 1999	The scaling of collisionless, magnetic reconnection for large systems	未获匹配全文
E515 / 2000	Collisionless reconnection in instabilities and due to external forcing	未获匹配全文
L018 / 2000	Collisionless reconnection: Effects of Hall current and electron pressure gradient	未获匹配全文
E337 / 2000	Comparison of hybrid and Hall-MHD simulations of reconnection	未获匹配全文
F764 / 2000	Fast collisionless reconnection in the whistler frequency range	未获匹配全文
L019 / 2000	Field-aligned currents generated in magnetotail reconnection: 3D Hall-MHD simulations	未获匹配全文
F648 / 2001	Collisionless magnetic reconnection: Electron processes and transport modeling	未获匹配全文
F695 / 2001	Exact Solutions for Two-dimensional Steady State Magnetic Reconnection in Partially Ionized Plasmas	未获匹配全文
Otto2001 / 2001	Geospace Environment Modeling (GEM) magnetic reconnection challenge: MHD and Hall MHD—constant and current dependent resistivity models	未获匹配全文
BirnHesse2001 / 2001	Geospace Environment Modeling (GEM) magnetic reconnection challenge: Resistive tearing, anisotropic pressure and Hall effects	未获匹配全文
L024 / 2001	Geospace Environment Modeling magnetic reconnection challenge: Simulations with a full particle electromagnetic code	未获匹配全文
E379 / 2001	Geotail observations of the Hall current system: Evidence of magnetic reconnection at the kinetic level	未获匹配全文
L026 / 2001	Geotail observations of the Hall current system: Evidence of magnetic reconnection in the magnetotail	未获匹配全文
F758 / 2001	Global hybrid simulation of the dayside reconnection layer and associated field-aligned currents	未获匹配全文
E394 / 2001	Hall MHD computations of magnetic reconnection with a fully implicit 2 1/2 D nonlinear code	未获匹配全文
L027 / 2001	Hall effects on the generation of field-aligned currents in three-dimensional magnetic reconnection	未获匹配全文
Ma2001 / 2001	Hall magnetohydrodynamic reconnection: The Geospace Environment Modeling challenge	未获匹配全文
L030 / 2001	Hybrid and Hall-MHD simulations of collisionless reconnection: Dynamics of the electron pressure tensor	未获匹配全文
E346 / 2001	Magnetic Reconnection in Kelvin-Helmholtz Vortices: Hall Dynamics	未获匹配全文
E329 / 2001	Magnetopause reconnection induced by magnetosheath Hall-MHD fluctuations	有 PDF，待核读
E376 / 2001	Particle Hall-MHD simulation of collisionless reconnection: Ion gyro-radius correction	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
Grasso2001 / 2001	Phase Mixing and Island Saturation in Hamiltonian Reconnection	未获匹配全文
L032 / 2001	Recent developments in collisionless reconnection theory: Applications to laboratory and space plasmas	未获匹配全文
F646 / 2001	Scaling of Collisionless Forced Reconnection	未获匹配全文
E368 / 2001	Two topics pointing to the importance of resolving Hall effects in reconnection jets	未获匹配全文
E360 / 2002	3D Hall MHD Reconnection Dynamics in a Strongly Sheared System	未获匹配全文
F765 / 2002	A new laboratory experiment on magnetic reconnection	未获匹配全文
E356 / 2002	Collisionless Hall MHD Reconnection Dynamics: Is the Nonlinear Reconnection Rate Independent of the Mechanism that Breaks Field Lines?	未获匹配全文
F714 / 2002	Driven Reconnection about a Magnetic X-Line with Strong Guide Component	未获匹配全文
F631 / 2002	Experimental study of lower-hybrid drift turbulence in a reconnecting current sheet	有 PDF，待核读
L034 / 2002	Fingerprints of collisionless reconnection at the separator, I, Ambipolar-Hall signatures	未获匹配全文
F598 / 2002	GEM reconnection challenge: Implicit kinetic simulations with the physical mass ratio	未获匹配全文
E364 / 2002	Hall MHD and hybrid simulations of the magnetic reconnection: A comparative study	未获匹配全文
E354 / 2002	Hybrid and Hall-magnetohydrodynamics simulations of collisionless reconnection: Effect of the ion pressure tensor and particle Hall-magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E524 / 2002	Kinetic regimes of high frequency magnetic reconnection in a neutral sheet configuration	未获匹配全文
E417 / 2002	Linear and nonlinear regimes of the 2-D Kelvin-Helmholtz/Tearing instability in Hall MHD.	未获匹配全文
E341 / 2002	Magnetic Reconnection in the Presence of Flow Shear and Hall Physics	未获匹配全文
E367 / 2002	Plasma Pressure Tensor Effects on Reconnection: Hybrid and Hall-MHD Simulations	未获匹配全文
E410 / 2002	Quasilinear Hall Dynamo Theory For Two-Fluid Tearing Instability	未获匹配全文
E503 / 2002	Recent advances in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F567 / 2002	Reconnection onset in the tail of Earth’s magnetosphere	未获匹配全文
E371 / 2002	The Role of Hall Electric Fields in Two-dimensional Forced Magnetic Reconnection	未获匹配全文
Huba2002 / 2002	Three-dimensional Hall magnetic reconnection	未获匹配全文
L037 / 2003	A hall dynamo effect driven by two-fluid tearing instability	未获匹配全文
E542 / 2003	Driven Collisionless Reconnection about a Magnetic X-line in the Absence of a Magnetic Guide Field	未获匹配全文
E384 / 2003	Effects of Hall Electric Fields on the Saturation of Flux Pile-up Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E519 / 2003	Electron kinetics in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E455 / 2003	Electron-inertia effects on driven magnetic field reconnection	未获匹配全文
F730 / 2003	Global extended magnetohydrodynamic studies of fast magnetic reconnection	未获匹配全文
E401 / 2003	Hall MHD effects on the 2D Kelvin–Helmholtz/tearing instability	未获匹配全文
E351 / 2003	Hall Mediated Reconnection in Systems with Wide Current Sheets	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L038 / 2003	Hall current effects in dynamic magnetic reconnection solutions	有 PDF，待核读
L039 / 2003	Magnetohydrodynamic modeling of two-dimensional reconnection in the Magnetic Reconnection Experiment	未获匹配全文
F673 / 2003	Measurement of the Current Sheet during Magnetic Reconnection in a Toroidal Plasma	未获匹配全文
L040 / 2003	Numerical modeling of linear drift-tearing mode stability	未获匹配全文
L041 / 2003	Plasma pressure tensor effects on reconnection: Hybrid and Hall-magnetohydrodynamics simulations	未获匹配全文
L042 / 2003	Signatures of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L043 / 2003	Structure of the Hall current system in the vicinity of the magnetic reconnection site	未获匹配全文
L044 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. I. Fields, currents, and flows	未获匹配全文
L045 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. II. Tilt and precession of a field-reversed configuration	未获匹配全文
L046 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. III. Energy conversion and electron heating	未获匹配全文
L047 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. IV. Instabilities, fluctuations, and emissions	未获匹配全文
E484 / 2003	Whistler-mediated magnetic reconnection in large systems: Magnetic flux pileup and the formation of thin current sheets	未获匹配全文
E382 / 2004	Collisionless Reconnection Dynamics Using PIC and Hall MHD Simulations: A Comparative Study	未获匹配全文
L048 / 2004	Collisionless magnetic reconnection with arbitrary guide field	未获匹配全文
F720 / 2004	Driven reconnection about a magnetic X point in weakly collisional plasmas	未获匹配全文
E338 / 2004	Effects of Hall Current in the Driven Reconnection with Various Scales	未获匹配全文
E456 / 2004	Electron inertia modifications to X-point reconnection in solar flares	未获匹配全文
E532 / 2004	Exact Steady State Reconnection Solutions in Weakly Collisional Plasmas	未获匹配全文
L050 / 2004	Exact models for Hall current reconnection with axial guide fields	有 PDF，待核读
Huba2004 / 2004	Hall Magnetic Reconnection Rate	未获匹配全文
L052 / 2004	Hall and Turbulence Effects on Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E400 / 2004	Hall dynamics and resistive tearing instability	未获匹配全文
HubaGuide2004 / 2004	Hall magnetic reconnection: Guide field dependence	未获匹配全文
F560 / 2004	Impulsive Magnetic Reconnection in the Earth's Magnetotail and the Solar Corona	未获匹配全文
L054 / 2004	Influence of the Hall term on KH instability and reconnection inside KH vortices	有 PDF，待核读
E429 / 2004	Laboratory Studies of the Physics of Two-Fluids MHD Physics for Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L055 / 2004	Measurement of the Hall Dynamo Effect during Magnetic Reconnection in a High-Temperature Plasma	未获匹配全文
L056 / 2004	On magnetic reconnection regimes and associated three-dimensional asymmetries: Hybrid, Hall-less hybrid, and Hall-MHD simulations	未获匹配全文
E480 / 2004	On the generation and structure of the quadrupole magnetic field in the reconnection process: Comparative simulation study	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F666 / 2004	Structure of the Magnetic Reconnection Diffusion Region from Four-Spacecraft Observations	有 PDF，待核读
E324 / 2004	The Hall Magnetic Reconnection Rate	未获匹配全文
E353 / 2004	Time Scales for Energy Release in Hall Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L060 / 2004	Turbulence in low-β reconnection	未获匹配全文
L061 / 2004	Two-fluid tearing instability in force-free magnetic configuration	未获匹配全文
E520 / 2004	Two-scale structure of the current layer controlled by meandering motion during steady-state collisionless driven reconnection	未获匹配全文
L062 / 2005	Bifurcation analysis of magnetic reconnection in Hall-MHD-systems	未获匹配全文
L064 / 2005	Current singularities: Drivers of impulsive reconnection	未获匹配全文
E397 / 2005	Drake and his colleagues confirmed their theoretical predictions with supercomputer simulations. Researchers haven't been able to detect Hall reconnection in the sun because the key effects occur in such small regions, but satellites have spotted it in the earth's magnetosphere.	排除：非论文
F783 / 2005	Electron surfing acceleration in magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F572 / 2005	Externally driven magnetic reconnection in the presence of a normal magnetic field	未获匹配全文
L066 / 2005	Forced magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E508 / 2005	Generalized Ohm's law in a 3-D reconnection experiment	未获匹配全文
L067 / 2005	Hall effect and fine structures in magnetic reconnection with high plasma β	未获匹配全文
L068 / 2005	Hall effect in incompressible magnetic reconnection	未获匹配全文
L069 / 2005	Hall effect on magnetic reconnection at the Earth's magnetopause	未获匹配全文
F678 / 2005	Hysteresis and the Onset of Fast Magnetic Reconnection	重复：Cassak2005
F563 / 2005	Kinetic theory of collisionless tearing at the magnetopause	未获匹配全文
E427 / 2005	Laboratory Studies of Magnetic Reconnection and the Physics of Two-Fluids MHD	未获匹配全文
L070 / 2005	Linear theory for fast collisionless magnetic reconnection in the lower-hybrid frequency range	未获匹配全文
F739 / 2005	Magnetic reconnection on the ion-skin-depth scale in the dusty magnetotail of a comet	未获匹配全文
F689 / 2005	Magnetic reconnection within MHD-scale Kelvin–Helmholtz vortices triggered by electron inertial effects	未获匹配全文
L071 / 2005	Magnetic reconnection within rolled-up MHD-scale Kelvin-Helmholtz vortices: Two-fluid simulations including finite electron inertial effects	未获匹配全文
E446 / 2005	Modeling of the tearing instability in unreduced two-fluid magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L072 / 2005	Nonlinear behaviour of collisionless double tearing mode induced by electron inertia	未获匹配全文
F650 / 2005	Roles of Initial Current Carriers in Three-dimensional Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L073 / 2005	Simulation of Space Plasma Allowing for the Hall Effect: Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E439 / 2005	Study of Two-Fluid MHD Physics and the Effects of Boundary Conditions on Magnetic Reconnection in MRX	未获匹配全文
E430 / 2005	Study of Two-fluid Effects during Magnetic Reconnection in a Laboratory Experiment	未获匹配全文
L074 / 2005	Suppression of Hall-Term Effects by Gyroviscous Cancellation in Steady Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L075 / 2005	The role of Hall currents on incompressible magnetic reconnection	未获匹配全文
L077 / 2005	The “Newton Challenge”: Kinetic aspects of forced magnetic reconnection	未获匹配全文
L078 / 2005	Theoretical and numerical simulation study of the structure of the Hall electric field in the vicinity of the magnetic reconnection site	未获匹配全文
E436 / 2005	Two-fluid effects on 3D reconnection in the SSX experiment with comparisons to space data	未获匹配全文
F565 / 2006	A generalized Petschek magnetic reconnection rate	未获匹配全文
E377 / 2006	A numerical study of low frequency wave in Hall MHD reconnection with various plasma	未获匹配全文
L080 / 2006	Catastrophe Model for the Onset of Fast Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
Knoll2006 / 2006	Coalescence of Magnetic Islands in the Low-Resistivity, Hall-MHD Regime	未获匹配全文
F780 / 2006	Contour dynamics modelling of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L082 / 2006	Coupling between Global Geometry and the Local Hall Effect Leading to Reconnection-Layer Symmetry Breaking	未获匹配全文
L083 / 2006	Density depletion and Hall effect in magnetic reconnection	未获匹配全文
L084 / 2006	ELECTRON PARALLEL COMPRESSIBILITY IN THE NONLINEAR DEVELOPMENT OF TWO-DIMENSIONAL COLLISIONLESS MAGNETOHYDRODYNAMIC RECONNECTION	未获匹配全文
E425 / 2006	Experimental Study of Two-fluid Effects on Magnetic Reconnection	未获匹配全文
Yamada2006 / 2006	Experimental study of two-fluid effects on magnetic reconnection in a laboratory plasma with variable collisionality	未获匹配全文
L086 / 2006	Forced Hall magnetic reconnection: Parametric variation of the “Newton Challenge”	未获匹配全文
F738 / 2006	Forced Magnetic Reconnection and Field Penetration of an Externally Applied Rotating Helical Magnetic Field in the TEXTOR Tokamak	未获匹配全文
E326 / 2006	Forced Reconnection in the Hall Limit	未获匹配全文
E322 / 2006	Hall Reconnection in MST	未获匹配全文
L087 / 2006	Hall assisted forced magnetic reconnection	未获匹配全文
L088 / 2006	Hall effects on dynamic magnetic reconnection at an X-type neutral point	未获匹配全文
F786 / 2006	How Does Collisionless Magnetic Reconnection Work in the Presence of a Guide Magnetic Field	未获匹配全文
F581 / 2006	Kinetic Vlasov simulations of collisionless magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F670 / 2006	Magnetic reconnection induced by weak Kelvin-Helmholtz instability and the formation of the low-latitude boundary layer	未获匹配全文
F778 / 2006	Particle Demagnetization in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F575 / 2006	Reproducing the bipolar magnetic signature at the jet leading edge by three-dimensional reconnection with nonzero guide field	未获匹配全文
E358 / 2006	Scalings of steady state Hall magnetohydrodynamic reconnection in high-beta plasmas	未获匹配全文
E339 / 2006	Stability of a resistive Sweet-Parker reconnection layer and onset of fast reconnection in Hall MHD.	未获匹配全文
E363 / 2006	Structure of the electromagnetic field in Hall MHD turbulence and relation to reconnection	未获匹配全文
L090 / 2006	Study of Thermal Transport Effects on Drift-Tearing Mode	未获匹配全文
E365 / 2006	The Hall Effect and Magnetic Fluctuations during Fast Reconnection in MRX	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L091 / 2006	The Hall dynamo effect and nonlinear mode coupling during sawtooth magnetic reconnection	未获匹配全文
L092 / 2006	The role of the Hall effect in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F604 / 2006	Time evolution of the electron diffusion region and the reconnection rate in fully kinetic and large system	未获匹配全文
L093 / 2006	Two fluid effects on three-dimensional reconnection in the Swarthmore Spheromak Experiment with comparisons to space data	未获匹配全文
E383 / 2007	A First-Principles Analytical Theory for 2D Magnetic Reconnection in Electron and Hall Magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E359 / 2007	A Numerical Study of Low-frequency Waves in Hall MHD Reconnection	未获匹配全文
E385 / 2007	A first-principles analytical theory for 2D magnetic reconnection in electron and Hall MHD.	未获匹配全文
L095 / 2007	Catastrophic onset of fast magnetic reconnection with a guide field	未获匹配全文
L096 / 2007	Collapse of the neutral current sheet and reconnection at micro-scales	有 PDF，待核读
L097 / 2007	Collisionless magnetic reconnection dynamics with electron inertia and parallel electron compressibility	未获匹配全文
E527 / 2007	Comparison between resistive and collisionless double tearing modes for nearby resonant surfaces	有 PDF，待核读
F800 / 2007	Dissipation of magnetic fields in neutron star crusts due to development of a tearing mode	有 PDF，待核读
L099 / 2007	Global Two-Fluid Simulations Of Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L100 / 2007	Gyrokinetic simulations of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L101 / 2007	Hall MHD reconnection with an initial guide field By0	未获匹配全文
L102 / 2007	Is the “out-of-plane” magnetic perturbation always a quadrupole in the Hall-mediated magnetic reconnection?	未获匹配全文
E486 / 2007	Magnetic Reconnection Rate in Space Plasmas: A Fractal Approach	未获匹配全文
F618 / 2007	Magnetic reconnection during collisionless, stressed, X-point collapse using particle-in-cell simulation	有 PDF，待核读
E333 / 2007	Measurements of Linear and Nonlinear Hall Reconnection	未获匹配全文
L103 / 2007	Multi-point observations of the Hall electromagnetic field and secondary island formation during magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E451 / 2007	Numerical Studies of Linear Two Fluid Tearing Modes in Slab and Cylindrical Geometries	未获匹配全文
F561 / 2007	Numerical Study of Low Frequency Wave in Hall MHD Reconnection With Various Plasma β	未获匹配全文
E347 / 2007	Occurrence and signatures of the Hall-mediated regimes of magnetic reconnection	未获匹配全文
L104 / 2007	On the two-fluid modification of the resistive tearing instability	未获匹配全文
L105 / 2007	Poloidal Flow Generated by Drift-Tearing Mode	未获匹配全文
L106 / 2007	Poloidal Flow Generated by Tearing Mode	有 PDF，待核读
F662 / 2007	Progress in understanding magnetic reconnection in laboratory and space astrophysical plasmas	未获匹配全文
L108 / 2007	Steady-State Properties of Driven Magnetic Reconnection in 2D Electron Magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E521 / 2007	Temperature Gradients in Fast Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L109 / 2007	The bimodal distribution structure of electron density brought about by the Hall effect in the electron diffusion region during magnetic reconnection	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L110 / 2007	The influence of Hall currents, plasma viscosity and electron inertia on magnetic reconnection solutions	有 PDF，待核读
L111 / 2007	Thermal Transport Effects on Drift-Tearing Mode	未获匹配全文
E453 / 2007	Transition From Two-Fluid to Resistive MHD Tearing Instability in Slab and Cylindrical Geometries	未获匹配全文
L112 / 2007	Whistle and Hall Magnetic Field Associated with Near-Earth Magnetotail Reconnection Observed by Cluster	未获匹配全文
E404 / 2008	A Simulation Study of Hall Effect on Double Tearing Modes	未获匹配全文
F722 / 2008	A new fast reconnection model in a collisionless regime	有 PDF，待核读
E366 / 2008	A quantitative, comprehensive analytical model for “fast” magnetic reconnection in Hall MHD	未获匹配全文
L114 / 2008	COMPUTATIONAL STUDY OF THE INTERNAL KINK MODE EVOLUTION AND ASSOCIATED MAGNETIC RECONNECTION PHENOMENA	有 PDF，待核读
L115 / 2008	Calculation of resistive magnetohydrodynamics and two-fluid tearing modes by example of reversed-field-pinch-like plasma	有 PDF，待核读
L116 / 2008	Chromospheric magnetic reconnection: Two-fluid simulations of coalescing current loops	有 PDF，待核读
F613 / 2008	Chromospheric magnetic reconnection: two-fluid simulations of coalescing current loops	重复：L116
E340 / 2008	Cluster observations of collisionless Hall reconnection at high-latitude magnetopause	未获匹配全文
L117 / 2008	Collisionless tearing modes in cylindrical geometry	未获匹配全文
F591 / 2008	Development of a Turbulent Outflow During Electron-Positron Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L118 / 2008	Effect of zonal flow caused by microturbulence on the double tearing mode	未获匹配全文
L120 / 2008	Generation of Electric Field and Net Charge in Hall Reconnection	未获匹配全文
F692 / 2008	Generation of Suprathermal Electrons during Magnetic Reconnection	未获匹配全文
Dorfman2008 / 2008	Global axisymmetric simulations of two-fluid reconnection in an experimentally relevant geometry	未获匹配全文
L124 / 2008	Linear tearing mode stability equations for a low collisionality toroidal plasma	未获匹配全文
L125 / 2008	Magnetic reconnection with electron viscosity in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L126 / 2008	Magnetic reconnection with pressure gradient effect in compressible electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
F577 / 2008	Model of Reconnection of Weakly Stochastic Magnetic Field and its Testing	有 PDF，待核读
L128 / 2008	Nonlinear dynamics of rotating drift-tearing modes in tokamak plasmas	未获匹配全文
E450 / 2008	Numerical Studies of Nonlinear Two Fluid Tearing Modes in Cylindrical RFPs	未获匹配全文
F585 / 2008	Observations and simulations of asymmetric magnetic field reconnection	未获匹配全文
E335 / 2008	On the properties and limitations of magnetic reconnection in Hall MHD	未获匹配全文
E447 / 2008	Parametric analysis of the two-fluid, resistive tearing instability	未获匹配全文
F748 / 2008	Physics of collisionless reconnection in a stressed X-point collapse	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
Simakov2008 / 2008	Quantitative, Comprehensive, Analytical Model for Magnetic Reconnection in Hall Magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L131 / 2008	THEMIS observations of modified Hall fields in asymmetric magnetic field reconnection	未获匹配全文
L132 / 2008	The 2.5-D analytical model of steady-state Hall magnetic reconnection	未获匹配全文
L133 / 2008	The Hall fields and fast magnetic reconnection	未获匹配全文
E355 / 2008	The Importance of the Hall Effect in Magnetic Reconnection: Comparisons of Hybrid and Hall- less Hybrid Simulations	未获匹配全文
L134 / 2008	Three-dimensional lattice Boltzmann model for magnetic reconnection	未获匹配全文
L135 / 2008	Whistler Wave and Hall Effect in Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L136 / 2009	A numerical study of magnetic reconnection: a central scheme for Hall MHD	未获匹配全文
L138 / 2009	Being on time in magnetic reconnection	未获匹配全文
F731 / 2009	Collisionless Magnetic Reconnection via Alfvén Eigenmodes	有 PDF，待核读
L139 / 2009	Collisionless magnetic reconnection in a five-moment two-fluid electron-positron plasma	有 PDF，待核读
E491 / 2009	Collisionless magnetic reconnection: analytical model and PIC simulation comparison	有 PDF，待核读
E373 / 2009	Current sheet extension and reconnection scaling in collisionless, hyperresistive, Hall MHD	未获匹配全文
E545 / 2009	Electron Dynamics in Steady Collisionless Driven Reconnection	未获匹配全文
Jain2009 / 2009	Electron scale structures in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L140 / 2009	Extension of the Electron Dissipation Region in Collisionless Hall MHD Reconnection	重复：Sullivan2009
F775 / 2009	Fast magnetic reconnection in a kinked current sheet	未获匹配全文
L142 / 2009	In situ observations of reconnection Hall magnetic fields at Mars: Evidence for ion diffusion region encounters	未获匹配全文
F661 / 2009	Magnetic Reconnection in Astrophysical and Laboratory Plasmas	未获匹配全文
L143 / 2009	Magnetic reconnection with pressure tensor in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E327 / 2009	Measurements of Hall Reconnection in MST	未获匹配全文
E479 / 2009	NUMERICAL TESTS OF FAST RECONNECTION IN WEAKLY STOCHASTIC MAGNETIC FIELDS	有 PDF，待核读
E399 / 2009	Nonlinear evolution of double tearing mode in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
F602 / 2009	Observation of waves near lower hybrid frequency in the reconnection region with thin current sheet	未获匹配全文
F767 / 2009	On the role of a nonscalar electron pressure in the collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L146 / 2009	Parametric analysis of the two-fluid tearing instability	未获匹配全文
L147 / 2009	Particle-in-cell simulations of tearing modes in reversed-field-pinch-like plasma	未获匹配全文
L148 / 2009	Plasmoid-like structures in multiple X line Hall MHD reconnection	未获匹配全文
L150 / 2009	RELATIVISTIC TWO-FLUID SIMULATIONS OF GUIDE FIELD MAGNETIC RECONNECTION	有 PDF，待核读
E342 / 2009	Reconnection Hall current system observed in the magnetotail and in the ionosphere	未获匹配全文
F573 / 2009	Reconnection in semicollisional, low-β plasmas	未获匹配全文
E332 / 2009	Reconnection properties in Hall MHD Plasmas	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F609 / 2009	Simulation And Analysis Of Magnetic Reconnection In An Experimental Geometry	有 PDF，待核读
L151 / 2009	Simulation and Analysis of Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma Astrophysics Experiment	有 PDF，待核读
L152 / 2009	Structure of the dissipation region in fluid simulations of asymmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
L153 / 2009	TWO-FLUID MAGNETOHYDRODYNAMIC SIMULATIONS OF RELATIVISTIC MAGNETIC RECONNECTION	有 PDF，待核读
E462 / 2009	Tearing mode with guide field gradient in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E423 / 2009	Two-Fluid MHD Simulations of Relativistic Magnetic Reconnection	重复：L153
L155 / 2009	Two-fluid regimes of the resistive and collisionless tearing instability	未获匹配全文
F776 / 2009	What Turns Reconnection On and Off	未获匹配全文
E433 / 2010	A Two Fluid Code to Study Cross Scale Coupling in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L158 / 2010	Asymmetry of the Ion Diffusion Region Hall Electric and Magnetic Fields during Guide Field Reconnection: Observations and Comparison with Simulations	有 PDF，待核读
F756 / 2010	Cluster observations of bidirectional beams caused by electron trapping during antiparallel reconnection	未获匹配全文
E513 / 2010	Collisionless magnetic reconnection in the presence of a sheared velocity field	未获匹配全文
E372 / 2010	Diamagnetic Effects on Asymmetric Reconnection: A Comparative PIC and Hall MHD Study	未获匹配全文
E440 / 2010	Fast 2D magnetic reconnection: relating anomalous resistivity and two-fluid MHD models	未获匹配全文
F663 / 2010	Fast and slow two-fluid magnetic reconnection	重复：L160
L161 / 2010	Linear and nonlinear stability of drift-tearing mode	未获匹配全文
F734 / 2010	Local modeling of collisionless magnetic reconnection in the dayside magnetosphere	未获匹配全文
F660 / 2010	Magnetic reconnection	未获匹配全文
L162 / 2010	Magnitude of the Hall fields during magnetic reconnection	未获匹配全文
E334 / 2010	Measurements of impulsive reconnection driven by nonlinear Hall dynamics	未获匹配全文
E357 / 2010	Measurements of nonlinear Hall-driven reconnection in the reversed field pinch	未获匹配全文
E330 / 2010	On the question of hysteresis in Hall MHD Reconnection	未获匹配全文
Sullivan2010 / 2010	On the question of hysteresis in Hall magnetohydrodynamic reconnection	未获匹配全文
E424 / 2010	Pressure anisotropy in two-fluid simulations of magnetic reconnection	未获匹配全文
L165 / 2010	Simulation of Fast Magnetic Reconnection using a Two-Fluid Model of Collisionless Pair Plasma without Anomalous Resistivity	有 PDF，待核读
F586 / 2010	Study of magnetic reconnection in collisional and collionless plasmas in Magnetic Reconnection Experiment (MRX)	有 PDF，待核读
E415 / 2010	Tearing Instabilities in the Reversed-Field Pinch in the Presence of Hall Currents and Pressure Gradients	未获匹配全文
F745 / 2010	The Alfvén edge in asymmetric reconnection	有 PDF，待核读
E464 / 2010	The nonlinear evolution of tearing mode with electron viscosity in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E393 / 2010	The role of kinetic effects and parallel electric fields within the Hall current system of collisionless reconnection	未获匹配全文
E421 / 2010	Two-Fluid Models of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E529 / 2010	Two-dimensional and three-dimensional collisionless reconnection	未获匹配全文
E426 / 2010	Two-fluid Simulations of Relativistic Magnetic Reconnection in Pair Plasmas	未获匹配全文
F634 / 2010	Wave properties in the magnetic reconnection diffusion region with high β: Application of the k-filtering method to Cluster multispacecraft data	未获匹配全文
E370 / 2011	3D Dynamics of Magnetopause Reconnection Using Hall-MHD Global Simulations	未获匹配全文
L167 / 2011	A 2.5-D electron Hall-MHD analytical model of steady state Hall magnetic reconnection in a compressible plasma	未获匹配全文
E442 / 2011	A Two-Fluid Reconnection Code, Implementing the Electron Pressure Tensor With New Anisotropic Equations of State	未获匹配全文
L168 / 2011	A comparison of fluid and kinetic models of steady magnetic reconnection	未获匹配全文
E416 / 2011	A study of shear flows induced by nonlinear evolution of double tearing modes in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L169 / 2011	Collisionless magnetic reconnection: Flux quanta, field lines, ‘composite electrons’ – Is the quantum-Hall effect involved in its micro-scale physics?	有 PDF，待核读
E412 / 2011	Diamagnetic Effects on Double Tearing Modes in Hall-MHD and PIC Simulations	未获匹配全文
F777 / 2011	Dissipation mechanism in 3D magnetic reconnection	未获匹配全文
L170 / 2011	Downward auroral currents from the reconnection Hall-region	有 PDF，待核读
F588 / 2011	Electron dynamics in collisionless magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L171 / 2011	Evidence of the origin of the Hall magnetic field for reconnection: Hall MHD reconstruction results from Cluster observations	未获匹配全文
F562 / 2011	FAST MAGNETIC RECONNECTION AND SPONTANEOUS STOCHASTICITY	有 PDF，待核读
F584 / 2011	Fast Magnetic Reconnection in Laser-Produced Plasma Bubbles	有 PDF，待核读
F762 / 2011	Fast linear growth of collisionless double tearing modes in a cylindrical plasma	未获匹配全文
F749 / 2011	Gyrokinetic simulations of the tearing instability	有 PDF，待核读
L172 / 2011	Hall MHD simulations of collisionless multiple X line reconnection	未获匹配全文
E328 / 2011	Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas in the Magnetic Reconnection Experiment	未获匹配全文
F574 / 2011	Influences of sub-Alfvénic shear flows on nonlinear evolution of magnetic reconnection in compressible plasmas	未获匹配全文
F630 / 2011	Ion acceleration in antiparallel collisionless magnetic reconnection: Kinetic and fluid aspects	有 PDF，待核读
E507 / 2011	Magnetic Reconnection: A Kinetic Treatment	未获匹配全文
E495 / 2011	Magnetic islands produced by reconnection in large current layers: A statistical approach to modeling at global scales	有 PDF，待核读
E478 / 2011	Magnetic reconnection as an element of turbulence	有 PDF，待核读
F680 / 2011	Mechanisms of impulsive magnetic reconnection: Global and local aspects	未获匹配全文
F789 / 2011	ONSET OF FAST MAGNETIC RECONNECTION IN PARTIALLY IONIZED GASES	有 PDF，待核读
F583 / 2011	Scaling of the magnetic reconnection rate with symmetric shear flow	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E406 / 2011	Secondary Tearing Mode in Hall MHD and Its Application	未获匹配全文
L176 / 2011	The Hall Current System for Magnetic Reconnection in the Magnetotail	未获匹配全文
F619 / 2011	The Kinetic Structure of Collisionless Slow Shocks and Reconnection Exhausts	有 PDF，待核读
L177 / 2011	The inner structure of collisionless magnetic reconnection: The electron-frame dissipation measure and Hall fields	有 PDF，待核读
L178 / 2011	Theory and simulations of the scaling of magnetic reconnection with symmetric shear flow	未获匹配全文
L179 / 2011	Three-dimensional magnetic reconnection through a moving magnetic null	有 PDF，待核读
F599 / 2012	Characteristics of Reconnection Diffusion Region in the Solar Wind	有 PDF，待核读
F569 / 2012	Collisionless magnetic reconnection in a plasmoid chain	有 PDF，待核读
Ohia2012 / 2012	Demonstration of Anisotropic Fluid Closure Capturing the Kinetic Structure of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E494 / 2012	Distribution and evolution of plasma structure in region near X-line of magnetic reconnection	未获匹配全文
E386 / 2012	Effects of out-of-plane shear flows on fast reconnection in a two-dimensional Hall magnetohydrodynamics model	未获匹配全文
F590 / 2012	Electron dynamics in the reconnection ion diffusion region	未获匹配全文
F727 / 2012	Experimental evaluation of common spacecraft data analysis techniques for reconnection region analysis in a laboratory plasma	未获匹配全文
E348 / 2012	Guide Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma	未获匹配全文
E331 / 2012	Hall electric fields during reconnection	未获匹配全文
L181 / 2012	Hall magnetohydrodynamic effects for three-dimensional magnetic reconnection with finite width along the direction of the current	未获匹配全文
L182 / 2012	Linear stability of the tearing mode with two-fluid and curvature effects in tokamaks	未获匹配全文
F594 / 2012	MAGNETIC RECONNECTION, HELICITY DYNAMICS, AND HYPER-DIFFUSION	未获匹配全文
E483 / 2012	Magnetic reconnection in high-energy-density laser-produced plasmas	未获匹配全文
E526 / 2012	Nonlinear Acceleration Mechanism of Collisionless Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L183 / 2012	Nonlinear wave propagation and reconnection at magnetic X-points in the Hall MHD regime	有 PDF，待核读
L186 / 2012	Reconnection events in two-dimensional Hall magnetohydrodynamic turbulence	未获匹配全文
F601 / 2012	Scaling of the inner electron diffusion region in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L187 / 2012	Seed island formation by forced magnetic reconnection	未获匹配全文
E460 / 2012	Simulations of Experiments on Electron Magnetohydrodynamic Reconnection in a Field Reversed Configuration	未获匹配全文
E402 / 2012	Supersonic regime of the Hall-MHD tearing instability	未获匹配全文
E405 / 2012	Supersonic regime of the Hall-magnetohydrodynamics resistive tearing instability	未获匹配全文
L188 / 2012	Three-dimensional, impulsive magnetic reconnection in a laboratory plasma	未获匹配全文
E395 / 2013	3-D Simulations of Turbulent and Non-Turbulent Hall Magnetic Reconnection Via the Four-Field Equations	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F664 / 2013	A review of pressure anisotropy caused by electron trapping in collisionless plasma, and its implications for magnetic reconnection	未获匹配全文
F687 / 2013	Application of PDSLin to the magnetic reconnection problem	未获匹配全文
F773 / 2013	Bifurcated Structure of the Electron Diffusion Region in Three-Dimensional Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F795 / 2013	Cluster observations near reconnection X lines in Earth's magnetotail current sheet	未获匹配全文
F667 / 2013	Collisionless magnetic reconnection in space plasmas	有 PDF，待核读
E419 / 2013	Comment on "Supersonic regime of the Hall-magnetohydrodynamics resistive tearing instability" [Phys. Plasmas 19, 072519 (2012)]	未获匹配全文
E468 / 2013	Forced Magnetic Reconnection at an X-point: Particle-In-Cell and Ten-Moment Extended MHD Simulations	未获匹配全文
F709 / 2013	Formation of a transient front structure near reconnection point in 3-D PIC simulations	未获匹配全文
F801 / 2013	Gyrokinetic simulation of microtearing turbulence	未获匹配全文
E414 / 2013	Hall-MHD resistive tearing modes in finite-aspect-ratio cylindrical geometry	未获匹配全文
F564 / 2013	How to identify reconnecting current sheets in incompressible Hall MHD turbulence	未获匹配全文
F677 / 2013	Identification of Intermittent Multifractal Turbulence in Fully Kinetic Simulations of Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F736 / 2013	Low frequency Whistler waves excited in fast magnetic reconnection processes	未获匹配全文
E490 / 2013	Magnetic reconnection and particle acceleration in semi-collisional plasmas	未获匹配全文
E352 / 2013	Magnetic reconnection in Hall-MHD including electron inertia	未获匹配全文
F596 / 2013	Mechanisms of field-aligned current formation in magnetic reconnection	未获匹配全文
F787 / 2013	New Electric Field in Asymmetric Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F785 / 2013	On phase diagrams of magnetic reconnection	未获匹配全文
E485 / 2013	On the structure of guide magnetic field in the inertia-driven magnetic reconnection with the presence of shear flow	未获匹配全文
L192 / 2013	Onset of Hall-mediated magnetic reconnection in weakly ionized astrophysical plasmas	未获匹配全文
F582 / 2013	Plasmoid instability in high-Lundquist-number magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F688 / 2013	Propagation speed of rotation signals for field lines undergoing magnetic reconnection	未获匹配全文
F579 / 2013	Reconnection-driven plasmoids in blazars: fast flares on a slow envelope	有 PDF，待核读
F665 / 2013	Regimes of the Electron Diffusion Region in Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E420 / 2013	Response to "Comment on 'Supersonic regime of the Hall-magnetohydrodynamics resistive tearing instability'" [Phys. Plasmas 20, 014703 (2013)]	未获匹配全文
E517 / 2013	Reversible collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E413 / 2013	The effects of a shear flow on nonlinear evolutions of double tearing mode in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L194 / 2013	The influence of out-of-plane shear flow on Hall magnetic reconnection and FTE generation	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L195 / 2013	The scaling of reconnection rate in the two-fluid model of a collisionless forced magnetic reconnection	未获匹配全文
L196 / 2013	Two-fluid 20-moment simulation of fast magnetic reconnection	海报 / 幻灯片
L198 / 2014	A Study of Magnetic Reconnection: From 2D Energy Release to 3D Spreading and Localization	未获匹配全文
F605 / 2014	Asymmetric evolution of magnetic reconnection in collisionless accretion disk	有 PDF，待核读
L199 / 2014	Bursty magnetic reconnection under slow shock-generated whistler waves	未获匹配全文
E435 / 2014	Comparison of Two-Fluid and Kinetic Simulations of Magnetic Reconnection in Line-Tied Systems	未获匹配全文
L200 / 2014	Conversion of the dominantly ideal perturbations into a tearing mode after a sawtooth crash	未获匹配全文
E454 / 2014	Effect of parallel heat flux in the gyroviscous tensor on tearing mode instability in two-fluid magnetohydrodynamic model	未获匹配全文
F610 / 2014	Estimating proximity to the asymmetric reconnection X-line	未获匹配全文
F702 / 2014	Fast sawtooth reconnection at realistic Lundquist numbers	未获匹配全文
L203 / 2014	Gaussian-Moment Relaxation Closures for Verifiable Numerical Simulation of Fast Magnetic Reconnection in Plasma	有 PDF，待核读
L205 / 2014	Interaction of magnetic reconnection and Kelvin-Helmholtz modes for large magnetic shear: 1. Kelvin-Helmholtz trigger	未获匹配全文
L206 / 2014	Interaction of magnetic reconnection and Kelvin-Helmholtz modes for large magnetic shear: 2. Reconnection trigger	未获匹配全文
F725 / 2014	Lessons on collisionless reconnection from quantum fluids	有 PDF，待核读
F797 / 2014	Magnetic Reconnection in Plasma under Inertial Confinement Fusion Conditions Driven by Heat Flux Effects in Ohm’s Law	有 PDF，待核读
E476 / 2014	Magnetic reconnection in high-temperature plasmas: from fluid to gyrofluid modeling	未获匹配全文
L207 / 2014	Nonlinear dynamics of the tearing mode with two-fluid and curvature effects in tokamaks	未获匹配全文
L208 / 2014	Nonlinear mutual destabilization of the tearing mode and ion temperature gradient mode	未获匹配全文
F742 / 2014	Relativistic magnetic reconnection in collisionless ion-electron plasmas explored with particle-in-cell simulations	有 PDF，待核读
E349 / 2014	Scaling of Hall Reconnection in the Coalescence Problem in Large Systems	未获匹配全文
F653 / 2014	Strong electron heating and non-Maxwellian behavior in magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F713 / 2014	Study of local reconnection physics in a laboratory plasma	有 PDF，待核读
E444 / 2014	Studying Incomplete Sawtooth Reconnection in ASDEX Upgrade with the Non-linear Two-fluid 3D MHD Code M3D-C1	未获匹配全文
E523 / 2014	The origins of electrical resistivity in magnetic reconnection: Studies by 2D and 3D macro particle simulations	有 PDF，待核读
E493 / 2014	The scale of the magnetotail reconnecting current sheet in the presence of O+	未获匹配全文
F770 / 2014	Three dimensional instabilities of an electron scale current sheet in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L209 / 2014	Three-dimensional fast magnetic reconnection driven by relativistic ultraintense femtosecond lasers	未获匹配全文
E434 / 2014	Two-fluid simulations of magnetic reconnection with a kinetic closure for the electron pressure anisotropy	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F737 / 2015	ASYMMETRIC MAGNETIC RECONNECTION IN WEAKLY IONIZED CHROMOSPHERIC PLASMAS	有 PDF，待核读
L211 / 2015	Asymmetric magnetic reconnection with a flow shear and applications to the magnetopause	有 PDF，待核读
E431 / 2015	Basic Study on the High-Resolution Two-Fluid Simulation of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F757 / 2015	Development of bifurcated current sheets in solar wind reconnection exhausts	未获匹配全文
F750 / 2015	Direct evidence for kinetic effects associated with solar wind reconnection	有 PDF，待核读
E522 / 2015	Evolution of electron current sheets in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E457 / 2015	Fast magnetic reconnection in thin current sheets: effects of different current profiles and electron inertia in Ohm's law.	未获匹配全文
F603 / 2015	Frozen flux violation, electron demagnetization and magnetic reconnection	未获匹配全文
F568 / 2015	Generation of Alfvénic waves and turbulence in reconnection jets	有 PDF，待核读
L218 / 2015	How Does the Guide Field Affect the Asymmetry of Hall Magnetic and Electric Fields in Fast Magnetic Reconnection?	未获匹配全文
F571 / 2015	Magnetic reconnection: from the Sweet–Parker model to stochastic plasmoid chains	有 PDF，待核读
E438 / 2015	Measuring Properties of Magnetic Reconnection in Nonlinear Resistive and Two-Fluid Toroidal Simulations of Sawteeth	未获匹配全文
L219 / 2015	Modelling and analytic studies of sheared flow effects on tearing modes	未获匹配全文
L220 / 2015	Modification of the Hall physics in magnetic reconnection due to cold ions at the Earth's magnetopause	未获匹配全文
E497 / 2015	Recent Developments in Reconnection Theory: the Plasmoid Instability, Self-Generated Turbulence, and Implications for Laboratory and Space Plasmas	未获匹配全文
E343 / 2015	Reconnection dynamics with secondary tearing instability in compressible Hall plasmas	未获匹配全文
Ohia2015 / 2015	Scaling laws for magnetic reconnection, set by regulation of the electron pressure anisotropy to the firehose threshold	未获匹配全文
F685 / 2015	Slowing of Magnetic Reconnection Concurrent with Weakening Plasma Inflows and Increasing Collisionality in Strongly Driven Laser-Plasma Experiments	有 PDF，待核读
L222 / 2015	Theory and Simulations of Incomplete Reconnection During Sawteeth Due to Diamagnetic Effects	未获匹配全文
F637 / 2015	UNCERTAINTY QUANTIFICATION OF THE GEM CHALLENGE MAGNETIC RECONNECTION PROBLEM USING THE MULTILEVEL MONTE CARLO METHOD	未获匹配全文
F684 / 2016	Cold ion demagnetization near the X-line of magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E422 / 2016	Effect of electron inertia in two-fluid magnetic reconnection	未获匹配全文
E477 / 2016	Energy principle for a gyrofluid model and variational description of collisionless tearing modes	未获匹配全文
F642 / 2016	Extreme ultra-violet burst, particle heating, and whistler wave emission in fast magnetic reconnection induced by kink-driven Rayleigh-Taylor instability	有 PDF，待核读
F729 / 2016	Fluid and Magnetofluid Modeling of Relativistic Magnetic Reconnection	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E396 / 2016	Hall-MHD simulations of the magnetosphere-northward solar wind interface : the Kelvin-Helmholtz instability as an entry mechanism for the solar wind through mixing and reconnections	未获匹配全文
F791 / 2016	Inside the Black Box: Magnetic Reconnection and the Magnetospheric Multiscale Mission	未获匹配全文
E387 / 2016	Ion and electron dynamics generating the Hall current in the exhaust far downstream of the reconnection x-line	未获匹配全文
L226 / 2016	Kinetic Alfvén wave explanation of the Hall fields in magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E556 / 2016	Local properties of magnetic reconnection in nonlinear resistive- and extended-magnetohydrodynamic toroidal simulations of the sawtooth crash	有 PDF，待核读
E375 / 2016	Magnetic reconnection at the magnetopause: Low-energy ions and modification of the Hall physics	未获匹配全文
F683 / 2016	Magnetic reconnection in Saturn's magnetotail: A comprehensive magnetic field survey	未获匹配全文
E509 / 2016	Magnetospheric Multiscale Observations of the Electron Diffusion Region of Large Guide Field Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F669 / 2016	Magnetospheric Multiscale observations of magnetic reconnection associated with Kelvin-Helmholtz waves	未获匹配全文
L228 / 2016	Observations of Hall Reconnection Physics Far Downstream of the X Line	有 PDF，待核读
F728 / 2016	On Lorentz invariants in relativistic magnetic reconnection	未获匹配全文
F649 / 2016	Perspectives on magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L229 / 2016	Relativistic tearing and drift-kink instabilities in two-fluid simulations	有 PDF，待核读
F587 / 2016	Resistive tearing instability in electron MHD: application to neutron star crusts	有 PDF，待核读
E388 / 2016	Structures of the Hall magnetic field in the dayside magnetic reconnection inferred from Geotail data	未获匹配全文
L231 / 2016	Tearing and surface preserving electron magnetohydrodynamic modes in a current layer	有 PDF，待核读
E361 / 2016	The plasmoid instability and Hall effect during chromospheric magnetic reconnection	未获匹配全文
E378 / 2016	The role of Hall magnetic field in large-scale magnetic reconnection dynamics and structure	未获匹配全文
E443 / 2016	Three-dimensional two-fluid investigation of 3D-localized magnetic reconnection and its relation to whistler waves	未获匹配全文
L232 / 2016	Two types of whistler waves in the hall reconnection region	未获匹配全文
F626 / 2016	Understanding the dynamics and energetics of magnetic reconnection in a laboratory plasma: Review of recent progress on selected fronts	有 PDF，待核读
E514 / 2016	‘Ideally’ unstable current sheets and the triggering of fast magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E437 / 2017	A generalized two-fluid picture of non-driven collisionless reconnection and its relation to whistler waves	有 PDF，待核读
E380 / 2017	Cold ion heating in the vicinity of the Hall field region in dayside magnetic reconnection	未获匹配全文
E504 / 2017	Collisionless Reconnection in Magnetohydrodynamic and Kinetic Turbulence	有 PDF，待核读
F668 / 2017	Disruption of Alfvénic turbulence by magnetic reconnection in a collisionless plasma	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L233 / 2017	Double-peaked core field of flux ropes during magnetic reconnection	未获匹配全文
L234 / 2017	Effect of Radiation on Chromospheric Magnetic Reconnection: Reactive and Collisional Multi-fluid Simulations	未获匹配全文
F763 / 2017	Electron and Ion Acceleration Associated with Magnetotail Reconnection	未获匹配全文
E390 / 2017	Electron scale quadrants of the Hall quadrupolar structure observed during asymmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
L235 / 2017	Electron-Scale Quadrants of the Hall Magnetic Field Observed by the Magnetospheric Multiscale spacecraft during Asymmetric Reconnection	有 PDF，待核读
F732 / 2017	Experimental Verification of the Role of Electron Pressure in Fast Magnetic Reconnection with a Guide Field	未获匹配全文
F566 / 2017	Forced magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L237 / 2017	Generation of Alfvén wave energy during magnetic reconnection in Hall MHD	未获匹配全文
E398 / 2017	Hall effect on tearing mode instabilities in tokamak	未获匹配全文
F652 / 2017	How anomalous resistivity accelerates magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E362 / 2017	Kinetic Alfven wave explanation of the Hall signals in magnetic reconnection	未获匹配全文
E541 / 2017	Kinetic-scale flux rope reconnection in periodic and line-tied geometries	未获匹配全文
E547 / 2017	Linear tearing modes in an electron-positron plasma	未获匹配全文
F681 / 2017	Magnetic Reconnection in Turbulent Diluted Plasmas	有 PDF，待核读
F686 / 2017	Magnetic reconnection in the high-energy density regime	未获匹配全文
F721 / 2017	Magneto-thermal reconnection processes, related mode momentum and formation of high energy particle populations	有 PDF，待核读
E488 / 2017	On the influence of environmental parameters on mixing and reconnection caused by the Kelvin-Helmholtz instability at the magnetopause	未获匹配全文
E392 / 2017	Particle-in-cell simulations of asymmetric guide-field reconnection: quadrupolar structure of Hall magnetic field	海报 / 幻灯片
F705 / 2017	Quadrupolar pattern of the asymmetric guide-field reconnection	未获匹配全文
L239 / 2017	Quantitative analysis of a Hall system in the exhaust of asymmetric magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E543 / 2017	Secondary fast reconnecting instability in the sawtooth crash	有 PDF，待核读
E336 / 2017	Simulations of Hall reconnection in partially ionized plasmas	未获匹配全文
E408 / 2017	Tearing mode dynamics and sawtooth oscillation in Hall-MHD	未获匹配全文
F790 / 2017	The Effects of Turbulence on Magnetic Reconnection at the Magnetopause	有 PDF，待核读
E381 / 2017	Tripolar Hall Magnetic Field Signatures in Magnetic Reconnection in the Solar Wind and Magnetopause	未获匹配全文
F608 / 2017	Turbulent transport in 2D collisionless guide field reconnection	有 PDF，待核读
E441 / 2017	Two-fluid studies including pressure tensor effects of current sheet instabilities and reconnection in the magnetotail	未获匹配全文
L242 / 2017	Two-fluid tearing mode instability in cylindrical geometry	未获匹配全文
F612 / 2018	An Electron-Scale Current Sheet Without Bursty Reconnection Signatures Observed in the Near-Earth Tail	未获匹配全文
L245 / 2018	An intuitive two-fluid picture of spontaneous 2D collisionless magnetic reconnection and whistler wave generation	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E445 / 2018	An intuitive two-fluid picture of spontaneous collisionless magnetic reconnection and whistler wave generation involving frozen-in canonical vorticity	未获匹配全文
L246 / 2018	Fast magnetic reconnection: The ”ideal” tearing instability in classic, Hall, and relativistic plasmas	有 PDF，待核读
F715 / 2018	General connected and reconnected fields in plasmas	未获匹配全文
E369 / 2018	Hall electric field in pre-reconnection magnetotail thin current sheet	未获匹配全文
F793 / 2018	MMS Observation of Asymmetric Reconnection Supported by 3-D Electron Pressure Divergence	有 PDF，待核读
F675 / 2018	Magnetic Reconnection in Strongly Magnetized Regions of the Low Solar Chromosphere	有 PDF，待核读
F671 / 2018	Magnetic reconnection driven by electron dynamics	有 PDF，待核读
L248 / 2018	Magnetic reconnection in fusion plasmas	未获匹配全文
F624 / 2018	North-South Asymmetric Kelvin-Helmholtz Instability and Induced Reconnection at the Earth’s Magnetospheric Flanks	有 PDF，待核读
L249 / 2018	Numerical analysis of two-fluid tearing mode instability in a finite aspect ratio cylinder	未获匹配全文
E374 / 2018	Onset and nonlinear evolution of fast reconnection: Lundquist number and Hall effects	未获匹配全文
L252 / 2018	Quadrupolar and hexapolar Hall magnetic field during asymmetric magnetic reconnection without a guide field	未获匹配全文
E344 / 2018	Recombination and the Hall Effect in Simulations of Chromospheric Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L253 / 2018	Reconnection in the Martian Magnetotail: Hall- MHD With Embedded Particle-in-Cell Simulations	未获匹配全文
L254 / 2018	Reconstruction of the Electron Diffusion Region of Magnetotail Reconnection Seen by the MMS Spacecraft on 11 July 2017	未获匹配全文
L255 / 2018	Structures of Hall Fields in Asymmetric Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E487 / 2018	Study of magnetic reconnection in large-scale magnetic island coalescence via spatially coupled MHD and PIC simulations	有 PDF，待核读
E452 / 2018	Two-fluid edge-plasma SOL turbulent transport driven by interchange/tearing instabilities	未获匹配全文
L258 / 2018	Upward Frequency Sweeping Due to the Nonlinear Resonance of Multiwave Coupling and Its Significant Contribution to the Hall Effect at the Reconnection Point	未获匹配全文
L259 / 2019	A Parametric Study of the Structure of Hall Magnetic Field Based on Kinetic Simulations. I. Anti-parallel Magnetic Reconnection in an Asymmetric Current Sheet	未获匹配全文
L260 / 2019	A Parametric Study of the Structure of Hall Magnetic Field Based on Kinetic Simulations. II. Asymmetric Magnetic Reconnection with a Guide Field	未获匹配全文
F694 / 2019	Asymmetric and endogenous magnetic reconnection processes in quasi-collisionless plasmas	有 PDF，待核读
F774 / 2019	Collisionless Magnetic Reconnection and Waves: Progress Review	有 PDF，待核读
F658 / 2019	Dissipation of Earthward Propagating Flux Rope Through Re-reconnection with Geomagnetic Field: An MMS Case Study	有 PDF，待核读
E449 / 2019	Effect of Two-Fluid Equilibrium Flow on Tearing Linear Stability	未获匹配全文
L261 / 2019	Electron Magnetohydrodynamics Magnetic Reconnection Experiment on Keda Linear Magnetized Plasma Device	未获匹配全文
E548 / 2019	Fluid closures for the modelling of reconnection and instabilities in magnetotail current sheets	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F682 / 2019	Gravitational electromotive force in magnetic reconnection around Schwarzschild black holes	有 PDF，待核读
F632 / 2019	Inner and outer electron diffusion region of antiparallel collisionless reconnection: Density dependence	有 PDF，待核读
F645 / 2019	Magnetospheric MultiscaleMission Observations of Reconnecting Electric Fields in the Magnetotail on Kinetic Scales	有 PDF，待核读
F623 / 2019	Mechanism of Reconnection on Kinetic Scales Based on Magnetospheric Multiscale Mission Observations	未获匹配全文
F754 / 2019	Numerical study of tearing mode seeding in tokamak X-point plasma	有 PDF，待核读
F726 / 2019	Relativistic Tearing Mode in Pair Plasmas and Application to Magnetic Giant Flares	未获匹配全文
F693 / 2019	Satellite Data-Based 3-D Simulation of Kelvin-Helmholtz Instability and Induced Magnetic Reconnection at the Earth's Magnetopause	有 PDF，待核读
E533 / 2019	The electron canonical battery effect in magnetic reconnection: Completion of the electron canonical vorticity framework	有 PDF，待核读
F638 / 2020	Comparative Analysis of the Vlasiator Simulations and MMS Observations of Multiple X-Line Reconnection and Flux Transfer Events	未获匹配全文
L266 / 2020	Effect of bootstrap current on the onset of neoclassical tearing mode	未获匹配全文
F723 / 2020	Grad–Shafranov reconstruction of the magnetic configuration in the reconnection X-point vicinity in compressible plasma	未获匹配全文
F747 / 2020	MESSENGER Observations of Mercury's Nightside Magnetosphere Under Extreme Solar Wind Conditions: Reconnection-Generated Structures and Steady Convection	未获匹配全文
E482 / 2020	Magnetic Reconnection and Turbulence in the Inner Heliosphere	未获匹配全文
E539 / 2020	Magnetic reconnection in 3D fusion devices: non-linear reduced equations and linear current-driven instabilities	未获匹配全文
F570 / 2020	Magnetotail Reconnection Asymmetries in a Small, Earth-Like Magnetosphere	未获匹配全文
F707 / 2020	Major Scientific Challenges and Opportunities in Understanding Magnetic Reconnection and Related Explosive Phenomena in Solar and Heliospheric Plasmas	有 PDF，待核读
E540 / 2020	Multiparametric study of tearing modes in thin current sheets	有 PDF，待核读
F657 / 2020	Multiscale Coupling During Magnetopause Reconnection: Interface Between the Electron and Ion Diffusion Regions	有 PDF，待核读
F752 / 2020	Observation of Energy Conversion Near the X-line in Asymmetric Guide-field Reconnection	未获匹配全文
F622 / 2020	Physical Implication of Two Types of Reconnection Electron Diffusion Regions With and Without Ion-Coupling in the Magnetotail Current Sheet	有 PDF，待核读
F580 / 2020	Reconnection from a turbulence perspective	有 PDF，待核读
E323 / 2020	Reconnection in Hall-MHD	未获匹配全文
E389 / 2020	Reconnection-Driven Dynamics at Ganymede's Upstream Magnetosphere: 3-D Global Hall MHD and MHD-EPIC Simulations	未获匹配全文
E551 / 2020	Reconstruction of Electron and Ion Distribution Functions in a Magnetotail Reconnection Diffusion Region	有 PDF，待核读
E463 / 2020	Tearing mode analysis in electron magnetohydrodynamics with pressure gradient	未获匹配全文
F805 / 2020	The physics of a collisionless micro-scale tearing mode	有 PDF，待核读
E350 / 2020	Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L269 / 2020	Using a Higher-order Numerical Scheme to Study the Hall Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F651 / 2021	A novel kinetic mechanism for the onset of fast magnetic reconnection and plasmoid instabilities in collisionless plasmas	有 PDF，待核读
L270 / 2021	Electrodynamic Contributions to the Hall- and Parallel Electric Fields in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L271 / 2021	Energy transfer in reconnection and turbulence	有 PDF，待核读
E411 / 2021	Hall instability: origin, properties and asymptotic theory for its tearing mode	有 PDF，待核读
F760 / 2021	Impact of electron temperature anisotropy on the collisionless tearing mode instability in the presence of a strong guide field	有 PDF，待核读
L273 / 2021	Influence of Hall effect and toroidal flow on the plasmoid formation and incomplete reconnection in a low resistivity plasma in tokamak	未获匹配全文
F700 / 2021	Kelvin-Helmholtz instability and induced magnetic reconnection at the Earth’s magnetopause: a 3D simulation based on satellite data	有 PDF，待核读
L274 / 2021	MMS Observation of the Hall Field in an Asymmetric Magnetic Reconnection with Guide Field	未获匹配全文
F643 / 2021	MMS Observations of Double Mid-Latitude Reconnection Ion Beams in the Early Non-Linear Phase of the Kelvin-Helmholtz Instability	有 PDF，待核读
F698 / 2021	Magnetic Reconnection Within the Boundary Layer of a Magnetic Cloud in the Solar Wind	有 PDF，待核读
F595 / 2021	Magnetic reconnection as an energy cascade process	重复：L271
E492 / 2021	Magnetotail reconnection asymmetries in an ion-scale, Earth-like magnetosphere	有 PDF，待核读
F576 / 2021	Nonlinear evolution and secondary island formation of the double tearing mode in a hybrid simulation	未获匹配全文
E465 / 2021	Numerical studies on electron magnetohydrodynamics tearing mode instability	未获匹配全文
E496 / 2021	Reconnection as an Energy Cascade	未获匹配全文
F593 / 2021	Reconnection-Controlled Decay of Magnetohydrodynamic Turbulence and the Role of Invariants	有 PDF，待核读
F628 / 2021	Shear Alfvén Waves Driven by Magnetic Reconnection as an Energy Source for the Aurora Borealis	有 PDF，待核读
F656 / 2021	The Formation of Electron Outflow Jets with Power-law Energy Distribution in Guide-field Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F701 / 2021	W7-X and the sawtooth instability: towards realistic simulations of current-driven magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L276 / 2022	12 Cross-discipline study of the two-fluid dynamics of magnetic reconnection in laboratory and magnetopause plasmas	未获匹配全文
E432 / 2022	5 Development of two-fluid theory for reconnection coordinated with key observations	未获匹配全文
F796 / 2022	Anisotropic Electron Heating in Turbulence-driven Magnetic Reconnection in the Near-Sun Solar Wind	有 PDF，待核读
F712 / 2022	Energy Transport during 3D Small-scale Reconnection Driven by Anisotropic Plasma Turbulence	有 PDF，待核读
L277 / 2022	Evidence of the Hall Effect Providing the Core Field inside a Magnetic Flux Rope in an Antiparallel Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F740 / 2022	Fast magnetic reconnection and driven plasma rotation in reversed central magnetic shear configuration	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F746 / 2022	Influence of anomalous perpendicular transport on linear tearing mode dynamics in tokamak plasmas	有 PDF，待核读
F614 / 2022	Kinetic Alfven wave (KAW) eigenmode in magnetosphere magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L278 / 2022	Magnetic reconnection rate during sawtooth crashes in ASDEX Upgrade	未获匹配全文
E537 / 2022	Microscopic scales of linear tearing modes: a tutorial on boundary layer theory for magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L279 / 2022	Scaling Theory of 3D Magnetic Reconnection X-Line Spreading	未获匹配全文
L280 / 2022	Simulation of Magnetospheric Sawtooth Oscillations: The Role of Kinetic Reconnection in the Magnetotail	未获匹配全文
L281 / 2022	Stabilization of double tearing mode growth by resonant magnetic perturbations	未获匹配全文
L282 / 2022	The Helicity Sign of Flux Transfer Event Flux Ropes and Its Relationship to the Guide Field and Hall Physics in Magnetic Reconnection at the Magnetopause	有 PDF，待核读
E461 / 2023	Asymptotic scalings of fluid, incompressible “electron-only” reconnection instabilities: Electron-magnetohydrodynamics tearing modes	有 PDF，待核读
E534 / 2023	Characteristics of Magnetic Reconnection With a Finite X-Line Length	未获匹配全文
F620 / 2023	Does Magnetic Reconnection Occur in the Near Lunar Surface Environment?	有 PDF，待核读
L284 / 2023	Effect of a guide field on the turbulence like properties of magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L285 / 2023	Electron magnetohydrodynamics Grad–Shafranov reconstruction of the magnetic reconnection electron diffusion region	有 PDF，待核读
F636 / 2023	Experimental mitigation of fast magnetic reconnection in multiple interacting laser-produced plasmas	有 PDF，待核读
L286 / 2023	Hall Fields and Current Systems of Magnetic Reconnection under Asymmetric Conditions	未获匹配全文
L287 / 2023	Hall effect on the magnetic reconnections during the evolution of a three-dimensional magnetic flux rope	有 PDF，待核读
L288 / 2023	Impact of Hall effect and ambipolar diffusion on the magnetic reconnection rate and energy distribution in the Earth’s magnetotail	未获匹配全文
E549 / 2023	MESSENGER Observations of Reconnection in Mercury’s Magnetotail Under Strong IMF Forcing	未获匹配全文
L289 / 2023	Magnetic reconnection during sawteeth crashes	未获匹配全文
F641 / 2023	Major Scientific Challenges and Opportunities in Understanding Magnetic Reconnection and Related Explosive Phenomena in Heliophysics and Beyond	未获匹配全文
L290 / 2023	Multifluid Simulations of Upper-chromospheric Magnetic Reconnection with Helium–Hydrogen Mixture	有 PDF，待核读
F753 / 2023	Non-ideal MHD growth of current interchange tearing modes at plasma edge and response to externally-imposed flow	有 PDF，待核读
F640 / 2023	Numerical investigation of the 2/1 double tearing mode in EAST with the CLT code	未获匹配全文
L291 / 2023	Observation of the Hall Magnetic Reconnection As Close As 56 Solar Radii from the Sun	未获匹配全文
E530 / 2023	Post-disruption reconnection event driven by a runaway current	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L292 / 2023	Preferential acceleration of heavy ions in magnetic reconnection: Hybrid-kinetic simulations with electron inertia	有 PDF，待核读
L293 / 2023	Role of edge-localized neoclassical tearing modes in quiescent H-mode plasmas in the DIII-D tokamak	有 PDF，待核读
F592 / 2023	Subion-Scale Turbulence Driven by Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L295 / 2023	Two-fluid reconnection jets in a gravitationally stratified atmosphere	有 PDF，待核读
F699 / 2023	Two-fluid reconnection jets in a gravitationally stratified atmosphere	重复：L295
E466 / 2024	A numerical study of electron-magnetohydrodynamics tearing modes in parameter ranges of experimental interest	有 PDF，待核读
F733 / 2024	An examination of nonlinear collisionless magnetic reconnection through eigenmode decomposition	未获匹配全文
F716 / 2024	Analytical solution of steady reconnection outflows in a time-varying three-dimensional reconnection model with generalized spatiotemporal distributions	有 PDF，待核读
F629 / 2024	Comparative simulations of Kelvin–Helmholtz induced magnetic reconnection at the Earth's magnetospheric flanks	有 PDF，待核读
F633 / 2024	Counter-Helical Magnetic Flux Ropes From Magnetic Reconnections in Space Plasmas	未获匹配全文
F784 / 2024	Current Sheet Broadening due to Turbulence in Three-dimensional Collisionless Reconnection	未获匹配全文
F654 / 2024	Duskward displacement of plasmoids and reconnection in the near-Earth magnetotail	有 PDF，待核读
F771 / 2024	Electron-only Reconnection and Ion Heating in 3D3V Hybrid-Vlasov Plasma Turbulence	有 PDF，待核读
L297 / 2024	Gyrofluid simulations of turbulence and reconnection in space plasmas	有 PDF，待核读
L298 / 2024	Hall physics during magnetic reconnection with collision effect	未获匹配全文
E546 / 2024	Influence of ion-to-electron temperature ratio on tearing instability and resulting subion-scale turbulence in a low- β e collisionless plasma	有 PDF，待核读
E467 / 2024	Instabilities of ideal magnetohydrodynamics mode and neoclassical tearing mode stabilization by electron cyclotron current drive for EHL-2 spherical torus	未获匹配全文
F607 / 2024	Intermittent Electron-only Reconnection at Lunar Mini-magnetospheres	有 PDF，待核读
F597 / 2024	Kinetic Signatures, Dawn-Dusk Asymmetries, and Flux Transfer Events Associated With Mercury's Dayside Magnetopause Reconnection From 3D MHD-AEPIC Simulations	未获匹配全文
F794 / 2024	Laboratory Study of Magnetic Reconnection in Lunar-relevant Mini-magnetospheres	有 PDF，待核读
F711 / 2024	Localization of beam generated whistler wave and turbulence generation in reconnection region of magnetopause	未获匹配全文
F799 / 2024	Neural network based fast prediction of double tearing modes in advanced tokamak plasmas	未获匹配全文
L299 / 2024	Numerical analysis of three-dimensional magnetopause-like reconnection properties by Hall MHD simulation for SPERF-AREX	未获匹配全文
E498 / 2024	Numerical study of the influence of electron inertial effects and electron dynamics on tearing mode instability	未获匹配全文
E535 / 2024	Numerical study of the suppression of magnetic reconnection onset with injected plasma	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F772 / 2024	Preferential acceleration of heavy ions in magnetic reconnection: Hybrid-kinetic simulations with electron inertia	未获匹配全文
L300 / 2024	Stability of the experimental and numerical spheromaks with shear toroidal flow induced by magnetic reconnection	未获匹配全文
F615 / 2024	Structure of the diffusion region in three dimensional magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L301 / 2024	Systematic 2.5D resistive MHD simulations with ambipolar diffusion and Hall effect for fast magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E470 / 2025	2D Full-F Gyrofluid Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E536 / 2025	Comparative study of magnetic reconnection rates in ASDEX Upgrade and EAST tokamaks	未获匹配全文
F690 / 2025	Determining the 3D Dynamics of Solar Flare Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F621 / 2025	Effect of Initial Current Sheet and Stratification on Reconnection and Coronal Heating	未获匹配全文
L303 / 2025	Effective Resistivity for Magnetohydrodynamic Simulation of Collisionless Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F751 / 2025	Evidence of a Magnetic Null in Electron-Only Reconnection	未获匹配全文
L304 / 2025	Fundamental Understanding of Magnetic Reconnection via Spiral CT Scan. V. Ion Demagnetization, Electron Demagnetization, and Hall Effect	未获匹配全文
F802 / 2025	GREENY: A full-F 2D gyrofluid reconnection code	重复：E473
F803 / 2025	Greeny: A Full-F 2dgyrofluid Reconnection Code	重复：E473
L305 / 2025	Impact of tearing instability on the global quadrupole Hall magnetic field in an anti-parallel magnetic reconnection	未获匹配全文
F708 / 2025	Influence of kinetic effects in large-scale magnetic reconnection with multi-hierarchy simulation code KAMMUY	有 PDF，待核读
L306 / 2025	Laboratory Observations of Hall Magnetic Field in Electron-Only Magnetic Reconnection With a Guide Field	未获匹配全文
F724 / 2025	Laboratory Realization of Magnetopause-Like Reconnection in Space Plasma Environment Research Facility (SPERF)	未获匹配全文
L307 / 2025	Magnetic Reconnection Signatures in Near-Earth Magnetotail Dipolarization Processes: Hall Electrons	未获匹配全文
F759 / 2025	New Insights on the High Reconnection Rate and the Diminishment of Ion Outflow	有 PDF，待核读
E550 / 2025	Observation of a Knotted Electron Diffusion Region in Earth's Magnetotail Reconnection	有 PDF，待核读
F616 / 2025	Simulating Extreme Space Weather With Kinetic Magnetotail Reconnection	未获匹配全文
F559 / 2025	Simulation Models for Exploring Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F735 / 2025	Study of driven magnetic reconnection with a multiscale analysis	未获匹配全文
F627 / 2025	The Enhancement of Ion Heating in Kinetic, Antiparallel Reconnection in the Presence of a Flow Shear	有 PDF，待核读
Huang2026 / 2025	The morphology of large-scale magnetic reconnection: the role of plasmoid instability and Hall effects	未获匹配全文
F704 / 2025	Turbulence excited by the electron beam and evolution of current sheets near magnetopause magnetic reconnection regions	未获匹配全文
F578 / 2025	Unveiling a New β Scaling of the Tearing Instability in Weakly Collisional Plasmas	有 PDF，待核读
F639 / 2026	A numerical experiment on oscillatory magnetic reconnection in a laboratory plasma system driven by alternating currents	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L309 / 2026	A structure-preserving Numerical Method for the Compressible Resistive-Hall-MHD System	有 PDF，待核读
Teh2026 / 2026	Asymmetric Hall Magnetic Field Structures in Oppositely Directed Jets During Guide-Field Magnetopause Reconnection	未获匹配全文
F804 / 2026	Collisionless Plasma Physics below the Ion Scales: Instabilities, Reconnection, and Turbulence	未获匹配全文
F696 / 2026	Effects of internal current-sheet structure on magnetic reconnection evolution	未获匹配全文
F744 / 2026	Ion dynamics in the ion diffusion region of symmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
F718 / 2026	Laboratory Observation of Transition from Collisional Slow to Collisionless Fast Reconnection	未获匹配全文
L315 / 2026	Magnetic Reconnection Process in Partially Ionized Fluids: Insights from the Solar Chromosphere	有 PDF，待核读
F691 / 2026	Magnetic Reconnections Stochastic-Adaptive Control for Plasma Fusion	有 PDF，待核读
Arshad2026 / 2026	Modeling Kinetic Reconnection Onset in Global Magnetospheric Simulations	未获匹配全文
L317 / 2026	Numerical modeling of linear and nonlinear evolution of tearing modes and resistive-kink modes with runaway electrons	未获匹配全文
L318 / 2026	Plasmoid-Mediated 2D Magnetic Reconnection in Partially Ionized Plasmas	有 PDF，待核读
F617 / 2026	Recent advances in magnetic reconnection in Mars’ space environment	有 PDF，待核读
L319 / 2026	Reconnection in 2D Inertial Magnetohydrodynamics	有 PDF，待核读
F755 / 2026	Synergetic effects of E × B shear flow and diamagnetic flow on boundary-perturbation-driven neoclassical tearing modes	未获匹配全文
F761 / 2026	Tearing and Kelvin–Helmholtz dynamics in fully kinetic particle-in-cell simulations of electron-scale current sheets	有 PDF，待核读
L320 / 2026	Tearing stability prediction combining toroidal calculations with a two-fluid slab layer	有 PDF，待核读
E555 / 2026	The behavior of electron flow during asymmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
L321 / 2026	The impact of localized out-of-plane antisymmetric flows and Hall effect on the magnetic reconnection in a compressible plasma	未获匹配全文
E554 / 2026	Transition of Magnetic Reconnection Regimes in Partially Ionized Plasmas	有 PDF，待核读

参考文献

[1] Dieter Biskamp, E. Schwarz, and J. F. Drake. Two-fluid theory of collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 1997. doi: 10.1063/1.872211. URL https://doi.org/10.1063/1.872211. 文献键：Biskamp1997；全文核读档案；本地 PDF.

[2] Joachim Birn, J. F. Drake, Michael A. Shay, B. N. Rogers, R. E. Denton, M. Hesse, M. M. Kuznetsova, Z. W. Ma, Amitava Bhattacharjee, A. Otto, and Philip L. Pritchett. Geospace Environmental Modeling (GEM) Magnetic Reconnection Challenge. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001. doi: 10.1029/1999ja900449. URL https://doi.org/10.1029/1999ja900449. 文献键：Birn2001；全文核读档案；本地 PDF.

[3] B. N. Rogers, R. E. Denton, J. F. Drake, and M. A. Shay. Role of Dispersive Waves in Collisionless Magnetic Reconnection. *Physical Review Letters*, 2001. doi: 10.1103/physrevlett.87.195004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.87.195004. 文献键：Rogers2001；全文核读档案；本地 PDF.

[4] A. Stanier, Andrei N. Simakov, L. Chacón, and W. Daughton. Fast magnetic reconnection with large guide fields. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4905629. URL https://doi.org/10.1063/1.4905629. 文献键：L216；全文核读档案；本地 PDF.

[5] A. Stanier, Andrei N. Simakov, L. Chacón, and W. Daughton. Fluid vs. kinetic magnetic reconnection with strong guide fields. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4932330. URL https://doi.org/10.1063/1.4932330. 文献键：L217；全文核读档案；本地 PDF.

[6] P. A. Cassak, R. N. Baylor, R. L. Fermo, M. T. Beidler, M. A. Shay, Marc Swisdak, J. F. Drake, and H. Karimabadi. Fast magnetic reconnection due to anisotropic electron pressure. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4908545. URL https://doi.org/10.1063/1.4908545. 文献键：Cassak2015；全文核读档案；本地 PDF.

[7] Lin Yin, D. Winske, S. Peter Gary, and Joachim Birn. Hybrid and Hall-MHD simulations of collisionless reconnection: Effects of plasma pressure tensor. *University of North Texas Digital Library (University of North Texas)*, 2001. URL https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc718188/. 文献键：L029；全文核读档案；本地 PDF.

[8] K. Malakit, P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. The hall effect in magnetic reconnection: Hybrid versus Hall-less hybrid simulations. *Geophysical Research Letters*, 2009. doi: 10.1029/2009gl037538. URL https://doi.org/10.1029/2009gl037538. 文献键：L154；全文核读档案；本地 PDF.

[9] Lin Yin and D. Winske. Simulations of current sheet thinning and reconnection. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2002. doi: 10.1029/2002ja009507. URL https://doi.org/10.1029/2002ja009507. 文献键：L035；全文核读档案；本地 PDF.

[10] M. A. Shay, J. F. Drake, M. Swisdak, and B. N. Rogers. The scaling of embedded collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2004. doi: 10.1063/1.1705650. URL https://doi.org/10.1063/1.1705650. 文献键：Shay2004；全文核读档案；本地 PDF.

[11] Leonid Malyshkin. Model of Hall Reconnection. *Physical Review Letters*, 2008. doi: 10.1103/physrevlett.101.225001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.101.225001. 文献键：Malyshkin2008；全文核读档案；本地 PDF.

[12] Andrei N. Simakov and Luis Chacòn. Quantitative analytical model for magnetic reconnection in Hall magnetohydrodynamics. *Physics of Plasmas*, 2009. doi: 10.1063/1.3077269. URL https://doi.org/10.1063/1.3077269. 文献键：Simakov2009；全文核读档案；本地 PDF.

[13] Leonid Malyshkin. Model of Two-Fluid Reconnection. *Physical Review Letters*, 2009. doi: 10.1103/physrevlett.103.235004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.103.235004. 文献键：Malyshkin2009；全文核读档案；本地 PDF.

[14] N. Andrés, Luis Martin, P. Dmitruk, and Daniel Gómez. Effects of electron inertia in collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4890021. URL https://doi.org/10.1063/1.4890021. 文献键：Andres2014；全文核读档案；本地 PDF.

[15] Dmitri Uzdensky. On the physical interpretation of Malyshkin' s (2008) model of resistive Hall magnetohydrodynamic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2009. doi: 10.1063/1.3125819. URL https://doi.org/10.1063/1.3125819. 文献键：L145；全文核读档案；本地 PDF.

[16] Yuri E. Litvinenko. ANALYTICAL DESCRIPTION OF STEADY MAGNETIC RECONNECTION IN HALL MAGNETOHYDRODYNAMICS. *The Astrophysical Journal*, 2009. doi: 10.1088/0004-637x/694/2/1464. URL https://doi.org/10.1088/0004-637x/694/2/1464. 文献键：L137；全文核读档案；本地 PDF.

[17] Leonid M Malyshkin. Fast and slow two-fluid magnetic reconnection. *Physica Scripta*, 2010. doi: 10.1088/0031-8949/2010/t142/014033. URL https://doi.org/10.1088/0031-8949/2010/t142/014033. 文献键：L160；全文核读档案；本地 PDF.

[18] Brian P. Sullivan, A. Bhattacharjee, and Yi-Min Huang. Extension of the electron dissipation region in collisionless Hall magnetohydrodynamics reconnection. *Physics of Plasmas*, 2009. doi: 10.1063/1.3251423. URL https://doi.org/10.1063/1.3251423. 文献键：Sullivan2009；全文核读档案；本地 PDF.

[19] N. Andrés, P. Dmitruk, and Daniel O. Gómez. Influence of the Hall effect and electron inertia in collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4942418. URL https://doi.org/10.1063/1.4942418. 文献键：Andres2016；全文核读档案；本地 PDF.

[20] P. A. Cassak and Michael A. Shay. Scaling of asymmetric Hall magnetic reconnection. *Geophysical Research Letters*, 2008. doi: 10.1029/2008gl035268. URL https://doi.org/10.1029/2008gl035268. 文献键：Cassak2008；全文核读档案；本地 PDF.

[21] Richard Fitzpatrick. Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamic Taylor problem. *Physics of Plasmas*, 2004. doi: 10.1063/1.1640378. URL https://doi.org/10.1063/1.1640378. 文献键：L057；全文核读档案；本地 PDF.

[22] Richard Fitzpatrick. Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamical Taylor problem with arbitrary guide field. *Physics of Plasmas*, 2004. doi: 10.1063/1.1768956. URL https://doi.org/10.1063/1.1768956. 文献键：L058；全文核读档案；本地 PDF.

[23] Brian Sullivan, B. N. Rogers, and Michael A. Shay. The scaling of forced collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2005. doi: 10.1063/1.2146910. URL https://doi.org/10.1063/1.2146910. 文献键：L076；全文核读档案；本地 PDF.

[24] Brian P. Sullivan and Barrett N. Rogers. The scaling of forced collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2008. doi: 10.1063/1.2992136. URL https://doi.org/10.1063/1.2992136. 文献键：F717；全文核读档案；本地 PDF.

[25] Jonathan Ng, Yi-Min Huang, Ammar Hakim, A. Bhattacharjee, Adam John Stanier, W. Daughton, Liang Wang, and Kai Germaschewski. The island coalescence problem: Scaling of reconnection in extended fluid models including higher-order moments. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4935302. URL https://doi.org/10.1063/1.4935302. 文献键：Ng2015；全文核读档案；本地 PDF.

[26] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Amitava Bhattacharjee, Adam John Stanier, and W. Daughton. Simulations of anti-parallel reconnection using a nonlocal heat flux closure. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4993195. URL https://doi.org/10.1063/1.4993195. 文献键：Ng2017；全文核读档案；本地 PDF.

[27] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Liang Wang, and Amitava Bhattacharjee. An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities. *Physics of Plasmas*, 2020. doi: 10.1063/5.0012067. URL https://doi.org/10.1063/5.0012067. 文献键：Ng2020；全文核读档案；本地 PDF.

[28] Christopher Bard and J. Dorelli. On the role of system size in Hall MHD magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2018. doi: 10.1063/1.5010785. URL https://doi.org/10.1063/1.5010785. 文献键：L251；全文核读档案；本地 PDF.

[29] Adam John Stanier, W. Daughton, Andrei N. Simakov, L. Chacón, A. Lê, H. Karimabadi, Jonathan Ng, and A. Bhattacharjee. The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4976712. URL https://doi.org/10.1063/1.4976712. 文献键：L241；全文核读档案；本地 PDF.

[30] Adam John Stanier, P. K. Browning, Mykola Gordovskyy, K. G. McClements, M. Gryaznevich, and V. S. Lukin. Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4830104. URL https://doi.org/10.1063/1.4830104. 文献键：Stanier2013；全文核读档案；本地 PDF.

[31] Yi-Min Huang, Naoki Bessho, Li-Jen Chen, Judith T. Karpen, and Amitava Bhattacharjee. System size dependence of collisionless reconnection rate. *Physical Review Letters*, 2026. doi: 10.1103/xpsr-4hqn. URL https://doi.org/10.1103/xpsr-4hqn. 文献键：F600；全文核读档案；本地 PDF.

[32] M. Ottaviani and F. Porcelli. Nonlinear collisionless magnetic reconnection. *Physical Review Letters*, 1993. doi: 10.1103/PhysRevLett.71.3802. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.3802. 文献键：Ottaviani1993；全文核读档案；本地 PDF.

[33] T. J. Schep, F. Pegoraro, and B. N. Kuvshinov. Generalized two-fluid theory of nonlinear magnetic structures. *Physics of Plasmas*, 1994. doi: 10.1063/1.870523. URL https://doi.org/10.1063/1.870523. 文献键：Schep1994；全文核读档案；本地 PDF.

[34] Francesco Pegoraro, D. Borgogno, F. Califano, D. Del Sarto, E. Yu. Echkina, D. Grasso, T. V. Liseykina, and Francesco Porcelli. Developments in the theory of collisionless reconnection in magnetic configurations with a strong guide field. *Nonlinear processes in geophysics*, 2004. doi: 10.5194/npg-11-567-2004. URL https://doi.org/10.5194/npg-11-567-2004. 文献键：L049；全文核读档案；本地 PDF.

[35] D. Grasso, E. Tassi, and François L. Waelbroeck. Nonlinear gyrofluid simulations of collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3475440. URL https://doi.org/10.1063/1.3475440. 文献键：E469；全文核读档案；本地 PDF.

[36] A. Biancalani and B. Scott. Observation of explosive collisionless reconnection in 3D nonlinear gyrofluid simulations. *Europhysics Letters (EPL)*, 2012. doi: 10.1209/0295-5075/97/15005. URL https://doi.org/10.1209/0295-5075/97/15005. 文献键：L184；全文核读档案；本地 PDF.

[37] Makoto Hirota, P.J. Morrison, Yasutomo Ishii, M. Yagi, and N. Aiba. Nonlinear variational method for predicting fast collisionless magnetic reconnection. *Nuclear Fusion*, 2013. doi: 10.1088/0029-5515/53/6/063024. URL https://doi.org/10.1088/0029-5515/53/6/063024. 文献键：L191；全文核读档案；本地 PDF.

[38] Makoto Hirota, Yuji Hattori, and P. J. Morrison. Explosive magnetic reconnection caused by an X-shaped current-vortex layer in a collisionless plasma. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4921329. URL https://doi.org/10.1063/1.4921329. 文献键：L214；全文核读档案；本地 PDF.

[39] Makoto Hirota. An Explosive Scaling Law for Nonlinear Magnetic Reconnection and Its Insensitivity to Microscopic Scales. *Plasma and Fusion Research*, 2017. doi: 10.1585/pfr.12.1401010. URL https://doi.org/10.1585/pfr.12.1401010. 文献键：F697；全文核读档案；本地 PDF.

[40] L. Comisso, D. Grasso, F. L. Waelbroeck, and D. Borgogno. Gyro-induced acceleration of magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4821840. URL https://doi.org/10.1063/1.4821840. 文献键：F672；全文核读档案；本地 PDF.

[41] O. Zacharias, Luca Comisso, D. Grasso, Ralf Kleiber, Matthias Borchardt, and R. Hatzky. Numerical comparison between a gyrofluid and gyrokinetic model investigating collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4882679. URL https://doi.org/10.1063/1.4882679. 文献键：E475；全文核读档案；本地 PDF.

[42] F. F. Locker, Markus Held, Tobias Stocker-Waldhuber, Alexander Stürz, M. Rinner, and A. Kendl. GREENY: A Full-F 2D Gyrofluid Reconnection Code. *Computer Physics Communications*, 2025. doi: 10.1016/j.cpc.2025.109807. URL https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109807. 文献键：E473；全文核读档案；本地 PDF.

[43] F. F. Locker, M. Rinner, Markus Held, and A. Kendl. Gyrofluid magnetic reconnection beyond the δF approximation. *Physics of Plasmas*, 2026. doi: 10.1063/5.0332416. URL https://doi.org/10.1063/5.0332416. 文献键：L314；全文核读档案；本地 PDF.

[44] P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. Catastrophe Model for Fast Magnetic Reconnection Onset. *Physical Review Letters*, 2005. doi: 10.1103/physrevlett.95.235002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.95.235002. 文献键：Cassak2005；全文核读档案；本地 PDF.

[45] P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. A saddle-node bifurcation model of magnetic reconnection onset. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3435269. URL https://doi.org/10.1063/1.3435269. 文献键：Cassak2010；全文核读档案；本地 PDF.

[46] P. A. Cassak, J. F. Drake, and M. A. Shay. A Model for Spontaneous Onset of Fast Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal*, 2006. doi: 10.1086/505690. URL https://doi.org/10.1086/505690. 文献键：Cassak2006；全文核读档案；本地 PDF.

[47] I. J. D. Craig and Yuri E. Litvinenko. Influence of the Hall effect on the reconnection rate at line-tied magnetic X-points. *Astronomy and Astrophysics*, 2008. doi: 10.1051/0004-6361:200809569. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809569. 文献键：L123；全文核读档案；本地 PDF.

[48] Bhimsen K. Shivamoggi. Hall resistive tearing mode: A variational formulation. *Europhysics Letters (EPL)*, 2008. doi: 10.1209/0295-5075/83/55002. URL https://doi.org/10.1209/0295-5075/83/55002. 文献键：L122；全文核读档案；本地 PDF.

[49] Grigory Vekstein. On the Hall-mediated resistive tearing instability of highly elongated current sheets. *arXiv preprint*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.11401. 文献键：L250；全文核读档案；本地 PDF.

[50] G. Vekstein and K. Kusano. Hall-mediated magnetic reconnection and onset of plasmoid instability. *arXiv preprint*, 2017. URL https://arxiv.org/abs/1704.06540. 文献键：L238；全文核读档案；本地 PDF.

[51] Scott Baalrud, Amitava Bhattacharjee, Yi-Min Huang, and K. Germaschewski. Hall magneto-hydrodynamic reconnection in the plasmoid unstable regime. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3633473. URL https://doi.org/10.1063/1.3633473. 文献键：Baalrud2011；全文核读档案；本地 PDF.

[52] Yi-Min Huang, A. Bhattacharjee, and Brian P. Sullivan. Onset of fast reconnection in Hall magnetohydrodynamics mediated by the plasmoid instability. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3606363. URL https://doi.org/10.1063/1.3606363. 文献键：Huang2011；全文核读档案；本地 PDF.

[53] Fulvia Pucci, Marco Velli, and Anna Tenerani. Fast Magnetic Reconnection: "Ideal" Tearing and the Hall Effect. *The Astrophysical Journal*, 2017. doi: 10.3847/1538-4357/aa7b82. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa7b82. 文献键：L236；全文核读档案；本地 PDF.

[54] E. Papini, Simone Landi, and L. Del Zanna. Fast Magnetic Reconnection: Secondary Tearing Instability and Role of the Hall Term. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab4352. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab4352. 文献键：L262；全文核读档案；本地 PDF.

[55] Chen Shi, Anna Tenerani, Marco Velli, and San Lu. Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab33ff. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab33ff. 文献键：L263；全文核读档案；本地 PDF.

[56] Keita Akutagawa, Shinsuke Imada, and Munehito Shoda. Can plasmoid-mediated reconnection occur in collisionless systems? *Physics of Plasmas*, 2025. doi: 10.1063/5.0274477. URL https://doi.org/10.1063/5.0274477. 文献键：F606；全文核读档案；本地 PDF.

[57] José María García Morillo and Alexandros Alexakis. Magnetic reconnection, plasmoids and numerical resolution. *Journal of Fluid Mechanics*, 2025. doi: 10.1017/jfm.2025.109. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2025.109. 文献键：F788；全文核读档案；本地 PDF.

[58] D. Del Sarto, F. Califano, and Francesco Pegoraro. Current layer cascade in collisionless electron-magnetohydrodynamic reconnection and electron compressibility effects. *Physics of Plasmas*, 2005. doi: 10.1063/1.1829064. URL https://doi.org/10.1063/1.1829064. 文献键：E459；全文核读档案；本地 PDF.

[59] Paul M. Bellan. Fast, purely growing collisionless reconnection as an eigenfunction problem related to but not involving linear whistler waves. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4897375. URL https://doi.org/10.1063/1.4897375. 文献键：L202；全文核读档案；本地 PDF.

[60] J. Graf von der Pahlen and D. Tsiklauri. Role of electron inertia and reconnection dynamics in a stressedX-point collapse with a guide-field. *Astronomy and Astrophysics*, 2016. doi: 10.1051/0004-6361/201628071. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628071. 文献键：L230；全文核读档案；本地 PDF.

[61] L. S. Shepherd and P. A. Cassak. Comparison of Secondary Islands in Collisional Reconnection to Hall Reconnection. *Physical Review Letters*, 2010. doi: 10.1103/physrevlett.105.015004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.105.015004. 文献键：L159；全文核读档案；本地 PDF.

[62] Matthew Beidler and P. A. Cassak. Model for Incomplete Reconnection in Sawtooth Crashes. *Physical Review Letters*, 2011. doi: 10.1103/physrevlett.107.255002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.107.255002. 文献键：L174；全文核读档案；本地 PDF.

[63] E. Tassi, François L. Waelbroeck, and D. Grasso. Gyrofluid simulations of collisionless reconnection in the presence of diamagnetic effects. *PORTO Publications Open Repository TOrino (Politecnico di Torino)*, 2010. URL http://porto.polito.it/2380084/1/2380084.pdf. 文献键：E472；全文核读档案；本地 PDF.

[64] Michael A. Shay, J. F. Drake, B. N. Rogers, and R. E. Denton. Alfvénic collisionless magnetic reconnection and the Hall term. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001. doi: 10.1029/1999ja001007. URL https://doi.org/10.1029/1999ja001007. 文献键：Shay2001；全文核读档案；本地 PDF.

[65] A. Lê, W. Daughton, Homayoun Karimabadi, and J. Egedal. Hybrid simulations of magnetic reconnection with kinetic ions and fluid electron pressure anisotropy. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4943893. URL https://doi.org/10.1063/1.4943893. 文献键：F611；全文核读档案；本地 PDF.

[66] F. Allmann-Rahn, T. Trost, and Rainer Grauer. Temperature gradient driven heat flux closure in fluid simulations of collisionless reconnection. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/s002237781800048x. URL https://doi.org/10.1017/s002237781800048x. 文献键：L256；全文核读档案；本地 PDF.

[67] F. Allmann-Rahn, S. Lautenbach, Rainer Grauer, and R. D. Sydora. Fluid simulations of three-dimensional reconnection that capture the lower-hybrid drift instability. *Journal of Plasma Physics*, 2021. doi: 10.1017/s0022377820001683. URL https://doi.org/10.1017/s0022377820001683. 文献键：E552；全文核读档案；本地 PDF.

[68] Liang Wang, Ammar H. Hakim, A. Bhattacharjee, and K. Germaschewski. Comparison of multi-fluid moment models with particle-in-cell simulations of collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4906063. URL https://doi.org/10.1063/1.4906063. 文献键：Wang2015；全文核读档案；本地 PDF.

[69] K. Bradshaw, A. H. Hakim, James Juno, J. Pawlak, Jason M. TenBarge, and A. Bhattacharjee. Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2026. doi: 10.1029/2026ja035250. URL https://doi.org/10.1029/2026ja035250. 文献键：Closure2026；全文核读档案；本地 PDF.

[70] E. Tassi, D. Grasso, D. Borgogno, T. Passot, and P. L. Sulem. A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/S002237781800051X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781800051X. 文献键：L244；全文核读档案；本地 PDF.

[71] Madox C. McGrae-Menge, Jacob R. Pierce, Maria Almanza, Alexander Velberg, Nathaniel Barbour, W. Dorland, Nuno Loureiro, Frederico Fiúza, and E. P. Alves. Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/arxiv.2607.07106. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2607.07106. 文献键：F635；全文核读档案；本地 PDF.

[72] L. S. Shepherd and P. A. Cassak. Guide field dependence of 3-D X-line spreading during collisionless magnetic reconnection. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2012. doi: 10.1029/2012ja017867. URL https://doi.org/10.1029/2012ja017867. 文献键：Shepherd2012；全文核读档案；本地 PDF.

[73] Milton Arencibia, P. A. Cassak, M. A. Shay, and E. R. Priest. Scaling theory of three-dimensional magnetic reconnection spreading. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0052189. URL https://doi.org/10.1063/5.0052189. 文献键：L275；全文核读档案；本地 PDF.

[74] M. A. Shay, J. F. Drake, M. Swisdak, W. Dorland, and B. N. Rogers. Inherently three dimensional magnetic reconnection: A mechanism for bursty bulk flows? *Geophysical Research Letters*, 2003. doi: 10.1029/2002gl016267. URL https://doi.org/10.1029/2002gl016267. 文献键：Shay2003；全文核读档案；本地 PDF.

[75] Milton Arencibia, P. A. Cassak, Michael A. Shay, Jiong Qiu, S. M. Petrinec, and Haoming Liang. Three-Dimensional Magnetic Reconnection Spreading in Current Sheets of Non-Uniform Thickness. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2023. doi: 10.1029/2022ja030999. URL https://doi.org/10.1029/2022ja030999. 文献键：L294；全文核读档案；本地 PDF.

[76] Yi-Hsin Liu, T. C. Li, M. Hesse, W. J. Sun, J. Liu, J. Burch, J. A. Slavin, and K. Huang. Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent: Implications for Dipolarizing Flux Bundles and the Dawn-Dusk Asymmetry. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019ja026539. URL https://doi.org/10.1029/2019ja026539. 文献键：F659；全文核读档案；本地 PDF.

[77] Kai Huang, Yi-Hsin Liu, Quanming Lu, and Michael Hesse. Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent. *Geophysical Research Letters*, 2020. doi: 10.1029/2020gl088147. URL https://doi.org/10.1029/2020gl088147. 文献键：F792；全文核读档案；本地 PDF.

[78] Cihan Akçay, W. Daughton, V. S. Lukin, and Yi-Hsin Liu. A two-fluid study of oblique tearing modes in a force-free current sheet. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4940945. URL https://doi.org/10.1063/1.4940945. 文献键：L224；全文核读档案；本地 PDF.

[79] Chen Shi, Marco Velli, Fulvia Pucci, Anna Tenerani, and Maria Elena Innocenti. Oblique Tearing Mode Instability: Guide Field and Hall Effect. *The Astrophysical Journal*, 2020. doi: 10.3847/1538-4357/abb6fa. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/abb6fa. 文献键：L268；全文核读档案；本地 PDF.

[80] Ron Schreier, M. Swisdak, J. F. Drake, and P. A. Cassak. Three-dimensional simulations of the orientation and structure of reconnection X-lines. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3494218. URL https://doi.org/10.1063/1.3494218. 文献键：L166；全文核读档案；本地 PDF.

[81] B. N. Rogers, J. F. Drake, and Michael A. Shay. The onset of turbulence in collisionless magnetic reconnection. *Geophysical Research Letters*, 2000. doi: 10.1029/2000gl000038. URL https://doi.org/10.1029/2000gl000038. 文献键：L020；全文核读档案；本地 PDF.

[82] N. Yokokawa, M. Fujimoto, Y. Yamade, and Tohru Mukai. Hall effects on field-aligned current generation in three-dimensional magnetic reconnection. *Earth, Planets and Space*, 2001. doi: 10.1186/bf03353262. URL https://doi.org/10.1186/bf03353262. 文献键：L204；全文核读档案；本地 PDF.

[83] Yi-Min Huang and Amitava Bhattacharjee. Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection and turbulence in Hall magnetohydrodynamics. *Physics of Plasmas*, 2024. doi: 10.1063/5.0216561. URL https://doi.org/10.1063/5.0216561. 文献键：Huang2024；全文核读档案；本地 PDF.

[84] Joshua Paul Sauppe and Carl R. Sovinec. Extended MHD modeling of tearing-driven magnetic relaxation. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4977540. URL https://doi.org/10.1063/1.4977540. 文献键：F798；全文核读档案；本地 PDF.

[85] F. Califano, Silvio Sergio Cerri, M. Faganello, D. Laveder, Manuela Sisti, and Matthew W. Kunz. Electron-Only Reconnection in Plasma Turbulence. *Frontiers in Physics*, 2020. doi: 10.3389/fphy.2020.00317. URL https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00317. 文献键：L267；全文核读档案；本地 PDF.

[86] Joaquín Espinoza-Troni, Giuseppe Arrò, F. Califano, Julia E. Stawarz, and Pablo S. Moya. Secondary Electron-Only Reconnection Driven by Large Scale Ion-Coupled Reconnection and Electron Kelvin-Helmholtz Instabilities in Hybrid Simulations of Solar Wind Turbulence. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/arxiv.2605.11139. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2605.11139. 文献键：F655；全文核读档案；本地 PDF.

[87] Yi-Hsin Liu, P. S. Pyakurel, Xiaocan Li, Michael Hesse, Naoki Bessho, K. J. Genestreti, and Shiva Bikram Thapa. An analytical model of "Electron-Only" magnetic reconnection rates. *Communications Physics*, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02034-z. URL https://doi.org/10.1038/s42005-025-02034-z. 文献键：F741；全文核读档案；本地 PDF.

[88] Luca Comisso, D. Grasso, E. Tassi, and François L. Waelbroeck. Numerical investigation of a compressible gyrofluid model for collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2012. doi: 10.1063/1.3697860. URL https://doi.org/10.1063/1.3697860. 文献键：E471；全文核读档案；本地 PDF.

[89] Camille Granier, D. Borgogno, D. Grasso, and E. Tassi. Gyrofluid analysis of electron β e effects on collisionless reconnection. *Journal of Plasma Physics*, 2022. doi: 10.1017/s0022377822000010. URL https://doi.org/10.1017/s0022377822000010. 文献键：E474；全文核读档案；本地 PDF.

[90] Emanuele Papini, Luca Franci, Simone Landi, Petr Hellinger, Andrea Verdini, and Lorenzo Matteini. Statistics of magnetic reconnection and turbulence in Hall-MHD and hybrid-PIC simulations. *CNR Solar (Scientific Open-access Literature Archive and Repository) (Consiglio Nazionale delle Ricerche)*, 2019. doi: 10.1393/ncc/i2019-19023-0. URL https://doi.org/10.1393/ncc/i2019-19023-0. 文献键：L264；全文核读档案；本地 PDF.

[91] C. Rossi, F. Califano, Alessandro Retinò, Luca Sorriso-Valvo, Pierre Henri, Sergio Servidio, F. Valentini, A. Chasapis, and L. Rezeau. Two-fluid numerical simulations of turbulence inside Kelvin-Helmholtz vortices: Intermittency and reconnecting current sheets. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4936795. URL https://doi.org/10.1063/1.4936795. 文献键：F644；全文核读档案；本地 PDF.

[92] A. Zocco and A. A. Schekochihin. Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3628639. URL https://doi.org/10.1063/1.3628639. 文献键：E512；全文核读档案；本地 PDF.

[93] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, and Amitava Bhattacharjee. Using the maximum entropy distribution to describe electrons in reconnecting current sheets. *Physics of Plasmas*, 2018. doi: 10.1063/1.5041758. URL https://doi.org/10.1063/1.5041758. 文献键：E553；全文核读档案；本地 PDF.

[94] Allen H. Boozer. Electron inertia and magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2026. doi: 10.1063/5.0304789. URL https://doi.org/10.1063/5.0304789. 文献键：L313；全文核读档案；本地 PDF.

[95] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0040374. URL https://doi.org/10.1063/5.0040374. 文献键：L272；全文核读档案；本地 PDF.

[96] P. K. Browning, S. Cardnell, M. Evans, F. Arese Lucini, V. S. Lukin, K. G. McClements, and A. Stanier. Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona. *Plasma Physics and Controlled Fusion 58, 014041*, 2016. doi: 10.1088/0741-3335/58/1/014041. URL https://doi.org/10.1088/0741-3335/58/1/014041. 文献键：L223；全文核读档案；本地 PDF.

[97] A. A. Kaptanoglu, T. E. Benedett, K. D. Morgan, C. J. Hansen, and T. R. Jarboe. Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment. *Physics of Plasmas 27, 072505*, 2020. doi: 10.1063/5.0006311. URL https://doi.org/10.1063/5.0006311. 文献键：Kaptanoglu2020；全文核读档案；本地 PDF.

[98] D. W. Longcope and S. J. Bradshaw. Slow shocks and conduction fronts from Petschek reconnection of skewed magnetic fields: two-fluid effects. *Astrophysical Journal 718, 1491–1508*, 2010. doi: 10.1088/0004-637X/718/2/1491. URL https://doi.org/10.1088/0004-637X/718/2/1491. 文献键：L164；全文核读档案；本地 PDF.

[99] Z. Li and D. Livescu. High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena. *Physics of Plasmas 26, 012109*, 2019. doi: 10.1063/1.5082190. URL https://doi.org/10.1063/1.5082190. 文献键：L247；全文核读档案；本地 PDF.

[100] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. Fast Ion Heating in Transient Collisionless Magnetic Reconnection via an Intrinsic Stochastic Mechanism. *The Astrophysical Journal Letters*, 2018. doi: 10.3847/2041-8213/aaf0a3. URL https://doi.org/10.3847/2041-8213/aaf0a3. 文献键：Yoon2018Heating；全文核读档案；本地 PDF.

[101] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal Letters*, 2019. doi: 10.3847/2041-8213/ab5b0a. URL https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab5b0a. 文献键：F743；全文核读档案；本地 PDF.

[102] Young Dae Yoon, Paul M. Bellan, and Gunsu S. Yun. Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal*, 2023. doi: 10.3847/1538-4357/acf1f5. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/acf1f5. 文献键：Yoon2023PhaseSpace；全文核读档案；本地 PDF.

[103] N. F. Loureiro, A. A. Schekochihin, and A. Zocco. Fast collisionless reconnection and electron heating in strongly magnetized plasmas. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.111.025002. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.025002. 文献键：Loureiro2013Heating；全文核读档案；本地 PDF.

[104] Ryusuke Numata and N. F. Loureiro. Ion and electron heating during magnetic reconnection in weakly collisional plasmas. *Journal of Plasma Physics*, 2015. doi: 10.1017/S002237781400107X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781400107X. 文献键：Numata2015Heating；全文核读档案；本地 PDF.

[105] J. M. TenBarge, J. Ng, J. Juno, L. Wang, A. H. Hakim, and A. Bhattacharjee. An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019JA026731. URL https://doi.org/10.1029/2019JA026731. 文献键：TenBarge2019MMS；全文核读档案；本地 PDF.

[106] F. Finelli, S. S. Cerri, F. Califano, F. Pucci, D. Laveder, G. Lapenta, and T. Passot. Bridging hybrid- and full-kinetic models with Landau-fluid electrons. I. 2D magnetic reconnection. *Astronomy & Astrophysics*, 2021. doi: 10.1051/0004-6361/202140279. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140279. 文献键：Finelli2021；全文核读档案；本地 PDF.

[107] H. Che. Two-Fluid Description of Wave-Particle Interactions in Strong Buneman Turbulence. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4882677. URL https://doi.org/10.1063/1.4882677. 文献键：Che2014Buneman；全文核读档案；本地 PDF.

[108] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, Jonathan Jara-Almonte, and Clayton E. Myers. Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4874331. URL https://doi.org/10.1063/1.4874331. 文献键：F679；全文核读档案；本地 PDF.

[109] Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, Jonathan Jara-Almonte, W. Daughton, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Clayton E. Myers. Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4920960. URL https://doi.org/10.1063/1.4920960. 文献键：F674；全文核读档案；本地 PDF.

[110] Jongsoo Yoo, Byungkeun Na, J. Jara-Almonte, Masaaki Yamada, Hantao Ji, V. Roytershteyn, M. R. Argall, W. Fox, and Li-Jen Chen. Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017. doi: 10.1002/2017JA024152. URL https://doi.org/10.1002/2017JA024152. 文献键：Yoo2017Heating；全文核读档案；本地 PDF.

[111] H. Tanabe, T. Yamada, T. Watanabe, K. Gi, K. Kadowaki, M. Inomoto, R. Imazawa, M. Gryaznevich, C. Michael, B. Crowley, N. J. Conway, R. Scannell, J. Harrison, I. Fitzgerald, A. Meakins, N. Hawkes, K. G. McClements, T. O'Gorman, C. Z. Cheng, Y. Ono, and The MAST Team. Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak. *Physical Review Letters*, 2015. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.215004. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.215004. 文献键：Tanabe2015MAST；全文核读档案；本地 PDF.

[112] T. Ahmadi, Y. Ono, H. Tanaka, and H. Tanabe. The scaling of the ion heating and electrostatic potential in spherical tokamak. *IAEA FEC2025 conference manuscript IAEA-H-8*, 2025. URL https://conferences.iaea.org/event/392/papers/35991/. 文献键：TS6FEC2025；全文核读档案；本地 PDF.

[113] J. F. Drake, M. Swisdak, T. D. Phan, P. A. Cassak, M. A. Shay, S. T. Lepri, R. P. Lin, E. Quataert, and T. H. Zurbuchen. Ion heating resulting from pickup in magnetic reconnection exhausts. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2009. doi: 10.1029/2008JA013701. URL https://doi.org/10.1029/2008JA013701. 文献键：Drake2009Pickup；全文核读档案；本地 PDF.

[114] Dmitri Uzdensky and Russell M. Kulsrud. Physical origin of the quadrupole out-of-plane magnetic field in Hall-magnetohydrodynamic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2006. doi: 10.1063/1.2209627. URL https://doi.org/10.1063/1.2209627. 文献键：L089；全文核读档案；本地 PDF.

[115] Yang Ren, Masaaki Yamada, Hantao Ji, S. Dorfman, Stefan P Gerhardt, and Russel Kulsrud. Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2008. doi: 10.1063/1.2936269. URL https://doi.org/10.1063/1.2936269. 文献键：L119；全文核读档案；本地 PDF.

[116] Neeraj Jain and A. Surjalal Sharma. Electron-scale nested quadrupole Hall field in Cluster observations of magnetic reconnection. *Annales Geophysicae*, 2015. doi: 10.5194/angeo-33-719-2015. URL https://doi.org/10.5194/angeo-33-719-2015. 文献键：L213；全文核读档案；本地 PDF.

[117] Mats André, W. Li, Sergio Toledo-Redondo, Y. V. Khotyaintsev, Andris Vaivads, Daniel Bruce Graham, Cecilia Norgren, James L. Burch, Peter Lindqvist, Göran T. Marklund, R. E. Ergun, R. B. Torbert, Werner Magnes, Christopher T. Russell, Barbara L. Giles, Thomas Earle Moore, M. O. Chandler, Craig J. Pollock, D. T. Young, L. A. Avanov, J. Dorelli, Daniel J. Gershman, W. R. Paterson, B. Lavraud, and Y. Saito. Magnetic reconnection and modification of the Hall physics due to

cold ions at the magnetopause. *Geophysical Research Letters*, 2016. doi: 10.1002/2016gl069665. URL https://doi.org/10.1002/2016gl069665. 文献键：L227；全文核读档案；本地 PDF.

[118] Shu-Di Yang, Liang Wang, and Chuanfei Dong. Discovery of double Hall pattern associated with collisionless magnetic reconnection in dusty plasmas. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2023. doi: 10.1093/mnras/stad1453. URL https://doi.org/10.1093/mnras/stad1453. 文献键：L283；全文核读档案；本地 PDF.

[119] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, and Clayton E. Myers. Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.110.215007. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.215007. 文献键：Yoo2013；全文核读档案；本地 PDF.

[120] Masaaki Yamada, Li-Jen Chen, Jongsoo Yoo, Shan Wang, W. Fox, Jonathan Jara-Almonte, Hantao Ji, W. Daughton, A. Lê, James L. Burch, Barbara L. Giles, M. Hesse, Thomas Earle Moore, and R. B. Torbert. The two-fluid dynamics and energetics of the asymmetric magnetic reconnection in laboratory and space plasmas. *Nature Communications*, 2018. doi: 10.1038/s41467-018-07680-2. URL https://doi.org/10.1038/s41467-018-07680-2. 文献键：Yamada2018；全文核读档案；本地 PDF.

[121] Yang Ren, Masaaki Yamada, Stefan P Gerhardt, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Aleksey Kuritsyn. Experimental Verification of the Hall Effect during Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2005. doi: 10.1103/physrevlett.95.055003. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.95.055003. 文献键：Ren2005；全文核读档案；本地 PDF.

[122] T. D. Tharp, Masaaki Yamada, Hantao Ji, E. Lawrence, S. Dorfman, Clayton E. Myers, and Jongsoo Yoo. Quantitative Study of Guide-Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2012. doi: 10.1103/physrevlett.109.165002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.109.165002. 文献键：GuideExp2012；全文核读档案；本地 PDF.

[123] T. D. Tharp, Masaaki Yamada, Hantao Ji, E. Lawrence, S. Dorfman, Clayton E. Myers, Jongsoo Yoo, Yi-Min Huang, and Amitava Bhattacharjee. Study of the effects of guide field on Hall reconnection. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4805244. URL https://doi.org/10.1063/1.4805244. 文献键：L193；全文核读档案；本地 PDF.

[124] Jonathan Jara-Almonte, Hantao Ji, Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, and W. Fox. Laboratory Observation of Resistive Electron Tearing in a Two-Fluid Reconnecting Current Sheet. *Physical Review Letters*, 2016. doi: 10.1103/physrevlett.117.095001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.117.095001. 文献键：E448；全文核读档案；本地 PDF.

[125] Noam Katz, Jan Egedal, Will Fox, Ari Le, Jeff Bonde, and Arturs Vrublevskis. Laboratory Observation of Localized Onset of Magnetic Reconnection. *Physical Review Letters*, 2010. doi: 10.1103/physrevlett.104.255004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.104.255004. 文献键：Katz2010；全文核读档案；本地 PDF.

[126] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Tongnyeol Rhee, Hantao Ji, Ari Le, Tai Phan, Sung Hyun Son, and A.B. Robbins. Cross-scale observations of expanding bifurcated current sheets in fast magnetic reconnection. *Nature Communications*, 2026. doi: 10.1038/s41467-026-79220-2. URL https://doi.org/10.1038/s41467-026-79220-2. 文献键：L312；全文核读档案；本地 PDF.

[127] Kotaro YAMASAKI, S. Kamio, Koichiro Takemura, Qinghong Cao, T. Watanabe, Hirotomo Itagaki, Takuma Yamada, Michiaki Inomoto, and Yasushi Ono. Experimental Study of Two-Fluid Effect during Magnetic Reconnection in the UTST Merging Experiment. *Plasma and Fusion Research*, 2013. doi: 10.1585/pfr.8.2401130. URL https://doi.org/10.1585/pfr.8.2401130. 文献键：L189；全文核读档案；本地 PDF.

[128] R. L. Stenzel, J. Manuel Urrutia, M. C. Griskey, and K. D. Strohmaier. 3D EMHD reconnection in a laboratory plasma. *Earth, Planets and Space*, 2001. doi: 10.1186/bf03353269. URL https://doi.org/10.1186/bf03353269. 文献键：F766；全文核读档案；本地 PDF.

[129] Thomas W O Varnish, Joe M. Chen, Simran Chowdhry, Rishabh Datta, George V. Dowhan, Lansing S. Horan, Nicholas Jordan, E. R. Neill, Akash P. Shah, Roman V. Shapovalov, Brendan J. Sporer, R. D. McBride, and Jack Hare. Quadrupolar density structures in driven magnetic reconnection experiments with a guide field. *Physics of Plasmas*, 2025. doi: 10.1063/5.0251581. URL https://doi.org/10.1063/5.0251581. 文献键：F703；全文核读档案；本地 PDF.

[130] Eric E. Lawrence, Hantao Ji, Masaaki Yamada, and Jongsoo Yoo. Laboratory Study of Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/physrevlett.110.015001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.110.015001. 文献键：L190；全文核读档案；本地 PDF.

[131] P. A. Cassak and M. A. Shay. Scaling of asymmetric magnetic reconnection: General theory and collisional simulations. *Physics of Plasmas*, 2007. doi: 10.1063/1.2795630. URL https://doi.org/10.1063/1.2795630. 文献键：Cassak2007；全文核读档案；本地 PDF.

[132] Lukas Arnold, Jürgen Dreher, and Rainer Grauer. A semi-implicit Hall-MHD solver using whistler wave preconditioning. *Computer Physics Communications*, 2008. doi: 10.1016/j.cpc.2007.11.018. URL https://doi.org/10.1016/j.cpc.2007.11.018. 文献键：Arnold2008；全文核读档案；本地 PDF.

[133] Ammar H. Hakim. Extended MHD Modelling with the Ten-Moment Equations. *Journal of Fusion Energy*, 2008. doi: 10.1007/s10894-007-9116-z. URL https://doi.org/10.1007/s10894-007-9116-z. 文献键：Hakim2008；全文核读档案；本地 PDF.

[134] Gábor Tóth, Yingjuan Ma, and Tamas I. Gombosi. Hall magnetohydrodynamics on block-adaptive grids. *Journal of Computational Physics*, 2008. doi: 10.1016/j.jcp.2008.04.010. URL https://doi.org/10.1016/j.jcp.2008.04.010. 文献键：Toth2008；全文核读档案；本地 PDF.

[135] John Loverich, Ammar Hakim, and Uri Shumlak. A Discontinuous Galerkin Method for Ideal Two-Fluid Plasma Equations. *Communications in Computational Physics*, 2011. doi: 10.4208/cicp.250509.210610a. URL https://doi.org/10.4208/cicp.250509.210610a. 文献键：L156；全文核读档案；本地 PDF.

[136] N. Aunai, Michael Hesse, Carrie Black, Rebekah Evans, and Maria Kuznetsova. Influence of the dissipation mechanism on collisionless magnetic reconnection in symmetric and asymmetric current layers. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4795727. URL https://doi.org/10.1063/1.4795727. 文献键：F625；全文核读档案；本地 PDF.

[137] Daniele Del Sarto, Fulvia Pucci, Anna Tenerani, and Marco Velli. "Ideal" tearing and the transition to fast reconnection in the weakly collisional MHD and EMHD regimes. *Journal of Geophysical*

Research: Space Physics, 2016. doi: 10.1002/2015ja021975. URL https://doi.org/10.1002/2015ja021975. 文献键：L210；全文核读档案；本地 PDF.

[138] Isaac Alonso Asensio, Alejandro Alvarez Laguna, Mohamed Hassanine Aissa, Stefaan Poedts, Nataly Ozak, and Andrea Lani. A GPU-enabled implicit Finite Volume solver for the ideal two-fluid plasma model on unstructured grids. *Computer Physics Communications*, 2019. doi: 10.1016/j.cpc.2019.01.019. URL https://doi.org/10.1016/j.cpc.2019.01.019. 文献键：L243；全文核读档案；本地 PDF.

[139] Yi-Hsin Liu, P. A. Cassak, Xiaocan Li, Michael Hesse, Shan-Chang Lin, and K. J. Genestreti. First-principles theory of the rate of magnetic reconnection in magnetospheric and solar plasmas. *Communications Physics*, 2022. doi: 10.1038/s42005-022-00854-x. URL https://doi.org/10.1038/s42005-022-00854-x. 文献键：F589；全文核读档案；本地 PDF.

[140] Luis Chacón. A scalable multidimensional fully implicit solver for Hall magnetohydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 2025. doi: 10.1016/j.jcp.2025.113789. URL https://doi.org/10.1016/j.jcp.2025.113789. 文献键：L296；全文核读档案；本地 PDF.