对种群动态的数学手段模式化分析方法建立暨对实际农作物生产场景预测分析

马宜远, 孙嘉俊, 王明哲*

大连第二十四中学

摘要：生态学在农业生产中常被用于预测农作物产量. 本文使用计算机分析方法, 就不同生态因素对叶菜类农作物产量影响进行建模, 得到了综合种内、种间竞争、天敌影响、土壤肥力等生态因素综合作用下的叶菜类农作物种群数量模型, 最终得以精准预测、精准干预.

关键词：农作物产量预测；计算机模拟；生态学模型

农业是我国的基础产业, 在我国有着悠久的历史. 新中国成立后, 我国人口迅速增长, 但受客观因素影响, 我国存在人均占有耕地面积少、耕地品质不足等问题, 农业产能难以满足人口增长的需要. 农业生产中, 作物的产量往往是人们亟需关注的问题. 在高中生物选修二《种群的数量特征》中, 我们初步学习了 “J 形增长曲线” 与 “S 形增长曲线” , 即指数增长曲线与逻辑斯蒂曲线. 为进一步深入、系统地学习, 并应用到实际生活中, 我们开展了本次研究, 结合生态学知识与信息技术, 将实际生产中难以量化计算的生态学因素, 使用数学语言精确表达, 建立数学模型, 并使用计算机进行数值分析. 考虑到农业的经济效益影响, 我们选择叶菜类农作物进行建模, 并结合现实环境因素进行模拟.

1 常见生态学模型

1.1 Logistic 增长模型

1.1.1 简述

皮埃尔-弗朗索瓦 · 韦吕勒 (P.F.Verhulst, 1804-1849) 于 1838 年提出 **Logistic 增长模型** [1], 为描述资源有限环境下种群增长的最简单模型, 也是多数生态学模型的基础. 我们熟知的 “S 形增长曲线” 即为该模型.

1.1.2 数学模型描述

由于生境中资源有限, 考虑引入环境对种群的影响, 可使用比值 $\frac{K-N}{K}$ 限制种群增长, 并添加常数 r 以控制增长速率. 如此, 可以得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN(1-\frac{N}{K}).} \tag{1}$$

其中 N 为种群数量,t 为时间, K 为生物的**环境容纳量 (environmental capacity)**, r 为**内禀增长率 (innate rate of increase)**. 内禀增长率 r 是一个经验数值, 可由近似公式

$$r = \frac{\ln R_0}{T}$$

给出. 其中 R_0 为净生殖率, 即一个世代中种群的增长倍数,T 为世代时间.

式 (1) 为一阶常微分方程, 通解为

$$N_t = \frac{K}{1+(\frac{K}{N_0}-1)e^{-rt}},$$

函数图像如图1所示, 其中 $N_0 = 3$, $r = 1$, $K = 100$.

*通讯作者



图 1: Logistic 增长模型

Logistic 方程十分简洁, 但未考虑种间影响. 接下来, 我们将在 Logistic 增长模型的基础上, 添加种间竞争的因素.

1.2 Lotka-Volterra 竞争模型

1.2.1 简述

二十世纪二十年代, 阿尔弗雷德 · 洛特卡 (Alfred Lotka, 1880-1949) 与维多 · 沃尔泰拉 (Vito Volterra, 1860-1940) 分别独立提出了描述种间竞争的简单数学模型, 即 **Lotka-Volterra 竞争模型**, 为生态学中描述种间竞争的基本模型.

1.2.2 数学模型描述

生物竞争的本质是对有限资源的争夺. 考虑种群之间的生境重叠, 可使用 $\frac{N_j}{K_i}$ 描述第 j 种群对第 i 种群生境的影响.

首先考虑两个种群的竞争

$$\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = r_1 N_1 (1 - \frac{N_1}{K_1} - \alpha_{1,2}\frac{N_2}{K_1}), \tag{2a}$$

$$\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = r_2 N_2 (1 - \frac{N_2}{K_2} - \alpha_{2,1}\frac{N_1}{K_2}). \tag{2b}$$

与方程(1)相比, 方程(2)仅添加 $\alpha_{i,j}\frac{N_j}{K_i}$ 一项 (简称为“交互项”), 其中 $\alpha_{i,j}$ 为**交互系数 (coefficient of interaction)**, 描述**第 j 种群对第 i 种群的影响**.

更一般地, 若存在多个种群, 则可叠加不同种群间的交互项

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} = r_i N_i (1 - \frac{1}{K_i}\sum_j \alpha_{i,j} N_j).} \tag{3}$$

方程(3)将 Logistic 方程(1)中 $\frac{N_i}{K_i}$ 一项并入求和, 既是为了保持方程形式简洁, 也为引入 **1.2.3交互矩阵**提供方便.

1.2.3 交互矩阵

如前文所述, 交互系数 $\alpha_{i,j}$ 描述第 j 种群对第 i 种群的影响. 注意到这里若要指定具体的 $\alpha_{i,j}$, 需要 i, j 两个值, 若种群数量为 n, 则交互系数共有 n^2 个. 随种群数量 n 增长, 大量交互系数若采用列表表示, 将难以维护.

此时可以令 i,j 分别表示行索引与列索引, 构造一个 $n\times n$ 的二维“数表”, 即**交互矩阵 (interaction matrix)**

$$\alpha := \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & \cdots & \alpha_{1,j} & \cdots & \alpha_{1,n} \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & \cdots & \alpha_{2,j} & \cdots & \alpha_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{i,1} & \alpha_{i,2} & \cdots & \alpha_{i,j} & \cdots & \alpha_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n,1} & \alpha_{n,2} & \cdots & \alpha_{n,j} & \cdots & \alpha_{n,n} \end{bmatrix},$$

如此, 交互系数便可以简单地使用符号 α 表示.



图 2: Lotka-Volterra 竞争模型

图2展示了当 $\vec{N_0} = [25\ 50]^\top$, $\vec{r} = [1\ 1]^\top$, $\vec{K} = [100\ 150]^\top$, $\alpha = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ 时方程的解.

Lotka-Volterra 竞争模型描述了种间竞争关系. 接下来, 我们将进一步引入捕食关系.

1.3 Lotka-Volterra 捕食模型

1.3.1 简述

Lotka-Volterra 捕食模型经常用来描述生物系统中, 掠食者与猎物进行互动时的动态过程, 也就是两者族群规模的消长. 同样地, 该模型分别由阿弗雷德 · 洛特卡与维多 · 沃尔泰拉于 1925 年与 1926 年独立发表.

1.3.2 数学模型描述

首先考虑一对捕食者与猎物. 考虑捕食者对猎物增长率的影响, 可在猎物的增长率 r_1 上添加一项 $-\beta_{1,2}N_2$, 并设 $\beta_{1,2} > 0$, 有

$$\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = N_1(r_1 - \beta_{1,2}N_2). \tag{4}$$

我们暂时设 $r_1 > 0$, 这表示我们假设猎物在无捕食者的情况下 ($\beta_{1,2} = 0$) 呈指数增长.

对于捕食者, 要添加 $\beta_{2,1}N_1$ 一项, 因为在食物充足情况下有助于其增长, 于是有

$$\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = N_2(-r_2 + \beta_{2,1}N_1). \tag{5}$$

注意到此处 r_2 前为负号, 这表示捕食者在食物缺乏情况下 ($\beta_{2,1} \to 0$), 其种群数量有下降趋势.

观察式(4)与式(5)的形式, 发现系数前符号可并入常数 r, β, 于是可以写出一般形式

$$\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} = N_i(r_i + \beta_{i,j}N_j).$$

考虑多个捕食关系的影响, 我们得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} = N_i(r_i + \sum_j \beta_{i,j}N_j).} \tag{6}$$

由于这里 $\beta_{i,j}$ 同1.2.2中的 $\alpha_{i,j}$ 一样, 均表示了**种群间的交互关系**, 因此我们也将 $\beta_{i,j}$ 称为**交互系数**, 而且由于形式上的一致性, 同样可以构建由 $\beta_{i,j}$ 构成的**交互矩阵**

$$\beta := \begin{bmatrix} \beta_{1,1} & \beta_{1,2} & \cdots & \beta_{1,j} & \cdots & \beta_{1,n} \\ \beta_{2,1} & \beta_{2,2} & \cdots & \beta_{2,j} & \cdots & \beta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{i,1} & \beta_{i,2} & \cdots & \beta_{i,j} & \cdots & \beta_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n,1} & \beta_{n,2} & \cdots & \beta_{n,j} & \cdots & \beta_{n,n} \end{bmatrix}.$$



图 3: Lotka-Volterra 捕食模型

图3便展示了 $\vec{N}_0 = \begin{bmatrix} 60 & 20 \end{bmatrix}^\top$, $\vec{r} = \begin{bmatrix} 0.07 & -0.1 \end{bmatrix}^\top$, $\vec{K} = \begin{bmatrix} 100 & 150 \end{bmatrix}^\top$, $\beta = \begin{bmatrix} 0 & -0.001 \\ 0.001 & 0 \end{bmatrix}$ 时方程的解.

1.4 广义 Lotka-Volterra 模型

2 计算机模拟与实际应用的结合

2.1 数学与农田的对话

数学建模作为现实生活中的一个重要工具, 它用简洁的数学语言描述了事物的变化. 在理解种群动态的任务中, 尤其是从理论模型到实际应用的场景, 我们仍然面对诸多挑战.

2.2 计算机模拟与实际应用的作用

2.2.1 预见性

原始的农业生产在有限的经验下, 需要克服不确定的气候、资源等因素, 才能提升产量. 计算机的模拟可以使经验判断成为定量计算. 值得注意的是,

这种预见性并不要求模型的绝对准确. 复杂计算机模型的校准需要明确处理结构的误差——意识到模型只是对现实的近似, 结果本身包含一定误差, 这对决策者而言也是非常重要的信息.

2.2.2 优化性

如上文所述, 模型只是对现实的近似. 显而易见, 模型越逼近现实, 其实用价值越高. 计算机模拟与优化算法的结合, 为解决这类问题提供了可行路径. 优化算法可以自我改进深度优化算法, 探索许多人类无法察觉的微小因素, 从而做出更加精准的判断.

2.2.3 普及性

理想情况下, 每一个农民都要掌握一定的气象、经济学知识, 能准确解读天气数据, 能优化资源配置, 但现实不是这样的. 计算机模拟在降低专业知识应用门槛方面可以发挥独特作用. 农民不必理解模型内部的微分方程, 不必掌握编程技能就能获得准确可靠的数据.

3 结论与展望

数学建模与计算机模拟的价值, 终究要由实践来检验. 在这个意义上, 模型永远只是模型——是对现实的简化与近似. 但这种简化如果得当, 就能帮助我们从复杂中识别简单, 从噪声中辨别信号, 从不确定性中锚定决策. 这或许正是“对种群动态的数学手段模式化分析”对农作物生产场景的最根本贡献. 当然了, 我们也要看到研究的局限性. 从空间的角度看, 如在 LV 竞争模型中, 如果我们拥有一个更加广阔的充足空间, 就需要考虑到种群的空间分布对于其数量变化的影响. 例如大型食肉动物对小型动物的威慑作用. 从时间的角度看, 因其还不具备引入长期复杂现实因素的能力, 可能在更加广阔的时间尺度上略显逊色. 例如将时间线拉长, 我们可能要考虑到进化、演替等因素, 以及基因的变异、自然选择等等. 短期内这些因素不会对模拟结果造成太大影响, 但是当时间线拉长, 它们对于预测结果的影响程度成指数级增加, 成为我们不能忽略不计的因素. 从社会的角度看, 计算机模拟的能力仍然不足. 从人类影响的程度上看, 就本研究的例子而言, 当我们进一步思考实际意义, 我们需要考虑到人工对害虫的扑杀等因素. 人类对自然的影响是丰富的, 不仅仅体现在程度上, 更体现在形式上. 每一个人的细微举动都会对自然造成影响, 当人流量增大, 如在考虑人口增长或是城市中公园的生态问题时, 这些影响也是不可忽略的因素. 而计算机如何体现各种各样形式的影响成为了我们面对此类问题时的主要挑战. 数学建模与计算机模拟的价值, 终究要由实践来检验. 在这个意义上, 模型永远只是模型——是对现实的简化与近似. 但这种简化如果得当, 就能帮助我们从复杂中识别简单, 从噪声中辨别信号, 从不确定性中锚定决策. 这或许正是“对种群动态的数学手段模式化分析”对农作物生产场景的最根本贡献. 我们相信在不远的将来, 计算机技术可以成熟的被运用到实际生产生活当中, 让人类的生活更加美好.

参考文献

[1] J. S. Cramer. *The origins of logistic regression*. Tinbergen Institute, 2002.