

1 Example FoxH-Bessel-J_2_9_18.wls

File content

Fox H-function

$$H_{0,2}^{1,0} \left(\cdot \left| \begin{array}{c} \\ \left(\frac{a+\eta}{2}, 1 \right), (a-\eta, 1) \end{array} \right. \right)$$

$$H_{0,2}^{1,0} \left(\cdot \left| \begin{array}{c|c} & \\ \hline \left(\frac{a+\eta}{2}, 1 \right) & (a-\eta, 1) \end{array} \right. \right)$$

Summary

$$\begin{aligned} a^* &= 0 \\ \Delta &= 2 \\ \delta &= 1 \\ \mu &= \frac{1}{2}(3a - \eta - 2) \\ a_1^* &= 1 \\ a_2^* &= -1 \\ \xi &= \frac{1}{2}(3\eta - a) \\ c^* &= 0 \end{aligned}$$

Poles 1. First eight poles from upper front list

$$a_{i,k} = \{\}^T$$

2. First eight poles from lower front list

$$b_{j,\ell} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(-a - \eta) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 2) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 4) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 6) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 8) \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 5 \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 6 \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 7 \end{pmatrix}^T$$