Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[]beamerthemedefault []beamercolorthemedefault
[]beamerfontthemedefault
[czech]babel [utf8]inputenc [T1]fontenc lmodern

Matematické modelovanie

Miroslava Vargová

Techmická Univerzita v Košiciach

19 Pebruari 2025

Obsah

Úvod

Příklady

- Tabulky a obrázky
- Matematika

Literatura

Úvod


- Několik poznámek k tvorbě prezentací.
- Pro tvorbu výčtů použijte prostředí `itemize`.

Příklady

Pro usnadnění práce při tvorbě prezentací uvádíme několik jednoduchých příkladů.

Tabulky a obrázky

- Použijte prostředí `tabular` na sazbu základních tabulek – viz. Tabulka 1.
- Pro vložení obrázku použijte příkaz `\includegraphics`.




Gambar 1: Bílá myška.

Položka	Množství
Jablka	42
Hrušky	13

Text a obrázek vedle sebe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rutrum urna vitae tellus consequat vestibulum. Nam ut purus diam, ac fermentum metus. Sed quam augue, lobortis ac mattis non, consectetur vitae elit. Ut tellus arcu, pellentesque convallis congue at, faucibus at velit.



Matematika

Věta

Moje první věta o tom, že $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ *vypadá lépe, než* $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Matematika

Věta

Moje první věta o tom, že $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ vypadá lépe, než $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Věta (Abelova)

Věta s označením.

Matematika

Věta

Moje první věta o tom, že $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ *vypadá lépe, než* $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Věta (Abelova)

Věta s označením.

Lemma

$[0, 1]$ *je kompaktní podmnožinou* $\mathbb{R}$.

Matematika – pokračování

Celý systém, skládající se z rovnic (1), (2) a (3), se nachází v Sekci 2.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= y_1, && (1)\\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{24}x_4 &= y_2, && (2)\\ a_{31}x_1 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 &= y_3. && (3) \end{aligned}$$

$$\cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cdots}} \qquad (4)$$

Řetězové zlomky viz (4) nebo také [1, strana 30].

$$\left\langle u \,\middle|\, \sum_{i=1}^{n} F(e_i, v)e_i \right\rangle = F\left(\sum_{i=1}^{n} \langle e_i|u\rangle e_i, v\right). \qquad (5)$$

Seznam použité literatury

- PLCH, Roman; LOMTATIDZE, Lenka. *Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky*. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 122 s. ISBN 80-210-3228-6.
- RYBIČKA, Jiří. *LaTeX pro začátečníky*. 3. vydání. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1.