

คู่มือค่า EC และ pH สำหรับพืชแต่ละชนิด

Hydroponics Crop EC & pH Comprehensive Dataset

คำแนะนำการใช้งาน: ค่า *pH* และค่า *EC* (Electrical Conductivity) เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการสารอาหารพืชไฮโดรโปนิกส์ ค่า *EC* มีหน่วยเป็น *mS/cm* ช่วงค่าที่ระบุด้านล่างนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตทั่วไป ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและระยะการเจริญเติบโตของพืช

1. กลุ่มผักสลัดและผักใบเขียว (Leafy Greens & Salad Vegetables)

ชื่อพืช (ภาษาไทย / English)	ช่วง pH ที่เหมาะสม	ช่วง EC ที่เหมาะสม (mS/cm)
คะเล / Kale	6.0 – 7.0	1.6 – 2.5
ผักสลัด / Lettuce (กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, คอส)	5.5 – 6.5	0.8 – 1.2
ผักโขม / Spinach	6.0 – 7.0	1.8 – 2.3
กวางตุ้งไต้หวัน / Pak Choy	6.5 – 7.0	1.5 – 2.0
กะหล่ำปลี / Cabbage	6.5 – 7.0	2.5 – 3.0
บรอกโคลี / Broccoli	6.0 – 6.8	2.8 – 3.5
ขึ้นฉ่าย / Celery	6.5 – 7.0	1.8 – 2.4

2. กลุ่มผักกินผล (Fruiting Vegetables)

ชื่อพืช (ภาษาไทย / English)	ช่วง pH ที่เหมาะสม	ช่วง EC ที่เหมาะสม (mS/cm)
มะเขือเทศ / Tomato	6.0 – 6.5	2.0 – 3.5
แตงกวา / Cucumber	5.5 – 6.0	1.7 – 2.5
พริกหวาน / Bell Pepper	6.0 – 6.5	1.8 – 2.2
มะเขือยาว / Eggplant	6.0 – 6.5	2.5 – 3.5
เมลอน / Melon	5.8 – 6.5	1.8 – 2.5

3. กลุ่มสมุนไพรและผักสวนครัว (Herbs & Kitchen Vegetables)

ชื่อพืช (ภาษาไทย / English)	ช่วง pH ที่เหมาะสม	ช่วง EC ที่เหมาะสม (mS/cm)
โหระพา / Basil	5.5 – 6.5	1.0 – 1.6
สะระแหน่ / Mint	6.0 – 7.0	2.0 – 2.4
พาร์สลีย์ / Parsley	5.5 – 6.0	0.8 – 1.8
โรสแมรี่ / Rosemary	5.5 – 6.0	1.0 – 1.6
ผักชีฝรั่ง / Coriander	5.8 – 6.4	1.2 – 1.8

4. กลุ่มผลไม้และไม้ดอก (Fruits & Flowers)

ชื่อพืช (ภาษาไทย / English)	ช่วง pH ที่เหมาะสม	ช่วง EC ที่เหมาะสม (mS/cm)
สตรอว์เบอร์รี่ / Strawberry	5.5 – 6.2	1.0 – 1.4
กุหลาบ / Rose	5.5 – 6.0	1.5 – 2.0
ดาวเรือง / Marigold	6.0 – 6.5	1.2 – 2.0
กล้วยไม้ / Orchid	5.5 – 6.5	0.8 – 1.2