

សំណួរមានចម្លើយជ្រើសរើសច្រើន

1	តើមីតូសជាអ្វី? A. ប្រភេទមួយនៃការបំបែកខ្លួនរបស់កោសិកាធម្មតា B. ការធ្វើមេតាបូលីសរបស់កោសិកា C. ការជួសជុលកោសិកាដែលខូចខាត D. ចម្លើយ ក+ខ ត្រឹមត្រូវ	A
2	តើក្រពេញណាមួយដែលជាក្រពេញអង់ដូត្រីន? A. ក្រពេញញើស B. ក្រពេញទឹកមាត់ C. ក្រពេញរសរំលាយអាហារ D. ក្រពេញThyroid	D
3	តើមនុស្សមានក្រូម៉ូសូម ចំនួនប៉ុន្មានគូ ? A. ១៣គូ B. ២៣គូ C. ២៨គូ D. ៣៣គូ	B
4	តើក្រូម៉ូសូមស្ថិតនៅលើខ្សែត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងតំណាក់កាល Metaphase ? A. ផ្នែកខាងដើមកោសិកា B. ផ្នែកខាងចុងកោសិកា C. ផ្នែកកណ្តាលកោសិកា D. ផ្នែកទាំងសងខាងកោសិកា	C
5	តើជាលិកាគឺជាអ្វី ? A. បណ្តុំសារធាតុ Matrix ដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយ B. បណ្តុំកោសិកាសំរាប់បង្កើតផ្នែកផ្សេងៗរបស់រាងកាយ C. បណ្តុំសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយ D. ចម្លើយ ខ + គ ត្រឹមត្រូវ	B

6	តើជាលិកាអេពីតេលីយ៉ាល់មានតួនាទីសំរាប់ធ្វើអ្វី ? A. បង្កើតស្រទាប់ការពាររាងកាយ B. បង្កើតស្រទាប់ខាងក្នុងនៃសរីរាង្គក្រៅ C. បង្កើតជាសរីរាង្គទ្រទ្រង់ D. ចម្លើយក + ខ ត្រឹមត្រូវ	D
7	តើ Ligaments ដែលចងភ្ជាប់ឆ្អឹងទៅនឹងឆ្អឹង កើតឡើងដោយជាលិកាអ្វី? A. ជាលិកាសន្ធានសាមញ្ញ B. ជាលិកាសន្ធានចម្រុះ C. ជាលិកាភ្ជាប់ដែលមានសរសៃរាពណ៍ស D. ជាលិកាភ្ជាប់ដែលមានសរសៃរាពណ៍លឿង	C
8	តើនៅលើសរីរាង្គមួយណាដែលគេសង្កេតឃើញមានជាលិកាអាឌីបូ ? A. សរសៃឈាម B. សួត C. ដោះ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
9	តើភ្នាសមុយក៏ (Mucous membrane) ជាអ្វី? A. ភ្នាសស្តើងមានស្រទាប់កោសិកា B. ភ្នាសស្តើងមានស្រទាប់កោសិកាអេពីតេលីយ៉ាល់ C. ភ្នាសស្តើងមានស្រទាប់កោសិកាអេពីតេលីយ៉ាល់ ស្ថិតនៅលើស្រទាប់ជ្រៅៗនៃជាលិកាសន្ធាន D. Mucus ដែលមានលក្ខណៈដូចសំបុក	C
10	តើសមាសភាគរបស់(Mucous) មានអ្វីខ្លះ? A. កោសិកាឈាម ស B. អំបិលគ្មានសរីរាង្គបៅ C. Mucin D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

11	តើសារធាតុរាវអិល ដែលបញ្ចេញដោយ Synovial membrane មានមុខងារសម្រាប់ធ្វើអ្វី? A. ធ្វើឱ្យសន្លាក់ឆ្អឹងមានសភាពសើម B. ធ្វើឱ្យសន្លាក់ឆ្អឹងរឹងមាំ C. ធ្វើឱ្យសន្លាក់ឆ្អឹងមានចលនាដោយមិនមានការកកិត D. ធ្វើឱ្យកោសិកាឆ្អឹងរឹងមាំ	C
12	តើដោយសារអ្វីដែលគេអាចចាត់ទុកថា ឈាមជា ជាលិកាភ្ជាប់ (Connective tissue)បាន ? A. កោសិកាឈាមក្រហម B. សារធាតុរាវជា Matrix C. កោសិកាឈាមស D. ប្លាកែត	B
13	តើអេឡិចត្រូលីតមួយណាដែលសំខាន់នៅក្នុងកោសិកា ? A. អ៊ីយ៉ុង K+ B. អ៊ីយ៉ុង N+ C. អ៊ីយ៉ុង cl D. ចម្លើយ ក+ខ ត្រឹមត្រូវ	A
14	តើចម្លើយមួយណាដែលជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៃ មីតូស ឬមីយ៉ូស ? A. ក្នុងមីតូសក្រុមសូមនៃកោសិកាកូនតិចជាងកោសិកាមេ២ដង B. ក្នុងមីយ៉ូសក្រុមសូមនៃកោសិកាកូនតិចជាងកោសិកាមេ២ដង C. ក្នុងមីយ៉ូសក្រុមសូមនៃកោសិកាកូនច្រើនជាងកោសិកាមេ២ដង D. ក្នុងមីយ៉ូសក្រុមសូមនៃកោសិកាកូនច្រើនជាងកោសិកាមេ២ដង	B
15	តើកំហាប់អ្វីដែលធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃអាស៊ីដ-បាស ? A. កំហាប់អុកស៊ីសែននៃរាងកាយ B. កំហាប់អាស៊ីដនៃរាងកាយ C. កំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងសារធាតុរាវនៃរាងកាយ D. កំហាប់បាសនៃរាងកាយ	C

16	តើឆ្អឹង ulna និង radius បង្កើតបានជាផ្នែកណាមួយនៃសរីរាង្គមនុស្ស? A. ឆ្អឹងកំភួនដៃ B. កំភួនជើង C. ឆ្អឹងក្បាល D. ឆ្អឹងត្រីតាក	A
17	តើនៅពេលគភីមានអាយុប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ដែលការវិវត្តន៍គ្រោងឆ្អឹងអំប្រើយ៉ុងមានលក្ខណៈពេញលេញ ? A. ៦ សប្តាហ៍ B. ៨ សប្តាហ៍ C. ១០ សប្តាហ៍ D. ១២ សប្តាហ៍	B
18	តើឆ្អឹងកងចង្កេះ (lumbar vertebra) មានចំនួនប៉ុន្មាន ? A. ៥ B. ៧ C. ៨ D. ១០	A
19	តើឆ្អឹងកងសាក់ក្រូម (sacral vertebra) មានចំនួនប៉ុន្មាន ? A. ៥ B. ៧ C. ៨ D. ១០	A
20	តើឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាលមានចំនួនប៉ុន្មាន ? A. ៤ B. ៨ C. ១២ D. ១៤	B

21	តើទារកមានអាយុប៉ុន្មានខែ ទើបបង្ហើយខាងមុខ (anterior fontanelle) បិទជិត ? A. ៨ខែ B. ១២ ខែ C. ១៨ ខែ D. ២៤ ខែ	C
22	តើទារកមានអាយុប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទើបបង្ហើយខាងក្រោយ (posterior fontanelle) បិទជិត? A. ៦ - ៨ សប្តាហ៍ B. ៩ - ១០ សប្តាហ៍ C. ១១ - ១២ សប្តាហ៍ D. ១៣ - ១៤ សប្តាហ៍	A
23	តើឆ្អឹងមួយណា ដែលជាប្រភេទឆ្អឹងអនិយ័តហើយវាបង្កើតបានជាផ្នែកមួយរបស់បាតឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាល (Base of skull) និងផ្នែកកណ្តាលរបស់វាមានក្រហូងផ្ទុកក្រពេញ Pituitary ? A. Parietal B. Temporal C. sphenoid D. Occipital	C
24	តើឆ្អឹងមួយណា ដែលជាប្រភេទឆ្អឹងដែលមានអនិយ័តហើយវាបង្កើតបានជាផ្នែកមួយរបស់បាតឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាល (Base of skull) និងមានប្រហោងជាច្រើនដែលសរសៃប្រសាទឈានវិញ្ញាណឆ្លងកាត់ ? A. Parietal B. Temporal C. sphenoid D. Ethmoid	D

25	តើទីតាំងរបស់បេះដូង ស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណា ? A. លើសន្ទះខណ្ឌទ្រូងខាងឆ្វេង B. ក្រោមផ្ចឹងសន្ទះទ្រូង(diaphragm) C. លើសន្ទះខណ្ឌទ្រូង និង ចន្លោះសួតទាំង២(mediastinum) D. នៅក្បែរថ្លើម	C
26	តើសរសៃវ៉ែនសួត (Pulmonary vein) មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ? A. ដឹកនាំឈាមទៅកាន់ជាលិការាងកាយ B. ដឹកនាំឈាមចូលក្នុងថតលើស្តាំបេះដូង C. ដឹកនាំឈាមចេញពីសួតចូលក្នុងថតលើបេះដូងឆ្វេង D. ដឹកនាំឈាមពីសួតទៅចិញ្ចឹមបេះដូង	C
27	តើសរសៃឈាមអាអ័ក (Aorta) ដែលធំជាងគេនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ? A. ទទួលឈាមចេញពីថតលើបេះដូង ទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល និងរាងកាយ B. ទទួលឈាមពីថតក្រោមស្តាំបេះដូងទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល និងរាងកាយ C. ទទួលឈាមពីថតលើឆ្វេងបេះដូង ទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល និងរាងកាយ D. ដឹកនាំឈាមពីថតក្រោមឆ្វេងនៃបេះដូងទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាល និងរាងកាយ	D
28	តើសរសៃវ៉ែនសួត (Pulmonary vein) មានចំនួនប៉ុន្មានមែក គឺអ្វីខ្លះ ? A. ២មែក ឆ្វេង១ ស្តាំ១ B. ៤មែក ឆ្វេង២ ស្តាំ២ C. ៦មែក ឆ្វេង៣ ស្តាំ៣ D. ៨មែក ឆ្វេង៤ ស្តាំ៤	B
29	តើសរសៃវ៉ែនការ (Vena cava) ដឹកនាំឈាមទៅទីណា ? A. នាំឈាមចូលទៅក្នុងថតលើស្តាំបេះដូង B. នាំឈាមចូលទៅក្នុងថតលើឆ្វេងបេះដូង C. នាំឈាមទៅកាន់ជាលិកាសរីរាង្គ D. នាំឈាមចែកចាយទៅសួត	A

30	តើឈាមត្រូវបានរុញច្រានទៅតាមណា នៅពេលដែលថតក្រោមស្តាំរបស់បេះដូង កន្ត្រាក់ ? A. តាមអាទែរពុលមូនៃរ B. តាមវ៉ែនពុលមូនៃរ C. តាមវ៉ែនការខាងលើ D. តាមសរសៃឈាមអាអ៊ីក	A
31	តើឈាមដែលមាននៅក្នុងថតបេះដូងខាងស្តាំ ជាឈាមសម្បូរទៅដោយអ្វីខ្លះ ? A. សម្បូរកាបូនឌីអុកស៊ីត មិនសូវមានអុកស៊ីហ្សែន B. សម្បូរកាបូនឌីអុកស៊ីត និងសម្បូរអុកស៊ីហ្សែន C. មិនសូវមានកាបូនឌីអុកស៊ីត និងអុកស៊ីហ្សែន D. មិនសូវមានកាបូនឌីអុកស៊ីត និង សម្បូរអុកស៊ីហ្សែន	A
32	តើសរសៃឈាមមួយណាដែលនាំឈាមទៅចិញ្ចឹមបេះដូងទាំងមូល ? A. អាទែរពុលមូនៃរ (Pulmonry artery) B. អាទែរក្លរូនៃរ (Coronary artery) C. អាទែរីយ៉ូល (Arteriol) D. អាទែរកាវ៉ូទីត (Carotid artery)	B
33	មុខងារចម្បងរបស់ អ័រម៉ូន Testosterone គឺ៖ A. រំញោចដើម្បីលូតលាស់សរីរៈភេទបុរស B. រំញោចដើម្បីលូតលាស់សរីរៈភេទស្រ្តី C. រំញោចបញ្ចេញអ័រម៉ូន Oestrogen D. រំញោចបញ្ចេញ Progesterone	A
34	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលជំរុញឱ្យមានការលូតលាស់លក្ខណៈភេទបន្ទាប់បន្សំរបស់បុរស? A. Progesterone B. Oestrogen C. Testosterone D. Follicle-stimulating hormon (FSH)	C

35	តើរយៈពេលមធ្យមនៃរដូវស្រូវមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ? A. ១៨ ថ្ងៃ B. ២៥ ថ្ងៃ C. ២៨ ថ្ងៃ D. ៣០ ថ្ងៃ	C
36	តើចម្លើយណាមួយដែលមិនមែនជាមុខងាររបស់ស្បែក ? A. ផលិតអ្វីរុល B. ផ្តល់នូវទីជម្រកសំរាប់ការលូតលាស់របស់ទារក C. បញ្ចេញទារកមកក្រៅ D. ទទួលបានបង្កកំណើត	A
37	តើដោះស្រូវម្ខាងៗមានក្លែបចំនួនប្រហែលប៉ុន្មាន តាមលក្ខណៈកាយវិភាគវិទ្យា ? A. ១០ - ១៥ ក្លែប B. ១៥ - ២០ ក្លែប C. ២០ - ៣៥ ក្លែប D. ៣៥ - ៤០ ក្លែប	B
38	តើ Testosterone គឺជាអ្វី ? A. អ័រម៉ូនភេទបុរស B. អ័រម៉ូនភេទស្រី C. ជាតិគីមីដែលចាំបាច់សំរាប់ពេលអស់រដូវ D. អ័រម៉ូនដែលផលិតដោយអូវុល	A
39	តើផ្នែកណាមួយរបស់មេជីវិតឈ្មោល ដែលផ្ទុកសេនេទិក (DNA) ? A. ផ្នែកក្បាល B. ផ្នែក ក C. ផ្នែក តូនូន D. ផ្នែក កន្ទុយ	A

40	តើមេជីវិតឈ្មោល មានអាយុអាចរស់នៅក្នុងប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តីបានប៉ុន្មានម៉ោង? A. ១២ - ២៤ ម៉ោង B. ២៤ - ៤៨ ម៉ោង C. ៤៨ - ៧២ ម៉ោង D. លើសពី ៧២ ម៉ោង	C
41	តើចម្លើយណាមួយជាមុខងាររបស់ប្រដាប់បន្តពូជបុរស? A. ផលិតមេជីវិតឈ្មោល B. ដឹកនាំមេជីវិតឈ្មោល C. ផលិត និង ដឹកនាំមេជីវិតឈ្មោល D. ផលិតទឹកកាម	C
42	តើចម្លើយណាមួយជាមុខងាររបស់ប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តី? A. ផលិតអូវុល B. ទទួលពងបង្កកំណើត C. ផលិតអ័រម៉ូន D. ផលិតអូវុល និងទទួលពងបង្កកំណើត	D
43	តើចម្លើយណាមួយដែលមិនមែនជាមុខងារចម្បងរបស់អ័រម៉ូន oestrogen ? A. ធ្វើឱ្យមានការលូតលាស់សរីរៈបន្តពូជស្រ្តី B. ជំរុញឱ្យមានលក្ខណៈភេទបន្ទាប់បន្សំ C. ធ្វើឱ្យមានវដ្តឈាមរដូវ D. ធ្វើឱ្យមានអូវុលច្បាសប្រុង	D
44	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលជំរុញឱ្យមានការលូតលាស់លក្ខណៈភេទបន្ទាប់បន្សំរបស់ស្រ្តី ? A. Progesterone B. Oestrogen C. Follicle-stimulating hormone (FSH) D. Testosterone	B

45	នៅពេលមេជីវិតឈ្មោលមិនទាន់ពេញវ័យ វាត្រូវបានស្តុកទុកជាបណ្តោះអាសន្ននៅ A. Seminiferous Tubules B. Tube Deferens C. Epididymis D. ក្រពេញប្រូស្តាត prostate gland	C
46	តើអ្វីមួយជាគោសិកាបន្តពូជបុរស ? A. ទឹកកាម B. មេជីវិតឈ្មោល C. ប្រូស្តាត D. ពងស្វាស	B
47	តើស្រទាប់ណាមួយនៃស្បូនដែលជ្រុះនៅក្នុងកំឡុងពេលមានឈាមរដូវ ? A. Endometrium B. Myometrium C. Perimetrium D. Vagina Cells	A
48	តើការឡើងវិញនៃប្រដាប់ភេទបុរសបណ្តាលមកពីអ្វី ? A. ការកន្ត្រាក់សាច់ដុំឆ្អឹង B. ការរីកបង្កូរនោម C. ចំនួនទឹកកាមកើនឡើង D. លំហូរឈាមបំពេញសរីរៈភេទ	D
49	តើក្រពេញណាដែលបញ្ចេញសារធាតុរាវដូចទឹកដោះគោនៅក្នុងទឹកកាម? A. ក្រពេញប្រូស្តាត B. ក្រពេញ bulbo-urethral C. ក្រពេញទឹកកាម (Seminal vesicles) D. ពងស្វាស (Testis)	A

50	តើមេជីវិតឈ្មោលមានជីវិតរស់នៅក្នុងផ្លូវបន្តពូជបុរស(male genital tract) បានប៉ុន្មានសប្តាហ៍? A. ២ - ៤ សប្តាហ៍ B. ៤ - ៦ សប្តាហ៍ C. ៦ - ៨ សប្តាហ៍ D. ៨ - ១០ សប្តាហ៍	B
51	តើបំពង់ដៃស្បូនរបស់ស្រ្តីពេញវ័យមានបណ្តោយប្រវែងប្រហែលប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ? A. ១០សម B. ១៥ សម C. ២០ សម D. ២៥ សម	A
52	តើក្រពេញមួយណាដែលជាក្រពេញបញ្ចេញអ័រម៉ូន Oxytocin ? A. Suprarenal B. Thyroid C. Pituitary D. Parathyroid	C
53	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលធ្វើឱ្យការផលិត testosterone នៅក្នុងកោសិកា interstitial សកម្មឡើង? A. Oestrogen B. Luteinizing hormon (LH) C. Follicle-stimulating hormon (FSH) D. Progesterone	C
54	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលភ្លេចស្បូនឱ្យកន្ត្រាក់? A. Oxytocin B. Oestrogen C. Prolactin D. Progesterone	A

55	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលជាអ័រម៉ូនទីពីរធ្វើការជាមួយ oestrogen ជួយរៀបចំ endometrium សំរាប់ការគោងនៅ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃពងបង្កកំណើត? A. Luteinizing hormon (LH) B. Follicle stimulating hormon (FSH) C. Anti-diuretic hormon (ADH) D. Progesterone	D
56	តើអ័រម៉ូនណាមួយដែលផលិតឡើងដោយក្លែបខាងមុខរបស់ក្រពេញ pituitary និងបន្ទាប់ពី ទារកប្រសូត្រូវបាន វាមានមុខងារភ្លេចផលិតទឹកដោះ? A. Oxytocin B. Oestrogen C. Prolactin D. Progesterone	C
57	តើអ័រម៉ូនណាមួយដែលផលិតឡើងដោយក្លែបខាងក្រោយរបស់ក្រពេញ pituitary និងបន្ទាប់ពី ទារក ប្រសូត្រូវបានវាមានមុខងារភ្លេចបញ្ចេញទឹកដោះ? A. Oxytocin B. Oestrogen C. prolactin D. Progesterone	A
58	តើមេជីវិតឈ្មោលអាចមានជីវិតរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបានប៉ុន្មានម៉ោង ? A. ២៤ ម៉ោង B. មិនលើសពី ៤៨ ម៉ោង C. មិនលើសពី ៧២ ម៉ោង D. លើសពី ៧២ ម៉ោង	B

59	ស្ត្រីម្នាក់មានក្រុមឈាមអេសុស ដក (Rh-) ទទួលការដាក់បញ្ចូលឈាមដែលមានអេសុស បូក(Rh+) ចំនួន២ដងរួចមកហើយ។ ក្នុងករណីគាត់មានផ្ទៃពោះដែលមានអេសុសបូកជាលើកទី១ តើស្ត្រីនោះ ឬទារកប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្វី ? A. មិនទាន់មានការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយទេ B. ការបែកគ្រាប់ឈាមរបស់ម្តាយ C. ការបំផ្លាញគ្រាប់ឈាមរបស់ម្តាយផង និងរបស់ទារកផង D. ការបំផ្លាញគ្រាប់ឈាមរបស់ទារក	D
60	តើអ័រម៉ូនណាមួយ ដែលជាអ្នកភ្ជោចអង្គល្បឿង ឱ្យមានការបញ្ចេញ Estrogen និងProgesterone ដែលចាំបាច់ក្នុងពេលមានគភ៌ ? A. FSH B. LH C. Growth hormon (GH) D. Oxytocin	B
61	តើអ័រម៉ូនណាមួយដែលជាអ្នកភ្ជោចឱ្យមានការផលិតទឹកដោះបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួច ? A. FHS B. LH C. Prolactin D. Oxytocin	C
62	តើអ័រម៉ូនណាមួយដែលជាអ្នកភ្ជោចឱ្យមានការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំស្បូននៅពេលឈឺពោះសម្រាល ? A. FSH B. LH C. Prolactin D. Oxytocin	D
63	តើអ័រម៉ូនណាមួយដែលជាអ្នកភ្ជោចឱ្យមានការបាញ់ចេញនៃទឹកដោះនៅពេលបំបៅដោះកូន? A. Prolactin B. Oxytocin C. Growth hormone (GH) D. Thyroxine	B

64	តើអ័រម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយ Testis និង Ovary មានមុខងារអ្វីខ្លះ? A. ការលូតលាស់ រាងកាយ និង សរីរាង្គបន្តពូជ B. មានលក្ខណៈសំគាល់ភេទបន្ទាប់បន្សំ C. ជួយបញ្ចេញបញ្ចេញអ័រម៉ូន Oestrogen D. បញ្ចេញដើម្បីលូតលាស់សរីរៈភេទបុរស	A
65	តើសរីរាង្គអ្វី ខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាផ្លូវបន្តពូជស្រ្តី ? A. ទ្វារមាស ស្បូន និង ដៃស្បូន B. ស្បូន និង ដៃស្បូន C. យោនី បបូរកូច និង ធំ D. យោនី និង ទ្វារមាស	A
66	តើក្រពេញដោះរបស់ស្រ្តីមាន ទទឹង និង កំពស់ ប៉ុន្មាន ? A. ទទឹង ១០ សម និង កំពស់៩-១០ សម B. ទទឹង ១០ សម និង កំពស់ ១១-១២ សម C. ទទឹង ១១ សម និង កំពស់៩-១០ សម D. ទទឹង ១២ សម និង កំពស់១១-១២ សម	B
67	តើជម្ងឺហង់សិន មានការប៉ះពាល់ទៅផ្នែកមួយណានៃរាងកាយ ? A. ស្បែក B. សរសៃប្រសាទខាងក្រៅ C. ផ្លូវដង្ហើម D. ចម្លើយ ទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
68	តើរយៈពេលសម្ងាត់នៃជម្ងឺហង់សិន មានរយៈពេលប៉ុន្មាន ? A. ១-២ឆ្នាំ B. ៣-៥ឆ្នាំ C. ៦-៨ឆ្នាំ D. ៨-១០ឆ្នាំ	B

69	តើការក្អកនៃជម្ងឺរបេងមានលក្ខណៈដូចម្តេច ?	C
	A. ក្អកស្ងួត B. ក្អកស្ងួតរួចមានកំហាក C. ក្អកស្ងួត មានកំហាក មានស្នេស្នខាប់ D. ក្អកផ្លូវខ្លាំងៗ	
70	តើជម្ងឺហង់សិន កើតនៅលើមនុស្សវ័យណា ?	C
	A. មនុស្សចាស់ B. មនុស្សពេញវ័យ C. គ្រប់វ័យនិងគ្រប់ភេទ D. ក្មេងជំទង់	
71	តើសភាពស្បែកយ៉ាងដូចម្តេច ដែលជាទូទៅគេអាចកត់សំគាល់ថាជាលេស្យុង (Lesion) ស្បែកនៃជម្ងឺហង់សិន ?	D
	A. ស្បែកមានពណ៌ស B. ស្បែកមានពណ៌ក្រហម C. ស្បែកមានពណ៌ក្រមៅ	
72	តើលក្ខណៈមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាជាលេស្យុង (Lesion) ស្បែកពិតប្រាកដនៃជម្ងឺហង់សិន ?	B
	A. រមាស់ B. បាត់បង់ញាណដឹង C. ដុំពក D. ក្រហាយឬឈឺចាប់ស្បែក	
73	តើទីកន្លែងណាដែលមេរោគរបេងមិនងាយស្រួលរស់នៅ ?	C
	A. ទីកន្លែងងងឹត B. ទីកន្លែងសើម C. ទីកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ D. ទីកន្លែងដែលមានកំដៅ	

74	តើរយៈពេលសម្ងាត់នៃជម្ងឺលាក់ថ្លើមដោយវីរុសប្រភេទ បេ មានរយៈពេលប៉ុន្មានខែ? A. ១ខែកន្លះ - ៦ខែ B. ៧ខែកន្លះ - ១២ខែ C. ១២ខែកន្លះ - ២៤ខែ D. ៣៦ខែកន្លះ - ៣៩ខែ	A
75	តើជម្ងឺហង់សិន គឺជាជម្ងឺអ្វី ? A. ជម្ងឺសួរពូជ B. ជម្ងឺ ឆ្លង C. ជម្ងឺបណ្តាលមកពីខ្វះចំណីអាហារ D. ជម្ងឺកាមរោគ	B
76	តើលេស្យុង(Lesion)ស្បែកនៃជម្ងឺហង់សិន នៅក្នុងសណ្ឋាន I មុន T មានលក្ខណៈដូចម្តេច? A. លេស្យុងមានទំហំធំ និងស្លឹកនៅកណ្តាលលេស្យុង B -លេស្យុងមានទំហំធំ មានគែមច្បាស់ C. លេស្យុងមានទំហំធំ គ្មានគែមច្បាស់និងស្លឹកនៅកណ្តាលលេស្យុង D. លេស្យុងមានទំហំធំ មានគែមច្បាស់និងស្លឹកនៅកណ្តាលលេស្យុង	D
77	តើលេស្យុងស្បែកនៃជម្ងឺហង់សិន នៅក្នុងសណ្ឋាន T ស្តែងឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ? A. បន្ទះក្រហម លើស្បែកធម្មតា ដែលមានវិជ្ជមានត្រលើសពី១០ស.ម B. បន្ទះក្រហម លើស្បែកធម្មតា និង ស លើស្បែកក្រមៅ ដែលមានវិជ្ជមានត្រលើសពី១០ស.ម C. បន្ទះក្រហម លើស្បែកធម្មតា និង ស លើស្បែកក្រមៅ ដែលមានវិជ្ជមានត្រមិនលើសពី១០ស.ម D. លេស្យុងមានទំហំធំ គែមច្បាស់និងស្លឹកនៅកណ្តាលលេស្យុង ហើយហើមប៉ោង ដែលមានវិជ្ជមានត្រ មិនលើសពី១០ស.ម	C

78	តើរូបមន្តប្រភេទទី១ (CAT1) RHZE/RH នៃការព្យាបាលជម្ងឺរបេង មានរយៈពេលប៉ុន្មាន ? A. ៦ខែ B. ៨ខែ C. ១០ខែ D. ១២ខែ	A
79	តើគេប្រើរូបមន្តប្រភេទទី១ (CAT 1) 2RHZE/4RH សំរាប់ព្យាបាលជម្ងឺរបេងប្រភេទណា ? A. របេងស្លុតវិជ្ជមានមេរោគ (BK+) B. របេងស្លុតអវិជ្ជមានមេរោគធ្ងន់ធ្ងរ (BK-) C. របេងក្រៅស្លុតធ្ងន់ធ្ងរ របេង/អេដស៍គ្រប់សណ្ឋាន D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
80	តើរូបមន្តប្រភេទទី២ (CAT 2) SRHZE/ RHZ/ RHZ នៃការព្យាបាលជម្ងឺរបេងមានរយៈពេលប៉ុន្មាន ? A. ៦ខែ B. ៨ខែ C. ១០ខែ D. ១២ខែ	B
81	តើជម្ងឺរបេងប្រភេទមួយណាដែលគេមិនប្រើរូបមន្តប្រភេទទី២(CAT2) 2SREZE//1RHZE/5RHEសំរាប់ព្យាបាល ? A. របេងស្លុតវិជ្ជមានមេរោគ (BK+) លាប់ បរាជ័យ B. របេងស្លុតអវិជ្ជមានមេរោគ (BK-) C. របេងស្លុតវិជ្ជមានមេរោគ (BK+) ពីឡើងវិញ D. របេងក្រៅស្លុត	B

82	តើរូបមន្តប្រភេទទី៣ (CAT3) RHZE/ RHE នៃការព្យាបាលជម្ងឺរបេង មានរយៈពេលប៉ុន្មាន? A. ៦ខែ B. ៨ខែ C. ១០ខែ D. ១២ខែ	A
83	ក្នុងចំណោមអ្នកដែលពុំមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១០០នាក់ តើមានកើតជម្ងឺរបេងសកម្មប៉ុន្មាននាក់/ឆ្នាំ? A. ១០នាក់ B. ២០នាក់ C. ៣០នាក់ D. ៤០នាក់	A
84	ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១០០នាក់ តើមានកើតជម្ងឺរបេងសកម្មប៉ុន្មាននាក់/ឆ្នាំ? A. ១០នាក់ B. ២០នាក់ C. ៣០នាក់ D. ៤០នាក់	C
85	តើរយៈកាលសម្ងំនៃEpidemic viral gastroenteritis មានរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ? A. ៤-៦ ម៉ោង B. ៨-១២ ម៉ោង C. ១២-២៤ម៉ោង D. ២៤-៤៨ម៉ោង	D

86	តើប្រតិកម្ម (Reaction) នៃជម្ងឺហង់សិន បណ្តាលមកពីអ្វី ? A. ការព្យាបាលដោយថ្នាំ B. បាក់ស៊ីច្រើនពេក C. លេស្យុងស្បែកច្រើនពេក D. បាត់បង់លំនឹងនៃប្រព័ន្ធការពារ	D
87	តើពាក្យខាងក្រោមណាមួយ ដែលជាភាពសាហាវនៃមេរោគក្នុងការបង្កជម្ងឺ? A. Toxigenicity B. Antigenicity C. Allergen D. Pathogenicity	A
88	តើសញ្ញាមួយណាដែលជាសញ្ញានៃការប៉ះពាល់សរសៃប្រសាទនៅក្នុងជម្ងឺហង់សិន ? A. ការបាត់បង់ញាណដឹង B. ឈឺសន្លាក់ C. បាត់បង់ញាណដឹង និងខ្សោយសាច់ដុំ D. ឈឺម្រាមដៃ ជើង	C
89	តើលេស្យុង(Lesion)ស្បែកនៃជម្ងឺហង់សិន នៅក្នុងទម្រង់ BB មានលក្ខណៈដូចម្តេច ? A. រាងមូល ឬពងក្រពើតែមរាបស្មើស្បែក B. រាងមូល ឬពងក្រពើតែមហើបហួសពីស្បែកនិងកន្ទួលខ្ពស់ C. លេស្យុងស្បែកច្រើន ស្នាម បន្ទះ កន្ទួលតូចៗ ជុំពក D. បន្ទះផ្កាឈូក មានចំនួនច្រើនលើស្បែក	B
90	តើជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ អា (A) ឆ្លងតាមរបៀបណា? A. ចំណីអាហារ B. ការចាក់ថ្នាំ C. ផ្លូវដង្ហើម D. ការរួមភេទ	A

91	តើជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ សេ(C) ឆ្លងតាមរបៀបណា? A. ចំណីអាហារ B. ការចាក់ថ្នាំដោយប្រើមូល ស៊ីរ៉ាំងរួមគ្នា C. ផ្លូវដង្ហើម D. ការប្រើប្រាស់សំលៀកបំពាក់រួមគ្នា	B
92	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុនៃការពុលចំណីអាហារ (Food Poisoning) ? A. មេរោគបាក់តេរី B. តុកស៊ីនរបស់មេរោគ C. ប៉ារ៉ាស៊ីត D. មេរោគវីរុស	B
93	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃជម្ងឺរលាកក្រពះ ពោះវៀន(Gastro enterite) ដែលបង្កដោយបាក់តេរី និងវីរុស ? A. ខ្សោះជាតិទឹក B. អតុល្យភាពអេឡិចត្រូលីត C. ខ្សោយចរន្តឈាម	D
94	តើអ្នកត្រូវពិនិត្យអ្វី ដើម្បីឱ្យដឹងថាអ្នកជម្ងឺរបេងស្លូតមាន បេកា វិជ្ជមាន ? A. ពិនិត្យកំហក B. ពិនិត្យឈាម C. ពិនិត្យលាមក D. ពិនិត្យទឹករងៃ	A
95	តើជម្ងឺរបេងប្រភេទមួយណាដែលអាចឆ្លងទៅអ្នកដទៃបាន ? A. របេង BK- B. របេងស្រោមខ្វរ C. របេង BK+ D. របេងកូនកណ្តុរ	C

96	តើការពិនិត្យអមគ្លីនិកចាំបាច់អ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមេរោគអេដស៍ ?	A
	A. ពិនិត្យកំហាក និងថតស្ទូត B. ពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ និងកំហាក C. ពិនិត្យឈាម និងថតស្ទូត D. ពិនិត្យឈាមក និងទឹកនោម	
97	តើជម្ងឺអេដស៍ គឺជាជម្ងឺអ្វី ?	A
	A. ចង្កោមរោគសញ្ញាដែលកើតក្រោយភាពស៊ាំចុះខ្សោយ B. ជាជម្ងឺដែលមិនអាចព្យាបាលជា C. ជាជម្ងឺ តំណពូជ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	
98	តើមេរោគអេដស៍ មិនឆ្លងតាមរយៈអ្វី ?	B
	A. ការប៉ះទីករងៃដំបៅ B. ការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ C. ការបញ្ចូលឈាម D. ការសាក្សមគ្នា	
99	តើអង់ហ្ស៊ីមមួយណាដែលធ្វើឱ្យRNAនៃវីរុសជម្ងឺអេដស៍នៅក្នុងកោសិកា Host ប្រែក្លាយទៅជា DNA?	B
	A. Deoxyribonucleas B. Reverse transcriptase C. Ribonuclease	
100	តើកោសិកាមួយណាត្រូវបានរកឃើញដោយវីរុសអេដស៍ដែលនាំឱ្យមានការថយចុះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ?	A
	A. កោសិកា CD4 B. កោសិកា Neutrophile C. កោសិកា CD8	

101	តើមេរោគអេដស៍ ឆ្លងតាមរយៈអ្វី? A. ការរស់នៅជាមួយគ្នា B. ការបរិភោគអាហារជាមួយគ្នា C. ការប៉ះពាល់ប្រចាំថ្ងៃ D. ការបញ្ចូលឈាមមានមេរោគអេដស៍	D
102	តើមេរោគអេដស៍អាចចម្លងពីម្តាយទៅកូននៅក្នុងផ្ទៃតាមរយៈអ្វីខ្លះ ? A. ទឹកភ្លោះ B. ស្រោមទឹកភ្លោះ C. សុក និង ទងសុក D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
103	តើអ្វីខ្លះជាដំណាក់កាលនៃការវិវត្តរបស់មេរោគអេដស៍ដែលឆ្លងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស ? A. ការឆ្លងរោគតាម ៗ B. ការផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលគ្មានរោគសញ្ញា C. ជម្ងឺអេដស៍ដែលលេចចេញជារោគសញ្ញា D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
104	តើអ្នកណា ឬ របៀបមួយណាដែលប្រឈមមុខនឹងការចម្លងមេរោគអេដស៍ ? A. អ្នកមានដៃគូរួមភេទច្រើន B. ការបញ្ចូលឈាមដែលបានពិនិត្យ C. ការអោប និង ថើប D. ការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព	A
105	តើផ្នែកលើអ្វីខ្លះដែលគេអាចចាត់ទុកមនុស្សម្នាក់បានថាជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ? A. សភាពនៃរាងកាយ B. ប្រវត្តិនៃការរួមភេទ C. លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តឈាម D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C

106	តើអ្វីមួយជាទង្វើដើម្បីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ ? A. រួមភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព B. ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ C. ប្រើប្រាស់សំភារៈរួមគ្នា D. ប្រើប្រាស់សីរ៉ាំង និងមូលរួមគ្នា	A
107	តើត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាឱ្យធ្វើតេស្តឈាមម្តងទៀតនៅពេលណា ប្រសិនបើលទ្ធផលរកមេរោគអេដស៍អវិជ្ជមាន ? A. ៣ ខែក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម B. ២ ខែក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម C. ១ ខែក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម	A
108	តើសារធាតុរាវសរីរៈ ណាមួយដែលមានលទ្ធភាពចម្លងមេរោគអេដស៍ខ្លាំងជាងគេ ? A. ទឹកនោម B. ទឹកភ្នែក C. ទឹកមាត់ D. ទឹកដោះ	D
109	តើអ្វីមួយជាគោលបំណងនៃការផ្តល់ប្រឹក្សា ធ្វើតេស្តឈាម និងរក្សាការសម្ងាត់(VCCT)? A. កាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃទៀត B. ស្វែងរកការគាំទ្រពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុក C. បង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់អ្នកធ្វើតេស្ត D. ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនពីដៃគូរួមភេទ	C
110	តើអ្វីខ្លះជាគោលបំណងនៃការផ្តល់ប្រឹក្សាក្រោយពេលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ? A. ជួយអតិថិជនឱ្យសម្របខ្លួនទៅតាមលទ្ធផលតេស្ត B. ដើម្បីឱ្យអតិថិជនស្វែងរកសេវាថែទាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ C. កាត់បន្ថយការប្រឈមមុខនិង គ្រោះថ្នាក់ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

111	តើវីរុសមួយណាដែលបង្កឱ្យកើតមានជម្ងឺសិរមាន់ (Codylomata Acuminata) ? A. Rotary virus B. Papilloma virus C. Rhinovirus D. Cytomegalovirus	B
112	តើអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនស្តីពីមេរោគអេដស៍ ? A. ធ្វើឱ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្ត B. បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ C. មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់	D
113	តើបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីជៀសវាងនូវផលវិបាកផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលនឹងកើតមានមុន និងក្រោយ ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ? A. ទទួលស្គាល់នូវការពិតរបស់ខ្លួន B. ត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចមុននឹងធ្វើតេស្ត C. សម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
114	តើបញ្ហាមួយណាដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សភាគច្រើនមានការភ័យខ្លាចជាងគេ ក្នុងការស្វែងរកសេវាដែលទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស៍ ? A. មិនអាចទទួលស្គាល់ការពិតរបស់ខ្លួន B. មិនមានការគាំទ្រ និងការលើកទឹកចិត្ត C. ខ្លាចការរើសអើងពីក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍	C

115	តើការជៀសវាងមួយណាដែល មិនមែនជាការជួយឱ្យការសម្រាលកូនរបស់ស្ត្រីដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍បានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ? A. ជៀសវាងធ្វើការបំបែកស្រោមទឹកភ្លោះ បើមិនចាំបាច់ B. ជៀសវាងកាត់ទ្វារមាសប្រសិនបើចាំបាច់ C. ជៀសវាងការសម្រាលដោយរះកាត់ D. ជៀសវាងប្រើឧបករណ៍ជំនួយដល់ការសម្រាល	C
116	តើរោគសញ្ញា ឬ ជម្ងឺមួយណាដែលស្តែងឡើងក្នុងដំណាក់កាលទី៤ នៃជម្ងឺអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យ ? A. ស្រកទម្ងន់តិចជាង ១០% B. មានជម្ងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល C. គ្រុនក្តៅគ្មានមូលហេតុលើសពី១ ខែ D. មានកូនកណ្តុរពេញខ្លួន	B
117	តើរោគសញ្ញា ឬជម្ងឺមួយណាដែលស្តែងឡើងក្នុងដំណាក់កាលទី២ នៃជម្ងឺអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យ ? A. ស្រកទម្ងន់តិចជាង ១០% B. មានជម្ងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល C. គ្រុនក្តៅគ្មានមូលហេតុលើសពី១ ខែ D. ជម្ងឺរបេងស្ងួត	A
118	តើអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ដំបូងដែលចេញរោគសញ្ញាគ្រុនផ្តាសសាយមានប៉ុន្មានភាគរយ ? A. ១០-២០% B. ២០-៣០% C. ៣០-៤០% D. ៤០-៥០%	B

119	តើអ្វីខ្លះជាពោធិសញ្ញាដ៏អ្នករស់អ្នកជម្ងឺធ្លាក់ស ឬហូរខ្ទះតាមទ្វារមាស ? A. ធ្លាក់សខុសប្រក្រតី B. ឈឺចាប់ពេលរួមភេទ C. រមាស់ទ្វារមាស នោមឈឺ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
120	តើជម្ងឺរលាកក្នុងអាងត្រគាក គឺជាអ្វី ? A. គឺជាការរលាកស្បូន-ដៃស្បូននិងអូរ B. គឺជាការរលាកមាត់ស្បូន និង អូរ C. គឺជាការរលាកទ្វារមាស និង ពោះ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
121	តើអ្វីខ្លះជាការបង្កការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូនតាមរយៈសេវាសុខភាពបន្តពូជ ? A. ផ្តល់ឌីសថបង្កាប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ B. ការចិញ្ចឹមកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព C. ការសម្រាលកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
122	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកសំខាន់នៃជម្ងឺកាមរោគលើបុរស? A. ប្រដាប់បន្តពូជស្លូត B. អសមត្ថភាពក្នុងការបង្កកំណើត C. អសមត្ថភាពក្នុងការរួមភេទ D. គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរួមភេទ	B

123	តើមេរោគអ្វីខ្លះជាមូលហេតុចម្បងៗនៃជម្ងឺរលាកក្នុងអាងត្រជាក់របស់ស្ត្រី ?	A
	A. ប្រមេរទឹកបាយ និង ភ្លាមីឌីយ៉ា B. អាមីប និង ទ្រីកូម៉ូណាស់ C. កង់ឌីជាអាល់ប៊ីកង់ និង ប៉ាពីឡូម៉ា D. ត្រេប៉ូណេម និង ទ្រីកូម៉ូណាស់	
124	តើផលវិបាកមួយណាដែលមិនមែនជាផលវិបាកសំខាន់នៃជម្ងឺកាមរោគលើស្ត្រី ?	B
	A. ការឈឺចាប់ពោះពុំរ៉ាំរ៉ៃ B. គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរួមភេទ C. គភ៌ក្រៅស្បូន និងមហារីកមាត់ស្បូន D. ជម្ងឺរលាកក្នុងអាងត្រជាក់	
125	តើមនុស្សធម្មតាដែលមានសុខភាពល្អមានកោសិកា CD 4 ៤ចំនួនប្រហែលប៉ុន្មាន ?	C
	A. ប្រហែល ១០០ ទៅ ២៥០កោសិកា/mm³ឈាម B. ប្រហែល ៣០០ ទៅ ៤៥០កោសិកា/mm³ឈាម C. ប្រហែល ៥០០ ទៅ ១៥០០កោសិកា/mm³ឈាម D. ប្រហែល ១៦០០ ទៅ ២០០០កោសិកា/mm³ឈាម	
126	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃជម្ងឺរលាកប៉េលវីសបណ្តាលមកពីជម្ងឺកាមរោគ ?	D
	A. ថយចុះសមត្ថភាពបន្តពូជ B. ថយចុះសមត្ថភាពបន្តពូជទាំងស្រុង C. គភ៌ក្រៅស្បូន D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	
127	តើការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមយុវវ័យទាក់ទងនឹងភេទដូចម្តេចខ្លះ ដែលជាការប្រឈមមុខនឹងការចម្លងជម្ងឺកាមរោគ ?	D
	A. ការចាប់ផ្តើមមានសកម្មភាពរួមភេទ B. ការរួមភេទដោយមិនប្រើប្រាស់បន្លាបាយបង្ករ C. ផ្លាស់ប្តូរដៃគូរួមភេទញឹកញាប់	

128	តើកម្រិតឌីសថណាមួយដែលសមស្របសំរាប់ការព្យាបាលជម្ងឺរលាកបង្ហូរនោមដោយមេរោគប្រមេ:ទឹកបាយ? A. Cefexiime ២៥០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់ B. Cefexiime ៥០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់ C. Cefexiime ៤០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់	C
129	តើកម្រិតឌីសថណាមួយដែលសមស្របសំរាប់ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ Chancroid ? A. Cefexiime ៤០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់ B. Cotrimoxazol ៥០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់ C. Ciprofloxacin ៥០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់ D. Erytromycin ៥០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់	C
130	តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាជាជម្ងឺអ្វី ចំពោះស្រ្តីដែលកើតជម្ងឺកាមរោគ ដោយមិនមានធ្លាក់ស? A. ជម្ងឺរលាកទ្វារមាស B. ជម្ងឺរលាកប៉ែលវីស C. ជម្ងឺរលាកមាត់ស្បូន D. ជម្ងឺស្វាយ	C
131	តើកម្រិតឌីសថណាមួយដែលសមស្របសំរាប់ព្យាបាលជម្ងឺរលាកទ្វារមាសបង្កដោយមេរោគទ្រីកូម៉ូណាស់ ? A. Clotrimazol ៥០០ម.ក្រ សុលទ្វារមាសតែម្តង B. Cefexime ៤០០ម.ក្រ លេបតែម្តងគត់ C. Metronidazol ៥០០ម.ក្រ លេបតែម្តង D. Metronidazol ២ក្រ. លេបតែម្តង	D

132	តើឌីសថ Metronidazol ហាមប្រើចំពោះស្ត្រីមានគភ៌នៅអម្បងពេលណា ? A. ត្រីមាសទី១នៃគភ៌ B. ត្រីមាសទី២នៃគភ៌ C. ត្រីមាសទី៣នៃគភ៌ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
133	តើអ្នកថែទាំគប្បីជួយអ្នកជម្ងឺតាមរោគយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យការព្យាបាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ? A. ធ្វើការអប់រំពីជម្ងឺតាមរោគ B. ផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត C. ឱ្យអ្នកជម្ងឺធ្វើតាមការព្យាបាលរៀងរាល់ខែ D. ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត	A
134	តើអ្នកជម្ងឺតាមរោគត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីរក្សាការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តបានយូរអង្វែង ? A. ទទួលការអប់រំញឹកញាប់ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត B. មានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត C. ចូលរួមការងារសង្គមពីការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត D. ស្តាប់ព័ត៌មានពីការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត	B
135	តើអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់សំរាប់ការគ្រប់គ្រងព្យាបាលអ្នកជម្ងឺតាមរោគ ? A. ការលើកទឹកចិត្ត B. ការផ្តល់ព័ត៌មាន C. ការជឿទុកចិត្ត D. ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់	C
136	តើដោយសារអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យទំនុកចិត្តរវាងអ្នកផ្តល់ការថែទាំ និង អ្នកជម្ងឺកើតមានឡើង ? A. ការរក្សាការសំងាត់ B. ការផ្តល់ចម្លើយតប C. ការទំនាក់ទំនងល្អ D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A

137	តើសំណើណាមួយដែលជាសំដីដែលមានក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ? A. អ្នកគួរតែខ្មាសអៀន ចំពោះការរួមភេទដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើន B. អ្នកគួរសាកល្បងប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរាល់ពេលរួមភេទ C. អ្នកអាចប្រាប់បានទេ ហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកឆ្លងរោគនេះ D. ពេលអ្នកកើតជម្ងឺនេះតើអ្នកមានគំរោងអ្វីជាបន្ត	A
138	តើអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តដោយប្រើស្រោមអនាម័យ ? A. មានអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាលក្នុងការរួមភេទ B. កាត់បន្ថយនូវអារម្មណ៍សុខស្រួលក្នុងការរួមភេទ C. មិនបណ្តាលឱ្យឆ្លងជម្ងឺកាមរោគដល់កូន D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
139	តើមូលហេតុសំខាន់អ្វីមួយដែលនាំឱ្យក្រុមស្ត្រី យុវជន យុវនារី ធ្លាក់ចូលក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទ ? A. ចាកចេញឆ្ងាយផ្ទះ B. ភាពក្រីក្រ C. បាត់ភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង D. ដើម្បីរកប្រាក់ឱ្យបានច្រើន	C
140	តើការពង្រឹងការសម្រេចចិត្តមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? A. ប្រាប់អ្នកជម្ងឺពីវិធីធ្វើអ្វីមួយ ឬមូលហេតុរបស់វា B. ចង្អុលបង្ហាញពីជម្រើសឬជំហាននានា C. ផ្តល់ឧទាហរណ៍ដល់អ្នកដទៃ D. ជួយអ្នកជម្ងឺឱ្យយល់ពីបញ្ហាមួយចំនួន	D
141	តើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានភាគរយក្នុង ការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយសារការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យត្រឹមត្រូវ ? A. ៧៥% B. ៨៥% C. ៩៥% D. ១០០%	C

142	ភាពស្មាត់ជំនាញផ្នែកអប់រំដែលសំរាប់ប្រើជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត តើការពន្យល់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? A. ប្រាប់អ្នកដទៃពីវិធីធ្វើអ្វីមួយ ឬមូលហេតុរបស់វា B. ចង្អុលបង្ហាញពីជម្រើសឬជំហាននានា C. ផ្តល់ឱទ្ធិហោរណដល់អ្នកដទៃ D. អ្នកដទៃយល់ពីបញ្ហាមួយចំនួន	A
143	តើសកម្មភាពមួយណាជាជំហានទី១នៃការណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យឱ្យ បានត្រឹមត្រូវ ? A. ពន្យល់ពីរបៀបហែកស្រោមអនាម័យ B. ពន្យល់ពីរបៀបកាន់ស្រោមនៅពេលពាក់ C. ពន្យល់ពីការពិនិត្យមើលកាលកំណត់ប្រើរបស់ស្រោម D. ពន្យល់ពីរបៀបដោះស្រោមក្រោយពេលរួមភេទ	C
144	តើសកម្មភាពមួយណាជាជំហានទី២នៃការពិនិត្យរាងកាយបុរសរករោគសញ្ញាជម្ងឺតាមរោគ ? A. សុំឱ្យអ្នកជម្ងឺឈរស្រាតខោត្រឹមជង្គង់ B. ពិនិត្យមើលលិង្គ C. ស្ទាបតំបន់ក្រលៀន D. ស្ទាបពងស្វាស	C
145	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃជម្ងឺរលាកអាងត្រគៀក ដែលជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យមានគភ៌ក្រៅស្បូន ? A. ថយចុះនៃសមត្ថភាពបន្តពូជ B. ជិតរន្ធដែស្បូនមិនទាំងស្រុង C. រលាកដៃស្បូន D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	B

146	តើជម្ងឺ ឬបញ្ហាមួយណាដែលធ្វើឱ្យមានការហូរឈាមក្នុងពោះ បណ្តាលឱ្យអ្នកជម្ងឺអាចស្លាប់បាន ?	D
	A. រលាកស្រទាប់ក្នុងរបស់ដៃស្បូន B. កខ្វះនៅដៃស្បូន C. រលាកដៃស្បូន D. គភ៌ក្រៅស្បូន	
147	តើអាចជាជម្ងឺអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើនៅពេលស្រង់ប្រវត្តិ និងពិនិត្យអ្នកជម្ងឺ ឃើញមានហូរខ្ទះតាមបង្ហូរនោម ?	A
	A. ជម្ងឺប្រមេរៈទឹកបាយ និង ក្លាមីឌីយ៉ា B. ជម្ងឺប្រមេរៈទឹកបាយ និង ពងបែក C. ជម្ងឺស្វាយ និង Chancroid D. ក្លាមីឌីយ៉ា និង ស្វាយ	
148	តើអ្វីមួយជាពេគសញ្ញានៃជម្ងឺប្រមេរៈទឹកបាយ ?	B
	A -ឈឺចាប់ក្នុងពោះ B -ឈឺចាប់ពេលបត់ជើងតូច C -ឈឺពោះពេលស្លាប់ប៉ះ D. ធ្លាក់ស លាយឈាម	
149	ហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវព្យាបាលដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកដែលកើតជម្ងឺកាមរោគ ?	B
	A. បញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ B. បង្កការរាលដាលនៃជម្ងឺ C. កំណត់ដៃគូរួមភេទ D. កំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល	

150	តើអ្វីខ្លះជាមធ្យោបាយប្រសើរជាងគេ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកាមរោគ? A. អប់រំដល់គូស្វាមីភ្លេងៗ B. អប់រំដល់មនុស្សគ្រប់រូប C. ចែកស្រោមអនាម័យដល់អ្នកមានដៃគូរួមភេទច្រើន D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
151	តើនៅពេលណាដែលគេត្រូវព្យាបាលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមានជម្ងឺស្វាយដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាចំពោះទារក ? A. ក្នុងអម្ពង្គ ២០សប្តាហ៍នៃគភ៌ B. ក្នុងអម្ពង្គ ៣០សប្តាហ៍នៃគភ៌ C. ក្នុងអម្ពង្គ ៣៥សប្តាហ៍នៃគភ៌ D. សប្តាហ៍ ៣៨នៃគភ៌ជិតសម្រាល	A
152	តើជម្ងឺអ្វីខ្លះដែលមេរោគក្លាមីឌីយ៉ានិង ប្រមេរៈទឹកបាយអាចបង្កដល់ទារកទើបកើត ? A. រាក និង រលាកសួត B. រលាកសួត និង មានពងបែកលើស្បែក C. រលាកភ្នែក និង រលាកសួត D. ភ្នែកឡើងល្បឿង	C
153	តើអ្វីមួយជារោគសញ្ញានៃជម្ងឺរលាកមាត់ស្បូនដែលបង្កដោយមេរោគក្លាមីឌីយ៉ា ? A. មានហូរខ្ទុះតាមទ្វារមាស B. គ្មានឆ្លាក់ស C. ឈឺចាប់ពេលរួមភេទ D. មានការឈឺចាប់នៅពោះ	A
154	តើឱសថព្យាបាលជម្ងឺកាមរោគណាមួយដែលហាមប្រើចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនៅត្រីមាសទី១ ? A. Metronidazole B. Erythromycin C. Cefexime D. Spectinomycin	A

155	តើជម្ងឺមួយណាដែល មិនមែនជា ជម្ងឺបណ្តាលឱ្យមានដំបៅលើប្រដាប់បន្តពូជ ? A. ជម្ងឺបង្កឡើងដោយក្លាមីឌីយ៉ា B. ជម្ងឺពងបែកលើប្រដាប់បន្តពូជ C. ជម្ងឺ Chancroid D. ជម្ងឺស្វាយ	A
156	តើអ្វីមួយជាបំណងនៃការគ្រប់គ្រងព្យាបាលគ្លីនិកអ្នកជម្ងឺកាមរោគ ? A. អនុវត្តទៅតាមការបង្កជាសកល B. ជួយសម្ភារៈផ្សេងៗដែលចាំបាច់ C. ជួយឱ្យរស់នៅដោយវិជ្ជមាន D. ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺឌីកាសនិយមទាន់ពេលវេលា	D
157	តើលើសពីប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបការកំណត់ចំនួនកូនពីកំណើតមួយទៅមួយទៀតជាការពន្យារកំណើត ? A- លើសពី ១ ឆ្នាំ B- លើសពី ២ ឆ្នាំ C- លើសពី ៣ ឆ្នាំ D- លើសពី ៤ ឆ្នាំ	C
158	តើការពន្យារកំណើតមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេច ? A- ធ្វើឱ្យមានសមភាពរវាងបុរស និងស្ត្រី B- ធ្វើឱ្យម្តាយ និងកូនមានសុខភាពល្អ និងមានជីវភាពធូរធារ C- ធ្វើឱ្យកូនជៀសផុតពីភាពមិនធម្មតាពីកំណើតម្តាយ D- ធ្វើឱ្យម្តាយជៀសផុតពីការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល	B
159	តើលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលធ្វើឱ្យមធ្យោបាយពន្យារកំណើតតាមប្រតិទិនមានប្រសិទ្ធភាព? A- ស្ត្រីត្រូវតមការរួមភេទ ១០ ថ្ងៃមុនមានឈាមរដូវ B- ស្ត្រីត្រូវតមការរួមភេទ ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានឈាមរដូវ C- ស្ត្រីយល់ដឹងថាថ្ងៃណាក្នុងខែនីមួយៗដែលគាត់អាចមានកូន D- ស្ត្រីដែលមានវដ្តឈាមរដូវទៀងទាត់ចំនួន ២៥ ថ្ងៃ	C

160	តើអ្វីជាសកម្មភាពរបស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដោយប្រើអ័រម៉ូន ? A- បញ្ឈប់ការបញ្ចេញមេធាវីតញី B- សំលាប់មេធាវីតឈ្មោលក្នុងពេលរួមភេទ C- ធ្វើឱ្យស្រទាប់ក្នុងនៃតួស្បូនឡើងក្រាស់ D- ធ្វើឱ្យទឹកអំពិលនៅមាត់ស្បូនរាវថ្លា	A
161	COC ជាថ្នាំគ្រាប់ដែលមាន អ័រម៉ូន: A- មួយមុខ B- ពីរមុខលាយបញ្ចូលគ្នា C- បីមុខលាយបញ្ចូលគ្នា D- ច្រើនមុខលាយបញ្ចូលគ្នា	B
162	POP ជាថ្នាំគ្រាប់ដែលមាន អ័រម៉ូន: A- មួយមុខ B- ពីរមុខលាយបញ្ចូលគ្នា C- បីមុខលាយបញ្ចូលគ្នា D- ច្រើនមុខលាយបញ្ចូលគ្នា	A
163	តើអ្វីមួយជាគុណសម្បត្តិនៃកងដាក់ក្រោមស្បែក ? A- ជួយការពារស្រ្តីមិនឱ្យមានជម្ងឺកាមរោគ B- មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រយៈពេល ៣ឆ្នាំ C- ប្រើបានចំពោះស្រ្តីដែលមិនអាចប្រើអ័រម៉ូនអ៊ីស្ត្រូសែនបាន D- មានឥទ្ធិពល ១២ ម៉ោងក្រោយពេលដាក់	C
164	តើអ្វីមួយជាសកម្មភាពរបស់កងដាក់ក្នុងស្បូន ? A- រារាំងការជួបគ្នារវាងមេធាវីតញី និង ឈ្មោលត្រង់១/២ខាងក្រៅនៃដៃស្បូន B- រារាំងការជួបគ្នារវាងមេធាវីតញី និង ឈ្មោលត្រង់១/៤ខាងក្រៅនៃដៃស្បូន C- បំផ្លាញការលូតលាស់នៃពងដែលកក់កំណើតក្រោយពេលកាច់សំបុក D- បំផ្លាញការលូតលាស់នៃពងដែលកក់កំណើតមុនពេលកាច់សំបុក	D

165	តើអ្វីមួយដែលជាផលរំខានបន្ទាប់បន្សំរបស់កងដាក់ក្នុងស្បូន ? A- ធ្លាក់ឈាមច្រើននៅចន្លោះវដ្តឈាមរដូវ B- ធ្លាក់ឈាមតិចតួចនៅចន្លោះវដ្តឈាមរដូវ C- មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដាក់កងក្លាម D- ធ្លាក់ស តិចតួចមុនមករដូវ	B
166	តើរបៀបមួយណាដែលមិនមែនជា មធ្យោបាយពន្យារកំណើត ? A- ការចាក់ថ្នាំ ដេប៉ូប្រូរីក B- ការដាក់កងក្នុងស្បូន C- ការកាត់ចងដៃស្បូន D- ការដាក់កងក្រោមស្បែក	C
167	តើបញ្ហាមួយណាដែលមិនមែនជា ផលរំខានបន្ទាប់បន្សំរបស់ថ្នាំចាក់ដេប៉ូប្រូរីក ? A- អាចធ្វើឱ្យគ្មានកូន B- ឈឺក្បាលតិចតួច C- បាត់ឈាមរដូវមួយរយៈ D- ឈាមរដូវមិនទៀងទាត់	A
168	តើនៅពេលទារកមានអាយុប៉ុន្មាន ទើបម្តាយដែលបំបៅដោះកូនអាចចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំគ្រាប់ស៊ីអូស៊ី ? A- មួយខែឡើងទៅ B- មួយខែកន្លះឡើងទៅ C- ៦ខែ ឡើងទៅ	C
169	តើនៅពេលទារកមានអាយុប៉ុន្មាន ដែលម្តាយបំបៅដោះកូន អាចចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំគ្រាប់ ភីអូភី និង ថ្នាំចាក់ដេប៉ូប្រូរីក ? A- មួយខែឡើងទៅ B- មួយខែកន្លះឡើងទៅ C- ៦ខែ ឡើងទៅ D- ៩ ខែឡើងទៅ	B

170	តើនៅពេលណាដែលស្រ្តីត្រូវចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំពន្យារកំណើតគ្រាប់ទី១ ? A- ថ្ងៃទី១ ទៅ ថ្ងៃទី ២នៃវដ្តឈាមរដូវ B- ថ្ងៃទី១ ទៅ ថ្ងៃទី ៣នៃវដ្តឈាមរដូវ C- ថ្ងៃទី១ ទៅ ថ្ងៃទី ៤នៃវដ្តឈាមរដូវ D- ថ្ងៃទី១ ទៅ ថ្ងៃទី ៥នៃវដ្តឈាមរដូវ	D
171	តើនៅពេលទារកមានអាយុប៉ុន្មាន ដែលស្រ្តីមិនបំបៅដោះកូនអាចចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីអូស៊ី ? A- ១ សប្តាហ៍ B- ២ សប្តាហ៍ C- ៤ សប្តាហ៍ D- ៦ សប្តាហ៍	D
172	តើអ្វីខ្លះជាគោលបំណងនៃការផ្តល់ប្រឹក្សា ពន្យារកំណើត ? A- ជួយអតិថិជនក្នុងការប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ B- ជួយអតិថិជនថ្លឹងថ្លែងអំពីសារៈប្រយោជន៍ និងផលរំខាន C- ធ្វើឱ្យមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងអ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកប្រើប្រាស់ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
173	តើនរណាជាអ្នកជ្រើសរើសមធ្យោបាយពន្យារកំណើតឱ្យស្រ្តីដែលមានសុខភាពល្អ ? A- ឱសថការី B- បុគ្គលិកសុខាភិបាល C- ស្រ្តីខ្លួនឯងផ្ទាល់ D- ប្តីរបស់ស្រ្តី	C
174	តើនរណាម្នាក់ជាអ្នកអាចប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតប្រតិទិនបានជោគជ័យ ? A- ស្រ្តីមានវដ្តឈាមរដូវទៀងទាត់ ២៨ ថ្ងៃ B- ស្រ្តីមានវដ្តឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ ២១ និង២៨ថ្ងៃ C- ស្រ្តីមានវដ្តឈាមរដូវទៀងទាត់ ៣០ថ្ងៃ D- ស្រ្តីមានវដ្តឈាមរដូវទៀងទាត់ ៣២ ថ្ងៃ	A

175	ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាពីផលរំខានបន្ទាប់បន្សំរបស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត ? A- ជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនបោះបង់សេវាពន្យារកំណើត B- ដើម្បីឱ្យអតិថិជនដឹងពីបញ្ហាជាមុន C- ដើម្បីឱ្យអតិថិជនរៀបចំខ្លួនទទួលយកនូវអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើង D- ដើម្បីបំបាត់ការព្រួយបារម្ភរបស់អតិថិជន	A
176	តើចំណេះដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាពីការពន្យារកំណើតត្រូវមាន ? A- ទំនៀមទំលាប់តាមតំបន់របស់អតិថិជន B- មធ្យោបាយពន្យារកំណើត C- ពីកាយវិភាគ និងសរីរវិទ្យានៃប្រដាប់បន្តពូជ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
177	តើអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាពន្យារកំណើត ត្រូវយល់ដឹងអំពីអតិថិជន ដូចម្តេច ? A- យកចិត្តទុកដាក់តែលើទឹកមុខរបស់អតិថិជន B - កត្តាដែលរារាំងស្តាប់ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជន C- យកចិត្តទុកដាក់តែលើភាពជោគជ័យក្នុងការប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត D- ទទួលខុសត្រូវតែលើភាពជោគជ័យក្នុងការប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត	B
178	តើអ្វីមួយដែលមិនមែនជា សមាសភាគរបស់ កម្មវិធីពន្យារកំណើត ដែលមានដំណើរការល្អ ? A- ថវិកា ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិបាល B- សេវាកម្មនៅសហគមន៍ ប្រព័ន្ធបញ្ជូន និង ផ្គត់ផ្គង់ C- សេវាកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងបរិក្ខារផ្នែកវះកាត់ D- ការរក្សាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនៅមណ្ឌលសុខភាព	C
179	តើអ្វីខ្លះជាសមាសភាគរបស់កម្មវិធីពន្យារកំណើត ? A- ថវិកា ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិបាល B- សេវាកម្មនៅសហគមន៍ ប្រព័ន្ធបញ្ជូន និង ផ្គត់ផ្គង់ C- ការរក្សាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនៅមណ្ឌលសុខភាព D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

180	តើរបាយការណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវមាន ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធបញ្ជូនផ្នែកសេវាពន្យារកំណើតមានប្រសិទ្ធភាព ? A- របាយការណ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំត្រីមាស B- របាយការណ៍ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ C- របាយការណ៍ រៀងរាល់ ៣ឆ្នាំម្តង D- របាយការណ៍ ត្រូវប្រុងពីលទ្ធផលទៅកន្លែងដើម	D
181	តើជំនាញអ្វីខ្លះដែលត្រូវបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកផ្តល់សេវារបស់កម្មវិធីពន្យារកំណើតដើម្បីឱ្យសេវាមានតំណើការល្អ ? A- សម្ភាសន៍ និងគ្រប់គ្រង B- ប្រើសម្ភារៈបរិក្ខារ C- ទំនាក់ទំនង និងគ្រប់គ្រង D- ផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង	C
182	តើនៅកន្លែងដែលមានសភាពដូចម្តេចខ្លះ អ្នកត្រូវរក្សាទុកគ្រប់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត ? A- មានខ្យល់ចេញចូល គ្មានសំណើម គ្មានសត្វល្អិត B- មានខ្យល់ចេញចូល ដាក់ក្នុងប្រអប់ចំហរ C- មិនឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ហើយខ្ពស់ពីកំរាលឥដ្ឋ ៥ស.ម D- មានខ្យល់ចេញចូល និងឆ្ងាយពីជញ្ជាំង ១០ស.ម	A
183	តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតមានតំណើការល្អ ? A- មានការស្នើសុំត្រឹមត្រូវមុនពេលប្រើប្រាស់ B- មានការផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតទាន់ពេល C- កន្លែងរក្សាទុកសមស្រប ការចែកចាយ និងតាមដានហ្មត់ចត់ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

184	ពាក្យ I E C មានន័យថា: A- ព័ត៌មាន អប់រំ ទំនាក់ទំនង B- ព័ត៌មាន ប្រឹក្សាយោបល់ ទង្វើ C- អប់រំ សំភាសន៍ ពិភាក្សា D- ការបញ្ចូលគំនិត យោបល់ ព័ត៌មាន	A
185	តើនៅពេលណាដែលខិតបណ្តុំស្តីពីមធ្យោបាយពន្យារ និងបញ្ឈប់កំណើតគួរត្រូវបានចែកជូនអតិថិជន ? A- នៅចុងបញ្ចប់នៃការពិគ្រោះពិភាក្សា B- ក្រោយពេលទទួលមធ្យោបាយណាមួយលើកដំបូង C- គ្រប់ពេលដែលអតិថិជនមកទទួលសេវាពន្យារកំណើត D- ក្រោយពេលការពិគ្រោះពិភាក្សា និងទទួលមធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយ	D
186	តើអ្វីមួយដែល មិនមែនជា គុណសម្បត្តិរបស់មធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត ? A- មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ B- សមស្របចំពោះបុរស-ស្ត្រីដែលមិនចង់បានកូន C- មិនមានផលរំខានបន្ទាប់បន្សំ D- ស្ត្រី និង បុរសត្រូវទទួលការវះកាត់តូចមួយ	D
187	តើនៅពេលណាខ្លះដែលគេអាចធ្វើការវះចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលបាន ? A- គ្រប់ពេលក្រោយពីការទទួលពិគ្រោះពិភាក្សាបានត្រឹមត្រូវ B- គ្រប់ពេលដែលអតិថិជនមិនចង់បានកូន C- គ្រប់ពេលក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មាន D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A

188	តើរយៈពេលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោល ដែលបុរសអាចរួមភេទដោយមិនបាច់ប្រើស្រោមអនាម័យ ? A- មួយខែ B- ពីរខែ C- បីខែ D- បួនខែ	C
189	តើការពិនិត្យមួយណាដែលអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើពេលពិនិត្យអតិថិជនក្នុងការផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត ? A- ការវាស់សម្ពាធឈាម B- ការពិនិត្យឈាម C- ការពិនិត្យភ្នែក និង ស្បែកដើម្បីរកខាន់ល្បឿង D- ការពិនិត្យរកមើលភាពស្លេកស្លាំង	B
190	តើអ្វីខ្លះជាគុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត ? A- មិនបន្សល់ទុកដោះម្តាយ B- អាចបន្ថយភាពស្លេកស្លាំង C- មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើប្រើបានត្រឹមត្រូវ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
191	តើអ្នកត្រូវផ្តល់យោបល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់អតិថិជនស្តីអំពីការរក្សាទុកស្រោមអនាម័យ ? A- ត្រូវទុកដាក់ស្រោមនេះនៅកន្លែងក្តៅឧណ្ហៗ B- ទុកដាក់នៅកន្លែងដែលមានទឹកត្រជាក់ C- ទុកដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ស្ងួតក្បែរគ្រែ D- ទុកដាក់នៅក្នុងទូរឱ្យបានស្រួលបំផុត	C
192	តើនរណាជាអ្នកដែលមិនសមស្របចំពោះការដាក់កងក្នុងស្បូន ? A- ស្ត្រីដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ B- ស្ត្រីដែលមានកូនរួចហើយ មិនទាន់ចង់បានកូនទៀត C- ស្ត្រីដែលមានជម្ងឺរលាកអាងត្រគាក D- ស្ត្រីដែលមិនអាចប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតមានជាតិអ័រម៉ូន	C

193	តើអ្វីមួយជាគុណវិបត្តិនៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត ? A- មិនអាចជួយបន្ស្រយភាពស្លេកស្លាំង B- មិនអាចការពារការឆ្លងរោគតាមផ្លូវបន្តពូជ C- មិនអាចជួយរក្សាការសំងាត់ដល់ស្ត្រីបាន D- ឈាមរដូវមិនទៀងទាត់	B
194	តើអ្វីមួយជាគុណវិបត្តិរបស់កងដាក់ក្រោមស្បែក ? A- មិនអាចការពារការឆ្លងរោគតាមផ្លូវបន្តពូជ B- អាចបាត់ឈាមរដូវមួយរយៈ C- អាចប្រែប្រួលអារម្មណ៍ D- អាចមានឈាមរដូវមិនទៀងទាត់	A
195	តើអ្វីខ្លះជាគុណសម្បត្តិរបស់ស្រោមអនាម័យ ? A- អាចការពារការឆ្លងរោគ B- មិនចាំបាច់វេជ្ជញ្ជា និង ពិនិត្យសុខភាព C- អាចការពារការឆ្លងរោគ និង ការមានគភ៌ D- អាចរកបានគ្រប់ទីកន្លែង	C
196	តើសំណួរណាមួយជាប្រភេទសំណួរលើក ? A- តើមធ្យោយន្យារកំណើតណាមួយដែលអ្នកបានប្រើ ? B- តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះពីស្រោម ? C- តើពេលណាទើបអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកចង់បានកូនមួយទៀត ? D- តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន ?	B
197	តើថ្នាំបង្ការអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវផ្តល់ដល់ទារកពេលកើតភ្លាម? A- B C G, HepB B- B C G, Tétanol C- HepB, Rouvax D- D T P, HepB	A

198	តើក្នុងកម្រិតប៉ុន្មាន ដែលអ្នកត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង B C G ឱ្យទារក ? A- 0.0 ៥ ម.ល B- 0.១ ម.ល C- 0. ២ម.ល D- 0.៥ ម.ល	A
199	តើនៅមុនកុមារអាយុប៉ុន្មាន ដែលគោលនយោបាយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចែងថា ត្រូវផ្តល់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺទាំង ៧ មុខ ដល់កុមារទាំងអស់ ? A- ១០ខែ B- ១២ ខែ C- ១៨ ខែ	B
200	តើអ្វីខ្លះជាគោលបំណងនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារ ? A- កាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់ B- បង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីបញ្ហាសុខភាព C- ពង្រឹងសេវាសុខាភិបាល D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
201	តើទារកអាយុប៉ុន្មានដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំង D P T1 ? A- ទារកកើតភ្លាម B- ទារកអាយុ ១ខែ កន្លះ C- ទារកអាយុ ៣ ខែ កន្លះ D- ទារក អាយុ ៩ ខែ	B
202	តើក្នុងកម្រិតប៉ុន្មាន ដែលអ្នកត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង D P T ឱ្យទារក ? A- 0.0 ៥ មល B- 0.១ មល C- 0. ២មល D- 0.៥ មល	D

203	តើកុមារអាយុប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង Rouvax ឱ្យ ? A- ទារកអាយុ ៩ ខែ B- ទារកអាយុ ៣ខែ កន្លះ C- ទារកអាយុ ១ ខែ កន្លះ D- ទារកកើតភ្លាម	A
204	តើនរណាខ្លះដែលត្រូវទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណុស ដើម្បីការពារជម្ងឺតេតាណុសផ្ទិតទារក ? A ទារកទើបកើត B- ស្ត្រី ដែលមានអាយុចាប់ ១៥ ដល់ ៤៤ ឆ្នាំ C- បុរសដែលមានអាយុ ចាប់ពី ១៥ ដល់ ៤៥ ឆ្នាំ D- ស្ត្រី ដែលមានអាយុចាប់ ៤៥ ឆ្នាំឡើងទៅ	B
205	តើក្នុងសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានដែលត្រូវទុកវ៉ាក់សាំងនៅមណ្ឌលសុខភាព ? A- +២ ទៅ + ៨អង្សាសេ B- 0 ទៅ +១ អង្សាសេ C- +៤ ទៅ + ៨អង្សាសេ D- លើសពី + ៨ អង្សាសេ	A
206	តើបញ្ហាណាខ្លះដែលអាចបណ្តាលមកពីការសង្កត់ទៅលើស្បូន ដើម្បីជំរុញឱ្យទារកឆាប់កើត ? A- កូនសម្រាលចេញយ៉ាងរហ័ស B- ស្បូនមានការកន្ត្រាក់ខ្លាំងក្លា C- សុករបេះ ឬ ឆ្លាយស្បូន D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
207	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ លើសពី៣៦សប្តាហ៍មានជំងឺស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- បញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាបន្ទាន់ B- ឱ្យថ្នាំជាតិដែកចំនួន៦០គ្រាប់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះ C- តាមដានរកមូលហេតុនៃការស្លេកស្លាំង D- ឱ្យថ្នាំជាតិដែកលេបមួយថ្ងៃ២គ្រាប់ ចំនួន៣០គ្រាប់	A

208	ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ក្រោម៣៦សប្តាហ៍មានជំងឺស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ តើឆ្លុះត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-បញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាបន្ទាន់ B-ឲ្យថ្នាំជាតិដែកចំនួន៦០គ្រាប់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះ១គ្រាប់ព្រឹក ១គ្រាប់ល្ងាច C-ឲ្យថ្នាំជាតិដែកចំនួន៣០គ្រាប់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះ១គ្រាប់ព្រឹក ១គ្រាប់ល្ងាច	B
209	នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះលើសខែ តើឆ្លុះត្រូវថែទាំដូចម្តេច? A-តាមដានទម្ងន់ម្តាយនិងការវិវត្តរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ B-ប្រើថ្នាំដើម្បីឲ្យការសម្រាលបានឆាប់ C-តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក D-ធ្វើការរក្សា	A
210	តើឆ្លុះត្រូវប្រាប់ទៅស្រ្តីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ឲ្យដឹងថាលើសសម្ពាធឈាម? A-110/70mmHg B- 120/70mmHg C-130/800mmHg D-140/90mmHg	D
211	តើឆ្លុះត្រូវវាស់សម្ពាធឈាមដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាទំងន់បំប្លែងក្រឡាភ្លើង? A-វាស់នៅពេលមកដល់បន្ទប់ពិនិត្យភ្លាម B-វាស់នៅពេលត្រឡប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណ C-វាស់បន្ទាប់ពីស្រ្តីសម្រាកបានយ៉ាងតិច១០នាទី D-វាស់នៅពេលគាត់អស់កម្លាំង	C

212	តើឆ្មបត្រូវអប់រំដល់ស្ត្រីពីសញ្ញាសំខាន់ៗដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- សម្ភាធរាយាមខ្ពស់ B- មានជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោម C- មានហើម D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
213	តើឆ្មបត្រូវពិនិត្យប្រដាប់ភេទស្ត្រីដូចម្តេចនៅពេលស្ត្រីមានបញ្ហាផ្លូវភេទ? A- ស្ទាបទ្វារមាសខាងក្រៅដើម្បីរកគីស្ត ស្នាមដាច់រំហែក B- លូកមើលទ្វារមាស C- លូកពិនិត្យអាងត្រគាក D- ពិនិត្យមើលការធ្លាក់ទឹករំអិល	A
214	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរមកទទួលការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី១នៅពេលណា? A- ធ្វើនៅត្រីមាសទី១មុនចប់សប្តាហ៍ទី១៦ B- ធ្វើនៅត្រីមាសទី១មុនចប់សប្តាហ៍ទី២៤ C- ធ្វើនៅត្រីមាសទី១មុនចប់សប្តាហ៍ទី២៨ D- ធ្វើនៅត្រីមាសទី១មុនចប់សប្តាហ៍ទី៣០	A
215	តើឆ្មបត្រូវធ្វើអាកប្បករណ៍យោធាដូចម្តេចក្នុងការអានសញ្ញាសំខាន់ៗស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? ពេលគាត់មកប្រឹក្សាពិភាក្សានឹងសម្រាល? A- ឆ្មបសំរេចចិត្តជំនួសស្ត្រីក្នុងការជ្រើសរើសកន្លែងសម្រាល B- ឆ្មបជួយស្ត្រីឲ្យយល់ពីជំរើសរបស់គាត់និងសំរេចចិត្តដោយខ្លួនឯង C- ឆ្មបសំរេចចិត្តជំនួសក្រុមគ្រួសារដោយសារគ្រួសារគាត់ក្រ D- ឆ្មបឆ្លើយថាមិនដឹងស្រេចតែស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារ	B
216	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីអាហារូបត្ថម្ភ? A- បន្ថែមអាហារ១ពេល គឺហូបអាហារគ្រប់ប្រភេទឲ្យបាន៤ដងក្នុង១ថ្ងៃយ៉ាងតិច B- បង្កើនអាហារសំបូរជាតិដែក ត្រីសាច់ C- ដឹកទឹកឲ្យបានច្រើនឬសារធាតុរាវផ្សេងទៀត លើកលែងត្រៀងស្រវឹង D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A

217	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់សេវាប្រឹក្សាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ស្តីពីការធ្វើផែនការសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពយ៉ាងដូចម្តេច? A- សុំជំនួយពីអ្នកស្មគ្រីចិត្ត B- ប្រាប់ស្ត្រីត្រូវត្រៀមអ្នកមើលការងារផ្ទះ C- សុំជំនួយពីសហគមន៍	D
218	គេឆ្មបត្រូវប្រាប់អ្វីដល់ស្ត្រី ពេលពេលបាចដេបេគាតត្រូវទៅសម្រាបេកូននៅមន្ទីរពេទ្យ? A- ផលវិបាកផ្សេងៗអាចកើតមានឡើងដោយមិនបានដឹងជាមុន B- មន្ទីរពេទ្យនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់ C- គាត់គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ D- គាត់គ្មានអ្នកជួយគាត់ទេ	A
219	គេឆ្មបត្រូវពន្យាយាមដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកភ្លោះបានលេកមុនពេលបេកដោត? A-សាកសួរតើទឹកភ្លោះបែកនៅពេលណា? B-ពិនិត្យថ្ងៃខែសម្រាល C-ប្រើចំពុះទាពិនិត្យមើលឃើញទឹកភ្លោះហូរចេញឬដក់ក្នុងទ្វារមាស D-វាស់កំពស់ស្បូន	C
220	គេឆ្មបត្រូវសាកសួរអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានធរណីមូលនៅឆ្នាំនោះមធ្យោបាយដូចម្តេច? A-ពេលនោះមានឈឺផ្សា និងឃើញឈឺចាប់នៅក្នុងពោះ B-ពេលនោះមានឈឺនិងមានគ្រុនក្តៅ C-មានគ្រុនក្តៅចន្លោះ៤ម៉ោងម្តងនិងមាននោមតិចៗ D-ដកដង្ហើមញាប់ និងអស់កម្លាំង	A
221	គេឆ្មបត្រូវសាកសួរអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានធរណីមូលនៅឆ្នាំនោះមធ្យោបាយដូចម្តេច? A-មានគ្រុនក្តៅចន្លោះ៤ម៉ោងម្តងនិងមាននោមតិចៗ B-មានគ្រុនក្តៅនិងមានក្អក C-ឈឺផ្សានៅពេលនោម D-ដកដង្ហើមញាប់ និងអស់កម្លាំង	C

222	ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមេរៈទឹកបាយ តើឆ្មបត្រូវសាកសួរនិងពិនិត្យយ៉ាងដូចម្តេច? A- សាកសួរនិងពិនិត្យការធ្លាក់សតាមទ្វារមាស B- ដាក់ចំពុះទារកមើលការរលាកមាត់ស្បូន C-ស្ទាបពោះរកមើលការឈឺចាប់ D- យកសទៅពិនិត្យ	A
223	គេឆ្មបត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានយោងដូចម្តេចលើស្ត្រមានផ្ទៃពោះមានរាងកាយប្រភេទ? A- ណែនាំស្ត្រីឲ្យដើរបានច្រើន B- ណែនាំស្ត្រីឲ្យញ៉ាំចំណីអាហារបានគ្រប់មុខនិងលើកជើងឲ្យខ្ពស់ពេលគេង C- ម៉ាស្សាជើងមុនពេលចូលគេងនិងលើកជើងឲ្យខ្ពស់២០-២៥ស.ម D-ម៉ាស្សាជើងមុនពេលចូលគេងនិងណែនាំស្ត្រីឲ្យដើរបានច្រើន	C
224	គេឆ្មបត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានយោងដូចម្តេចលើស្ត្រមានផ្ទៃពោះយើងម្តង? A-ពេលដេកត្រូវលើកជើងឲ្យខ្ពស់៦០ស.មខាងលើត្រគាករយៈពេល២០នាទី៤ដង/ថ្ងៃ B-ពេលដេកត្រូវលើកជើងឲ្យខ្ពស់៥០ស.មខាងលើត្រគាករយៈពេល១០នាទី៤ដង/ថ្ងៃ C-ពេលដេកត្រូវលើកជើងឲ្យខ្ពស់៤០ស.មខាងលើត្រគាករយៈពេល១០នាទី៣ដង/ថ្ងៃ D-ពេលដេកត្រូវលើកជើងឲ្យខ្ពស់៣០ស.មខាងលើត្រគាករយៈពេល១០នាទី៣ដង/ថ្ងៃ	A
225	ម្រាមដៃ? A- ព្យាបាលដោយចលនា ឈ្លីស្រាលនៅលើកំភួនដៃ B-ព្យាបាលដោយចលនា ឈ្លីស្រាលនៅលើដើមដៃ C-ព្យាបាលដោយចលនា ឈ្លីស្រាលនៅដៃ D-ព្យាបាលដោយចលនា ឈ្លីស្រាលនៅលើឆ្អឹងកង់ដៃ	D
226	គេឆ្មបត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានយោងដូចម្តេចលើស្ត្រមានផ្ទៃពោះ មានការរយោបាលនៅអង្គពុយប៊ីស? A-ណែនាំឲ្យស្ត្រីដេកផ្អៀងអាចជួយកាត់បន្ថយការព្យាបាលពេញពីសន្លាក់ឆ្អឹងពុយប៊ីស B-ណែនាំឲ្យស្ត្រីដេកផ្ទាអាចជួយកាត់បន្ថយការព្យាបាលពេញពីសន្លាក់ឆ្អឹងពុយប៊ីស C-ណែនាំឲ្យស្ត្រីដើរតិចៗអាចជួយកាត់បន្ថយការព្យាបាលពេញពីសន្លាក់ឆ្អឹងពុយប៊ីស D-ណែនាំឲ្យស្ត្រីអង្គុយសំរាកអាចជួយកាត់បន្ថយការព្យាបាលពេញពីសន្លាក់ឆ្អឹងពុយប៊ីស	A

227	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលចរន្តនៃការងារសាងសង់ផ្ទះសំបែងដូចខាងក្រោម? ការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលនិងសរីរាង្គទារកកើតមកមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ? A- បរិភោគអាហារសំបូរសារជាតិកាល់ស្យូម B- បរិភោគអាហារសំបូរដោយវីតាមីន C- បរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុវ៉ែតជាតិអ៊ីយ៉ូដ D- បរិភោគអាហារសំបូរសារជាតិកាបូអ៊ីប្រាត	C
228	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រែប្រួលអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួល Stress ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ? A- សំរាកឱ្យបានទៀងទាត់ និង កន្លែងមានសុខភាព B- បរិភោគឱ្យបានច្រើន C- ធ្វើលំហាត់ប្រាណ D- ហូបអាហាររួចចូលគេងភ្លាម	A
229	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រភេទយោបល់ដល់ស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីយល់ច្បាស់ផលប្រយោជន៍ពីការពន្យារកំណើត? A- ធ្វើអោយមានសមភាពរវាងបុរស និងស្ត្រី B- ធ្វើអោយម្តាយ និងកូនមានសុខភាពល្អ និងមានជីវភាពធូធារ C- ធ្វើអោយកូនជៀសផុតពីភាពមិនធម្មតាពីកំណើតម្តាយ D- ធ្វើអោយម្តាយជៀសផុតពីការធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលសម្រាល	B
230	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រភេទយោបល់ពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើតតាមប្រតិទិនយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព? A- ស្ត្រីត្រូវតែរួមភេទ ១០ ថ្ងៃ មុនមានឈាមរដូវ B- ស្ត្រីត្រូវតែរួមភេទ ១០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានឈាមរដូវ C- ស្ត្រីយល់ដឹងថាថ្ងៃណា ដែលគាត់អាចមានកូន D- ស្ត្រីដែលមានវដ្តឈាមរដូវទៀងទាត់ចំនួន ២៥ ថ្ងៃ	C

231	ឆ្លុបផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ស្ត្រី ពីផលរំខានបន្ទាប់បន្សំរបស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដូចម្តេច? A- ជាមូលហេតុចំបងដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនបោះបង់ចោលសេវាពន្យារកំណើត B- ដើម្បីឲ្យអតិថិជនដឹងពីបញ្ហាជាមុន C- ដើម្បីឲ្យអតិថិជនរៀបចំខ្លួនទទួលនូវអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើង D- ដើម្បីបំបាត់ការព្រួយបារម្ភរបស់អតិថិជន	A
232	ដើម្បីអោយប្រព័ន្ធបញ្ជូនផ្នែក សេវាពន្យារកំណើតមានប្រសិទ្ធភាព តើឆ្លុបត្រូវមានរបាយការណ៍ដូចម្តេច? A- ប្រចាំខែ និងប្រចាំត្រីមាស B- ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ C- រៀងរាល់ ៣ ឆ្នាំម្តង D- ត្រលប់ពីលទ្ធផលទៅកន្លែងដើម	D
233	តើឆ្លុបត្រូវរក្សាទុកសំភារៈមធ្យោបាយពន្យារកំណើត យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីអោយបានត្រឹមត្រូវ? A- បន្ទប់មានខ្យល់ចេញចូល គ្មានសំណើម គ្មានសត្វល្អិត B- បន្ទប់មានខ្យល់ចេញចូល ដាក់ក្នុងប្រអប់ចំហរ C- បន្ទប់មិនឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃហើយខ្ពស់ពីកំរាលឥដ្ឋ ៥ ស.ម D- បន្ទប់មានខ្យល់ចេញចូល និងឆ្ងាយពីជញ្ជាំង១០ ស.ម	A
234	ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតល្អ តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- មានការស្នើសុំត្រឹមត្រូវក្រោយពេលប្រើប្រាស់ B- មានការផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតទាន់ពេល C- មិនត្រូវរក្សាទុកសមស្របចែកចាយភ្លាមៗ D- ត្រូវធ្វើការស្នើសុំរៀងរាល់ថ្ងៃ	B

235	តើឆ្នបចែកខិតបំណ្តើស្តីពីការពន្យារកំណើត និងបញ្ឈប់កំណើតនៅពេលណា ? A- ១អាទិត្យក្រោយការពិគ្រោះពិភាក្សា B- មុនពេលទទួលមធ្យោបាយណាមួយលើកដំបូង C- គ្រប់ពេលដែលអតិថិជនមកទទួលសេវាពន្យារកំណើត D- ១ថ្ងៃក្រោយការពិគ្រោះពិភាក្សា	C
236	តើឆ្នបត្រូវប្រឹក្សាយោបល់ដូចម្តេចពីវិធីមធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត? A- ស្ត្រីមានប្រវត្តិធ្លាក់ឈាមក្នុងពេលសម្រាល B- សមស្របចំពោះបុរស-ស្ត្រីដែលមិនចង់បានកូន C- ស្ត្រីមានផលរំខានបន្ទាប់បន្សំ ជាមួយមធ្យោបាយផ្សេងទៀត D- ស្ត្រី និងបុរសត្រូវទទួលការវះកាត់តូចមួយ	D
237	តើមុនពេលផ្តល់មធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើតដោយការវះចងបំពង់បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោល តើឆ្នបត្រូវ ផ្តល់ប្រឹក្សាពីគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេច? A-បន្ទាប់វះចងបើមានការរួមភេទត្រូវប្រើស្រោមនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតរយៈពេល១ខែ B- បន្ទាប់វះចងបើមានការរួមភេទត្រូវប្រើស្រោមនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតរយៈពេល២ខែ C-បន្ទាប់វះចងបើមានការរួមភេទត្រូវប្រើស្រោមនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតរយៈពេល៣ខែ	A
238	ស្ត្រីម្នាក់គាត់ជ្រើសរើសមធ្យោបាយពន្យារកំណើតតាមប្រតិទិនមានរដូវទៀងទាត់២៨ថ្ងៃ ឈាម រដូវគាត់ធ្លាក់នៅថ្ងៃទី ១ - ៥ តើឆ្នបត្រូវប្រាប់ដល់ស្ត្រី ថ្ងៃណាដែលអាចមានកូន? A-ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី៧ B-ថ្ងៃទី៨ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ C-ថ្ងៃទី១០ ដល់ ថ្ងៃទី២០	C
239	តើឆ្នបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកូនបានទទួលភាពសុខុមាលភាព? A- ពន្យារកំណើតតាមប្រតិទិន B-ពន្យារកំណើតតាមបំបៅដោះ C-ពន្យារកំណើតតាមកងក្រោមស្បែក D-ពន្យារកំណើតតាមថ្នាំគ្រាប់អ័រម៉ូន	B

240	តើឆ្មបត្រូវពន្យល់ស្ត្រីពីសកម្មភាពរបស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដោយអ័រម៉ូនដូចម្តេច? A- ធ្វើឲ្យស្រទាប់Endometreក្រាស់ B-បន្ថយរំញ័រដៃស្បូន C-ទឹកអំពិលមាត់ស្បូនឡើងវិញ D-ទឹកអំពិលមាត់ស្បូនឡើងខាប់	D
241	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដូចម្តេចពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ដែលមិនសមស្របដល់ស្ត្រីដែលបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយ? A-ពន្យារកំណើតថ្នាំC O C B-ពន្យារកំណើតថ្នាំP O P C-ពន្យារកំណើតថ្នាំDepoprovrea D-ពន្យារកំណើតកងក្រោមស្បែក Jadalle	A
242	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដូចម្តេចអំពីរយៈពេលដែលអាចមានកូនវិញចំពោះស្ត្រីប្រើប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតថ្នាំចាក់? A- រយៈពេលឈប់ចាក់ថ្នាំ ១ខែទៅ២ខែ B-រយៈពេលឈប់ចាក់ថ្នាំ ៣ ខែទៅ៤ខែ C-រយៈពេលឈប់ចាក់ថ្នាំ ៥ខែទៅ៦ខែ	D
243	តើអ្នកត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជន អំពីការរក្សាទុកស្រោមអនាម័យយ៉ាងដូចម្តេច? A- ត្រូវទុកដាក់ស្រោមអនាម័យនេះនៅកន្លែងក្តៅឧណ្ហៗ B- ទុកដាក់នៅកន្លែងដែលមានទឹកត្រជាក់ C- ទុកដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ស្ងួតក្បែរគ្រែ D- ទុកដាក់នៅក្នុងទូរឲ្យបានស្រួលបូល	C

244	នៅមណ្ឌលសុខភាព តើឆ្មបត្រូវរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងក្នុងសីតុណ្ហភាពដូចម្តេច? A- +២ ទៅ +៨អង្សាសេ B- 0 ទៅ +១អង្សាសេ C- + ៤ទៅ +៨អង្សាសេ D- លើសពី+៨អង្សាសេ	A
245	តើបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពមុន និង ទទួលវ៉ាក់សាំងត្រូវពិនិត្យអ្វីមុនគេ ? A- ផ្លាកសំគាល់ឈ្មោះ និង ថ្ងៃខែហួសកំណត់ប្រើ B- ពិនិត្យមើលទឹកលាយវ៉ាក់សាំង C- លេខឡូត៍វ៉ាក់សាំង D- ពិនិត្យមើលការកក	A
246	តើឆ្មបនៅមណ្ឌលសុខភាពត្រូវថែរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងដូចម្តេចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ? A- យ៉ាងយូរ ១ខែ B- យ៉ាងយូរ ១ខែកន្លះ C- យ៉ាងយូរ ២ខែ D- យ៉ាងយូរ ២ខែកន្លះ	B
247	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការលាក់ស្លូត និងស្រោមខ្នុរ (PCV) អោយកុមារយ៉ាងដូចម្តេច ? A-- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅខាងឆ្វេង B- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅខាងស្តាំ C- ចាក់សាច់ដុំស្មាខាងឆ្វេង D-ចាក់សាច់ដុំ ស្មាខាងស្តាំ	A

248	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការស្វិតដៃជើង (IPV) កុមារដូចម្តេច ? A-ចាក់សាច់ដុំនៅខាងឆ្វេងក្រោមវ៉ាក់សាំង PCV ២.៥ cm B-ចាក់សាច់ដុំនៅខាងស្តាំ ក្រោមវ៉ាក់សាំង PCV ២.៥ cm C-ចាក់សាច់ដុំស្មាខាងឆ្វេង ក្រោមវ៉ាក់សាំង PCV ២.៥ cm D-ចាក់សាច់ដុំ ស្មាខាងស្តាំ ក្រោមវ៉ាក់សាំង PCV ២.៥ cm	A
249	ចំពោះកុមារមានដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍(HIV)តើឆ្មបត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំងអ្វីបន្ថែមដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងគ្មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ? A- B C G . HepB B- B C G .Tetanol C- DTP .HepB – Hib D- រលាកសួត និងរលាកស្រោមខួរ(PCV)	D
250	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាពន្យារកំណើតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព? A.កត់ត្រាលើប័ណ្ណត្រីនិក បញ្ជីពន្យារកំណើត រក្សាទុកនិងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យត្រឹមត្រូវ B.លើកទឹកចិត្តស្ត្រីនិងបុរសឲ្យទទួលមធ្យោបាយពន្យារកំណើត C.ពន្យល់ផ្តល់មធ្យោបាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងរក្សាការសម្ងាត់ជូនគាត់ D.កាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាក្នុងគ្រួសារនិងមិនបារម្ភក្នុងពេលសំរាល	A
251	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង HepB អោយទារកដូចម្តេច? A- សើរស្បែកក្នុងមុំ១៥អង្សា B- ចាក់សាច់ដុំក្នុងមុំ៩០អង្សា C- ចាក់ក្រោមស្បែកក្នុងមុំ៤៥អង្សា D- ចាក់សាច់ដុំក្នុងមុំ៧៥អង្សា	B

252	តើឆ្មបត្រូផ្តល់វ៉ាក់សាំង B C G អោយទារកដូចម្តេច? A- សើរស្បែកស្មារឆ្វេងក្នុងមុំ១៥អង្សា B- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅស្តាំក្នុងមុំ៩០អង្សា C- ចាក់ក្រោមស្បែកស្មារឆ្វេងក្នុងមុំ៤៥អង្សា D- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅឆ្វេងក្នុងមុំ១៥អង្សា	A
253	តើឆ្មបត្រូផ្តល់វ៉ាក់សាំង DPT អោយទារកដូចម្តេច? A- សើរស្បែក ក្នុងមុំ១៥អង្សា B- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅស្តាំ ក្នុងមុំ៩០អង្សា C- ចាក់ក្រោមស្បែក ក្នុងមុំ៤៥អង្សា D- ចាក់សរសៃនៅឆ្វេង ក្នុងមុំ៩០អង្សា	B
254	តើឆ្មបត្រូផ្តល់វ៉ាក់សាំង Rouvax អោយទារកដូចម្តេច? A- សើរស្បែក ក្នុងមុំ១៥អង្សា B- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅស្តាំ ក្នុងមុំ៩០អង្សា C- ចាក់ក្រោមស្បែក ក្នុងមុំ៤៥អង្សា D- ចាក់សរសៃភ្លៅឆ្វេង ក្នុងមុំ៩០អង្សា	C
255	តើឆ្មបត្រូផ្តល់វ៉ាក់សាំងJE អោយទារកដូចម្តេច? A- សើរស្បែក ក្នុងមុំ១៥អង្សា B- ចាក់សាច់ដុំភ្លៅស្តាំ ក្នុងមុំ៩០អង្សា C- ចាក់ក្រោមស្បែក ក្នុងមុំ៤៥អង្សា D- ចាក់សរសៃភ្លៅឆ្វេង ក្នុងមុំ៩០អង្សា	C
256	តើឆ្មបត្រូផ្តល់ប្រឹក្សាយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះស្ត្រីលេបថ្នាំពន្យារកំណើតមានកូនក្នុងចន្លោះពេល២ម៉ោង? A -ត្រូវលេបថ្នាំ១គ្រាប់ភ្លាម ហើយបន្តតាមការធ្លាប់លេប B -ត្រូវលេបថ្នាំ២គ្រាប់ភ្លាម ហើយបន្តតាមការធ្លាប់លេប C -ត្រូវលេបថ្នាំ១គ្រាប់ភ្លាម ហើយដៃគូគាត់ប្រើស្រោមអនាម័យ	A

257	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះស្ត្រីភ្លេចលេបថ្នាំពន្យារកំណើត(POP)លើសពី៣ម៉ោង ឬ១ថ្ងៃតែម្តងបើមានការរួមភេទ ? A-ត្រូវលេបថ្នាំ២គ្រាប់ភ្លាម ហើយបន្តតាមការធ្លាប់លេប B-ត្រូវលេបថ្នាំ២គ្រាប់ភ្លាម ហើយដៃគូគាត់ប្រើស្រោមអនាម័យ C -ត្រូវលេបថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ ហើយដៃគូគាត់ប្រើស្រោមអនាម័យ	D
258	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដូចម្តេច ក្រោយពីការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតឲ្យស្ត្រី? A-កុំអោយឈ្លឹកន្លែងចាក់ និងជៀសវាងចាក់ថ្នាំផ្សេងៗកន្លែងដដែលរយៈពេល១ខែ B-កុំអោយឈ្លឹកន្លែងចាក់ និងជៀសវាងចាក់ថ្នាំផ្សេងៗកន្លែងដដែលរយៈពេល២ខែ C-កុំអោយឈ្លឹកន្លែងចាក់ និងជៀសវាងចាក់ថ្នាំផ្សេងៗកន្លែងដដែលរយៈពេល៣ខែ D-កុំអោយឈ្លឹកន្លែងចាក់ និងជៀសវាងចាក់ថ្នាំផ្សេងៗកន្លែងដដែលរយៈពេល៤ខែ	C
259	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ចំពោះស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរក្រោយទទួលថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត? A- ធ្វើការកោសល្យោភស្បូនដើម្បីបំបាត់ការធ្លាក់ឈាម B- ផ្តល់ថ្នាំលេបថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ដើម្បីបំបាត់ការធ្លាក់ឈាម C- ផ្តល់ថ្នាំលេបអ៊ីម៉ូនលាយគ្នា ត្រូវលេបព្រឹក១គ្រាប់ល្ងាច១គ្រាប់ រយៈពេល៥ថ្ងៃ D -ផ្តល់ថ្នាំលេបអ៊ីម៉ូនតែមួយមុខត្រូវលេបព្រឹក១គ្រាប់ល្ងាច១គ្រាប់រយៈពេល៥ថ្ងៃ	C
260	តើឆ្មបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះស្ត្រីដែលយល់ច្រឡំថាការប្រើថ្នាំពន្យារកំណើតធ្វើឲ្យគាត់មិនមានគតិរហូត? A -ជាការប្រែប្រួលសរីរាង្គរបស់ស្ត្រី B -ជាផលរំខានបន្ទាប់បន្សំរបស់ថ្នាំ C -ជាគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាំ D -ក្រោយពីឈប់ប្រើមួយរយៈ អាចមានកូនវិញ	D

261	ស្រ្តីម្នាក់មានការយល់ច្រឡំពីការដាក់កងក្នុងស្បូនហើយមានផ្ទៃពោះ អាចកងអាចកប់ចូលក្នុងរាងកាយរបស់ទារក តើឆ្លុបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ស្រ្តីយ៉ាងដូចម្តេច? A-ទារកមានការលូតលាស់ធម្មតា B-ទារកមានសុភកភារពារនិងស្រោមទឹកភ្លោះ C-ទារកមានទឹកភ្លោះនិងសុភកភារពារ D-ទារកមានទឹកភ្លោះនិងស្រោមទឹកភ្លោះការពារ	D
262	តើឆ្លុបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាពីការរះចងដៃស្បូនដូចម្តេច? A -ស្រ្តីមានអាយុតិចជាង៣០ឆ្នាំមានកូននៅរស់យ៉ាងតិច៣នាក់ហើយកូនទីបីមានអាយុតិចបំផុត១ឆ្នាំ B -ស្រ្តីមានអាយុតិចជាង៣០ឆ្នាំមានកូននៅរស់យ៉ាងតិច៣នាក់ហើយកូនទីបីមានអាយុតិចបំផុត២ឆ្នាំ C -ស្រ្តីមានអាយុលើសជាង៣០ឆ្នាំមានកូននៅរស់យ៉ាងតិច៣នាក់ហើយកូនទីបីមានអាយុតិច	B
263	ស្រ្តីម្នាក់ដែលគ្រួសារគាត់មានស្បែកគ្របក្បាលលឿងមិនអាចព្រលាត់បាន សួរទៅឆ្លុបថាតើគាត់ងាយនឹងឆ្លងជម្ងឺកាមរោគដោយសារអ្វី? ឆ្លុបបានឆ្លើយថា៖ A. លំបាកក្នុងការធ្វើអនាម័យ ងាយឆ្លងពេលប៉ះពាល់វត្ថុរាវសរីរៈនៅពេលរួមភេទ B. លំបាកក្នុងការរួមភេទ ងាយឆ្លងពេលប៉ះពាល់វត្ថុរាវសរីរៈនៅពេលរួមភេទ C. ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តជាច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគក្នុងពេលរួមភេទ D. លំបាកក្នុងការប្រើស្រោមអនាម័យ ងាយឆ្លងពេលប៉ះពាល់វត្ថុរាវសរីរៈនៅពេលរួមភេទ	A
264	ឆ្លុបបានឆ្លើយទៅស្រ្តីដែលមានជំងឺកាមរោគថា ប្រសិនបើគ្មានការថែទាំព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាទេ ជម្ងឺកាមរោគអាចបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកមួយចំនួនលើកលែងតែ៖ A. កង្វះសមត្ថភាពបន្តពូជ B. គ្រុឺតបង្ហូរនោម C. កូនក្រៅស្បូន D. កូនមិនគ្រប់លក្ខណៈពីកំណើត	D

265	ឆ្លបបានពន្យល់ទៅស្រ្តីដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថា កោសិកាដែលរាតត្បាតដោយវីរុសអេដស៍ ហើយនាំឱ្យមានការថយចុះប្រព័ន្ធភាពស្មាំគឺ: A. កោសិកា CD4 B. កោសិកា Neutrophile C. កោសិកា CD8 D. កោសិកា Eosinophile	A
266	ប្រសិនបើលទ្ធផលរកមេរោគអេដស៍អវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាឱ្យគាត់មកធ្វើតេស្តឈាមម្តងទៀតនៅពេល: A. 3 ខែក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម B. ២ ខែក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម C. ១ ខែក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម D. ២ អាទិត្យក្រោយពីធ្វើតេស្តឈាម	A
267	ឆ្លបធ្វើការផ្តល់ប្រឹក្សា ធ្វើតេស្តឈាម និងរក្សាការសម្ងាត់ដោយមានគោលបំណង: A. កាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃទៀត B. ស្វែងរកការគាំទ្រពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុក C. បង្ហាញការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់អ្នកធ្វើតេស្ត D. ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនពីដៃគូរួមភេទ	C

268	ឆ្លបត្រូវការពន្យល់ទៅកាន់ស្រ្តី ក បន្ថែមនូវពេលដែលនាងឆ្លើយថា“ផលវិបាកសំខាន់នៃជម្ងឺកាមរោគលើស្រ្តីគឺ” A. ការឈឺចាប់ពោះរ៉ាំរ៉ៃ B. គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរួមភេទ C. គភ៌ក្រៅស្បូន និងមហារីកមាត់ស្បូន D. ជម្ងឺរលាកក្នុងអាងត្រគាក	B
269	ឆ្លបបានប្រាប់ទៅស្រ្តី A ថាជម្ងឺ ឬបញ្ហាមួយណាដែលធ្វើឱ្យមានការហូរឈាមក្នុងពោះហើយបណ្តាលឱ្យអ្នកជម្ងឺអាចស្លាប់បានគឺ: A. រលាកស្រទាប់ក្នុងរបស់ដៃស្បូន B. កខ្វះនៅដៃស្បូន C. រលាកដៃស្បូន D. គភ៌ក្រៅស្បូន	D
270	ឆ្លបបានផ្តល់ប្រឹក្សាទៅកាន់ស្រ្តីដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍ហើយមិនបានទទួលការព្យាបាល ថាទារកដែលកើតពីម្តាយផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អាចឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយនៅ: A. ខែដំបូងនៃគភ៌ និងពេលសំរាល B. ចុងត្រីមាសទី៣ ពេលសំរាល និងពេលបំបៅដោះ C. ចុងត្រីមាសទី២ រហូតដល់ពេលសំរាល	B
271	ឆ្លបគួរផ្តល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ៖ A. គាំទ្រផ្នែកថវិកា និង គាំទ្រផ្លូវចិត្ត B. ផ្តល់ការអប់រំ និង គាំទ្រផ្នែកថវិកា C. ផ្តល់ការអប់រំ និង គាំទ្រផ្លូវចិត្ត D. ផ្តល់ការអប់រំ គាំទ្រផ្នែកថវិកា និង ផ្លូវចិត្ត	D

272	អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវអប់រំទៅអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថា ដើម្បីការពារសុខភាពកុំឱ្យឆាប់ទ្រុឌទ្រោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ៖ A. ត្រូវមានអនាម័យក្នុងការហូបចុក និង ខ្លួនប្រាណ B. ត្រូវមានអនាម័យខ្លួនប្រាណ និង មិនត្រូវអនុវត្តការរួមភេទ C. ត្រូវមានអនាម័យក្នុងការហូបចុកនិង មិនត្រូវធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់ D. ត្រូវមានអនាម័យខ្លួនប្រាណ និង មិនត្រូវទៅរាំកំសាន្ត	A
273	តើឆ្មបត្រូវណែនាំស្ត្រីដែលបានឆ្លងជម្ងឺកាមរោគហើយ ដូចម្តេចខ្លះ? A. ត្រូវព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា និង រួមភេទឲ្យមានសុវត្ថិភាព B. ត្រូវព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា និង មិនត្រូវអនុវត្តការរួមភេទ C. ត្រូវព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា និង មិនត្រូវធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់ D. សាកល្បងធ្វើតេស្តឈាម និង មិនត្រូវទៅរាំកំសាន្ត	A
274	ប្រការយកប្រាបាលនៅផ្ទះដោយឲ្យរោគបណ្ឌិតយកមកព្យាបាលដោយមិនបានឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល៤៨ម៉ោង ឆ្មបត្រូវ៖ A. បញ្ជូនគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដោយប្រើក្រណាត់ស្អាតជ្រលក់ទឹកក្តៅស្អំ B. បញ្ជូនគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យ ដោយចាក់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកតាមសរសៃ C. ឲ្យគាត់សម្រាកនៅផ្ទះ ដោយប្រើក្រណាត់ស្អាតជ្រលក់ទឹកក្តៅស្អំ D. ឲ្យគាត់សម្រាកនៅផ្ទះដោយចាក់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកតាមសរសៃ	B
275	បញ្ហាការចេញស្រូវបែករលាកក្រពេញបាតក្បាលឡើងឆ្មបត្រូវ A. ឲ្យគាត់លាងសម្អាតទ្វារមាសជាមួយទឹកស្អាត B. ឲ្យគាត់លាងសម្អាតទ្វារមាសជាមួយទឹកក្តៅឡើង C. យកក្រណាត់ស្អាតជ្រលក់ទឹកក្តៅស្អំលើកន្លែងដែលហើម D. ណែនាំគាត់មិនត្រូវអនុវត្តការរួមភេទ	C

276	ប្រើប្រាស់ថាវ៉ានដូប្រភេទ ឬ ឆ្លាស់យ៉ាងណាដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបវន្ត ទារកទើបនឹងកើតឆ្លងត្រូវ៖ A. ឲ្យទារកលេបអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក B. ឲ្យទារកចាក់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក C. ប្រើប៉ូម៉ាតអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដាក់ក្នុងទារក D. ណែនាំស្រ្តីឲ្យសម្រាលដោយរះកាត់	C
277	ដំណើរការផ្តល់ប្រឹក្សា និង ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត អ្នកផ្តល់គ្រូតែប្រើរយៈពេល A. កុំឱ្យលើសពី២ម៉ោង តែយ៉ាងខ្លីក៏ឱ្យបាន៣០នាទីដែរ B. កុំឱ្យលើសពី១. ៣០ម៉ោង តែយ៉ាងខ្លីក៏ឱ្យបាន៣០នាទីដែរ C. កុំឱ្យលើសពី១ម៉ោង តែយ៉ាងខ្លីក៏ឱ្យបាន៣០ នាទីដែរ D. កុំឱ្យលើសពី១ម៉ោង តែយ៉ាងខ្លីក៏ឱ្យបាន១៥នាទីដែរ	D
278	ដំណើរការផ្តល់ប្រឹក្សា និង ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាមិនត្រូវ៖ A. សន្យានូវអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានចំពោះអតិថិជនឡើយ B. បែកអារម្មណ៍និង វិនិច្ឆ័យឬស្តីបន្ទោស លើការប្រព្រឹត្តរបស់អតិថិជន C. មានអារម្មណ៍មិននឹងនៅចំពោះមុខអតិថិជន D. ប្រើរយៈពេលខ្លីឬវែងពេកទេ	B
279	ចំពោះលទ្ធផលតេស្តយោធន៍រកមេរោគអេដស៍អវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវព្រមានដោយ៖ A. រយៈពេលឆ្លង B. រយៈពេលចេញរោគសញ្ញា C. រយៈពេលផ្ទុក D. រយៈពេលចំហរ	D

280	ចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធផលអតេស្តវិជ្ជមាន ត្រូវធ្វើតេស្តប្រែប្រួលអនាម័យ រួចពោះអ្នកដែលមានលទ្ធផលអតេស្តវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវតែពន្យល់គាត់ឱ្យ៖ A. ប្រើស្រោមអនាម័យទៀងទាត់គ្រប់ពេលវេលា B. ដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួន C. យល់ដឹងអំពីជំនឿ និងការឱ្យតម្លៃរបស់ខ្លួន D. ទៅកាន់សេវាជម្ងឺកាមរោគ ដើម្បីពិនិត្យ និងព្យាបាល	A
281	អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែក VCCT គួរតែ អាចផ្តល់នូវការពន្យល់ត្រួសៗដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដោយ៖ A. ឲ្យគាត់ពិចារណាអំពីការទទួលការអប់រំពីអ្នក B .ឲ្យគាត់ពិចារណាអំពីការទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំប្រឆាំងវីរុស C. ឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីជំនឿ និងការឱ្យតម្លៃរបស់ខ្លួន D. ឲ្យគាត់ដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួន	B
282	តើឆ្នបត្រូវធ្វើតេស្តកុមាររកមេរោគអេដស៍នៅពេលណា ? A. ពេលកើតភ្លាម B. ពេលកើតបាន១ខែ C.ពេលកើតបាន១២ខែ D. ពេលកើតបាន១៨ខែ	D
283	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីការពារកុំឱ្យមេរោគអេដស៍ឆ្លងទៅកូនយើងត្រូវណែនាំស្ត្រីឱ្យ៖ A. ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ B. ប្រើស្រោមអនាម័យទៀងទាត់គ្រប់ពេលវេលា C. ដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួន D.យល់ដឹងអំពីជំនឿ និងការឱ្យតម្លៃរបស់ខ្លួន	A

284	ប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ហើយគ្មានជម្ងឺស្លេកស្លាំងយើងត្រូវជួយគាត់ឲ្យ៖ A. ចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយការប្រើឱសថ DT4 + 3TC + NVP អោយបានឆាប់រហ័សបំផុត B. ចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយឱសថ Zidovudine + 3TC + Nevirapine ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត C. បន្តព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដែលសកម្មបំផុត តទៅទៀតក្នុងពេលសំរាល D. ទទួលសេវាបង្ការ ការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន	B
285	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានសួរទៅឆ្លបថា តើហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្តរក មេរោគអេដស៍លើគ្រប់ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះទាំងអស់មុនសំរាល? ឆ្លបឆ្លើយថាតាម គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ ១៩៩៩ គឺមានគោលបំណង៖ A. រុករកម្តាយមានផ្ទុក មេរោគអេដស៍ B. កាត់បន្ថយការចម្លង មេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន	B
286	ជំងឺរលាក ថ្លើម ប្រភេទបេ ជាជំងឺឆ្លងមេរោគតាមឈាមពេលទារកកើត ដើម្បីបង្ការការចម្លងរោគឆ្លងត្រូវផ្តល់ A. Vaccine Hepatitis B-1 : ក្រោយកើត ១ខែ កន្លះ B. Vaccine Hepatitis B-2 : ក្រោយកើត ២ខែ កន្លះ C. Vaccine Hepatitis B-0 : ក្រោយកើត រហូតដល់ ១សប្តាហ៍ D. Vaccine Hepatitis B-3 : ក្រោយកើត ៣ខែ កន្លះ	C
287	នៅពេលរៀបចំគម្រោងអប់រំដល់ស្ត្រី អាយុ១៨ឆ្នាំ ដែលមានចំងល់ពី ការព្យាបាលនៃជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ។ ឆ្លបគួរតែពន្យល់ថា៖ A- Acyclovir (Zovirax)អាចប្រើសំរាប់ព្យាបាល រោគប្រមេ៖ B- ការបង្ករោគផ្សិតក្នុងប្រដាប់ភេទ ជាធម្មតាព្យាបាលដោយPenicillin C- Ceftriaxone sodium (Recephin)អាចត្រូវបានប្រើសំរាប់ព្យាបាល រោគប្រមេ៖ D- Metronidazole (Flagyl)អាចត្រូវបានប្រើសំរាប់ព្យាបាលរោគដុះឬសជុំវិញប្រដាប់ភេទ	C

288	ការផ្តល់លទ្ធផល និងការផ្តល់ប្រឹក្សាក្រោយធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវ៖ A. ផ្តល់ជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយ B. ផ្តល់ក្នុងពេលផ្សេងៗគ្នា C. ផ្តល់សំរាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីរក្សាការសំងាត់ D. ផ្តល់សំរាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍	C
289	នៅក្នុងកំឡុងពេលរងចាំសម្រាល តើឆ្លុបត្រូវថែទាំស្ត្រីដូចម្តេច ដើម្បីកាត់បន្ថយ ការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តអេដស៍វិជ្ជមាន៖ A. ផ្តល់ថ្នាំណេវីរ៉ាពីន(NVP) មួយដូសគត់ និងផ្តល់ 3TC និង AZT រៀងរាល់ ១២ម៉ោងម្តង និងបន្តរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលសម្រាល B. បន្ទាប់ពីពិនិត្យ CD4 ទើបចាប់ផ្តើមព្យាបាល ការចម្លងពីម្តាយទៅកូន C. ផ្តល់ ថ្នាំណេវីរ៉ាពីន(NVP) ដល់ទារកនៅពេលកើតតែម្តង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ D. រង់ចាំការបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលពីអន្តរាគមន៍ និងការពិនិត្យ CD4 រួចបញ្ជូនទៅសេវា OI/ART	A
290	ស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មានកូនម្នាក់ ចង់ប្រើវិធីផែនការគ្រួសាររបស់គាត់ ដោយប្រើសីតុណ្ហភាពរាងកាយ។ តើឆ្លុបត្រូវតែណែនាំវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលសមស្របដល់ស្ត្រី? A. ពិនិត្យមើលក្លាសស្បូនដើម្បីដឹងពីភាពឡើងក្រាស់និងរង្វើល B. វាស់សីតុណ្ហភាពរាងកាយរបស់គាត់នៅម៉ោងដដែលជារៀងរាល់ព្រឹកមុនពេលក្រោកពីគ្រែ C. កត់ត្រាការវិវត្តន៍នៃអវលនៅពេលដែលរាងកាយគាត់ថយកម្រៅយ៉ាងហោចណាស់មួយអង្សា	B
291	ស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មានកូន ម្នាក់អាយុ ១៩ឆ្នាំ មកគ្លីនិកដើម្បីពិនិត្យសុខភាព បានប្រាប់ទៅឆ្លុបអំពីការប្រែប្រួលនៃក្លាសមាត់ស្បូនកើតឡើងក្នុងរដូវផ្តុះផ្តុះ។ តើឃ្លាខាងក្រោមមួយណាដែលឆ្លុបត្រូវតែបន្ថែមក្នុងគម្រោងនៃការអប់រំ? A- អំពីដំណើរពាក់កណ្តាលនៃរដូវផ្តុះផ្តុះក្លាសនៃមាត់ស្បូនឡើងក្រាស់និងស្អិត B- ក្នុងការវិវត្តន៍នៃអវល មាត់ស្បូនស្ងួតនិងមិនមានការផលិតក្លាស។ C- នៅពេលដែលការវិវត្តន៍នៃអវលជិតមកដល់ក្លាសនៃមាត់ស្បូនកើនឡើងច្រើនហើយថ្លា	C

292	ក្នុងចំណោមការណែនាំខាងក្រោម តើឃ្លាមួយណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវបន្ថែមសម្រាប់ស្ត្រីមានអាយុ ៣០ឆ្នាំហើយមានកូនច្រើន ពីផលវិបាកដែលជ្រើសយកការដាក់កងក្នុងស្បូនសំរាប់ការពន្យារកំណើត? A- ការរាំងរដូវជាផលវិបាកទូទៅនៃដាក់កងក្នុងស្បូន B- ស្ត្រីគួរតែបន្ថែមការការពារសំរាប់ការបង្កកំណើត C- ការដាក់កងក្នុងស្បូនចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនជាងវិធីពន្យារកំណើតផ្សេងៗ D- អាចមានការចុករមូលខ្លាំងក្នុងពេលដែលដាក់កងចូលក្នុងស្បូន	D
293	ស្ត្រីដែលមានកូនច្រើនដងប្រើ ថ្នាំចាក់ (Depo-Provera) សម្រាប់ពន្យារកំណើត។ តើឆ្លុះបញ្ចាំងណែនាំស្ត្រីអំពីវិធីនេះ តើក្នុងចំណោមឃ្លា ខាងក្រោមមួយណាដែលបង្ហាញពីការផលវិបាកដែលកើតមានធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ? A.មានការធ្លាក់ឈាមខុសធម្មតា(Meno-metrorrhagie) B. មានធ្លាក់សខុសធម្មតា C. មានការបាត់រដូវ D. មានការឡើងដោះខ្លាំង	A
294	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលសម្រាលកូននៅផ្ទះ ? A- ចង្វាក់បេះដូងទារក ១៤០ដងក្នុង ១នាទី B- ចាក់អុកស៊ីតូស៊ីនពន្លឿនឱ្យទារកឆាប់កើត C- ស្ត្រីភ្លេចចង្ហោរពេលឈឺពោះសម្រាល D- ការរុញពោះស្ត្រីពេលឈឺពោះសម្រាល	B

295	តើសកម្មភាពមួយណាដែលមិនមែនជាកត្តានាំឱ្យមានការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីសម្រាលកូននៅផ្ទះ ? A. ការសម្រាលកូនដោយឆ្លបជំនាញ B. ការប្រើប្រាស់នូវឱសថបុរាណមិនបានត្រឹមត្រូវ C. ការឈឺពោះយូរហើយស្បូនមានការកន្ត្រាក់ខ្លាំង D. ការឈឺពោះយូរហើយវិធីសម្រាលពុំមានប្រសិទ្ធភាព	A
296	តើនៅចំពោះមុខបញ្ហាមួយណាដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើការសម្រាលកូននៅផ្ទះ ? A. ទារកមានទម្រង់ខុសធម្មតា B. ចង្វាក់បេះដូងទារក ១៥០ដង/នាទី C. ម្តាយមានសំពាធឈាម ១១០/៧០ D. ចង្វាក់បេះដូងទារក ១២០-១៦០ដង/នាទី	A
297	តើអ្វីខ្លះជាសំភារៈដែលស្ត្រីជាមាតាចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីឱ្យការសម្រាលកូននៅផ្ទះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ? A. សំភារៈសំរាប់សម្រាល B. សំភារៈប្រើប្រាស់ស្អាតសំរាប់ស្ត្រី និងទារក C. ឱសថប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសម្រាល	B
298	តើអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើចលនា (ដើរ អង្គុយ ឬ ឈរ) ពេលឈឺពោះសម្រាល ? A. ជួយជំរុញឱ្យមាត់ស្បូនបើកបានលឿន B. ជួយម្តាយកុំឱ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំង C. ជួយម្តាយឱ្យមានទំនុកចិត្ត D. ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A

299	តើក្នុងពេលមួយណាដែលគេត្រូវប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ? A. ៧២ម៉ោងមុនពេលរួមភេទដោយមិនបានការពារ B. ក្រោម៧២ម៉ោងក្រោយពេលរួមភេទដោយមិនបានការពារ C. លើសពី៥ថ្ងៃក្រោយពេលរួមភេទដោយមិនបានការពារ D. ៧ ថ្ងៃក្រោយពេលរួមភេទដោយមិនបានការពារ	B
300	តើអ្វីមួយជាផលវិបាកដែលកើតមានញឹកញាប់ជាងគេ ចំពោះកុមារកើតដម្លឹកញើល? A. កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ B. រាក C. រលាកសួត D. គ្រុនក្តៅ	A
301	តើអ្វីមួយជាសារៈសំខាន់នៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ? A. មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ថែទាំកូន B. កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ C. ម្តាយនិងកូនមានសុខភាពល្អ D. មានកូនតិច	C
302	តើអ្វីមួយជាមធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើតដែលគេធ្វើលើបុរស ? A. ការវះចងបំពង់ទឹកកាម B. ការគ្រៀវ C. ការវះចងបំពង់បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោល D. ការវះចងថង់ទឹកកាម	C
303	តើថ្នាំបង្ការអ្វីខ្លះដែលទារកមានអាយុមួយខែកន្លះត្រូវទទួល ? A. B C G, HepB B. B C G, Tétanol C. D T P, HepB D. HepB, Rouvax	C