

សំណួរមានចម្លើយជ្រើសរើសច្រើន		
1	តើអ្វីមួយដែលជាគោលបំណងសំខាន់នៃការវិភាគទឹកនោមកណ្តាលទី (Midstream urine specimen) A. ពិនិត្យមើលកម្រិតជាតិស្ករ B. ពិនិត្យមើលជាតិ អាល់ប៊ុយមីន C. ធ្វើការបណ្តុះមេរោគ D. ពិនិត្យរកមើលជាតិក្រេអាទីនីន	C
2	ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនយកទឹកនោមដំបូងទីទៅធ្វើការបណ្តុះមេរោគ ? A. ធ្វើឱ្យគ្មានលទ្ធផល B. ធ្វើឱ្យមានលទ្ធផលចម្រុះ C. ធ្វើឱ្យមានលទ្ធផលមិនពិត D. ធ្វើឱ្យមានលទ្ធផលតិចតួច	C
3	តើអ្នកត្រូវជូតសំអាតរន្ធនោមរបស់ស្រ្តីដោយសំឡីកំប៉ាវយ៉ាងដូចម្តេច មុនពេលយកទឹកនោមទៅបណ្តុះមេរោគ ? A. ពីក្រោមឡើងលើ ពីរន្ទគូទទៅរន្ធនោម B. ពីឆ្វេងទៅស្តាំ រួចឡើងលើ C. ពីស្តាំទៅឆ្វេង រួចចុះក្រោម D. ពីលើចុះក្រោមពីរន្ទនោមចុះទៅរន្ទគូទ	D
4	តើអ្នកត្រូវត្រង់យកទឹកនោមចំណុះប៉ុន្មានមីលីលីត្រ ដើម្បីយកទឹកនោមទៅបណ្តុះមេរោគ ? A. ៣០ ទៅ ៦០ មល B. ៦០ ទៅ ៧០ មល C. លើសពី ៧០ មល D. ២០ មល	A

5	រោគវិនិច្ឆ័យថែទាំដែលអាចមាននៅពេលយកទឹកនោមតាមស្តង់ដារវិភាគគឺ៖ A. មានការថប់បារម្ភ B. ការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរោគ C. មានការថប់បារម្ភ ការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរោគ D. មានការថប់បារម្ភ ការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរោគ និង ការរៀនខ្ជាប់	C
6	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្តល់យក ស នៅតាមបង្គន់នោមនៃស្ត្រីទៅវិភាគ ? A. ទាញបបូរតូចថ្មមៗ ទៅក្រោម និង ទៅមុខ B. ទាញបបូរតូចថ្មមៗ ទៅលើ និង ទៅមុខ C. ទាញបបូរតូចថ្មមៗ ទៅក្រោម និង ទៅក្រោយ D. ទាញបបូរតូចថ្មមៗ ទៅលើ និង ទៅក្រោយ	D
7	តើជម្រៅប្រហែលប៉ុន្មាន អ្នកត្រូវសិកតំបន់ចូលក្នុងទ្វារមាស នៅពេលអ្នកយកវត្ថុវិភាគពីទ្វារមាស ដែលពុំមានការហូរចេញមកក្រៅ ? A. ១ ទៅ ២.៥ សម B. ២ ទៅ ៤ សម C. ៤ ទៅ ៤.៥ សម D. ៤.៥ ទៅ ៥ សម	A
8	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចបន្ទាប់ពីយកវត្ថុវិភាគពីទ្វារមាសហើយ ? A. បញ្ជូនវត្ថុវិភាគទៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅ៣០ នាទីក្រោយ B. បញ្ជូនវត្ថុវិភាគទៅមន្ទីរពិសោធន៍ភ្លាមៗ ឬរក្សាទុកជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងទូទឹកកក C. ដាក់ទូទឹកកកទុក១ ម៉ោងសិន ទើបបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍ D. បញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍ ១៥ ទៅ ២០ នាទីក្រោយ	B
9	តើគេអាចផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យនរណាបានខ្លះក្នុងការអនុវត្តជំនាញនៃការយកវត្ថុវិភាគពីរូស ? A. អាចផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យ គ្រូសារអ្នកជម្ងឺ B. អាចផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យគិលានុបដ្ឋាកជំនួយការ C. មិនអាចផ្ទេរសិទ្ធិ D. អាចផ្ទេរសិទ្ធិដល់អ្នកជំនួយបើមានការអនុញ្ញាត	C

10	តើជម្ងឺណាខ្លះដែលជាទូទៅគេច្រើនយក ស របស់ស្ត្រីទៅធ្វើការបណ្តុះមេរោគ ? A. ជម្ងឺអែប៊ីស B. ជម្ងឺកាមរោគ C. ជម្ងឺតម្រងនោម D. ជម្ងឺស្វាយ	B
11	រោគវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃការយកវត្ថុវិភាគពីទ្វារមាសគឺ៖ A. អន្ទះសារ ភ័យខ្លាច B. ប្រឈមមុខនឹងការបង្ករោគ C. ឌីនភាពចំណេះដឹង និងអន្ទះសារ D. អន្ទះសារ ភ័យខ្លាច និងប្រឈមមុខនឹងការបង្ករោគ	D
12	តើក្នុងករណីមួយណាដែលអ្នកមិនគួរបូមឈាមអ្នកជម្ងឺយកទៅធ្វើការបណ្តុះមេរោគ ? A. មានកំដៅធម្មតា B. មានកំដៅកើនឡើងខ្លាំង C. ប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិករួចហើយ D. មានជម្ងឺរាក	C
13	តើអ្នកត្រូវចងហ្គារ៉ូបប្រែប្រួលប្រហែលប៉ុន្មានពីលើកនៃចាក់ ដើម្បីបូមឈាមពីសរសៃវ៉ែនទៅវិភាគ? A. ៥ ទៅ ១០ សម B. ១២ ទៅ ១៥ សម C. ១៥ ទៅ ១៧ សម D. ២០ សម	A
14	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបូមយកឈាមទៅវិភាគរកកម្រិតអាស៊ីតឡាក់ទិក (lactic acid) ? A. ដាក់ឈាមក្នុងបំពង់សាកមានកំដៅ B. ដាក់ឈាមក្នុងបំពង់សាកដែលត្រាំក្នុងទឹកកក C. ប្រើខ្សែហ្គារ៉ូប D. កុំប្រើខ្សែហ្គារ៉ូប	D

15	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបូមយកឈាមទៅវិភាគរក កម្រិតវីតាមីនក្នុងឈាម ? A. ដាក់ឈាមក្នុងបំពង់សាកមានកំដៅ B. ដាក់ឈាមក្នុងបំពង់សាកដែលត្រាំក្នុងទឹកកក C. ការពារកុំឱ្យឈាមត្រូវកំដៅថ្ងៃ D. កុំប្រើខ្សែហ្គារ៉ូចង	C
16	ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យឈាមកក តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចបន្ទាប់ពីបូមឈាមដាក់ចូលក្នុងបំពង់ដែលមានស៊ីត្រាត ? A. ទុកឱ្យស្ងៀមកុំឱ្យខូចគ្រាប់ឈាម B. បង្វិលដបឈាមកុំឱ្យកក ៣០ វិនាទី C. បង្វិលដបឈាមកុំឱ្យកក ១ នាទី D. បង្វិលដបចុះឡើងដោយថ្មមៗ៨ ទៅ ១០ ដង	D
17	តើសារធាតុអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវបានបំប្លែងដោយ Humam Placenta Lactogen (HPL) ? A. ជាតិសាច់ B- ជាតិស្ករ និង រំលាយប្រូតេអ៊ីន C- ជាតិខ្លាញ់ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	B
18	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលផលិតដោយក្រពេញអាដ្រែណាល់(Adrenal gland)? A. អាល់ដូស្តេរ៉ូន (Aldosterone) B- អ៊ីសត្រូហ្វ្រូស(Estrogen) C- អាំងស៊ុយលីន (Insulin) D- អុកស៊ីតូស៊ីន(Oxytocin)	A
19	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលផលិតដោយក្រពេញលំពែង(Pancreas) ? A. អាល់ដូស្តេរ៉ូន (Aldosterone) B- អ៊ីសត្រូហ្វ្រូស(Estrogen) C- អាំងស៊ុយលីន (Insulin) D- អុកស៊ីតូស៊ីន(Oxytocin)	C

20	តើក្នុងអម្ផង់ពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសម្រាលដែល ៣ ភាគ៤ នៃ មរណភាពទារកកើតមានឡើង ? A. ៥ថ្ងៃដំបូង ក្រោយសម្រាល B- ៧ថ្ងៃដំបូង ក្រោយសម្រាល C- ១២ថ្ងៃដំបូង ក្រោយសម្រាល D- ១៥ថ្ងៃដំបូង ក្រោយសម្រាល	B
21	តើការកង្វះជាតិអ៊ុយត៍ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះបង្កើននូវការប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះចំពោះទារក ? A. ទារកមានទម្ងន់ទាប B- ស្លាប់កើត និង រលូត C- ទារកមានលក្ខណៈមិនធម្មតា D- ទារកកើតល្បឿង	B
22	តើការកង្វះជាតិកាល់ស្យូមចំពោះស្រ្តីមានគភ៌បង្កើនការប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ? A. ជម្ងឺបំរុងក្រឡាភ្លើង និង ក្រឡាភ្លើង B- ការសម្រាលមានឧបសគ្គ C- ទារកកើតស្លាប់ និង ការរលូតកូន D- ជម្ងឺស្លេកស្លាំង	A
23	តើអ្វីខ្លះជាភាពយឺតយ៉ាវ ទី១ ដែលចូលរួមក្នុងមរណភាពមាតា ? A. ខ្វះឱសថ សំភារៈ និង បរិក្ខារពេទ្យ B- ខ្វះខាតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង C- វប្បធម៌ និង ជំនឿបុរាណ D- ខ្វះខាតធនធានមនុស្ស	C
24	តើអ្វីខ្លះជាភាពយឺតយ៉ាវទី ២ ដែលចូលរួមក្នុងមរណភាពមាតា ? A. ខ្វះឱសថ សំភារៈ និង បរិក្ខារពេទ្យ B- ខ្វះខាតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដើម្បីប្រើប្រាស់វេយន្តសង្គ្រោះ C- វប្បធម៌ និង ជំនឿបុរាណ D- ខ្វះខាតធនធានមនុស្ស	B

25	តើអ្វីមួយជាភារៈកិច្ចរបស់ម្តាយនៅត្រីមាសទី២ក្នុងការប្រែប្រួលផ្នែកចិត្តនៅពេលមានផ្ទៃពោះ ? A. ការទទួលយក ទារក B- យល់ថាទារកគឺជាចំណែកមួយនៃរាងកាយ C- ទទួលស្គាល់ទារកក្នុងផ្ទៃជាមនុស្សម្នាក់នៅក្បែរខ្លួនគាត់ D- ការបញ្ចូលក្នុងសមាជិកគ្រួសារជាមួយក្មេងៗ	C
26	តើអ្វីខ្លះជាភារៈកិច្ចដំបូងរបស់ម្តាយក្នុងការប្រែប្រួលផ្នែកចិត្តនៅពេលមានផ្ទៃពោះនៅត្រីមាសទី១ ? A. ការសុខចិត្តទទួលយកផ្ទៃពោះ B- គិតពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ C- ពេលវេលានៃការមានផ្ទៃពោះ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
27	តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលចូលរួមក្នុងមរណភាពមាតា ? A- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច B- ស្ថានភាពសង្គម គ្រួសារ C- ស្ថានភាពរបស់ក្មេងស្រី និង ស្រ្តីទាប D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
28	តើទឹកនោមធម្មតាផ្សំឡើងពីសមាសធាតុអ្វី? A. ផ្សំឡើងពីអាល់កាឡាំង៤៦% B. ផ្សំឡើងពីប្រូតេអ៊ីន៥៦% C. ផ្សំឡើងពីទឹក ៩៦% D. ផ្សំឡើងពីអាស៊ីត ៦៦%	C
29	ផ្នែកខាងក្រោមនៃប្លោកនោមត្រូវបានហៅថា: A. Quadrant B. The trigone C. The trident D. Triangular	B

30	បំពង់បង្ហូរនោមរបស់ស្រ្តីមិនមានផ្ទៃពោះ គឺមានប្រវែងប្រហែលជា: A. 2 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 8 cm	B
31	សន្លឹកប្រសាទដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្លោកនោមគឺបានមកពី: A. lumbosacral plexus B. Lee- Frankenhäuser plexus C. Döderliensplexuc D. Döderleins plexus	B
32	ខាងក្រោមនេះតើចំណុចណាមួយដែលមិនមែនជាអ័រម៉ូនរបស់កន្សោមពងព្រី (Ovarian hormone): A. oestrogen B. progesterone C. relaxin D. Aldosterone	D
33	ក្រពេញ pituitary ផ្នែកខាងមុខ (The anterior pituitary gland) ផលិតអ័រម៉ូន: A. oxytocin B. luteinizing hormone C. gonadotrophin- releasing hormone D. vasopressin	B
34	ជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវទៅតាមនិយមន័យនៃពាក្យ Menarche: A. រដូវធម្មតា និងទៀងទាត់ B. ឈឺពោះរមួលធ្ងន់ធ្ងរ C. ការធ្លាក់ឈាមរដូវជាលើកដំបូង D. ការធ្លាក់ឈាមច្រើន	C

35	ជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវតាមនិយមន័យនៃពាក្យ <i>menorrhoea</i> A. រដូវធម្មតានិងទៀងទាត់ B. ការឈឺរមួលពោះធ្ងន់ធ្ងរ C. ការធ្លាក់ឈាមរដូវជាលើកដំបូង D. ការធ្លាក់ឈាមច្រើន	A
36	ជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវតាមនិយមន័យនៃពាក្យ <i>menorrhagia</i> : A. រដូវធម្មតា និងទៀងទាត់ B. ការឈឺរមួលពោះធ្ងន់ធ្ងរ C. ការកើតឡើងជាដំបូងនៃវដ្តព្រឹត្តិការណ៍ D. ការធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើន និងយូរជាងធម្មតា	D
37	ជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវតាមនិយមន័យនៃពាក្យ <i>dysmenorrhoea</i> គឺ៖ A. រដូវធម្មតានិងទៀងទាត់ B. ការឈឺពោះពេលធ្លាក់ឈាមរដូវ C. ការកើតឡើងជាដំបូងនៃវដ្តព្រឹត្តិការណ៍ D. ការធ្លាក់ឈាមច្រើន	B
38	ខាងក្រោមនេះមួយណាមិនមែន ជាមុខងាររបស់សុក្រ៖ A. ផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័ន B. ចិញ្ចឹមទារកក្នុងផ្ទៃ C. បញ្ចេញកាកសំណល់ពីទារក D. ផ្ទុកគោលិកាឈាមក្រហម	D

39	តើចម្លើយខាងក្រោមមួយណាដែលជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបំរុងក្រឡាភ្លើង? A- ការលើសសម្ពាធឈាមដែលមិនមានរោគសញ្ញាបំរុងក្រឡាភ្លើង B- ការកើនសម្ពាធឈាមរួមផ្សំការហើមនិងប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោមចាប់ពីសប្តាហ៍ទី ២០នៃគភ៌ C- នៅពេលសម្រាកសម្ពាធឈាមឡើងលើសពី១៤០/៩០មីលីម៉ែត្របារ៉ែតពីអាយុដំបូងនៃគភ៌ D- កម្រិតសម្ពាធឈាម ១៣០/៨០មីលីម៉ែត្របារ៉ែត ចាប់ពី២០សប្តាហ៍នៃគភ៌	B
40	តើសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំអ្វីដែលកើតអាចកើតឡើងលើស្ត្រីមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ក្នុង ជម្ងឺបំរុងក្រឡាភ្លើង ? A- ឈឺក្បាល B- មាស់ C- ចេញកន្ទួល D- ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស	A
41	ការប្រែប្រួលនៅក្នុងឈាមស្រ្តីដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងជំងឺបំរុងក្រឡាភ្លើងគឺ៖ A- បរិមាណគ្រាប់ឈាមក្រហមថយចុះ B- ទំហំគ្រាប់ឈាមក្រហមកើនឡើង C- ទំហំគ្រាប់ឈាមក្រហមថយចុះ D- ទឹកនោមមានគោលិកាក្រហម	A
42	ចម្លើយទាំងអស់ជាសញ្ញានៃវិបត្តិកំណកឈាម លើកលែងតែ៖ A- ជាតិអាល់ប៊ុយមីនកើនឡើង B- ផ្លាវែតថយចុះ C- កត្តាកំណកឈាមកកចុះទាប D- ធ្លាក់ឈាមខ្លាំង	A

43	ផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃសម្ពាធឈាមទៅលើតំរង់នោម (Kidney) បណ្តាលឲ្យ : A- រលាកក្លូម៉េរុល (Glomerulonephritis) B- រលាកញ្ជោតនោម(Cystitis) C- រលាកបង្ហូរនោម(Urethritis) D- នោមទាស់ (Dysuria)	A
44	ចូរកំណត់ថាលទ្ធផលប៉ារ៉ាគ្លីនិកនៃការសន្និដ្ឋានពីជំងឺបំរុងក្រឡាភ្លើងគឺ: A- ផ្លាវៃតថយចុះ B- អេម៉ាតូក្រីតថយចុះ C- អង់ស៊ីមត្រង់សាមីណាផ្លើមថយចុះ D- ក្រេអាទីនីននៅក្នុងឈាមថយចុះ	A
45	តើឱសថព្យាបាលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះលើសសម្ពាធឈាមណាមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើយូរអង្វែង? A- Methyldopa B- Atenolol C- Labetalol D- Metoclopramide	B
46	រោគសញ្ញានៃជំងឺបំរុងក្រឡាភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគឺ : A- សន្លប់ ឬប្រកាច់ B- ហើមជើង C- នោមច្រើន D- សម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះ	A
47	តើរោគសញ្ញាណាមួយនៃជំងឺក្រឡាភ្លើង ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ជីវិតស្រ្តី ? A- ឈឺក្បាលខ្លាំង B- ឈាមកកសាយភាយគ្រប់សរសៃឈាម C- ដុំឈាមកកក្នុងសរសៃវ៉ែន D- ហើមមុខ ដៃជើង	B

48	តើយើងត្រូវផ្តល់ឱសថអ្វី ដើម្បីព្យាបាលស្ត្រីមានជម្ងឺក្រឡាភ្លើង ? A- ប៉ូតាស្យូមស៊ីលីកាត B- ម៉ាញ៉េស្យូមស៊ីលីកាត C- កាល់ស្យូមស៊ីលីកាត D- កាល់ស្យូមក្លរួយកូណាត	B
49	ចម្លើយទាំងអស់ជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមលើកលែងតែ: A- ជម្ងឺបាតភ្នែក B- ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល C- ជម្ងឺបេះដូង D- ជម្ងឺរលាកថ្លើម	D
50	<i>Trichomonas vaginalis</i> បណ្តាលឲ្យកើតមានជំងឺរលាកទ្វារមាស តើមេរោគនេះជាប្រភេទមីក្រូសរីរាង្គមួយណា ? A- បាក់តេរី B- ប្រូតូសូអ៊ែរ C- ផ្សិត D- វីរុស	B
51	តើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ដែលធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគនៅភ្នែកដោយមេរោគក្លាមីឌីយ៉ា ទៅលើទារកទើបកើត ? A- ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ B- ២៤ ទៅ ២៨ ថ្ងៃ C- ៦ ទៅ ២១ ថ្ងៃ D- រហូតដល់១១ ថ្ងៃ	C
52	តើមីក្រូសរីរាង្គមួយណាដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ស ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជម្ងឺពងបែក ? A- <i>Mobiluncus species</i> B- <i>Gardnerella vaginalis</i> C- <i>Mycoplasma hominis</i> D- <i>Herpes Simplex</i>	D

53	តើថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកមួយណាដែលមិនត្រូវប្រើក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ? A- Penicillin B- Tetracycline C- Erythromycin D- Cephalosporins	B
54	ចម្លើយទាំងអស់ជាមូលហេតុចំបងក្នុងការធ្វើឲ្យស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជធ្លាក់ស លើកលែងតែ: A- Virus B- Chlamydia C- Vulvovaginal candidasis D- Gonorrhea	A
55	តើជំងឺតាមរោគ២ណាដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនូវជំងឺរលាកភ្នែកទារកទើបនឹងកើត? A- Gonorrhea and syphilis B- Gonorrhea and Chlamydia C- Chlamydia and syphilis D- Chlamydia and group B streptococcus	B
56	តើជំនួញនាណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ជូនទាក់ទងនឹងរបៀបបំបៅដោះកូនចំពោះស្រ្តីឆ្លងជំងឺអេដស៍? A- ការបំបៅដោះកូនមិនបណ្តាលឲ្យមានការចម្លងពីម្តាយទៅកូនឡើយ B- ការបំបៅដោះកូនបណ្តាលឲ្យមានការចម្លងមេរោគពីម្តាយទៅកូន ហេតុនេះគួរជៀសវាង C- ត្រូវបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ តែមិនឲ្យលើសពី៦ខែទេ D- ការបំបៅដោះកូនមិនចម្លងមេរោគពីម្តាយទៅកូនទេ កូឡូស្ត្រុម (Colostrum) គឺមានសុវត្ថិភាព	C
57	មេរោគក្លាមីឌីយ៉ា ត្រាក់កូម៉ាទីស (Chlamydia Tra+C67comatis) បង្កជាជំងឺប្រមេះតើមេរោគនេះជាប្រភេទមីក្រូសរីរាង្គណាមួយ ? A- បាក់តេរី B- ប្រូតូសូអ៊ែរ C- ផ្សិត D- វីរុស	A

58	ជំងឺស្វាយ ដែលបង្កឡើងដោយមីក្រូសរីរាង្គគឺ: A- Streptococcus agalactiae B- Haemophilus ducreyi C- Mycoplasma genitalium D- Treponema pallidum	D
59	តើទារកកើតចេញពីម្តាយដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ ត្រូវចាក់ថ្នាំអ្វី ? A- Anti- HBe antibodies B- Hepatitis B surface antigen C- Hepatitis B specific immunoglobulin D- Anti- HBc IgM	C
60	តើឃ្លាណាមួយដែលពណ៌នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីជំងឺពងបែកនៅប្រដាប់បន្តពូជបង្កដោយវីរុសដែលធ្វើឱ្យមានដំបៅឈឺចាប់ ? A- វាគឺជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលជា ១០០% B- គឺជាជំងឺដែលអាចជាសះស្បើយ១០០% នៅពេលដែលដំបៅជា C- វាគឺជាជំងឺប្រចាំជីវិត ដែលកើតមានតាមរដូវបង្ករបស់វីរុស D- វាគឺជាជំងឺមួយដែលអាចឈឺរហូតទៅដល់៥ឆ្នាំ	C
61	តើមេរោគ Human cytomegalovirusគឺជាវីរុសនៅក្នុងក្រុមមួយណា? A- Parvoviruses B- Poxviruses C- Adenoviruses D- Herpes viruses	D
62	កូនភ្លោះម៉ូណូស៊ីកូត(Monozygotic twins) គឺ: A- កើតចេញពីមេជីវិតញី១ និងមេជីវិតឈ្មោល១ B- កើតចេញពីមេជីវិតញី២ និងមេជីវិតឈ្មោល២ C- កើតចេញពីមេជីវិតញី១ និងមេជីវិតឈ្មោល២ D- កើតចេញពីមេជីវិតញី២ និងមេជីវិតឈ្មោល១	A

63	កូនភ្លោះមានឌីស៊ីកូត (Dizygotic twins): A- កើតចេញពីមេជីវិតញី១ និងមេជីវិតឈ្មោល១ B- កើតចេញពីមេជីវិតញី២ និងមេជីវិតឈ្មោល២ C- កើតចេញពីមេជីវិតញី១ និងមេជីវិតឈ្មោល២ D- កើតចេញពីមេជីវិតញី២ និងមេជីវិតឈ្មោល១	B
64	នៅពេលសម្រាល កូនភ្លោះទាក់គ្នាអាចកើតឡើងនៅពេលដែល ៖ A- កូនភ្លោះទីមួយបង្ហាញជើង កូនភ្លោះទីពីរបង្ហាញក្បាល B- ទារកទាំងពីរស្ថិតក្នុងទំរង់បញ្ជ្រាសគ្នា C- កូនភ្លោះទីមួយបង្ហាញក្បាល កូនភ្លោះទីពីរបង្ហាញជើង D- កូនភ្លោះមានទម្រង់ទទឹងពោះ	A
65	ការពន្យារពេលនៃការសម្រាលរបស់កូនភ្លោះទី២នឹងអាចប្រឈមមុខ៖ A- ទារកមានចលនាខ្សោយ B- ទារកខ្វះអុកស៊ីសែន C- ទារកទៅជាពណ៌លឿង D- ទារកប្រកាច់ក្រោយពេលកើត	B
66	ស្ត្រីជាមួយដែលធ្លាប់មានកូនភ្លោះអាចនឹង៖ A- បំបៅដោះកូនតែមួយ B- បំបៅដោះកូនទាំងពីរបាន C- មិនមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនភ្លោះទាំងពីរ D- បំបៅកូនឆ្លាស់គ្នារវាងដោះ និងទឹកដោះគោ	B
67	តើគេយកដីពចរវាងរាល់នៅគ្រងកន្លែងណា ? A- នៅកដៃ B- នៅគន្លាក់ដៃ C- នៅភ្លើក D- នៅ ក	A

68	តើគេយកដីពចរនៅត្រង់ ក ក្នុងករណីណា ? A- អ្នកជំងឺសន្លប់ និង ដីពចរផ្សេងទៀតមិនអាចយកបាន B- ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ C- ករណីជំងឺធម្មតា D- ក្នុងករណីរកាត់	A
69	តើដីពចរធម្មតាសំរាប់មនុស្សពេញវ័យ មានចំនួនប៉ុន្មានដង / ១នាទី ? A- ៥០- ១០០ ដង / ១នាទី B- ៦០- ១០០ ដង/ ១នាទី C- ៧០- ១១០ ដង / ១នាទី D- ៨០- ១២០ ដង/ ១នាទី	B
70	ក្នុងករណីដីពចរដើរមិនទៀងទាត់ គេត្រូវរាប់ដីពចរក្នុងរយៈពេល ៖ A- ពេញមួយនាទី ដោយប្រមាណ B- ៣០ វិនាទី គុណនឹងពីរពីរលកចង្វាក់ និងលំនា C- ពេញមួយនាទី D- ៣០នាទី	C
71	តើសំណើរខាងក្រោមមួយណា ដែលបញ្ជាក់ពីកំរិតត្រៀមលើសសំពាធឈាមចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- អតិបរិមា<120mm Hgនិងអប្បរិមា<80 mm Hg B- អតិបរិមា120- 139 mm Hgនិងអប្បរិមា80- 89 mm Hg C- អតិបរិមា140- 159mm Hgនិងអប្បរិមា90- 99 mm Hg D- អតិបរិមា>160 mm Hgនិងអប្បរិមា>100 mm Hg	B
72	តើសំណើរខាងក្រោមមួយណា ដែលជាកំរិតសំពាធឈាមធម្មតាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- អតិបរិមា<120 mmHgនិងអប្បរិមា<80mmHg B- អតិបរិមា120- 139mmHgនិងអប្បរិមា 80- 89 mmHg C- អតិបរិមា140- 159 mmHgនិងអប្បរិមា90- 99 mmHg D- អតិបរិមា>160 mmHgនិងអប្បរិមា>100 mmHg	A

73	តើសំណើខាងក្រោមមួយណា ដែលជាការលើសសំពាធឈាម កំរិតទី ១ ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- អតិបរិមា<120mmHgនិងអប្បរិមា<80mmHg B- អតិបរិមា120- 139mmHgនិងអប្បរិមា 80- 89 mmHg C- អតិបរិមា140- 159mmHgនិងអប្បរិមា 90- 99 mmHg D- អតិបរិមា>160 mmHgនិងអប្បរិមា>100 mmHg	C
74	តើសំណើខាងក្រោមមួយណា ដែលជាការលើសសំពាធឈាម កំរិតទី ២ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- អតិបរិមា<120mmHgនិងអប្បរិមា<80mmHg B- អតិបរិមា120- 139mmHgនិងអប្បរិមា 80- 89mmHg C- អតិបរិមា140- 159mmHgនិងអប្បរិមា 90- 99 mmHg D- អតិបរិមា>160 mmHgនិងអប្បរិមា>100 mmHg	D
75	ចំពោះការយកសំពាធឈាម តើគេត្រូវសំបកបញ្ចូលខ្យល់ បន្ថែមប៉ុន្មាន mmHg ពីកំរិតអតិបរិមាបន្ទាប់ពីការបាត់ជីពចរ ? A- 50mmHg B- 40mmHg C- 30mmHg D- 20mmHg	C
76	តើការវាស់សំពាធឈាម ពេលបន្តរខ្យល់មកវិញ គេត្រូវអោយ ទ្រនិចនាឡិកា ធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនប៉ុន្មាន ? A- 1- 2mmHg / mn B- 2- 3mmHg / mn C- 3- 4mmHg / mn D- 4- 5mmHg / mn	B

77	មុនពេលវាស់សំពាធឈាមឲ្យអ្នកជំងឺតើត្រូវ សំរាកក្នុងរយៈពេល ប៉ុន្មាននាទី ? A- ៥ នាទី B- ១០ នាទី C- ១៥ នាទី D- ២០ នាទី	A
78	តើចង្វាក់ដង្ហើមធម្មតាចំពោះមនុស្សពេញវ័យ មានចំនួន ប៉ុន្មានដង /១នាទី ? A- ១០- ២០ ដង /១នាទី B- ១៤- ២០ដង /១នាទី C- ១២- ២០ដង /១នាទី D- ១៦- ២០ដង /១នាទី	C
79	ចាត់ទុកថា ការដកដង្ហើមយឺត នៅពេលដែលអត្រា នៃការដកដង្ហើមតិចជាង ៖ A- ១២ ដង /១នាទី B- ១៤ ដង /១នាទី C- ១៦ ដង /១នាទី D- ១៨ ដង /១នាទី	A
80	តើចាត់ទុកថា ការដកដង្ហើមញាប់ នៅពេលដែលអត្រានៃការដកដង្ហើមលឿនឡើងទាត់ ច្រើនជាង: A- ២០ ដង /១នាទី B- ២២ ដង /១នាទី C- ២៤ ដង /១នាទី D- ២៦ ដង /១នាទី	A
81	តើសំណើខាងក្រោមនេះ គឺជាពេកវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃការបញ្ជូនអ្នកជម្ងឺ លើកលែងតែ ៖ A- ការថប់អារម្ម B- ការភ័យខ្លាច C- ឈឺចាប់ខ្លាំង និងរាំរ៉ៃ D- ការដោះស្រាយគ្មានប្រសិទ្ធភាព	D

82	មុន និងយកកំដៅ គីលានុបដ្ឋាក ត្រូវលាស់ ទែម៉ូមែត្រ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន រហូតកំរិតបារត ធ្លាក់ចុះក្រោម ៖ A- ៣៥ អង្សាសេ B- ៣៥.៥ អង្សាសេ C- ៣៦ អង្សាសេ D- ៣៦.៥ អង្សាសេ	B
83	តើការយកកំដៅតាមគូថ ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ អ្នកត្រូវស៊ីក ទែម៉ូមែត្រ ចូលក្នុងរន្ធគូថជំពៅប៉ុន្មានសង់ទី មែត្រ ៖ A- ២.៥ ស.ម B- ៣.៥ ស.ម C- ៤ ស.ម D- ៤.៥ ស.ម	C
84	កំដៅធម្មតាស្ថិតនៅចន្លោះ ពី A- ៣៥- ៣៧ អង្សាសេ B- ៣៦- ៣៨ អង្សាសេ C- ៣៧- ៣៩ អង្សាសេ D- ៣៦- ៣៧ អង្សាសេ	B
85	កត្តាជះឥទ្ធិពល ធ្វើអោយកំដៅរាងកាយ ប្រែប្រួលមិនធម្មតា គឺ ៖ A- អាយុ ភេទ អ័រម៉ូន B- អាយុ ភេទ អ័រម៉ូន និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ C- អាយុ ភេទ អ័រម៉ូន ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និង ការប្រើថ្នាំ D- ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និង ការប្រើថ្នាំ	A
86	តើចំណេះយូរយងដែលមិនមែនជាលទ្ធផលរំពឹងទុកនៃការធ្វើផែនការថែទាំ ចំពោះអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ? A- អ្នកជំងឺ អាចពន្យល់ពីគោលបំណងនៃការថែទាំ B- អ្នកជំងឺ និងក្រុមគ្រួសារអាចពន្យល់អំពីការថែទាំនៅផ្ទះ C- អ្នកជំងឺ អាចបង្ហាញពីសកម្មភាពថែទាំដោយខ្លួនឯង D- អ្នកជំងឺមានការជឿជាក់លើពេទ្យ	D

87	អ្នកជំងឺចូលមកសំរាកពេទ្យ តើគិលានុបដ្ឋាកត្រូវកត់ត្រាពីអ្វី ? A- ការប៉ាន់ប្រមាណដែលរកឃើញ និង សាកសួរប្រវត្តិជំងឺ B- ប្រវត្តិជំងឺ ព័ត៌មានអ្នកជំងឺ ការប៉ាន់ប្រមាណដែលរកឃើញ C- ប្រមូលព័ត៌មានអ្នកជំងឺប្រាប់ និងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ D- កត់ត្រាពីស្ថានភាពជំងឺ និង ព័ត៌មានអ្នកជំងឺ	B
88	ដើម្បីទទួលព័ត៌មាន ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពីប្រវត្តិជំងឺ តើយើងត្រូវធ្វើការសំភាសន៍ ជាមួយអ្នកជំងឺ ចូលសំរាកពេទ្យ នៅពេលណា ? A- ពេលសំរាកពេទ្យ B- មុនពេលបញ្ជូន C- ក្រោយពេលបញ្ជូន D- ពេលអ្នកជំងឺមានសុខភាព	A
89	បន្ទាប់ពីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ អ្នកជំងឺរួចសព្វគ្រប់ តើគិលានុបដ្ឋាកត្រូវធ្វើកិច្ចការអ្វីបន្តទៀត ? A- អនុវត្តការថែទាំ B- ធ្វើផែនការថែទាំ C- ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថែទាំ D- ធ្វើការវាយតម្លៃការថែទាំ	C
90	ដើម្បីធ្វើអោយការបញ្ជូនអ្នកជំងឺ មានភាពត្រឹមត្រូវ គិលានុបដ្ឋាកត្រូវ ៖ A- មានការយល់ព្រមពីអ្នកជំងឺ ក្រុមគ្រួសារ និង មានលិខិតបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ B- មានការយល់ព្រមពីក្រុមគ្រួសារ និង មានលិខិតបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ C- មានលិខិតបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ និង រាយការណ៍ប្រាប់គ្រូពេទ្យ D- មានការយល់ព្រមពីក្រុមគ្រួសារ មានលិខិតបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ និង រាយការណ៍ប្រាប់គ្រូពេទ្យ	A
91	ចំណើយមួយណាដែលមិនមែននៅក្នុងការបញ្ជូនអ្នកជំងឺ តើគិលានុបដ្ឋាកត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីអ្វី ? A- ស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជំងឺ B- មធ្យោបាយបញ្ជូន C- របៀបបញ្ជូន D- លិខិតបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ និង ការយល់ព្រមពីអ្នកជំងឺ	D

92	តើសីតុណ្ហភាពនៅក្នុង ខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពនៅមាត់ ប៉ុន្មានអង្សាសេ ? A- 0.៥ អង្សាសេ B- 0.៦ អង្សាសេ C- 0.៧ អង្សាសេ D- 0.៨ អង្សាសេ	A
93	តើសីតុណ្ហភាពនៅភ្លើក ទាបជាងសីតុណ្ហភាពនៅមាត់ប៉ុន្មានអង្សាសេ ? A- 0.៥ អង្សាសេ B- 0.៦ អង្សាសេ C- 0.៧ អង្សាសេ D- 0.៨ អង្សាសេ	A
94	តើ ឆ្មបត្រូវប៉ាន់ប្រមាណពីអ្វីចំពោះការរៀបចំគ្រែមានអ្នកជំងឺសម្រាក ? A- ស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺ សំភារៈ បច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំគ្រែ B- សំភារៈដែលត្រូវការសំរាប់អ្នកជំងឺ C- បច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំគ្រែ D- ស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺ និងសំភារៈ	A
95	តើការពិនិត្យរាងកាយដែលធ្វើឡើងនៅពេលចាប់ផ្តើមនៃវេននីមួយៗ ត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មាន ? A- ពី ៥ ទៅ ១៥នាទី B- ពី ១០ ទៅ ១៥នាទី C- ពី ១០ ទៅ ២០នាទី D- ពី ៥ ទៅ ២០នាទី	B
96	តើទិន្នន័យដែលបានមកពីអ្នកជំងឺប្រាប់ អាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាយ៉ាងដូចម្តេច ? A- Objective data B- Subjective data C- Physical data D- Emotional data	B

97	តើព័ត៌មានដែលរកឃើញពីអ្នកជំងឺ អាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាយ៉ាងដូចម្តេច ? A- Objective data B- Subjective data C- Emotional data D- Physical data	A
98	ខាងក្រោមជាបច្ចេកទេសនៃការពិនិត្យ លើកលែងតែ: A- ការមើល, ការស្តាប់ B- ការហិត C- ការគោះ, ការស្តាប់ D- ការភ្ជក់	D
99	តើជំហានទីមួយនៃការពិនិត្យរាងកាយ គឺអ្វី ? A- ការពិនិត្យមើលដោយកាំរស្មី B- ការពិនិត្យមើលដោយម៉ាស៊ីនស្តេន C- ការពិនិត្យមើលដោយភ្នែក D- ការពិនិត្យមើលដោយអេកូសាស្ត្រ	C
100	តើជាញឹកញាប់ការស្តាប់ ត្រូវបានប្រើនៅពេលណា ? A- ជាមួយការមើលដោយភ្នែក B- ជាមួយ ឬបន្ទាប់ពីការមើលដោយភ្នែក C- ក្រោយការគោះ D- មុនការមើលដោយភ្នែក	B
101	តើការស្តាប់លើស្បែកដោយប្រើខ្នងដៃត្រូវបានប្រើដើម្បីរកអ្វី ? A- រកកំដៅរាងកាយ B- ដុំលើស្បែក C- ភាពធម្មតា ឬមិនធម្មតានៃរាងកាយ D- រកកំដៅរាងកាយ និង ដុំលើស្បែក	A

102	តើការស្ទាបរាក់ ឬសើៗ (light palpation) លើរាងកាយ ត្រូវសង្កត់ចុះជំហៀបប្រហែលប៉ុន្មាន ? A- ១ សម B- ២ សម C- ២,៥ សម D- ៤ សម	A
103	តើការស្ទាបជ្រៅ (Deep palpation) លើរាងកាយ ត្រូវសង្កត់ចុះប្រហែលប៉ុន្មាន ? A- ០,៥ សម B- ១ សម C- ២ សម D- ១០ សម	C
104	ខាងក្រោមនេះជាសំឡេងដែលកើតឡើងតាមរយៈការគោះ លើកលែងតែ: A- សំឡេងគោះស្តួរ (Tympany) B- សំឡេងប្រើបៗដូចអំបិលផ្ទុះ (Crackle) C- សំឡេងខ្វរ (Resonance) D- សំឡេងណែន (Dullness)	B
105	តើសរីរៈណាមួយនៃរាងកាយ ដែលគោះឮសំឡេងហាប់ណែន (Dullness) ? A- ពោះវៀន B- សួត C- ពោះវៀន និងសួត D- ថ្លើម	D
106	តើសរីរៈណាមួយនៃរាងកាយ ដែលគោះឮសំឡេងខ្វរ (Resonance) ? A- សួត B- អណ្តើក ឬផាល C- ថង់ទឹកប្រមាត់ D- សាច់ដុំ	A

107	តើត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះ ដើម្បីឱ្យការពិនិត្យរាងកាយឲ្យបានរលូន ? A- បរិយាកាសជុំវិញ B- សម្ភារ C- អ្នកជំងឺ D- សម្ភារ និងអ្នកជំងឺ	C
108	តើស្ថានភាពណាមួយខាងក្រោម ដែលមិនត្រូវប្រើក្នុងការពិនិត្យផ្នែកខាងមុខនៃទ្រូងនិងស្បូត? A- ដេកផ្ទាល់បញ្ឈរដង្កង់ (Dorsal recumbent) B- ដេកផ្ទាល់ (Supine) C- អង្គុយ (Sitting) D- ដេកផ្តាប់ (Prone)	D
109	ការពិនិត្យជាទូទៅត្រូវរួមបញ្ចូលនូវការប៉ាន់ប្រមាណដូចខាងក្រោម លើកលែងតែ: A- សញ្ញាជីវិត B- ការពិពណ៌នាពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺ C- អាការៈខាងក្រៅ, កម្ពស់ និង ទម្ងន់ D- ឥរិយាបថទូទៅ	B
110	តើសម្ភារណាមួយ ដែលមិនត្រូវការយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការពិនិត្យជាទូទៅ: A- នាឡិកាដែលមានទ្រនិចវិនាទី B- ប្រដាប់វាស់សម្ពាធឈាម C- ម៉ាស៊ីនថត D- ស្រោមដៃស្អាត, ស្ពៃតូស្តូប	C
111	តើកត់សំគាល់ឃើញអ្នកជំងឺយ៉ាងដូចម្តេចដែលត្រូវពន្យារពេលការពិនិត្យជាទូទៅ ? A- ពិបាកដកដង្ហើម B- ដកដង្ហើមធម្មតា C- ថប់បារម្ភ D- ពិបាកដកដង្ហើម និង ថប់បារម្ភ	D

112	តើមួយណាដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើទម្រង់ការពិនិត្យជាទូទៅ ? A- អ្នកជំងឺ បង្ហាញភាពរង់ចាំ(alert) B- អ្នកជំងឺ បង្ហាញភស្តុតាងបញ្ហារាងកាយ C- អ្នកជំងឺ បង្ហាញភស្តុតាងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត D- អ្នកជំងឺ ផ្តល់ព័ត៌មានមិនបានត្រឹមត្រូវ	A
113	តើត្រូវសួរសំណួរអ្វីខ្លះ ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងការណែនាំ(Oriented x 3)របស់អ្នកជំងឺ ? A- ឈ្មោះមនុស្ស, ទីកន្លែង, ពេលវេលា B- ពេលវេលា, កាលបរិច្ឆេទ, រដូវ C- ទីកន្លែង, ពេលវេលា, ផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺ D- ឈ្មោះអ្នកជំងឺ, ឈ្មោះបងប្អូនអ្នកជំងឺ, ទីកន្លែង	A
114	តើមួយណាខាងក្រោម ដែលមិនមែនជាមូលហេតុធ្វើឱ្យការលឺចុះថយ ? A- រលាកស្លឹកត្រចៀក B- អាចម៍ត្រចៀកណែន C- ហើមរន្ធត្រចៀកដោយប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ីចំពោះសម្ភារជំនួយការស្តាប់ D- រលាកត្រចៀកក្រៅ (External otitis)	A
115	ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Petechiae ? A- ស្នាមអុជពណ៌ក្រហម ឬលឿងតូចៗ មានទំហំប៉ុនមេដៃនៅលើស្បែកដែលបណ្តាលមកពីការហូរឈាម B- ស្នាមអុជពណ៌ខ្មៅ ឬស្វាយតូចៗ មានទំហំប៉ុនកូនដៃនៅលើស្បែកដែលបណ្តាលមកពីការហូរឈាម C- ស្នាមអុជពណ៌ក្រហម ឬស្វាយតូចៗ មានទំហំប៉ុនចុងម្ជុលនៅលើស្បែកដែលបណ្តាលមកពីការហូរឈាម D- ស្នាមអុជពណ៌ខ្មៅ ឬលឿងតូចៗ មានទំហំប៉ុនចុងម្ជុលនៅលើស្បែកដែលបណ្តាលមកពីការហូរឈាម	C

116	តើស្បែកឡើងស្វាយ (Cyanosis) បណ្តាលមកពីអ្វី ? A- ជំងឺបេះដូង B- ជំងឺសួត C- ជំងឺបេះដូង និង ជំងឺសួត D- ជំងឺថ្លើម	C
117	តើក្នុងការពិនិត្យស្បែកគេឃើញមានសភាពស្លេកស្លាំង(Pallor) បណ្តាលមកពីអ្វី ? A- ជំងឺបេះដូង B- ជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះឈាមក្រហម(Anemia) C- ជំងឺថ្លើម D- បរិយាកាសត្រជាក់	B
118	តើទីតាំងណាមួយដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមការឡើងលឿងដូចទឹកក្រូច(Yellow- orange ឬ Jaundice) លើស្បែក ? A- ផ្នែកសន្ទនាប្រាប់ភ្នែក B- បាតក្រចកដៃ C- តំបន់ដែលទទួលរងការប៉ះទង្គិច D- តំបន់ដែលប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃ	A
119	តើក្នុងការពិនិត្យស្បែកគេឃើញមានសភាពក្រហម(Erythema) បណ្តាលមកពីអ្វី ? A- ការប៉ះទង្គិចដោយផ្ទាល់ B- ស្ពឺក C- ជំងឺបេះដូង D- បរិយាកាសត្រជាក់	A
120	តើអ្នកត្រូវចាប់ច្បិតស្បែកនៅត្រង់ណា ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណពីភាពយឺតរបស់ស្បែក(skin turgor)? A- នៅខ្នងដៃ B- ឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង ឬនៅកំភួនដៃ C- នៅកំភួនជើង D- នៅភ្លៅ	B

121	ខាងក្រោមនេះជាតំបន់ស្បែកដែលងាយនឹងរងសម្ពាធ លើកលែងតែ: A- កញ្ចូញតូច B- កំភួនជើង C- ក្បាលឆ្អឹងភ្លៅ D- កែងជើង	B
122	តើភាពត្រឹមត្រូវ ៦យ៉ាងនៃការផ្តល់ថ្នាំមានអ្វីខ្លះ ? A- ឈ្មោះអ្នកជំងឺ, អាយុអ្នកជំងឺ, កម្រិតថ្នាំ, ផ្លូវដែលត្រូវផ្តល់, ពេលដែលត្រូវផ្តល់ និងកត់ត្រាត្រូវ B- ឈ្មោះគ្រួសារអ្នកជំងឺ, ឈ្មោះថ្នាំ, កម្រិតថ្នាំ, ផ្លូវដែលត្រូវផ្តល់, ពេលដែលត្រូវផ្តល់ និងកត់ត្រាត្រូវ C- ឈ្មោះអ្នកជំងឺ, ឈ្មោះថ្នាំ, កម្រិតថ្នាំ, ផ្លូវដែលត្រូវផ្តល់, ពេលដែលត្រូវផ្តល់ និងកត់ត្រាត្រឹមត្រូវ D- ឈ្មោះអ្នកជំងឺ, ឈ្មោះគ្រូពេទ្យ, កម្រិតថ្នាំ, ផ្លូវដែលត្រូវផ្តល់, ពេលដែលត្រូវផ្តល់ និងកត់ត្រាត្រូវ	C
123	តើត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសពិនិត្យអ្វីខ្លះ ក្នុងការពិនិត្យស្បែក ? A- ការមើល, ការស្ទាប, និងការហិត B- ការមើល, ការស្ទាប, ការគោះ និងការស្តាប់ C- ការមើល, ការស្ទាប, ការគោះ និងការវាស់ D- ការមើល, ការស្ទាប, ការគោះ, និងការហិត	A
124	តើត្រូវសង្កត់ទៅលើតំបន់ដែលហើមជាមួយមេដៃរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីរកមើលភាពហើមខ្លុង(pitting edema) ? A- ១ វិនាទី B- ៥ វិនាទី C- ១០ វិនាទី D- ៥ នាទី	B

125	តើជំងឺហើមខ្លុង(pitting edema) ប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រ ទើបយើងសន្មត់ថាហើមកម្រិត២+ ? A- ជំងឺ ១ មម B- ជំងឺ ២ មម C- ជំងឺ ៤ មម D- ជំងឺ ៦ មម	C
126	តើជាធម្មតា បំពង់ខ្យល់ស្ថិតនៅឃាំងដូចម្តេច ? A- ចំខ្សែគំនូសកណ្តាលក B- ចំខ្សែគំនូសកណ្តាលភ្លៀក C- ចំខ្សែគំនូសកណ្តាលលើផ្ទាំងស្លាបប្រចៀវ D- ចំខ្សែគំនូសកណ្តាលលើផ្ទាំងដងកាំបិត	A
127	តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលដង្ហើម ? A- ការមិនធ្វើចលនា, ការលើសសារធាតុរាវ B- ការបង្កពេត C- ការមិនធ្វើចលនា, ការលើសសារធាតុរាវ និង ការបង្កពេត D- ការលើសសារធាតុរាវ, ការបង្កពេត	C
128	តើនៅពេលពិនិត្យទ្រូង និង សួត យើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះ ? A- ការមើល និងការស្ទាប B- ការស្តាប់ និងការគោះ C- ការគោះ និងការមើល D- ការមើល, ការស្ទាប, ការគោះ និងការស្តាប់	D
129	តើនៅពេលពិនិត្យទ្រូង និង សួត យើងត្រូវការសម្ភារអ្វីខ្លះ ? A- ស្តេតូស្កុប B- ស្រោមដៃស្អាត C- ស្តេតូស្កុប និង ស្រោមដៃស្អាត D- Doppler stethoscope	C

130	ខាងក្រោមនេះជាពេតវិនិច្ឆ័យថែទាំដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាទ្រូង និង សួត លើកលែងតែ: A- លំនាំនៃការដកដង្ហើមគ្មានប្រសិទ្ធិភាព B- ទិន្នផលបេះដូងថយចុះ C- ភាពស្រឡះនៃផ្លូវខ្យល់គ្មានប្រសិទ្ធិភាព D- បំណាស់ប្តូរឧស្ម័នថយចុះ	B
131	តើគេបែងចែកសំឡេងដង្ហើមមិនធម្មតា (Crackles) ដូចម្តេចខ្លះ ? A- Fine crackles, Medium crackles, Coarse crackles B- Fine crackles, Coarse crackles C- Medium crackles, Coarse crackles D- Fine crackles, Coarse crackles, Murmurs	A
132	តើណាមួយដែលជាសំឡេងដង្ហើមមិនធម្មតា ? A- Wheezes B- Gallop C- Murmurs D- Click	A
133	តើសំឡេងដង្ហើមមិនធម្មតា (Rhonchi) ឮនៅពេលណា ? A- ដង្ហើមចូល ឬដង្ហើមចេញ B- ក្អក C- ដង្ហើមចូល ឬដង្ហើមចេញ និង ក្អក D- ដង្ហើមចូល	C
134	តើលំនាំជាប្រព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបនៅពេលស្តាប់សួត ? A- ពីលើ ចុះ ក្រោម B- ពីចំហៀងម្ខាង ទៅ ចំហៀងម្ខាងទៀត C- ពីមុខ ទៅ ចំហៀង D- ពីមុខ ទៅ ក្រោយ	B

135	តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម ? A- ជក់បារី, ប្រើការហ្វេអ៊ីន B- ជក់បារី, ជីកស្រា C- ជីកស្រា, ប្រើការហ្វេអ៊ីន D- ជក់បារី, ប្រើការហ្វេអ៊ីន និង ជីកស្រា	D
136	ខាងក្រោមនេះជាពេតសញ្ញានៃជំងឺបេះដូង លើកលែងតែ: A- ឈឺទ្រូង, ញ័រទ្រូង B- ហត់នៅពេលដេក C- ហើមពោះ D- ឡើងស្វាយ	C
137	តើ ជាធម្មតា ការឈឺទ្រូងក្នុងជំងឺបេះដូងមានលក្ខណៈដូចម្តេច ? A- ឈឺនៅក្រោមឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង ហើយសាយភាយទៅដៃម្ខាង ឬទាំងសងខាង B- ឈឺក្រហាយនៅចុងដង្ហើម C- ឈឺនៅក្រោមឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង ហើយសាយភាយទៅពោះ D- ឈឺដូចគេចាក់នៅតែមឆ្អឹងជំនីខាងស្តាំ	A
138	ខាងក្រោមនេះជាពេតវិនិច្ឆ័យថែទាំដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាបេះដូង និងសរសៃឈាម លើកលែងតែ: A- ភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រោចស្រពទៅក្នុងជាលិកានៅបរិមណ្ឌល B- ទិន្នផលបេះដូងថយចុះ C- ភាពស្រឡះនៃផ្លូវខ្យល់គ្មានប្រសិទ្ធភាព D- ការមិនអនុគ្រោះដល់សកម្មភាព	C
139	តើលទ្ធផលរំពឹងទុកក្នុងការពិនិត្យបេះដូង និង សរសៃឈាមនៅក មានអ្វីខ្លះ ? A- មានសំឡេងបេះដូងមិនធម្មតា B- បេះដូងឮសំឡេង មុរមុរ C- រ៉ែន ក រីកនៅពេលអ្នកជំងឺដេកថ្ងារ ហើយសំប៉ែតពេលជំងឺអង្គុយ D- រ៉ែន ក រីកនៅពេលអង្គុយ	C

140	តើបាតរបស់បេះដូង ជាធម្មតាស្ថិតនៅទីតាំងណា ? A- ផ្នែកខាងលើ B- ផ្នែកខាងមុខ C- ផ្នែកខាងក្រោម D- ផ្នែកខាងក្រោយ	A
141	តើកំពូលរបស់បេះដូង មានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ណា ? A- ផ្នែកខាងលើ B- ផ្នែកខាងមុខ C- ចុងខាងក្រោម D- ផ្នែកខាងក្រោយ	C
142	តើផ្ទៃថតក្រោមស្តាំរបស់បេះដូងមួយផ្នែកធំ មានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ណា ? A- ផ្ទៃខាងលើនៃបេះដូង B- ផ្ទៃខាងមុខនៃបេះដូង C- ផ្ទៃខាងក្រោមនៃបេះដូង D- ផ្ទៃខាងក្រោយនៃបេះដូង	B
143	តំបន់អាអ៊ីក(Aortic area) ស្ថិតនៅចន្លោះ: A- ឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង B- ឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង C- ឆ្អឹងជំនីទី៣ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង D- ឆ្អឹងជំនីទី៣ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង	A
144	តំបន់ពុលម្លូនៃទី២(Second pulmonic area) ស្ថិតនៅចន្លោះ: A- ឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង B- ឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង C- ឆ្អឹងជំនីទី៣ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង D- ឆ្អឹងជំនីទី៣ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង	D

145	តើតំបន់ពុលម៉ូនែរ(Pulmonic area)មានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ណា ? A- ចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង B- ចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង C- ចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី៣ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង D- ចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី៤ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង	B
146	តំបន់មីត្រាល់(Mitral area) ស្ថិតនៅចន្លោះឆ្អឹង: A- ជំនីទី៥ និងខ្សែបន្ទាត់ដែលអូសពីពាក់កណ្តាលឆ្អឹងដងកាំបិតខាងស្តាំ B- ជំនីទី២ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង C- ជំនីទី៥ និងខ្សែបន្ទាត់ដែលអូសពីពាក់កណ្តាលឆ្អឹងដងកាំបិតខាងឆ្វេង D- ជំនីទី៣ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង	C
147	តំបន់ទ្រីគុយស្ទីដ(Tricuspid area) ស្ថិតនៅចន្លោះ: A- ឆ្អឹងជំនីទី២ ខាងស្តាំឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង B- ជំនីទី៣ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង C- ឆ្អឹងជំនីទី៤ និងខ្សែបន្ទាត់ដែលអូសពីពាក់កណ្តាលឆ្អឹងដងកាំបិតខាងឆ្វេង D- ឆ្អឹងជំនីទី៤ ខាងឆ្វេងឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង	D
148	តើគេអាចហៅ Erb's Point ម្យ៉ាងទៀតថាជាតំបន់អ្វី ? A- អាអ៊ីក (Aortic area) B- ពុលម៉ូនែរទី២ (Second pulmonic area) C- ទ្រីគុយស្ទីដ (Tricuspid area) D- ពុលម៉ូនែរ (Pulmonic area)	B
149	តើទីតាំង ដើម្បីស្តាប់រកចំណុចលោតនៃបេះដូងដែលខ្លាំងបំផុត(PMI) នៅត្រង់ចំណុចណា ? A- នៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី៥ លើខ្សែបន្ទាត់ពាក់កណ្តាលឆ្អឹងដងកាំបិតឆ្វេង B- នៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី៣ ជាប់ឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងឆ្វេង C- នៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី៥ លើខ្សែបន្ទាត់ពាក់កណ្តាលឆ្អឹងដងកាំបិតស្តាំ D- នៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី៣ ជាប់ឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងស្តាំ	A

150	ប្រសិនបើការស្ទាបរកចំណុចលោតនៃបេះដូងដែលខ្លាំងបំផុត(PMI) មានការពិបាក ត្រូវដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាព: A- ដេកផ្អៀងឆ្វេង B- ដេកផ្ទាល់ C- ដេកផ្អៀងស្តាំ D- ពាក់កណ្តាលអង្គុយ	A
151	តើសំឡេងបេះដូង S1 ឮច្បាស់នៅត្រង់ណា ? A- Apex របស់បេះដូង B- តំបន់ពុលម៉ូនែរ C- Erb's Point D- តំបន់ទ្រីគុយស្តីដ	A
152	តើសំឡេងបេះដូង S2 ឮច្បាស់នៅត្រង់ណា ? A- Apex របស់បេះដូង B- តំបន់ពុលម៉ូនែរ C- តំបន់អាអ៊ីក D- Erb's Point	C
153	ខាងក្រោមនេះជាសំឡេងបេះដូងមិនធម្មតា លើកលែងតែ: A- Gallop B- Murmur C- Click D- Crackle	D
154	តើត្រូវដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពដូចម្តេច ដើម្បីស្តាប់រកសំឡេងកកិត ? A- អង្គុយផ្អៀងទៅចំហៀង B- ដេកផ្អៀងស្តាំ C- ដេកផ្អៀងឆ្វេង D- ដេកផ្តាច់មុខ	C

155	តើត្រូវលើកក្បាលគ្រែក្នុងម៉ូប៉ូន្ទានដីក្រេ នៅពេលប៉ាន់ប្រមាណសម្ពាធនៅសរសៃវ៉ែនក ? A- ១០ ដីក្រេ B- ៤៥ ដីក្រេ C- ២០ ដីក្រេ D- ៩០ ដីក្រេ	B
156	ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណសម្ពាធនៅសរសៃវ៉ែន ត្រូវដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាព: A- ដេកផ្អៀងឆ្វេង B- ដេកផ្ទាល់ C- ដេកផ្អៀងស្តាំ D- ពាក់កណ្តាលអង្គុយ	B
157	តើជាទូទៅគ្រប់ស្រីទាំងអស់ គួរតែធ្វើការពិនិត្យដោះដោយខ្លួនឯងនៅអាយុប៉ុន្មាន ? A- ២៦ឆ្នាំឡើងទៅ B- ២៤ឆ្នាំឡើងទៅ C- ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ D- ២០ឆ្នាំឡើងទៅ	D
158	តើជាធម្មតា ដោះស្ថិតនៅត្រង់ណា ? A- សន្លឹងពីឆ្អឹងជំនីទី ៤ ទៅ ទី ៥ B- សន្លឹងពីឆ្អឹងជំនីទី ៣ ទៅ ទី ៦ C- សន្លឹងពីឆ្អឹងជំនីទី ៤ ទៅ ទី ៦ D- សន្លឹងពីឆ្អឹងជំនីទី ៣ ទៅ ទី ៧	B
159	តើក្បាលដោះ ស្ថិតនៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីទីប៉ុន្មាន ? A- ទី៣ B- ទី៤ C- ទី៥ D- ទី៦	B

160	តើគេចែកដោះ ជាប៉ុន្មានចំណែក ? A- ៤ ចំណែក និងកន្ទុយ B- ២ចំណែក និងកន្ទុយដោះ C- ៦ ចំណែក D- ៣ ចំណែក	A
161	តើជំងឺរលាកខ្លួងពោះវៀន ជាញឹកញាប់ការឈឺចាប់មានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ណា ? A- ចំណែក១/៤នៃពោះផ្នែកខាងក្រោមខាងស្តាំ B- ចំណែក១/៤នៃពោះផ្នែកខាងលើខាងស្តាំ C- ចំណែក១/៤នៃពោះផ្នែកខាងក្រោមខាងឆ្វេង D- ចំណុច Murphy	A
162	តើជំងឺណាមួយខាងក្រោម ដែលមិនបណ្តាលឱ្យមានការឈឺចាប់នៅតំបន់ចុងដង្ហើម ? A- ជំងឺជំងឺក្រពះ B- ជំងឺរលាកលំពែង C- ជំងឺជំងឺដើមពោះវៀនតូច D- ជំងឺ Crohn	D
163	តើការពិនិត្យពោះ ជាទំលាប់ ត្រូវធ្វើនៅពេលណា ? A- មុនពេលហូបអាហារ B- ក្រោយពីរក្សាកាត់ពោះ C- មុនពេល និងក្រោយពេលរក្សាកាត់ផ្តឹង D- ក្រោយពីរក្សាកាត់អវយវៈ	B
164	តើការពិនិត្យពោះ មានការខុសពីការពិនិត្យដទៃយ៉ាងដូចម្តេច ? A- ស្ទាបមុនមើល B- ស្តាប់ក្រោយស្ទាប និងគោះ C- ស្តាប់បន្ទាប់ពីមើល D- គោះមុនស្តាប់	C

165	តើយើងត្រូវស្តាប់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទីលើចំណែកនីមួយៗនៃចំណែកទាំង៤នៃពោះ មុនពេលសំរេចថាសំឡេងពោះអវត្តមាន ? A- រយៈពេល ១ ទៅ ៣នាទី B- រយៈពេល ១០នាទី C- រយៈពេល ៥នាទី D- រយៈពេល ៣នាទី	C
166	តើការពិនិត្យប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តី ផ្តោតលើទីតាំងណា ? A- ប្រដាប់បន្តពូជខាងក្រៅ B- ប្រដាប់បន្តពូជខាងក្នុង C- រន្ធគូថ និង ប្រដាប់បន្តពូជខាងក្រៅ D- ប្រដាប់បន្តពូជខាងក្រៅ និងខាងក្នុង(ទ្វារមាស)	D
167	គោលបំណងសំខាន់នៃការពិនិត្យប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តី គឺ A- ការពារជំងឺកាមរោគ B- ការពារសុខភាពផ្លូវភេទរបស់ស្រ្តី C- រកមើលជំងឺកាមរោគ និងសញ្ញាផ្សេងៗ D- កាត់បន្ថយជំងឺផ្លូវភេទ	C
168	តើសម្ភារៈអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការពិនិត្យប្រដាប់ភេទស្រ្តីខាងក្នុង ? A- Speculum B- ស្រោមដៃស្អាត C- សំឡី ឬកំប្រេស D- K- Y jelly	A
169	តើត្រូវរៀបចំស្ថានភាពអ្នកជំងឺបែបណា ដើម្បីពិនិត្យប្រដាប់បន្តពូជខាងក្នុងរបស់ស្រ្តី ? A- ដេករាបស្មើដើម្បីឱ្យអ្នកជំងឺស្រួលក្នុងការបញ្ឈរជង្គង់ B- ដេកថ្ងារ បញ្ឈរជង្គង់ និងកន្លែកបន្តិច C- ស្ថានភាពពាក់កណ្តាលអង្គុយ D- ដេកផ្អៀងអង្គុយជើង	B

170	តើអ្នកត្រូវកត់សំគាល់អ្វីខ្លះក្នុងការពិនិត្យ Clitoris ? A- ពណ៌ ទំហំ សារធាតុហូរចេញ B- ពណ៌ ទំហំ កម្ពស់ C- ការធ្លាក់ស D- ការធ្លាក់ស ពណ៌	A
171	តើ glans (ក្បាលលិង្គ) ធម្មតាមានសភាពដូចម្តេច ? A- ផ្ទៃត្រឹម B- ផ្ទៃមត់រលោងនៅចុងលិង្គ C- ផ្ទៃរលោងស្មើ D- ផ្ទៃមត់	B
172	ប្រពន្ធ Apothecary គឺជាខ្នាតទំងន់ដែលគិត ជា: A - ounce B- Dram C- Grains D- Minim	A
173	តើ ១ Ounce(oz) ស្មើប៉ុន្មាន Milliliter(ml) ? A- ១ oz = ២០ មល B- ១ oz = ៣០ មល C- ១ oz = ៣៥ មល D- ១ oz = ៤០ មល	B
174	តើ ១ kilogram (kg) ស្មើប៉ុន្មាន Pound (lb) ? A- ១ kg = ២,២ lb B- ១ kg = ២,៣ lb C- ១ kg = ២,៤ lb D- ១ kg = ២,៥ lb	A

175	ក្នុងការផ្តល់ឱសថតាមមាត់ តើឱសថត្រូវបានស្រូបនៅកន្លែងណា ? A- ក្រពះ និងទឹកប្រមាត់ B- ក្រពះ និងពោះវៀនតូច C- ក្រពះ និងថ្លើម D- ពោះវៀនតូច និងពោះវៀនធំ	B
176	គណនាប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលជាមីលីលីត្រក្នុង ១ ដួស សំរាប់កុមារដែលមានទំងន់ ២២គីឡូក្រាម ។ បើដឹងថាកំរិតប្រើរបស់ប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលគឺ ១៥មីលីក្រាម/១គីឡូក្រាម/ ១ ដួស ហើយប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល ១២០មីលីក្រាម ស្មើនឹង ៥មីលីលីត្រ ។ A- ៧មីលីលីត្រ B- ១២មីលីលីត្រ C- ១៤មីលីលីត្រ D- ១៦មីលីលីត្រ	C
177	គណនាប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលជាមីលីក្រាមក្នុង ១ ដួស សំរាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានទំងន់ ៥០ គីឡូក្រាម ។ បើដឹងថាកំរិតប្រើរបស់ប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលគឺ ១៥មីលីក្រាម/១គីឡូក្រាម/ ១ ដួស ។ A- ៥០០មីលីក្រាម B- ៧៥០មីលីក្រាម C- ៨០០មីលីក្រាម D- ១០០០មីលីក្រាម	B
178	តើការផ្តល់ថ្នាំតាមបាតហាមប្រើចំពោះអ្នកជម្ងឺបែបណា ? A - ឫសដូងបាត B - ទល់លាមក C - ការហូរឈាមនៅវេចតូម D - ចង្កៀរ	C
179	គោលបំណងនៃការប្រើទឹកក្តៅឧស្ម័នៗមកស្តុំដបថ្នាំបន្តក់ថ្នាំត្រចៀក គឺ: A- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំ B - ការពារអ្នកជំងឺកុំអោយវិលមុខ C - ធ្វើអោយថ្នាំជ្រាបរហ័ស D- ការពារកុំឲ្យមានការបង្ករោគ	B

180	តើអ្នកត្រូវកាន់ប្រដាប់បន្តក់ថ្នាំត្រចៀក ពីផ្នែកខាងលើនៃន្ទូត្រចៀក ចំងាយប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ? A- ១ សង់ទីម៉ែត្រ B- ២ សង់ទីម៉ែត្រ C- ៣ សង់ទីម៉ែត្រ D- ៤ សង់ទីម៉ែត្រ	A
181	តើអ្នកត្រូវដាក់អ្នកជំងឺដែលបានបន្តក់ថ្នាំត្រចៀករួច នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេច? A- ដេកផ្អៀងក្នុងរយៈពេល២- ៣នាទី B- អង្គុយផ្អៀងត្រចៀកក្នុងរយៈពេល២- ៣នាទី C- ដំណេកផ្អៀងរយៈពេល៥- ១០នាទីប្រើម្រាមដៃមាំស្បាថ្មមៗនៅគល់ត្រចៀក D- អង្គុយផ្អៀងក្នុងរយៈពេល៥- ១០នាទី ហើយប្រើម្រាមដៃមាំស្បាថ្មមៗនៅគល់ត្រចៀករបស់ គាត់	C
182	នៅពេលបន្តក់ថ្នាំត្រចៀកចូលក្នុងន្ទូត្រចៀករួច អ្នកត្រូវប្រើដុំសំឡីដាក់ក្នុងន្ទូត្រចៀកខាងក្រៅ ក្នុងគោលបំណងកុំអោយថ្នាំកំពប់ចេញពីត្រចៀក ។ តើការដាក់ដុំសំឡីនេះ ត្រូវទុកក្នុងរយៈពេល ប៉ុន្មាននាទី ? A- ៥នាទី B- ១០នាទី C- ១៥នាទី D- ២០នាទី	C
183	តើអ្នកត្រូវចាប់កាន់ស្លឹកត្រចៀកក្មេងដែលមានអាយុតិចជាង៣ឆ្នាំ យ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលបន្តក់ថ្នាំ ត្រចៀក ? A- ទាញស្លឹកត្រចៀកផ្នែកខាងលើទៅលើ B- ទាញស្លឹកត្រចៀកផ្នែកខាងលើទៅលើ ហើយងាកទៅក្រោយថ្មមៗ C- ទាញទងត្រចៀកចុះក្រោម ហើយងាកទៅខាងមុខ D- ទាញទងត្រចៀកចុះក្រោម ហើយងាកទៅខាងក្រោយ	D

184	តើអ្នកត្រូវសិក្សាបញ្ចូលថ្នាំសុល ចូលទៅក្នុងរោងកូមក្នុងដំណើរប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ ចំពោះមនុស្សពេញ វ័យ? A- ៤ ស.ម B- ៦ ស.ម C- ៨ ស.ម D- ១០ ស.ម	D
185	តើអ្នកត្រូវអោយអ្នកជំងឺសំរាកក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចពេលសិក្សាបញ្ចូលថ្នាំសុល ? A- ដេកថ្ងារ B- ដេកផ្អៀងឆ្វេង ហើយអង្គុញជើងផ្នែកខាងលើបន្តិច C- ដេកថ្ងារដោយបញ្ឈរជង្គង់ D - ដេកផ្អៀងស្តាំ	B
186	តើអ្នកត្រូវកាន់ដបថ្នាំបន្តក់ភ្នែក យ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលបន្តក់ថ្នាំភ្នែក ? A-កាន់ដបថ្នាំពីលើថ្នាំស្នូលអ្នកជំងឺហើយប្រដាប់បន្តក់ថ្នាំត្រូវមានចំងាយពីភ្នែកអ្នកជំងឺពី១ទៅ២ស.ម B-កាន់ដបថ្នាំពីលើថ្នាំស្នូលអ្នកជំងឺហើយប្រដាប់បន្តក់ថ្នាំត្រូវមានចំងាយពីភ្នែកអ្នកជំងឺពី២ទៅ៣ស.ម C-កាន់ដបថ្នាំត្រង់ពីលើភ្នែកអ្នកជំងឺហើយប្រដាប់បន្តក់ថ្នាំត្រូវមានចំងាយពីភ្នែកអ្នកជំងឺពី១ទៅ២ស.ម D-កាន់ដបថ្នាំពីចំហៀងភ្នែកអ្នកជំងឺហើយប្រដាប់បន្តក់ថ្នាំត្រូវមានចំងាយពីភ្នែកអ្នកជំងឺពី២ទៅ៣ស.ម	A
187	មូលហេតុអ្វីបានជាគេផ្តល់ឱសថតាមស្តង់ដារក្រពះ ? A- បរិភោគមិនកើត B- ពិបាកក្នុងការលេបឱសថ C- ការប៉ះទង្គិចមុខ D- អ្នកជំងឺមិនយល់ចាស់	A
188	តើអ្នកត្រូវតាមដានអ្នកជំងឺឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ក្រោយពីផ្តល់ឱសថតាមស្តង់ដារក្រពះ? A- រយៈពេល ១០នាទី B- រយៈពេល ២០នាទី C- រយៈពេល ២៥នាទី D- រយៈពេល ៣០នាទី	D

189	តើអ្នកត្រូវរៀបចំស្ថានភាពអ្នកជម្ងឺយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងការផ្តល់ឱសថតាមសុងក្រពះ ? A- ដេករាបស្មើ B- ពាក់កណ្តាលអង្គុយ C- ផ្ទៀងទៅខាងធ្វេង D- ផ្ទៀងទៅខាងស្តាំ	B
190	គោលបំណងនៃការស៊ុលថ្នាំតាមយោនី គឺ ៖ A- សំអាតទ្វារមាសឱ្យស្អាត B- ប្រឆាំងនឹងការបង្កពេក C- អនាម័យតំបន់បើរំលោ D- អនាម័យរន្ធនោមឱ្យស្អាតល្អ	B
191	តើការស៊ុលថ្នាំតាមទ្វារមាសដោយប្រើចង្កូលដៃ ត្រូវសិកបញ្ចូលក្នុងជំពៅប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ ? A- ៣.៥ស.ម ទៅ ៥ស.ម B- ៥.៥ស.ម ទៅ ៧ស.ម C- ៧.៥ ស.ម ទៅ ១០ស.ម D- ១០.៥ស.ម ទៅ ១២ស.ម	C
192	គោលបំណងនៃការប្រើឱសថស្រូបតាមចំហាយ គឺដើម្បី ៖ A- ពង្រីកទងស្នូត B- សំរួលដល់ចលនាបេះដូង C- ពង្រីកសរសៃឈាម D- ពង្រីកស្បែក	A
193	តើឱសថស្រូបតាមចំហាយ ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់លើអ្នកជម្ងឺអ្វី? A- ជម្ងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ B- ជម្ងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃ C- ជម្ងឺរលាកស្នូត D- ជម្ងឺរបេង	A

194	ក្នុងការផ្តល់ឱសថតាមការបឺតស្រូបចំហាយ តើអ្នកត្រូវអោយអ្នកជំងឺដកដង្ហើមយ៉ាងដូចម្តេច ? A- ដកដង្ហើមចូលយឺតៗ B- ដកដង្ហើមចូលញាប់ C- ដកដង្ហើមចូលធម្មតា D- ដកដង្ហើមដង្ហក់ខ្លាំង	A
195	តើឃ្លាណាមួយខាងក្រោមដែលអ្នកមិនត្រូវប៉ាន់ប្រមាណមុននឹងលាបថ្នាំលើស្បែក ? A- ស្ថានភាពនិងភ្នាសរបស់ស្បែក B- កំរិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកជំងឺ C- សាកសួរពីប្រវត្តិប្រតិកម្មពីមុន D- កំរិតនៃការឈឺចាប់	D
196	តើសំណើខាងក្រោមណាមួយ ដែលជាពោធិវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃការលាបថ្នាំលើស្បែក ? A- ការឈឺចាប់ស្រួចស្រាវ B- អតុល្យភាពសារធាតុរាវ C- ឥរិយាបថសកម្មក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពសុខភាព D- អសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា	A
197	តើសំណើខាងក្រោមណាមួយដែលជាឧបសគ្គក្នុងការជ្រាបចូលនៃឱសថទៅក្នុងជាលិកាពេល លាបថ្នាំលើស្បែក? A- ការលាងសំអាតស្បែកដោយទឹកក្តៅឧណ្ហៗ B- ការងាប់នៃជាលិកាស្បែកត្រង់កន្លែងលាបថ្នាំ C- ការលាបថ្នាំមិនទៅតាមវេជ្ជបញ្ជា D- ការប្រើថ្នាំលាបនៅលើស្បែកច្រើនពេក	B
198	តើត្រូវកាន់ដបបន្តក់ថ្នាំច្រមុះចំងាយប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រពីលើរន្ធច្រមុះ? A- ១ស.ម B- ២ស.ម C- ៣ស.ម D- ៤ស.ម	A

199	តើត្រូវអោយអ្នកជំងឺដេកប៉ុន្មាននាទី បន្ទាប់ពីបន្តក់ថ្នាំច្រមុះរួច? A- ៣នាទី B- ៥នាទី C- ៧នាទី D- ១០នាទី	B
200	តើអ្នកត្រូវសង្កេតតាមដានពីឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំនៃឱសថក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីការ បន្តក់ថ្នាំច្រមុះរួច? A- ៥- ១០នាទី B- ១០- ១៥នាទី C- ១៥- ៣០នាទី D- ៣៥- ៤០នាទី	C
201	តើការសុលថ្នាំតាមទ្វារមាសដោយប្រើ Applicator ត្រូវសិក្សាបញ្ចូលក្នុងដំណើរប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ? A- ៣.៥ស.ម ទៅ ៥ស.ម B- ៥ស.ម ទៅ ៧.៥ស.ម C- ៧.៥ ស.ម ទៅ ១០ស.ម D- ១០.៥ស.ម ទៅ ១២ស.ម	B
202	ការវាស់កំពស់ស្បូនស្រ្តីពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចជាដំបូង? A- ស្ទាបរកកំពូលស្បូនជាមុន B- ស្ទាបរកតែមនៃឆ្អឹងថ្ងាស C- យកខ្សែម៉ែត្រវាស់ពីលើតែមន្តីងថ្ងាស ទៅកំពូលស្បូន D- យកខ្សែម៉ែត្រវាស់ពីកំពូលស្បូន មកលើតែមន្តីងថ្ងាស	A
203	នៅពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះដល់ស្រ្តី តើការវាស់កំពស់ស្បូនត្រូវធ្វើនៅពេលណាដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? A- ពេលស្រ្តីសម្រាកបានត្រឹមត្រូវ B- ពេលទារកធ្វើចលនា C- ពេលស្បូនកំពុងកន្ត្រាក់ D- ពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់	D

204	ការវាស់កំពស់ស្បូនស្រ្តីពេលមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ ត្រូវដាក់ស្រ្តីក្នុងស្ថានភាពដូចម្តេច?	B
	A- ស្រ្តីគេងថ្ងារបញ្ឈរជង្គង់ B- ស្រ្តីគេងថ្ងារសណ្តូកជើង C- ស្រ្តីគេងផ្អៀងឆ្វេង D- ស្រ្តីគេងក្នុងស្ថានភាពពាក់កណ្តាលអង្គុយ	
205	ការស្ទាបដោះស្រ្តីពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះ ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?	C
	A- ដៃ ទាំងពីរ ស្ទាប ជារង្វង់ជុំវិញដោះពីក្លៀកមកមុន B- ដៃ ទប់ដោះឲ្យនឹង ដៃម្ខាងទៀតស្ទាប ពីចុងដោះមកគល់ C- ដៃ ទប់ដោះឲ្យនឹង ដៃម្ខាងទៀតស្ទាប ជារង្វង់ជុំវិញដោះពីក្លៀកមកមុន D- ដៃ ទប់ដោះឲ្យនឹង ដៃម្ខាងទៀតស្ទាប ជារង្វង់ជុំវិញពីចុងដោះមកគល់ដោះ	
206	ក្នុងទម្រង់បង្ហាញក្បាល ខ្នងនៅខាងស្តាំតាមវិធីLeopold's តើត្រូវស្តាប់សំឡេងបេះដូងទារកនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យបានឮច្បាស់?	D
	A- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ខាងលើខាងឆ្វេងជួរ B- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ខាងលើខាងស្តាំ ជួរ C- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ ខាងក្រោម ខាងឆ្វេងជួរ D- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ ខាងក្រោម ខាងស្តាំជួរ	
207	តាមវិធី Leopold'sក្នុងទម្រង់បង្ហាញក្បាល ខ្នងនៅខាងឆ្វេង តើត្រូវស្តាប់សំឡេងបេះដូងទារកនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យបានឮច្បាស់?	C
	A- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ខាងលើ ខាងឆ្វេងជួរ B- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ខាងលើ ខាងស្តាំជួរ C- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ ខាងក្រោម ខាងឆ្វេងជួរ D- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ ខាងក្រោម ខាងស្តាំជួរ	
208	តាមវិធីLeopold'sទម្រង់បង្ហាញគូថ ខ្នងនៅខាងស្តាំ តើត្រូវស្តាប់សំឡេងបេះដូងទារកនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យបានឮច្បាស់?	B
	A- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ខាងលើ ខាងឆ្វេងជួរ B- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ខាងលើ ខាងស្តាំជួរ C- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ ខាងក្រោម ខាងឆ្វេងជួរ D- ស្តាប់នៅ១ភាគ៤ ខាងក្រោម ខាងស្តាំជួរ	

209	តាមវិធី Leopold's ពេលស្ទាបឃើញជុំមូល រឹងអាចឆ្លើយបាន នៅខាងលើផ្ទាំងថ្ងាស pubic ។ ម៉ាសដែលបានស្ទាបឃើញនោះគឺ៖ A- គូថទារក B- ក្បាលទារក C- ស្មារបស់ទារក D- ខ្នងទារក	B
210	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចមុនពេលចាប់ផ្តើមទម្ងន់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- ដោះស្បែកជើងជាមុនជៀសវាងការលំអៀង B- ពិនិត្យនិងតម្រូវទ្រនិចជញ្ជីងឲ្យចំលេខសូន្យ C- ចាប់ផ្តើមផ្ទាំងទម្ងន់ដោយធម្មតា D- ដោះស្បែកជើងនិងឈរឲ្យគ្រប់	B
211	នៅពេលវាស់កំពស់ស្ត្រី រាល់ពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះ តើត្រូវដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? A- ដោះស្បែកជើងជាមុនជៀសវាងការលំអៀង ខ្នងជួបទៅនឹងដងម៉ែត្រ B- ដោះស្បែកជើង ដាក់ជើងឲ្យកៀកគ្នា ខ្នងជួបទៅនឹងដងម៉ែត្រ C- ដោះស្បែកជើង ដាក់ជើងឲ្យកៀកគ្នា ឈរឲ្យគ្រប់ខ្នងជួបទៅនឹងដងម៉ែត្រ D- ដោះស្បែកជើងជាមុនជៀសវាងការលំអៀង ដាក់ខ្នងទៅនឹងដងម៉ែត្រ	C
212	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ពេលស្ទាបពោះ តើត្រូវធ្វើរបៀបដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ផ្នែកខ្នងរបស់ទារក? A- ប្រើបាតដៃម្ខាងទប់ស្បូនឲ្យនៅនឹង ដៃម្ខាងទៀតស្ទាបរុញដោយរំកិលទៅដៃម្ខាងទៀត បន្តិចម្តងៗ B- ប្រើបាតដៃទាំងសង្ខាងនិងម្រាមដៃស្ទាបទៅលើពោះដោយរំកិលបន្តិចម្តងៗ C- ប្រើបាតដៃទាំងសង្ខាងស្ទាបទៅលើពោះដោយរំកិលបន្តិចម្តងៗ D- ប្រើបាតដៃម្ខាងកំពូលស្បូនឲ្យនៅហ្នឹង ដៃម្ខាងទៀតស្ទាបស្បូនផ្នែកខាងក្រោម	A
213	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើត្រូវស្ទាបពោះរបៀបយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចុះចូលក្បាលរបស់ទារក ក្នុងអាងត្រគាក? A- ដាក់ប្រអប់ដៃទាំង២ទល់គ្នាលើពោះស្ទាបដោយ រំកិលដៃចុះក្រោមបន្តិចម្តងៗ B- ដាក់ប្រអប់ដៃម្ខាងទៅលើពោះ ហើយសង្កត់ផ្ទុកៗពីលើចុះមកក្រោម C- ប្រើប្រអប់ដៃទាំងសង្ខាងទៅលើពោះដោយរំកិលបន្តិចម្តងៗ D- យកម្រាមដៃទាំងសង្ខាងលូកចូលទៅច្រកលើនៃអាងត្រគាក រំកិលដៃចុះក្រោមបន្តិចម្តងៗ	D

214	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើនៅពេលស្តាប់សំលេងបេះដូងទារកនៅជំហានដំបូងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? A- យកស្តេតូស្កុបដាក់លើពោះម្តាយ ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដីពចរម្តាយ B- យកស្តេតូស្កុបដាក់លើពោះម្តាយ ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដីពចរម្តាយ C- ស្ទាបរកខ្នងទារកយកស្តេតូស្កុបដាក់លើពោះម្តាយ ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដីពចរម្តាយ D- យកស្តេតូស្កុបដាក់លើពោះម្តាយ នៅកន្លែងផ្នែកខាងខ្នងទារកដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដីពចរ	D
215	ការពិនិត្យផ្ទៃពោះស្ត្រីមុនពេលសម្រាល ដើម្បីជួយស្ត្រីឲ្យទាន់ពេលវេលា តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនគេ? A- ពិនិត្យឲ្យរហ័សរកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ B- យកសញ្ញាជីវិតនិងការបត់ជើងតូច C- សាកសួរពីរយៈពេលនៃការឈឺពោះ D- លូកពិនិត្យមាត់ស្បូន	A
216	តើត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ពីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដើម្បីឲ្យទារកក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អ? A- ណែនាំស្ត្រីសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ B- បរិភោគអាហារសំបូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹម C- ជៀសវាងធ្វើការធ្ងន់ D- ណែនាំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់	B
217	នៅពេលដែលផ្តល់ថ្នាំជាតិដែកដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើឆ្លើយត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ពន្យល់ពីរបៀបប្រើថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ B- ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ C- ផ្តល់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ D- ពន្យល់ពីអាហាររូបត្ថម្ភ	A
218	ក្នុងការផ្តល់ថ្នាំបង្ការគេតាណូសដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? A- ចាក់០,៥ម.លនៅសាច់ដុំត្រគាក B- ចាក់០,៥ម.លនៅសាច់ដុំដើមដៃ C- ចាក់០,១ម.លនៅសាច់ដុំត្រគាក D- ចាក់០,១ម.លនៅសើស្បែកនៅកំភួនដៃ	B

219	តើធូបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺក្រឡាភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរ? A- តាមដានសម្ពាធឈាមឌីឃ៉ាស្ទូលលើសពី១១០mm Hg B- តាមដានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោមមាន+++ C- តាមដានឈឺក្បាល ស្រវាំងភ្នែក D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
220	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ? A- តាមដានចង្វាក់ដង្ហើមញាប់លើសពី៣០ដងក្នុង១នាទី B- តាមដានសារធាតុHemoglobin<7g/1dl C- តាមដានភាពស្លេកស្លាំងនៅបាតដៃ និងភ្នាសត្របកភ្នែក D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
221	តើសំណើរខាងក្រោមណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីគណនាថ្ងៃខែសម្រាលរំពឹងទុក? A- ថ្ងៃខែរដូវចុងក្រោយ បូកនឹង៧ ខែ ៩ថ្ងៃ B- ថ្ងៃខែរដូវចុងក្រោយ បូកនឹង ៨ខែ៧ថ្ងៃ C- ថ្ងៃខែរដូវចុងក្រោយ បូកនឹង៩ខែ៧ថ្ងៃ D- ថ្ងៃខែរដូវចុងក្រោយ បូកនឹង៩ខែ១០ថ្ងៃ	C
222	តើការពិនិត្យរកមើលជំងឺពកក លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរបៀបណា? A- ឈរពីមុខស្ត្រី យកម្រាមដៃស្ទាបបំពង់ក B- ឈរពីមុខស្ត្រី យកម្រាមដៃ៣ស្ទាបបំពង់ក C- ឈរពីចំហៀងស្ត្រី យកម្រាមដៃ៣ស្ទាបចន្លោះបំពង់ខ្យល់ D- ឈរពីចំហៀងស្ត្រី យកម្រាមដៃ៣ស្ទាបចន្លោះបំពង់ខ្យល់ ខាងលើ	C
223	តើត្រូវពិនិត្យរកមើលសភាពស្លេកស្លាំងលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ របៀបយ៉ាងដូចម្តេច? A- យកម្រាមដៃសង្កត់ទៅលើបាតដៃនិងខ្នងដៃរយៈពេល២វិនាទី B- យកម្រាមដៃសង្កត់ទៅលើបាតដៃនិងចុងម្រាមដៃរយៈពេល២វិនាទី C- ពិនិត្យលើបាតដៃនិងសង្កត់ចុងក្រចកដៃរយៈពេល២វិនាទី D- យកម្រាមដៃសង្កត់អូសទៅលើបាតដៃនិងចុងម្រាមដៃរយៈពេល២វិនាទី	C

224	តើអ្នកវាយតម្លៃពីអ្វី នៅពេលពិនិត្យដោះស្រ្តី មានផ្ទៃពោះ ? A- ទំហំដោះ ដោះខ្វាក់និង ការឡើងដោះ B- ទំហំដោះ ដោះខ្វាក់និង ការចេញទឹកដោះ C- ទំហំដោះ ចុងដោះខ្វាក់ និង ពិនិត្យរកដុំដោះ D- ទំហំដោះ ដោះខ្វាក់និង ទំហំរបស់ដោះ	C
225	ចំពោះស្រ្តី មានផ្ទៃពោះ តើត្រូវពិនិត្យរកសភាពហើមយ៉ាងដូចម្តេច? A- ស្ទាបនៅលើមុខនិងដងខ្លួន B- សង្កត់នៅលើកំភួនដៃនិងកំភួនជើង C- សង្កត់នៅលើមុខនិងខ្នងដៃ D- សង្កត់នៅលើខ្នងជើង ស្មងជើង និងខ្នងដៃ	D
226	ចំពោះស្រ្តី មានផ្ទៃពោះ តើសង្កត់រកសភាពហើមយ៉ាងដូចម្តេច? A- សង្កត់ដោយបញ្ឈរដៃរាងផ្អែកបន្តិចរយៈពេល១វិនាទី B- សង្កត់ដោយបញ្ឈរដៃឲ្យត្រង់រយៈពេល២វិនាទី C- សង្កត់ដោយផ្អែកដៃរយៈពេល២វិនាទី D- សង្កត់ដោយបញ្ឈរដៃរាងផ្អែកបន្តិចរយៈពេល៣វិនាទី	D
227	តើស្ថានភាពមួយណាដែលជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីស្ទាបរកការចុះចូលក្បាលទារកក្នុងអាងត្រីគាត? A- ឆ្មបឈរពីចំហៀង បែរទៅរកមុខស្រ្តី B- ឆ្មបឈរពីចំហៀង បែរទៅរកជើងស្រ្តី C- ឆ្មបឈរបែរមុខទៅស្រ្តី D- ឆ្មបឈរពីចំហៀង បែរទៅរកពោះស្រ្តី	B
228	តើរបៀបណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីស្ទាបទម្រង់បង្ហាញក្បាលទារកក្នុងស្ថានភាព(Mobile, Amorce,Fixee)? A- ដាក់ដៃនៅលើផ្នែកណាមួយនៃពោះស្រ្តី ដោយរង្វៀកថ្មមៗ B- ដាក់ប្រអប់ដៃម្ខាងលើកំពូលស្បូន ដៃម្ខាងរង្វៀកថ្មមៗ C- ដាក់ប្រអប់ដៃម្ខាងលើកំពូលស្បូន ដៃម្ខាងដាក់លើតែមន្ទីរថ្ងាសរតៀកថ្មមៗ D- ដាក់ប្រអប់ដៃម្ខាងលើកំពូលស្បូន ដៃម្ខាងដាក់លើផ្ទាំងថ្ងាសរតៀកថ្មមៗ	C

229	នៅពេលឃើញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ជាដំបូងឆាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? A- ហៅជំនួយ ឬគ្រូពេទ្យ B- ដាក់សេរ៉ូមឡាក់តាតរឹងហ្ស៊ីបង្ហូរឲ្យលឿន C- យកសញ្ញាជីវិត D- ប្រាប់ក្រុមគ្រួសារឲ្យទៅពិនិត្យឈាម	A
230	តើឆាប់ត្រូវតាមដាននិង ពិនិត្យទៅលើអ្វី នៅពេលស្ត្រីមានការចាញ់កូនធ្ងន់ធ្ងរ? A- ការកូតញឹកញាប់បន្ត បាត់បង់ទម្ងន់ និងសញ្ញាខ្វះជាតិទឹក B- ការកូតញឹកញាប់ បាត់បង់ទម្ងន់ និងគ្មានសញ្ញាខ្វះជាតិទឹក C- កូតញឹកញាប់បន្ត គ្មានបាត់បង់ទម្ងន់ និងគ្មានសញ្ញាខ្វះជាតិទឹក D- កូតធម្មតា បាត់បង់ទម្ងន់ និងគ្មានសញ្ញាខ្វះជាតិទឹក	A
231	នៅពេលស្ត្រីមានការចាញ់កូនធ្ងន់ធ្ងរ តើឆាប់ត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដូចម្តេចខ្លះពីការថែទាំខ្លួននៅផ្ទះ? A- ណែនាំឲ្យសម្រាកឲ្យបានច្រើន B- ណែនាំឲ្យហូបអាហារ និងជាតិទឹកតិចៗតែឲ្យបានញឹកញាប់ C- ណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយបរិភោគអាហារដែលសំបូរដោយសារជាតិកាបូអ៊ីដ្រាត D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
232	តើចំណុចណាមួយដែលជាគន្លឹះក្នុងការថែទាំដល់ស្ត្រីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ? A- ពិនិត្យទឹកនោមរាល់ពេលមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ B- ពិនិត្យសម្ពាធឈាមរាល់ពេលមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ C- ពិនិត្យកំរិតជាតិស្ករក្រោយពេលញ៉ាំអាហារ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
233	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើឆាប់ត្រូវណែនាំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផឹកទឹកចំណុះប៉ុន្មាន ដើម្បីបង្ការការបង្ករោគនៅផ្លូវនោម? A- ១០០០ម.ល រៀងរាល់២៤ម៉ោង B- ២០០០ម.ល រៀងរាល់២៤ម៉ោង C- ៣០០០ម.ល រៀងរាល់២៤ម៉ោង D- ៤០០០ម.ល រៀងរាល់២៤ម៉ោង	C

234	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើឆ្លុបត្រូវអប់រំណែនាំពីអ្វីខ្លះ ដើម្បីបង្ការការបង្ករោគនៅផ្លូវនោម? A- អនាម័យប្រដាប់បន្តពូជ និងនោមឲ្យបានញឹកញាប់ B- នោមឲ្យបានញឹកញាប់ និងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន C- អនាម័យប្រដាប់បន្តពូជ និងទប់នោមពេលចង់នោម D- អនាម័យប្រដាប់បន្តពូជ និងប្រើថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម	A
235	ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ តើឆ្លុបគួរណែនាំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើថ្នាំMetronidazol យ៉ាងដូចម្តេច? A- ត្រីមាសទី១ និងទី២ B- ត្រីមាសទី១ និងទី៣ C- ត្រីមាសទី២ និងទី៣ D- ត្រីមាសណាក៏បាន	C
236	បើម្តាយមានជំងឺស្វាយពេលមានផ្ទៃពោះ តើឆ្លុបគួរប្រាប់ម្តាយពីគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះកើតឡើង ចំពោះទារក? A- អាចមានជំងឺផ្លូវចិត្ត B- សភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកើតឡើងភ្លាមៗ C- ភ្នែកឡើងបាយ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
237	ម្តាយមានជំងឺប្រមេទឹកបាយនៅពេលមានផ្ទៃពោះ តើឆ្លុបគួរប្រាប់ម្តាយពីគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះកើតឡើង ចំពោះទារក? A- អាចមានជំងឺ គ ថ្លង់ B- ហូរខ្ទុះចេញពីភ្នែក C- ភ្នែកឡើងបាយ D- រលាកស្រោមសួត	B

238	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះការថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងករណីពិនិត្យរកសញ្ញាសុភពង្សមានសុវត្ថិភាព? A- លូកពិនិត្យទ្វារមាសក្នុងករណីចាំបាច់ B- ប្រើចំពុះទាញក្នុងការពិនិត្យតាមទ្វារមាស C- តាមដានសញ្ញាជីវិត D- តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក	B
239	តើត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ជាដំបូងយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងករណីរហែកស្បូន? A- ចាប់ផ្តើមផ្តល់សារធាតុរាវនិងផ្តល់អុកស៊ីសែន B- រះកាត់និងផ្តល់អុកស៊ីសែន C- រះកាត់និងផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក D- ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់និងធ្វើឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍	A
240	តើវិធីធម្មតាងាយបំផុតមួយណា ដែលឆ្មបអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថែទាំបំប៉ងក្រឡាភ្លើង? A- ការវាស់សម្ពាធឈាមជាប្រចាំ B- ពិនិត្យផ្ទៃពោះជាប្រចាំ C- ផ្តល់ប្រឹក្សាជាប្រចាំ D- ប្រើថ្នាំជាប្រចាំ	A
241	តើត្រូវវាស់សម្ពាធឈាមយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថែទាំបំប៉ងក្រឡាភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? A- វាស់សម្ពាធឈាមពេលស្ត្រីមកដល់បន្ទប់ពិនិត្យភ្លាម B- វាស់សម្ពាធឈាមពេលស្ត្រីធ្វើការអ្វីមួយហើយភ្លាម C- វាស់សម្ពាធឈាមពេលស្ត្រីអស់កម្លាំង D- វាស់សម្ពាធឈាមពេលស្ត្រីសំរាក យ៉ាងហោចណាស់១០នាទី	D

242	តើឆ្លុបត្រូវរៀបចំស្ថានភាពស្រ្តីយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីយកសម្ភាធឰណាម ក្នុងករណីស្វែងរកជំងឺលើសសម្ភាធឰណាម? A- ស្ថានភាពគេងថ្ងារ B- ស្ថានភាពគេងផ្អៀងស្តាំ C- ស្ថានភាពគេងផ្អៀងឆ្វេងឬអង្គុយ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
243	តើឆ្លុបត្រូវតាមដានដូចម្តេចដើម្បីរកឲ្យឃើញពីផលវិបាកនៃគភ៌លើសខែ? A- តាមដានការកន្ត្រាក់របស់ស្បូនខ្លាំង B- តាមដានទឹកភ្លោះបែកមុនពេលសម្រាល C- តាមដានទារកស្លាប់ក្នុងស្បូន D- តាមដានម្តាយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម	C
244	តើឆ្លុបត្រូវតាមដានអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃគភ៌លើសខែ? A- តាមដានបេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃ B- តាមដានចលនារបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ C- ការលូតលាស់ទារកក្នុងផ្ទៃ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
245	ចំពោះទារកលើសខែ តើឆ្លុបត្រូវតាមដានលើអ្វី ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពចុះខ្សោយរបស់ទារក? A- ការលូតលាស់របស់ទារក B- ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃ C- ចលនារបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
246	ចំពោះស្រ្តីមានគភ៌លើសខែ តើឆ្លុបត្រូវតាមដានដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមាន ការចុះថយទឹកភ្លោះ? A- ការធ្វើអេកូសាស្ត្រ B- តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារកឃើញធម្មតា C- ការស្ទាបពោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយដៃឆ្លុបដដែលៗ D- ការស្ទាប និង ពិនិត្យពោះដោយឆ្លុបផ្សេងពីគ្នា	C

247	ការបញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃ ចំពោះស្ត្រីដែលមានការចាញ់កូនធ្ងន់ធ្ងរ តើឆ្មបត្រូវកត់ត្រានិងប៉ាន់ប្រមាណទៅលើអ្វីខ្លះ? A- ទឹកនោមរកជាតិKetone B- កង្វះជាតិទឹកនិងអតុល្យភាពនិងអេឡិចត្រូលីត C- ការឡើងក្រហមនៅកន្លែងចាក់ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
248	ការថែទាំចំពោះស្ត្រីដែលមានការចាញ់កូនធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងការបញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃដើម្បីកុំឲ្យមានការបង្ករោគឆ្មបត្រូវ៖ A- ពិនិត្យមើលកន្លែងចាក់ B- ផ្លាស់ប្តូរបំពង់ស៊ីម៉ង់កន្លែងចាក់រៀងរាល់៤៨ម៉ោង C- ផ្លាស់ប្តូរបំពង់ស៊ីម៉ង់កន្លែងចាក់រៀងរាល់៥២ម៉ោង D- ពិនិត្យមើលខ្សែសេរ៉ូម	B
249	ការថែទាំចំពោះស្ត្រីដែលមានការចាញ់កូនធ្ងន់ធ្ងរ ឆ្មបត្រូវណែនាំស្ត្រី៖ A- ការពិនិត្យផ្ទៃពោះ ការបន្ទុះអារម្មណ៍ ការផ្តល់ចំណីអាហារនិងសារធាតុរាវ B- អនាម័យខ្លួនប្រាណនិងការបន្ទុះអារម្មណ៍ C- ចំណីអាហារនិងសារធាតុរាវ អនាម័យខ្លួនប្រាណ D- ការពិនិត្យផ្ទៃពោះនិង ចំណីអាហារអនាម័យខ្លួនប្រាណ	A
250	ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ប៉ាន់ប្រមាណពិកត្តាប្រឈមមុខ B- វិភាគទឹកនោមរកវត្ថុមាននៃជាតិស្ករ C- ស្រាវជ្រាវជំងឺទឹកនោមផ្អែមមុនពេលមានគភ៌ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

251	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម តើឆ្លុបត្រូវណែនាំស្ត្រីពីការថែទាំនៅតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងដូចម្តេច? A- ធ្វើតេស្តទឹកនោម B- ត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម C- គ្រប់គ្រងអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណតិចតួច D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
252	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម តើឆ្លុបត្រូវណែនាំស្ត្រីពីរបៀបប្រើ Insuline នៅផ្ទះដូចម្តេច? A- ចាក់ក្រោមស្បែក B- ចាក់សើរស្បែក C- ចាក់សាច់ដុំ D- ចាក់តាមសរសៃ	B
253	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឆ្លុបត្រូវណែនាំស្ត្រីពីការផ្តល់Carbohydrateដូចម្តេច? A- 10%- 20% B- 30%- 40% C- 50%- 60% D- 70%- 80%	C
254	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម នៅពេលកើនឡើងលើស Caloriesក្នុង១ថ្ងៃ តើឆ្លុបត្រូវណែនាំស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេចពីការផ្តល់Proteinគឺ៖ A- 12%- 20% B- 20%- 30% C- 40%- 50% D- 60%- 70%	A

255	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយមានជំងឺបេះដូង តើឆ្លុះត្រូវអប់រំស្ត្រីដូចម្តេច? A- របបអាហារ សកម្មភាពដែលមិនត្រូវធ្វើ និងសញ្ញាបញ្ជាក់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ B- ការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងរបបអាហារ C- ការប្រើឱសថនិង របបអាហារ D- តាមដានការលូតលាស់នៃគភ៌ និង របបអាហារ	A
256	នៅពេលអប់រំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើឆ្លុះត្រូវណែនាំស្ត្រីដូចម្តេចពីការទទួលវ៉ាក់សាំងតេតាណូសក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះ? A- ១ដង B- ២ដង C- ៣ដង D- ៤ដង	B
257	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានជំងឺតម្រងនោម តើឆ្លុះត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ថែទាំដូចម្តេច? A- អប់រំពីមធ្យោបាយការពារ ការឆ្លងរោគលើផ្លូវនោម និងតាមដានការព្យាបាល B- អប់រំពីការប្រើថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម និងការឆ្លងរោគ C- តេស្តគូនាទីតម្រងនោម និងតេស្តរកភាពស្លកស្លាំង D- អប់រំពីការសម្រាកស្ងៀម និងអប់រំពីការប្រើថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម	A
258	នៅរយៈពេលដំបូងនៃការមានគភ៌ ស្ត្រីមានការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសខ្លាំង តើឆ្លុះត្រូវតាមដានសញ្ញាជីវិតដូចម្តេច? A- រៀងរាល់១៥- ៣០នាទី B- រៀងរាល់៤០- ៥០នាទី C- រៀងរាល់៥០នាទី D- រៀងរាល់៦០នាទី	A

259	តើឆ្លុបត្រូវបានប្រមាណទៅលើអ្វីខ្លះ? ចំពោះស្ត្រីមានជំងឺតម្រង់នោមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ A- ពីមធ្យោបាយការពារ ការឆ្លងរោគលើផ្លូវនោម និងការតាមដានការព្យាបាល B- ភាពស្មើភាពស្លាំង សម្ពាធឈាម បរិមាណទឹកនោមប្រចាំថ្ងៃ C- អប់រំពីអនាម័យខ្លួនប្រាណ D- អប់រំពីរបបចំណីអាហារ ការសម្រាក	B
260	តើឆ្លុបត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ថែទាំយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះស្ត្រីដែលមានជំងឺរបេងបន្ទាប់ពីសម្រាល? A- ដាក់ស្រ្តីឲ្យនៅបន្ទប់ក្រោយសម្រាលធម្មតា ជាមួយទារក B- ដាក់ទារកឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីម្តាយ C- អប់រំចំពោះស្ត្រីឲ្យចេះថែទាំដោយខ្លួនឯង D- ដាក់ទារកឲ្យនៅជាមួយម្តាយ ពេលពិនិត្យឃើញកំហកអវិជ្ជមាន	D
261	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលប៉ះជាមួយអ្នកកើតជំងឺ Rubella តើឆ្លុបត្រូវអប់រំដូចម្តេច? A- ផលប៉ះពាល់លើទារក B- ណែនាំឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តគ្រប់លក្ខខណ្ឌទុកឲ្យសម្រាល C- មិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងជំងឺ Rubella D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
262	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលមានធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ តាមទ្វារមាសមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- អាចលូកពិនិត្យទ្វារមាសដើម្បីរកមូលហេតុ B- ពិនិត្យទ្វារមាសដោយប្រើចំពុះទា C- តាមដានរកការហែកស្បូន D- ដាក់ស្បែក សាកសួរស្ត្រី	B
263	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលមានធ្លាក់ឈាមឈាមរំអិល តាមទ្វារមាសតើអ្វីដែលឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- គ្រប់គ្រងការឈឺពោះសម្រាល B- ពិនិត្យមាត់ស្បូនដោយប្រើចំពុះទា C- តាមដានការធ្លាក់ឈាម D- តាមដានការកន្ត្រាក់ស្បូន	A

264	ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនៅពេលមានឆ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ជិតគ្រប់ខែ តើឆ្លបត្រូវអ្វីមុនគេ?	A
	A- រកជំនួយជាបន្ទាន់ និងដាក់ស្រ្តីឲ្យសម្រាកលើគ្រែ B- ពិនិត្យទ្វារមាសដោយប្រើចំពុះទា C- ដាក់បញ្ចូលឈាមបើចាំបាច់ D- ដាក់សេរ៉ូម និងសាកសួរស្រ្តីរកមូលហេតុ	
265	ចៀសវាងការប្រឡាក់សារធាតុរាវទ្វារមាស តើឆ្លបត្រូវណែនាំឲ្យស្រ្តីយកទឹកនោមដូចម្តេច ?	C
	A- យកទឹកនោមនៅពេលព្រឹក ពេលនោមលើកដំបូង B- យកទឹកនោមនៅពេលព្រឹក C- យកទឹកនោមនៅពេលព្រឹក ពាក់កណ្តាលពេលនោម D- យកទឹកនោមនៅពេលព្រឹក ចុងក្រោយពេលនោម	
266	តើឆ្លបត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាដូចម្តេច ដើម្បីជួយស្រ្តីមានផ្ទៃពោះកាត់បន្ថយការទល់ឈាម?	C
	A- របបអាហារដែលមានវីតាមីន B- របបអាហារដែលសំបូរជាតិខ្លាញ់ C- របបអាហារសំបូរសារធាតុរាវ D- របបអាហារសំបូរសារធាតុសាច់	
267	តើឆ្លបចាក់អុកស៊ីតូស៊ីនដូចម្តេច?	C
	A- នៅពេលកំពុងឈឺពោះសម្រាល B- នៅពេលសម្រាលកូនទី១រួចហើយភ្លាម C- នៅពេលសម្រាលកូនទី១ក្នុង១នាទីដំបូងកើតភ្លាមប្រាកដថាគ្មានកូន១ទៀតទេ D- នៅពេលសម្រាលកូនទី១ ផុតបាន៥នាទីប្រាកដថាគ្មានកូន១ទៀតទេ	
268	តើឆ្លបត្រូវតាមដាន និងពិនិត្យទៅលើអ្វី បន្ទាប់ពីចាក់ magnesium sulphate ក្នុងដូសដដែលៗ?	D
	A- ចង្វាក់ដង្ហើម B- បរិមាណទឹកនោម C- Reflex ជង្គង់ (Knee jerk) D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	

269	ពេលប្រើmagnesium sulphate ក្នុងការថែទាំជំងឺក្រឡាភ្លើង នៅពេលចង្វាក់ដង្ហើមតិចជាង១៦ដងក្នុង១នាទី តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- បញ្ឈប់ឬពន្យាការប្រើmagnesium sulphate B- បន្តការប្រើmagnesium sulphate C- ប្រើឱសថជំនួយបន្ថែម D- តាមដានការកន្ត្រាក់នៃសួរន	B
270	នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាម តើឆ្លុបត្រូវថែទាំរបៀបណាដើម្បីចៀសវាងជំងឺរលាកសួត? A- ប្រែខ្លួនរៀងរាល់២ម៉ោង B- ប្រែខ្លួនរៀងរាល់៣ម៉ោង C- ប្រែខ្លួនរៀងរាល់៤ម៉ោង D- ប្រែខ្លួនរៀងរាល់៥ម៉ោង	A
271	នៅពេលមានរំលូតក្លាយរោគ តើឆ្លុបត្រូវគ្រប់គ្រងនិងអន្តរាគមន៍យ៉ាងដូចម្តេច? A- ផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងព្យាបាលការក្លាយរោគ B- តាមដានសញ្ញាជីវិត និងផ្តល់ជាតិទឹក C- តាមដានសញ្ញាជីវិត ផ្តល់ជាតិទឹក និងព្យាបាលការក្លាយរោគតាមវេជ្ជបញ្ជា D- ផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងព្យាបាលការក្លាយរោគតាមវេជ្ជបញ្ជា	C
272	ស្ត្រីមានកូនច្រើនដង ហើយមានផ្ទៃពោះ ៣៧សប្តាហ៍ កំពុងទទួលការព្យាបាលបម្រុង ក្រឡាភ្លើងធ្ងន់ និងបញ្ចូលម៉ាញ៉េស្យូមស៊ុលហ្វាត ៣ក្រ/ម៉ែ។ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺ អន្តរាគមន៍ចំបងដែលត្រូវធ្វើគឺ៖ A- បន្តពិនិត្យតាមដានសុខភាពមាតានិង ទារក B- លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅក្បែរអ្នកជំងឺ C- វាយតម្លៃ វេជ្ជច ការកន្ត្រាក់សាច់ដុំ ការស្រវាំងភ្នែក និងឈឺក្បាល D- ពិនិត្យលើការបញ្ចូលជាតិទឹក រៀងរាល់៤ ម៉ោងម្តង	C

273	ស្ត្រីម្នាក់អាយុ ១៧ឆ្នាំ មានផ្ទៃពោះ ៣៣សប្តាហ៍មានរោគវិនិច្ឆ័យ បម្រុងក្រឡាភ្លើង ដែលមកទទួលការព្យាបាលឆាប់បានណែនាំឲ្យគាត់ទាក់ទងនឹងអ្នកថែទាំបឋមក្លាយ ប្រសិនបើ៖ A- ស្រវឹងភ្នែក B- ហើម ក និងកែងជើង C- អស់កំលាំង D- ឈឺខ្នងតិចតួច	A
274	ក្នុងករណីសង្ស័យថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានការស្ទះដង្ហើម តើឆ្លុបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ ? A- ព្យាយាមសំអាតផ្លូវដង្ហើម B- ដាក់ក្បាលដេកផ្ទៀងខាងឆ្វេង C- ដាក់ស្រ្តីក្នុងស្ថានភាពប្រសើរបំផុត D- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់	A
275	តើរបៀបខាងក្រោមណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្តល់ម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាតដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីការពារការប្រកាច់ ? A- បូមម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាត៥ក្រាមលាយជាមួយសេរ៉ូម២០មលចាក់សរសៃរយៈពេល១៥- ២០នាទី B- បូមម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាត៥ក្រាមលាយជាមួយសេរ៉ូម៥មលចាក់សរសៃរយៈពេល៥- ១០នាទី C- បូមម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាត៥ក្រាមចាក់សាច់ដុំ (ចាក់ត្រគាកទាំងសងខាង) បន្ទាប់ពីចាក់សរសៃ D- បូមម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាត៥ក្រាមចាក់សាច់ដុំរៀងរាល់៥ម៉ោងរួចបន្តរយៈពេល ២៤ម៉ោងបន្ទាប់ពីសំរាល	B
276	ប្រសិនបើឆ្លុបជួបប្រទះស្ត្រីសំរាលកូនមានធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេចជាដំបូង ? A- ចាក់បញ្ចូលសេរ៉ូម Lactate តាមសរសៃយ៉ាងលឿន B- ចាក់អុកស៊ីតូស៊ីនតាមសាច់ដុំអោយស្បូនកន្ត្រាក់ C- ចាក់អែហ្គេមេទ្រីនអោយស្បូនកន្ត្រាក់ D- ចាក់ថ្នាំឃាត់ឈាមយ៉ាងហ័ស	A

277	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឈប់ដកដង្ហើម នៅពេលដែលកំពុងទទួលម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាត តើឆ្មបត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ដូចម្តេច ? A- ចាក់ Calcium SandoZ B- ចាក់ Calcium Gluconate C- ចាក់ Diazepam D- ចាក់ Oxytocine	B
278	ក្នុងការផ្តល់ម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាតដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានសញ្ញាក្រឡាភ្លើង ឆ្មបត្រូវធ្វើការតាមដានដោយត្រូវបញ្ឈប់ភ្លាមបើចង្វាក់ដង្ហើម: A- ១២ដងក្នុង១នាទី B- ១៦ដងក្នុង១នាទី C- ១៨ដងក្នុង១នាទី D- ២០ដងក្នុង១នាទី	A
279	ការថែទាំដ៏ល្អដល់ស្ត្រីជាដំបូងមុនធ្វើការទំលាក់សុកដោយដៃឆ្មបត្រូវ: A- ចាក់សេរ៉ូម ផ្តល់ Diazepam10mg និងអោយ Atropine 1\4mg B- ចាក់សេរ៉ូមលាយជាមួយ Oxytocine C- ដាក់សុងបង្ហូរទឹកនោម D- ផ្តល់ថ្នាំបង្ការការឆ្លងរោគ	A
280	ក្នុងការបារទំលាក់សុកដោយដៃ បើសំពាធឈាមតិចជាង90 mmHgឬដីពចរលើស ១១០\នាទី តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? តេចជាដំបូង ដើម្បីជួយស្ត្រីអោយមានជាសុកភាព ? A- ផ្តល់សេរ៉ូមនិងអោយស្ត្រីសំរាកក្នុងឥរិយាបថដេកផ្អៀងខាងឆ្វេង B- ផ្តល់សេរ៉ូមនិងដាក់អុកស៊ីសែន C- ផ្តល់សេរ៉ូមនិងសណ្តូកជើងអោយត្រង់ D- ផ្តល់ថ្នាំ Antibiotic	A
281	ប្រសិនបើឆ្មបធ្វើការសំរាលកូនហើយមានការធ្លាក់ឈាមដោយសារស្បូនមិនកម្រិត តើសកម្មភាពនៃការទប់សង្កត់ស្បូនដោយដៃទាំងពីរត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? A- ទប់សង្កត់ស្បូនដោយប្រើដៃម្ខាងរុញឡើងលើ B- លូកដៃចូលក្នុងទ្វារមាសហើយក្តាប់ដៃ រុញផ្ទប់ទៅនឹងជញ្ជាំងខាងមុខរបស់ស្បូននិងដៃម្ខាងទៀតសង្កត់លើស្បូន C- ទប់សង្កត់ស្បូនដោយប្រមូលយកកំទេចសុក D- ទប់សង្កត់ស្បូនដោយដៃទាំងពីរដាក់លើពោះ	B

282	ពេលស្ត្រីមិនធ្លាក់រយៈពេល៣០នាទីក្រោយសំរាលតើឆ្មបត្រូវធ្វើសកម្មភាពមួយណាដើម្បីបង្កអោយស្ត្រីធ្លាក់? A. ទាញទងស្ត្រីចេញមកក្រៅដោយថ្មីមៗ B- អនុវត្តដោយធ្វើការលូកបារ C- ចាក់Oxytocineតាមសាច់ដុំ ដើម្បីអោយស្ត្រីធ្លាក់ D- ចាក់សេរ៉ូមជាមួយOxytocine	B
283	ពេលជួបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺប្រកាច់ចូលមកកាន់មណ្ឌលសុខភាព តើឆ្មបត្រូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីមុនគេ? A- សិកកានុលក្នុងមាត់ B- ចាក់សេរ៉ូមជាមួយថ្នាំDiazepam C- ចាក់ម៉ាញេស្យូមសុលហ្វាត៥ក្រាម D- យកសញ្ញាជីវិត	A
284	ស្ត្រីម្នាក់មានធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសពេលគក់អាយុលើសពី២២សប្តាហ៍ឡើងទៅ តើវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលត្រូវចៀសវាង? A. លូកពិនិត្យទ្វារមាស B- សញ្ញាជីវិត C- ចាក់បញ្ចូលសេរ៉ូម D- តាមដានការធ្លាក់ឈាម	A
285	ឆ្មបមានភារៈកិច្ចក្នុងការបញ្ជូនអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ តើចំណុចសំខាន់ណាមួយដែលឆ្មបត្រូវធ្វើ? A- គ្រប់គ្រងស្ថានភាពអ្នកជំងឺអោយមានស្ថេរភាព B- ផ្តល់ដំណឹងទៅកន្លែងបញ្ជូន C- ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារកំណត់ត្រារបស់មាតានិងទារក D- បញ្ជូនភ្លាមៗដោយមិនបាច់រង់ចាំ	D
286	ក្នុងករណីបញ្ជូនអ្នកជំងឺពីមណ្ឌលសុខភាពទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកតើចំណុចណាមួយដែលអាចលើកលែងបាន? A- ត្រូវអោយមានបុគ្គលិកអមដំណើរទៅជាមួយអ្នកជំងឺ B- ត្រូវមានលិខិតបញ្ជូន C- ត្រូវមានkit សង្គ្រោះបន្ទាន់ D- មានវិទ្យុទាក់ទងឬទូរស័ព្ទដៃចាំបាច់សំរាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាបន្ថែម	D

287	ស្ត្រីដែលមានជំងឺបំប្លែងក្រឡាភ្លើងឬក្រឡាភ្លើង តើថ្នាំខាងក្រោមណាមួយដែលឆ្លងមិនត្រូវផ្តល់ស្ត្រីនេះ ? A- ម៉ាញ៉េស្យូមសុលហ្វាត B- អុកស៊ីតូស៊ីន C- អែហ្គេមេទ្រីន D- អំពីស៊ីលីន	C
288	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចពីសកម្មភាពនៃការទប់ស្កត់ទៅលើសរសៃអាអកនៅពេលដែលស្ត្រីមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាលដោយសារស្បូនមិនកន្ត្រាក់ ? A- ក្តាប់ដៃម្ខាងសង្កត់លើពោះចុះក្រោមបន្តិចនិងដៃម្ខាងទៀតស្ទាបជីចក្រលៀន B- ក្តាប់ដៃទាំងពីរសង្កត់លើពោះស្ត្រី C- ក្តាប់ដៃម្ខាងសង្កត់លើពោះនិងដៃម្ខាងទៀតដាក់ក្នុងស្បូន D- ក្តាប់ដៃសង្កត់ពោះអោយយូរ	A
289	តើអ្នកត្រូវសាកសួរអំពីអ្វីខ្លះក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណស្ត្រីមានគភ៌ក្រៅស្បូន ? A- ប្រវត្តិនៃឈាមរដូវ និងទីតាំងនៃការឈឺចាប់ B- ប្រវត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ និងទីតាំងនៃការឈឺចាប់ C- ប្រវត្តិនៃការរះកាត់ និងរបបចំណីអាហារ D- ប្រវត្តិកូនមិនគ្រប់លក្ខណៈពីមុន	A
290	សញ្ញា និងរោគសញ្ញាចំពោះស្ត្រីមានគភ៌ក្រៅស្បូនដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលលើកលែងតែ៖ A- សញ្ញាជីវិត B- កម្រិតនៃស្មារតី C- ការហូរឈាមតាមទ្វារមាស D- កំដៅរាងកាយ	D
291	តើអ្វីមួយដែលមិនមែនជារោគវិនិច្ឆ័យថែទាំស្ត្រីមានគភ៌ក្រៅស្បូន ? A- ការឈឺចាប់ B- ការថប់បារម្ភ C- ការឡើងកំដៅរាងកាយ D- ឱនភាពចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការព្យាបាល	C

292	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់របស់អ្នកជម្ងឺក្រោយពេលវះកាត់គភ៌ក្រៅស្បូន ? A- ឱ្យថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ B- ឱ្យថ្នាំអង់ទីស្បាស់ម៉ូឌិក (Antispasmodique) C- ស្តុំដោយទឹកក្តៅឧណ្ហៗ D- ឱ្យថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	A
293	ការបង្ករោគនៅទ្វារមាស- យោនី (Vulvovaginitis) មានសភាព និងបណ្តាលឲ្យដូចម្តេចឆ្លើយខាងក្រោម លើកលែងតែ ៖ A- ពណ៌ ក្លិន B- ធ្វើឱ្យរមាស់ ក្រហាយ C- ក្រហម ហើម រលោង D- ហូរឈាមរឹមៗ	D
294	តើអ្នកត្រូវណែនាំស្ត្រីដែលមានការបង្ករោគនៅទ្វារមាសយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមុនពេល ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ? A- កុំដឹកទឹក B- កុំងូតទឹក C- កុំញ៉ាំអាហារ D- កុំបត់ជើងតូច	B
295	តើកត្តាមួយណាដែលមិនទាក់ទងនឹងការបង្ករោគនៅទ្វារមាស- យោនី (Vulvovaginal) ? A- សំលៀកបំពាក់រលុង B- សំលៀកបំពាក់សើម C- ស្រ្តីវ័យចាស់ D- អនាម័យខ្លួនប្រាណ	A
296	តើឱសថមួយណាដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួល flora នៅទ្វារមាស ? A- Analgesique B- Antibiotique C- Antispasmodique D- Antipyretique	B

297	តើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាវិធីសំរាប់បន្ថយការឈឺចាប់ក្នុងករណីមានការបង្កពេកនៅទ្វារមាស? A- ការលាងដោយទឹកក្ដៅឧណ្ហាៗនៅតំបន់ប៉េរីណេ B- អង្គុយស្ដាំលើថ្មក្ដៅឧណ្ហាៗ C- លាងសំអាតក្រោយពីបត់ជើងតូច- ធំរួច D- អង្គុយត្រាំទឹកក្ដៅឧណ្ហាៗក្នុងបានឆ្នាំ	B
298	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថយការថប់បារម្ភរបស់អ្នកជម្ងឺដែលមានការបង្កពេកនៅទ្វារមាស? A- អនុញ្ញាតិឱ្យគាត់ទៅលំហែ B- ពន្យល់ស្ត្រីពីមូលហេតុនៃរោគសញ្ញា C- ឱ្យស្ត្រីដឹកទឹកឱ្យបានច្រើន D- ឱ្យស្ត្រីសំរាកឱ្យបានច្រើន	B
299	តើអ្នកជម្ងឺត្រូវដេកសំរាករយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីជៀសវាងការរហូតចេញពីទ្វារមាសនូវថ្នាំដែលបានសុលហើយ? A- ៥នាទី បន្ទាប់ពីសុលថ្នាំ B- ១០នាទី បន្ទាប់ពីសុលថ្នាំ C- ២០នាទី បន្ទាប់ពីសុលថ្នាំ D- ៣០ នាទី បន្ទាប់ពីសុលថ្នាំ	D
300	តើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាពោតវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃជម្ងឺអ៊ែរហ្វែស(Herpes)នៅលើប្រដាប់បន្តពូជ ? A- សកម្មភាពពុំអនុគ្រោះ B- ការឈឺចាប់ C- ការរាលដាលនៃការបង្កពេក D- ការបារម្ភ និងការធុញថប់ចំពោះជម្ងឺ	A

301	តើអ្វីមួយដែលគេត្រូវជៀសវាង ក្នុងករណីមានជំងឺប្រដាប់បន្តពូជ ? A- ប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ B- សំរាកច្រើន C- ផឹកទឹកច្រើន D- លាបប្រេង ឬ ម្សៅ	D
302	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកចម្បងនៃគភ៌ក្រៅស្បូន? A- ការធ្លាក់ឈាម និង ស្កក B- ការធ្លាក់សមាន់ធំ្មិន C- ការចុកចាប់ពេញរាងកាយ D- មិនអាចមានកូនលើកក្រោយទៀត	A
303	តើវិធីមួយណាដែលមិនមែនជាវិធីបន្ថយការឈឺចាប់ចំពោះស្ត្រីដែលមានការមានការបង្កពេកដោយ វីរុស អ៊ីអិលប៊ីសនៅប្រដាប់បន្តពូជ ? A- សំអាតដំបៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ B- ត្រាំក្នុងចានក្លាំតូចល្មម C- សំលៀកបំពាក់ត្រូវស្អាត	B
304	រោគវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃអ្នកជំងឺមានចង្កោមរោគសញ្ញាស្កកបណ្តាលមកពីសារធាតុពុលមានដូចម្តេចឆ្លើយ៣ខាងក្រោម លើកលែងតែ៖(Toxic shock syndrom)? A- ការថប់បារម្ភ B- អស់កម្លាំង C- កង្វះបរិមាណសារធាតុរាវ D- ឡើងកម្ដៅ	D
305	តើអ្វីមួយជាលទ្ធផលរំពឹងទុកចំពោះការវាយតម្លៃការថែទាំស្បែកនៃអ្នកជំងឺរះកាត់ទ្វារមាស ? A- បង្កើនការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពថែទាំខ្លួនឯង B- បង្ហាញពីនិន្ទ្រដើម្បីពិភាក្សាពីការរួមភេទ C- ការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពសំរាប់ភាពសុខស្រួល D- ប្រើធនធានដែលមានដើម្បីបន្ថយអារម្មណ៍តឹងតែង	A

306	ចម្លើយ៣ខាងក្រោមគឺជាបញ្ហាដែលបណ្តាលពីការប្រើដុំសំឡីជាក់ទឹកនៅក្នុងទ្វារមាសរយៈពេលយូរពេល មានរដូវ លើកលែងតែ៖ A- ការបង្ករោគ B- ស្តុកបណ្តាលមកពីសារធាតុពុល C- របួសកោសិកាទ្វារមាស D- ហើម	D
307	តើអ្វីមួយជាភាគវិនិច្ឆ័យថែទាំចំពោះអ្នកជម្ងឺរះកាត់ទ្វារមាស ? A- ការឈឺចាប់ទាក់ទងនឹងការរះ និង ការថែទាំរបួស B- ការស្តារឡើងវិញនូវមុខងាររួមភេទ C- ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ D- ការថែទាំបញ្ហាស្បែក	A
308	តើអ្វីខ្លះជាភាគវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃអ្នកជម្ងឺមានមហារីកដោះមុនពេលរះកាត់? A- ភាពពុំអនុគ្រោះនៃសកម្មភាពរាងកាយ B- ភ័យខ្លាចទាក់ទងនឹងការព្យាបាល ឬអាចស្លាប់ C- ខ្វែងភាពចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការថែទាំខ្លួនឯង D- មានការខ្មាសអៀន	B
309	តើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងម្តង ដែលគេត្រូវផ្លាស់ប្តូរតំប៉ុង ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានចង្កោមរោគសញ្ញាស្តុក បណ្តាលមកពីសារធាតុពុល (Toxic shock syndrom) ? A- ៤ ម៉ោងម្តង B- ៥ ម៉ោងម្តង C- ៦ ម៉ោងម្តង D- ៨ ម៉ោងម្តង	A

310	រោគវិនិច្ឆ័យថែទាំនៃអ្នកជម្ងឺមានមហារីកដោះក្រោយពេលវះកាត់មានដូចម្តេចខាងក្រោម លើកលែងតែ៖ A- ការខូចខាតស្បែកបណ្តាលមកពីការវះកាត់ B- ការថមថយញាណដឹងនៅដៃដែលមានបញ្ហាដោះ C- ឌីនភាពចំណេះដឹងពីលំហាត់ដៃប្រឆាំងទប់ចលនារបស់ដៃដែលឈឺ D- មានការខ្មាសអៀន	D
311	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃជម្ងឺមហារីកដោះ ? A- ដុំកំណកឈាម និងកង្វះជីវជាតិ B- ដុំកំណកឈាម ហើមកូនកណ្តុរ និងក្លាយរោគ C- ដុំកំណកឈាម និងសន្លប់បាត់ស្មារតី D- ដុំកំណកឈាម និងកង្វះជាតិទឹកខ្លាំង	B
312	ចូររើសចម្លើយមួយដែលមិនមែនជាមូលហេតុនាំឲ្យស្ត្រីក្រោយពេលវះកាត់មហារីកដោះ លើកដៃឱ្យបានខ្ពស់បន្តិច? A- បន្ថយភាពតឹងនៅកន្លែងវះកាត់ B- បង្កើនចលនាឈាមរត់ C- ការពារការចាស់សរសៃវ៉ែន D- បន្ថយភាពហើមនៅចុងដៃ	D
313	មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យមានការក្លាយរោគនៅក្រោយពេលវះកាត់ដោះលើកលែងតែ៖ A- ជម្ងឺលើសសំពាធឈាម B- វិបត្តិប្រពន្ធការពារមនុស្សចាស់ C- កត្តាសរីរៈរោគ D- ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម	A
314	តើបញ្ហាមួយណាដែលកើតមានហើយតែមិនតម្រូវឱ្យធ្វើការវះកាត់យកស្បូនចេញ ? A- មានដុំក្នុងសាច់ស្បូន B- កូនក្រៅស្បូន C- មហារីកមាត់ស្បូន D- ស្រុតស្បូន	B

315	តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងការថែទាំមុនពេលវះកាត់យកស្បូនចេញ ? A- ផ្តល់ថ្នាំបន្ថន់ឈាមកដល់អ្នកជម្ងឺ B- ងូតទឹកឱ្យអ្នកជម្ងឺ C- ការ និងសំអាតតំបន់វះកាត់ដោយអង់ទីស៊ីបទិក D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
316	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុអាចបណ្តាលឱ្យមានការក្អិតចង្កោរដែលមិនមែនជាការមានផ្ទៃពោះ ? A- ការថប់អារម្មណ៍ដោយការរំជួលចិត្ត B- ការហូបអាហារច្រើន C- ការផឹកទឹកច្រើន D- ការធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លាំងពេក	A
317	តើបញ្ហាមួយណាដែលគេគិតថាជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យមានការអស់កំលាំងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ? A- មានសម្ពាធខ្លាំងសង្កត់ទៅលើព្រោះនោម B- ការក្រហល់ក្រហាយផ្លូវក្រពះនិងពោះវៀន C- ការកើនឡើងនូវកម្រិតរបស់អ័រម៉ូននៅក្នុងខ្លួន D- ការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសការងារ	C
318	តើគិតមានអាយុប្រហែលប៉ុន្មាន ដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដំបូងដឹងបានពីការកំរើករបស់ទារក ? A. ១២ ទៅ ១៤ សប្តាហ៍ B- ១៤ ទៅ ១៦ សប្តាហ៍ C- ១៦ ទៅ ១៧ សប្តាហ៍ D- ១៨ ទៅ ២០ សប្តាហ៍	D
319	តើបន្ទាប់ពីទារកបង្កកំណើតបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ទើបសម្លេងចង្វាក់បេះដូងទារកអាចស្តាប់លឺ ដោយ ប្រើ អ៊ុលត្រាសោន និង ប្រើឌុបផ្ល័រ(Ultrasonic ឬ Doppler) ? A- បង្កកំណើតបាន ១០ - ២០ សប្តាហ៍ B- បង្កកំណើតបាន ៨ - ៩ សប្តាហ៍ C- បង្កកំណើតបាន ៤ - ៧ សប្តាហ៍ D- បង្កកំណើតបាន ២ - ៤សប្តាហ៍	A

320	តើបន្ទាប់ពីចាប់កំណើតបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ទើបគេអាចស្តាប់សម្លេងលឺបេះដូងទារកដោយប្រើស្តេតូស្កូប? A- ១០ ទៅ ១២ សប្តាហ៍ B- ១៤ ទៅ ១៦សប្តាហ៍ C- ១៨ ទៅ ២០ សប្តាហ៍ D- លើសពី២៤សប្តាហ៍	C
321	តើគិតអាយុប្រហែលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ដែលស្ត្រីមានកូនច្រើនដងអាចដឹងពីការកំរើករបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ ? A. ១០ ទៅ ១២ សប្តាហ៍ B- ១២ ទៅ ១៣ សប្តាហ៍ C- ១៤ ទៅ ១៥ សប្តាហ៍ D- ១៦ ទៅ ១៨ សប្តាហ៍	D
322	តើនៅពេលណាដែលស្ត្រីមានគភ៌ អាចច្របាច់ទឹកដោះដំបូង (Colostrum)ចេញបាន? A- អាទិត្យទី ៤ ទៅអាទិត្យទី ៦ នៃការមានផ្ទៃពោះ B- អាទិត្យទី ៧ ទៅអាទិត្យទី ៨ នៃការមានផ្ទៃពោះ C- អាទិត្យទី ៩ ទៅអាទិត្យទី ១១ នៃការមានផ្ទៃពោះ D- អាទិត្យទី ១២ ទៅអាទិត្យទី ១៤ នៃការមានផ្ទៃពោះ	D
323	តើនៅពេលគភ៌ចន្លោះសប្តាហ៍ទីប៉ុន្មាន ដែលជាទូទៅសញ្ញាការក្អួត ចង្កោរ (ចាញ់កូន)ចាប់ផ្តើមឡើង ? A- សប្តាហ៍ទី ១ និង សប្តាហ៍ទី ២ B- សប្តាហ៍ទី ២ និង សប្តាហ៍ទី ៦ C- សប្តាហ៍ទី ១២ និង សប្តាហ៍ទី ២០ D- សប្តាហ៍ទី ២០ និង សប្តាហ៍ទី ៣០	B
324	តើអ្វីម៉ូនសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលអង្គលៀង មានមុខងារផលិតនៅពេលមានគភ៌ ? A- អ៊ីសត្រូហ្សែន B- ប្រូសេស្តេរ៉ូន និង HCG C- Human placenta lactogen D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

325	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃការលូតលាស់ដោះរបស់ស្រ្តីក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ? A- ស្មាមធ្ងន់ៗ នៅលើដោះ B- សសៃឆ្មារៗ លើដោះ C- ធ្វើឱ្យមានសសៃអង្គុញនៅលើដោះ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
326	តើជាការសម្រាលដូចម្តេច ប្រសិនបើការឈឺពោះសម្រាលកើតឡើងមុនរយៈពេល៣៧សប្តាហ៍? A. ការសម្រាលមិនគ្រប់គ្រាន់ B. ការសម្រាលមិនគ្រប់ខែ C. ការសម្រាលមិនគ្រប់លក្ខណៈ D. ការសម្រាលធម្មតា	B
327	តើទារកសម្រាលមិនគ្រប់ខែមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន ? A. តិចជាង ២៥០០ ក្រាម B- តិចជាង ២៨០០ ក្រាម C- តិចជាង ៣០០០ ក្រាម D- តិចជាង ៣៥០០ ក្រាម	A
328	តើមាត់ស្បូនមានលក្ខណៈដូចម្តេច ក្នុងការពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើការឈឺពោះសម្រាលមិនគ្រប់ខែ ? A- មាត់ស្បូនរួញប្រមាណ ៥០ % បើកបាន ២ សម B- មាត់ស្បូនរួញប្រមាណ ៦០ % បើកបាន ២ សម C- មាត់ស្បូនរួញប្រមាណ ៧០ % បើកបាន ២ សម D- មាត់ស្បូនរួញប្រមាណ ៨០ % បើកបាន ២ សម	D
329	តើឱសថណាមួយដែលបន្ថយការកន្ត្រាក់ស្បូនពេលឈឺពោះសម្រាលមិនគ្រប់ខែ? A. Spasfon B. Buscopan C. Salbutamol D. Diazepam	C

330	តើគភីមានអាយុប៉ុន្មានថ្ងៃ ដែលចាត់ទុកថា លើសខែ ? A- ២៦៤ ថ្ងៃ គិតពីរដូវចុងក្រោយ B- ២៧៤ ថ្ងៃ គិតពីរដូវចុងក្រោយ C- ២៨៤ ថ្ងៃ គិតពីរដូវចុងក្រោយ D- ២៩៤ ថ្ងៃ គិតពីរដូវចុងក្រោយ	D
331	តើបញ្ហាអ្វីខ្លះរបស់ម្តាយដែលធ្វើឱ្យចង្វាក់បេះដូងទារកកើនឡើង ? A- ជម្ងឺគ្រុនក្តៅ B- លើសសម្ពាធឈាម C- ទឹកភ្លោះមានការបង្ករោគ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
332	ដូចម្តេចដែលហៅថាកូនភ្លោះ Monozygote ? A. កូនភ្លោះដែលមាន Ovule ២ បំបែកខ្លួនជា២ B. កូនភ្លោះដែលមាន Ovule ១ បំបែកខ្លួនជា២ C. កូនភ្លោះដែលមាន Ovule ២ + Spermatozoide ២ D. កូនភ្លោះដែលមាន Ovule ១ + Spermatozoide ២	B
333	ដូចម្តេចដែលហៅថាកូនភ្លោះ Dizygote? A. កូនភ្លោះដែលមាន ពងព្រី ២ បំបែកខ្លួនជា២ B. កូនភ្លោះដែលមាន ពងព្រី ១ បំបែកខ្លួនជា២ C. កូនភ្លោះដែលមាន ពងព្រី ២ និង មេជីវិតឈ្មោល ២ D. កូនភ្លោះដែលមានពងព្រី ១ និង មេជីវិតឈ្មោល ២	C
334	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃការសម្រាលកូនភ្លោះ ដែលកូនទី១ បង្ហាញគូថ និងកូនទី២បង្ហាញក្បាល? A- ធ្លាក់ឈាម B- ថ្កក់ចង្កា C- ជាប់ស្បុក D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

335	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុនៃការឈឺចាប់ដែលបណ្តាលមកពីមានដុំសាច់នៅដៃស្បូន ? A. ដុំនោះធំទាញបិទដៃស្បូន B- ដុំសង្កត់ទៅលើពោះវៀន C- ដុំរមូល ឬ បែក D- ដុំនោះសង្កត់ទៅលើព្រោះនោម	C
336	តើបញ្ហាមួយណាដែលអ្នកត្រូវគិតដល់ចំពោះស្ត្រីមានគភ៌នៅត្រីមាសទី១ ឈឺពោះខ្លាំង មានឆ្លាក់ឈាមតិចៗ មាត់ស្បូនបិទជិត មានដុំដៃស្បូន ? A. ដុំដៃស្បូនរមូល B- គំរាមរលូត C- រលាកខ្លែងពោះវៀន D- គភ៌ក្រៅស្បូន	D
337	តើបរិមាណទឹកភ្លោះប៉ុន្មានដែលគេចាត់ទុកថាច្រើនមិនធម្មតានៅពេលគ្រប់ខែ ? A- ៨០០មល B- ១០០០មល C- ១៥០០មល D- ៣០០០មល	C
338	តើនៅពេលណាដែលគេត្រូវរក្សាដុំដៃស្បូនរបស់ស្ត្រីមានគភ៌ ដើម្បីជៀសវាងនូវផលវិបាក? A. ត្រីមាសទី ១ B- ត្រីមាសទី ២ C- ត្រីមាសទី ៣ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	B
339	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះចំពោះអ្នកជម្ងឺស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ? A. បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅជិតបំផុត B- ផ្តល់ថ្នាំជាតិដែក១គ្រាប់រយៈពេល១៤ថ្ងៃ C- ផ្តល់ថ្នាំជាតិដែក២គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងផ្តល់អាហារដែលសំបូរជាតិដែក D- ផ្តល់សេរ៉ូម Lactate Ringer	A

340	តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យអាចដឹងថាមានទឹកភ្លោះច្រើន ? A- ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយគោះលើពោះ B- ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយការស្ទាបចុចលើពោះមួយចំហៀង C- ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយការស្ទាបឃើញពោះឡើងតឹង ហើយធំ D- ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយគោះនៅចំហៀងពោះម្ខាងទៀត	D
341	តើបរិមាណទឹកភ្លោះប៉ុន្មានដែលគេចាត់ទុកថាមានចំណុះតិច ? A. ១០០- ២០០ មល B- ២០០- ៣០០ មល C- ៣០០- ៥០០ មល D- ៦០០- ៧០០ មល	C
342	តើអ្វីខ្លះជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមានភាពស្លេកស្លាំង ដែលកើតមានញឹកញាប់ចំពោះស្ត្រីមានគភ៌កូនភ្លោះ ? A. កង្វះជាតិដែក និងអាស៊ីតហ្វូលិក B- សំរាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ C- កង្វះអនាម័យ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
343	តើអ្វីខ្លះជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យមានការលើសសម្ពាធឈាមញឹកញាប់ចំពោះស្ត្រីគគីកូនច្រើន? A- ទម្ងន់កូនសង្កត់លើសរសៃឈាមម្តាយ B- ម្តាយបរិភោគអាហារមានជាតិប្រៃពេក C- ផ្ទៃរបស់សុភព័ ឬជាតិអ័រម៉ូនកើនច្រើន D- ម្តាយធ្វើការច្រើន ឬពុំបានសម្រាក	B
344	តើអ្នកត្រូវផ្តល់ជាតិដែក និងអាស៊ីតហ្វូលិកយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអ្នកដើម្បីស្លេកស្លាំងកម្រិតស្រាល ឬមធ្យម (នៅមណ្ឌលសុខភាព)? A. ផ្តល់១គ្រាប់១ថ្ងៃរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ B- ផ្តល់២គ្រាប់១ថ្ងៃ ព្រឹក១ ល្ងាច១ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ C- ផ្តល់២គ្រាប់១ថ្ងៃ ព្រឹក១ ល្ងាច១ រយៈពេល ៤២ថ្ងៃ D- ផ្តល់២គ្រាប់១ថ្ងៃ ព្រឹក១ ល្ងាច១ រយៈពេល ៩០ថ្ងៃ	A

345	ស្បូនពីរកន្លាក់គឺជាការកន្លាក់រឹងជាប់ជាកងរឹតនៅព្រំដែនរវាងផ្នែក៖ A. ខាងក្រោមនៃអង្កត់ក្រោមរបស់ស្បូន (lower Segment) B- ខាងលើនៃអង្កត់ក្រោមរបស់ស្បូន (lower Segment) C- កំពូលស្បូន និងមាត់ស្បូន D- ចង្កេះស្បូន និងមាត់ស្បូន	B
346	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកចំពោះម្តាយដែលបណ្តាលមកពីការឈឺពោះសម្រាលរហ័សពេក ? A- ការរំហែកស្បូន និងបើរីណេ B- សល់កំទេចសុក C- ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
347	តើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាកត្តាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ចំពោះគភ៌លើសខែ ? A- ស្ត្រីកូនដំបូងអាយុចាប់ពី៣៥ឆ្នាំឡើង B- ស្ត្រីជក់បារីច្រើន C- ស្ត្រីមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម D- ស្ត្រីមានកំពស់ទាប	D
348	តើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាផលវិបាកនៃគភ៌ដែលមានទឹកភ្លោះច្រើនហួស ? A. ធ្លាក់ទងសុកមកមុនទម្រង់ B- បែកស្រោមទឹកភ្លោះមុនពេលកំណត់ C- ទារកមានទំហំធំពេក D- ឈឺពោះសម្រាលមិនគ្រប់ខែ	C
349	តើនៅពេលណាដែលគេត្រូវចាប់ផ្តើមបន្ថែមហ្វូលីកអាស៊ីត ៤០០មក្រ ចំពោះម្តាយដើម្បីការពារកុំឱ្យមានការខូចខាតប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាលរបស់ទារក ? A. ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី១នៃគភ៌ B- ក្រោយត្រីមាសទី១នៃគភ៌ C- ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី២នៃគភ៌ D- ក្រោយត្រីមាសទី២នៃគភ៌	A

350	តើសារធាតុអ្វីមួយដែលរារាំងដល់ការបឺតស្រូបជាតិដែកមិនបានល្អ ? A- សាច់ក្រហម B- តែ និងការហ្វូ C- ជីវជាតិសេ D- ជាតិប្រូតេអ៊ីន	B
351	តើការថយចុះនៃចលនាបំរះរបស់ទារកបញ្ជាក់អំពីអ្វី ចំពោះគភ៌លើសខែ ? A. ការឈឺពោះសម្រាលជិតមកដល់ B- ការរលើសសុកមុនសម្រាល C- ភាពខូចខាតនៃមុខងារសុក D- លំហនៃស្បូនតូចពេក	C
352	តើការបំរះរបស់ទារកមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងករណីមានការខូចមុខងារនៃសុក ? A. តិចជាង ៨ ដងក្នុងអម្បូង១២ម៉ោង B- តិចជាង ១០ដងក្នុងអម្បូង១២ម៉ោង C- តិចជាង ២៤ដងក្នុងអម្បូង២៤ម៉ោង D- តិចជាង ៣០ដងក្នុងអម្បូង២៤ម៉ោង	B
353	តើស្ត្រីធ្លាក់ឈាមប្រភេទណាខ្លះដែលយើងគួរតែផ្តល់ថ្នាំជាតិដែក និងអាស៊ីតហ្វូលិកព្យាបាលរយៈពេល២ខែ ? A- ធ្លាក់ឈាមល្មម B- ធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ C- ធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរបំផុត D- គ្រប់ករណី	A
354	តើទឹកចំណុះប៉ុន្មានដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវផឹកឱ្យបានយ៉ាងតិច ដើម្បីបង្ការការបង្កពេកនៅផ្លូវនោម ? A. ១០០០ម.ល /២៤ម៉ោង B- ២០០០ម.ល /២៤ម៉ោង C- ៣០០០ម.ល /២៤ម៉ោង D- ៤០០០ម.ល /២៤ម៉ោង	C

355	តើដោយសារអ្វីទើបជម្ងឺរបេងអាចឆ្លងទៅទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាន? A. ទារកមានលក្ខណៈមិនធម្មតា B- ទារកលេបទឹកភ្លោះ C- ទារកខ្សោយ D- ទារកចង្វាក់បេះដូងញាប់	B
356	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃជម្ងឺ Pyelonephritis ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- ធ្លាក់ឈាមពេលសម្រាលកូន B- សម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែ C- ឈឺពោះសម្រាលយូរ D- កូនមានលក្ខណៈមិនធម្មតាពីកំណើត	B
357	តើនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវព្យាបាលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានកើតជម្ងឺរបេង ? A. ព្យាបាលភ្លាម B- ក្រោយពេលកើត C- មុនពេលកើតបន្តិច D- ពេលណាមួយសមស្រប	B
358	តើជម្ងឺអ្វីខ្លះបង្កដោយChlamydia ដែលឆ្លងទៅទារកក្រោយកើតភ្លាម ? A. រលាកភ្នែក និងរលាកសួត B- រលាកផ្លូវដង្ហើម C- រលាកស្បែក D- រលាកបំពង់កធ្ងន់ធ្ងរ	A
359	តើពពួកមេរោគមួយណាដែលបង្កឱ្យមានជម្ងឺស្លូត Rubella ? A- ពពួកបាក់តេរី B- ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត C- ពពួកវីរុស D- ពពួកផ្សិត	C

360	តើជម្ងឺ Trichomonas នៅប្រដាប់បន្តពូជ ឆ្លងតាមរយៈអ្វី ? A. ការរួមភេទ B- ការប្រើប្រាស់បង្គន់រួម C- ការបញ្ចូលឈាម D- តាមទឹកមាត់	A
361	តើសារធាតុអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅពេលព្យាបាលដោយ Metronidazol ? A. កាហ្វេ B- ស្រា C- ទឹកដោះគោ D- ទឹកតែ	B
362	តើទារកនឹងអាចកើតជម្ងឺអ្វី ប្រសិនបើគេប្រសូតពីម្តាយដែលកើតជម្ងឺ Candida ? A- ជ្រាំងក្នុងមាត់ B- ដំបៅកញ្ចក់ភ្នែក C- រលាកកញ្ចក់ភ្នែក D- ភ្នែកឡើងបាយ	A
363	តើឱសថអ្វីដែលគេប្រើក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺស្វាយនៅដំណាក់កាលទី១ ? A. Gentamycin B- Penicillin C- Metronidazol D- Quinolone	B
364	តើជម្ងឺប្រមេៈ Gonorrhea ឆ្លងតាមរយៈអ្វី? A. ការប្រើប្រាស់ទឹក B- ការប្រើបង្គន់អត់អនាម័យ C- ការរួមភេទ D- តាមខ្យល់និងទឹកមាត់	C

365	តើជម្ងឺអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យជម្ងឺប្រមេ: Gonorrhea រាតត្បាតនៅប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តី ? A- រលាកទ្វារមាស B- រលាកមាត់ស្បូន C- រលាកអាងត្រគាក D- រលាកតូស្បូន	C
366	តើបញ្ហាអ្វីនឹងកើតមានចំពោះទារកដែលកើតពីម្តាយដែលមានជម្ងឺប្រមេ:នៅពេលសម្រាល ? A. រលាកភ្នែក B- រលាកផ្លូវដង្ហើម C- ជ្រាំងមាត់ D- រូបរាងមិនធម្មតា	A
367	តើរយៈពេលសម្លាប់ជម្ងឺប្រមេ: មានប៉ុន្មានសប្តាហ៍? A. ១- ២សប្តាហ៍ B- ២- ៣សប្តាហ៍ C- ១- ៣សប្តាហ៍ D- ៣- ៤សប្តាហ៍	C
368	តើត្រូវរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមប៉ុន្មាន ដើម្បីបង្ការផលវិបាកដល់ម្តាយ និង កូននៅពេលមាន ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ? A- ៦០- ១២០ ម.ក្រ/១ដ.ល/២៤ម៉ោង B- ១២០- ១៣០ ម.ក្រ/១ដ.ល/ ២៤ម៉ោង C- ១៣០- ១៤០ ម.ក្រ/១ដ.ល/ ២៤ម៉ោង D- ១៥០ - ១៨០ ម.ក្រ/១ដ.ល/ ២៤ម៉ោង	A