

សំណួរមានចម្លើយជ្រើសរើសច្រើន

1	ឆ្មបបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណកំពូលស្បូន(ការវិវត្តរបស់ស្បូន) ចំពោះស្ត្រីក្រោយសម្រាល ក្នុងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តលើទម្រង់ការនេះ ឆ្មបត្រូវតែដូចម្តេចដែលហៅថាការថែទាំក្រោយពេលសម្រាល (Puerperium)? A- ពី៦ម៉ោងបន្ទាប់ពីសម្រាលរហូតដល់ស្ត្រីចេញពីមន្ទីរពេទ្យ B- ចាប់ពី១០ថ្ងៃរហូតដល់២៨ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្រាល C- ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសម្រាលសុកនិងកំទេចសុករួច ហើយបន្តរហូតទៅដល់៦សប្តាហ៍ D- ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសម្រាលសុកនិងកំទេចសុករហូតដល់១៤ថ្ងៃ	C
2	តើសំណើណាមួយដែលមិនមែនជាគោលបំណងចម្បងនៃការថែទាំរបស់ឆ្មបទៅលើទារកទើបកើត? A- ពិនិត្យ និងតាមដានសុខភាពរបស់មាតា B- ពិនិត្យ និងតាមដានសុខភាពទារក C- ផ្តល់ការជួយគាំទ្រ និងណែនាំពីវិធីបំបៅដោះនិងមើលថែទារក D- ផ្តល់ការជួយគាំទ្រ និងណែនាំពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍	D
3	សំណើណាមួយដែលជាគ្រោះថ្នាក់នៃការស្វះសរសៃឈាមស្លូតនៅក្រោយពេលសម្រាលលើកលែងតែ៖ A- កំណកឈាមនៅក្នុងសរសៃវ៉ែនជ្រៅ B- ការសម្រាលដោយរះកាត់ C- ការសម្រាលតាមទ្វារមាស D- ជំងឺធាត់	C
4	តើសំណើណាមួយដែលមិនមែនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យម្តាយសន្លប់ក្នុង២៤ម៉ោងបន្ទាប់ពីសម្រាលដោយមិនមានការធ្លាក់ឈាម? A- ស្បូនពន្លាត់ B- ទឹកភ្លោះជ្រាបចូលសរសៃឈាម C- ការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល D- សុករបេះមុនកូនកើត	D

5	ស្រ្តីមានការធ្លាក់ឈាម៣ទៅ៤ម៉ោងក្រោយពេលសម្រាល តើឆ្លុបត្រូវពិនិត្យរកមើលអ្វី? A- មានការហែកទ្វារមាសកម្រិតទី២ B- ចង្វាក់បេះដូងម្តាយដើរញាប់ C- មានការពន្លាត់ស្បូន D- មានការហែកទ្វារមាសកម្រិតទី៣	B
6	ឆ្លុបត្រូវគិតទៅដល់ការបង្ករោគក្រោយសម្រាល ប្រសិនបើស្រ្តីរៀបរាប់ថាគាត់មាន៖ A- ការឈឺក្បាលខ្លាំង B- ការចុកទ្រូង C- ការឈឺក្នុងពោះ D- ការឈឺចាប់ក្នុងខ្លួន	C
7	តើភាពអស់កំលាំងរ៉ាំរ៉ៃបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួចអាចបណ្តាលមកពីអ្វី? A- ឆាប់ធ្វើការងារតិចតួចក្នុងផ្ទះ B- បំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយ C- មិនមានជាសុខភាពនៅសាច់ដុំបើរំលោ D- កង្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម	D
8	ក្រោយពេលសម្រាលបើស្រ្តីមិនអាចនោមបាន តើឆ្លុបត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានយ៉ាងដូចម្តេច? A- សុងទឹកនោម B- ស្រោចទឹកក្តៅអ៊ុនៗលើទ្វារមាស C- បំបៅដោះកូន D- ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន	B
9	តើកន្លែងមួយណាដែលរងសម្ពាធជាងគេក្នុងករណីដាក់អ្នកជម្ងឺក្នុងស្ថានភាពដេកជ្រាវ(super position) ? A- កែងជើងទាំងសងខាង B- ក្បាលឆ្អឹងទ្រតាក C- កែងដៃទាំងសងខាង D- ឆ្អឹងកញ្ចាញតូច	D

10	តើកន្លែងណាមួយដែលរងសម្ពាធជាងគេក្នុងករណីដាក់អ្នកជម្ងឺក្នុងស្ថានភាពដេកផ្តាប់មុខ(prone position)? A- ក្បាលជង្គង់សងខាង B- ត្រចៀក C- មុខ D- ក្បាលឆ្អឹងត្រចៀក	A
11	តើកន្លែងណាមួយដែលរងសម្ពាធជាងគេក្នុងករណីដាក់អ្នកជម្ងឺក្នុងស្ថានភាពដេកផ្ទៀង(lateral position)ក្នុងម៉ូប្រហែល៣០អង្សា? A- ជង្គង់ផ្នែកចំហៀងខាងក្រៅ B- ក្បាលឆ្អឹងត្រចៀក C- ស្មាផ្នែកខាងក្រៅ D- ឆ្អឹងជំនីផ្នែកចំហៀងខាងក្រៅ	B
12	តើក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចប៉ុន្មានម៉ោងម្តងដែលអ្នកត្រូវប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញពីកត្តាប្រឈមមុខនឹងដំបៅត្រចៀកពោះអ្នកជម្ងឺសន្លប់បាត់ស្មារតីម្នាក់? A- ១២ម៉ោងម្តង B- ២៤ម៉ោងម្តង C- ៣៦ម៉ោងម្តង D- ៤៨ម៉ោងម្តង	D
13	ហេតុអ្វីបានជាគេហាមមិនឱ្យឈ្លីនៅត្រង់កន្លែងដែលស្បែកឡើងក្រហមឬកន្លែងដែលស្បែកប្រែពណ៌នៅតំបន់ដែលកំពុងរងសម្ពាធទីព្រោះវាបណ្តាលឱ្យ៖ A- ខូចខាតជាលិការងាយ B- ដាច់រលាត់ស្បែក C- ខូចខាតសរសៃឈាមដែលនៅខាងក្រោមស្បែក D- ខូចខាតជាលិកាដែលកំពុងដុះលូតលាស់	A

14	តើអ្វីជាជំហានដំបូងនៃការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអ្នកជម្ងឺដំបៅគ្រែ? A- កម្រិតនៃការឈឺចាប់ B- សភាពសើមនៃបំពង់សីប៉ង់ C- សភាពដំបៅ D- កម្រិតនៃភាពសុខស្រួលនិងតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ	D
15	តើអ្វីមួយជាភាគីនិច្ច័យថែទាំនៃការព្យាបាលដំបៅគ្រែ? A- ការឈឺចាប់ B- ការឡើងកំដៅរាងកាយ C- ការប្រឈមមុខនឹងការខូចខាតផ្ទៃស្បែក D- ការប្រឈមមុខនឹងការបង្កពេក	A
16	តើបន្ទះស្បែកមួយណាដែលបិតស្រូបទឹករំង (exudate) ពីមុខរបួសបានល្អជាងគេ? A- បន្ទះស្បែក Hydrocolloid B- បន្ទះស្បែក Hydrogel C- បន្ទះស្បែក Hypoallergenic D- បន្ទះស្បែក Calcium alginate	D
17	តើអ្នកត្រូវដឹងពីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេមុនពេលអ្នករៀបចំអាហារដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកជម្ងឺ? A- ប្រភេទអាហារដែលអ្នកជម្ងឺចូលចិត្ត B- សាសនានិងវប្បធម៌ដើម C- អាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ D- បរិមាណអាហារដែលត្រូវផ្តល់	B
18	តើជាភាគសញ្ញានៃកង្វះសារជាតិអ្វីពេលណាបបូរមាត់ឡើងក្រហមហើមហើយមានស្នាមប្រេះតូចៗ? A- Niacin ,B6 B- Niacin, B2, Fe C- Niacin, B6, B2, Fe D- Niacin, B2, Fe, B6, B12	C

19	ស្ត្រីម្នាក់បានចូលមកសម្រាកពេទ្យដោយមានការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស តាមការពិនិត្យឃើញសំពាធឈាមស៊ីស្ទូលីកតិចជាង៩០មមបារត និងមានដីពចេញបំបើយខ្សោយស្ត្រីមានសភាពឡេះឡះ តើសញ្ញាទាំងនេះបញ្ជាក់ថាជាសញ្ញាអ្វី? A- សញ្ញាប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ B- សញ្ញាស្លេកស្លាំងខ្លាំង C- សញ្ញាស្លុក D- សញ្ញាបំរុងប្រកាច់	C
20	ក្នុងពេលស្តុកកើតឡើងការគ្រប់គ្រងជំហានដំបូងបង្អស់ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ស្រែករកជំនួយជាបន្ទាន់ B- យកសញ្ញាជីវិត C- ដាក់ស្រីឲ្យដេកផ្អៀង D- ដាក់សេរ៉ូម	A
21	ដើម្បីគ្រប់គ្រងមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្តុក តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- ពិនិត្យពីស្ថានភាពស្តុក B- ធ្វើតេស្តឈាម C- រកឲ្យឃើញមូលហេតុនៃស្តុក D- ចាប់ផ្តើមបញ្ចូលសេរ៉ូម	D
22	ចំពោះការបង្កពេទ្យជាមូលហេតុនៃស្តុក តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ចាប់ផ្តើមបញ្ចូលឈាម និងជំរាបគ្រូពេទ្យ B- ផ្តល់សារធាតុរាវតាមគំរូការ និងធ្វើតេស្តឈាម C- ផ្តល់សារធាតុរាវ និងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្ត D- យកឈាមទៅវិភាគ និងផ្តល់អង់ទីប៊ីយោទិក	D
23	បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងស្តុកហើយ តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីបន្ត? A- ជំរាបគ្រូពេទ្យពីស្ថានភាពជំងឺ B- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពជំងឺ C- បន្តផ្តល់សារធាតុរាវ D- រៀបចំផែនការថែទាំបន្ត	B

24	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយពីលក្ខណៈរបស់ទឹកដោះដំបូង(Colostrums)មានសភាពដូចម្តេច? A- មានពណ៌សថ្លា B- ពណ៌លឿងថ្លា C- ពណ៌សខាប់ D- ពណ៌លឿងចាស់	B
25	ឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយ តើទឹកដោះដំបូង(Colostrums)មាននៅដំណាក់កាលណា? A- មានក្នុងទឹកដោះម្តាយរាល់ពេល B- មានក្នុងទឹកដោះម្តាយនៅត្រីមាសទី៣ C- មានក្នុងទឹកដោះដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាល D- មានក្នុងទឹកដោះចុងក្រោយរបស់ម្តាយ	C
26	តើឆ្មបត្រូវណែនាំម្តាយឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរបៀបណាក្នុងការបំបៅកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? A- ម្តាយអង្គុយឲ្យត្រង់ឬផ្អែកទៅក្រោយ B- ម្តាយដើរឬបណ្តើរឲ្យទារកបៅបណ្តើរ C- ម្តាយអង្គុយឲ្យត្រង់ ពេលបំបៅសំលឹងមើលទារក D- ម្តាយដេកថ្ងារឲ្យទារកដេកបៅពីលើ	C
27	បើស្ត្រីមិនក្នុងដំណាក់កាលយឺតលើសពី៨ម៉ោង តើឆ្មបត្រូវវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច? A- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតទៅលើមាត់ស្បូន B- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតរបស់ទារក C- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតទៅលើការបង្កពេក D- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាលដល់ស្ត្រីដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន	A
28	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ម្តាយមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅពេលបំបៅកូនមិនបានល្អ? A- មានជំងឺលៀសដោះនិងប្រះចុងដោះ B- ទារកលូតលាស់មិនបានល្អ C- ទារកឈឺញឹកញាប់ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A

29	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ម្តាយ តើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែលបញ្ជាក់ពីការស្ទុះបំពង់ទឹកដោះ? A- ដោះឡើងពណ៌ក្រហម B- ដោះឡើងរឹង ក្រហមនិងមានគ្រុនក្តៅ C- ដោះមានសភាពឡើងជុំនិងឈឺអួលៗគ្មានកំដៅ D- ដោះមានរឹងដោយកន្លែង និងមានការឈឺចាប់	C
30	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីព្យាបាលក្បាលដោះលិបចូលក្នុង(ដោះខ្វាក់)? A- ច្របាច់ទឹកដោះដាក់ពែង B- ប្រើសីរ៉ាំងបូមក្បាលដោះ C- យកស្បែកខ្លាញ់គ្របពីលើដោះ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
31	ក្នុងការថែទាំជំងឺរលាកដោះ ជាលើកដំបូង តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ B- ធ្វើឲ្យទឹកដោះហូរចេញល្អ C- ស្តុកដាក់លើដោះ D- ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	B
32	បន្ទាប់ពីសម្រាល ឆ្មបដាក់ទារកស្បែកប៉ះស្បែកម្តាយដោយបំបៅផង តើត្រូវប្រាប់ម្តាយដើម្បីអ្វី? A- ជំរុញឲ្យសុកឆាប់ធ្លាក់ កាត់បន្ថយការធ្លាក់ឈាម B- ជំរុញការផលិតទឹកដោះនិងផ្តល់កំដៅដល់ទារក C- ជួយឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់និងបន្ថយការឈឺចាប់ D- ជំនួយដល់អារម្មណ៍ទារក	B
33	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ម្តាយដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីបង្កើនការផលិតទឹកដោះ? A- ច្របាច់ទឹកដោះឲ្យបានញឹកញាប់ B- បំបៅកូនឲ្យបានញឹកញាប់ ជាពិសេសនៅពេលយប់ C- ដាក់ទារកបៅផ្អឹបឲ្យបានល្អ D- ម្តាយញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន	B

34	តើម្តាយប្រភេទណាដែលយើងចាំបាច់ជួយគាត់ក្នុងការបំបៅកូន? A- ម្តាយសម្រាលកូនមិនគ្រប់គ្រាន់ B- ម្តាយមានជំងឺដោះតូចៗ C- ម្តាយមានការពិបាកក្នុងការបំបៅឬម្តាយថ្មី D- ម្តាយចូលចិត្តបៅកូនដោយទឹកដោះគោ	C
35	តើត្រូវប្រាប់ម្តាយឲ្យធ្វើដូចម្តេចយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលដែលមានជំងឺលៀសដោះ? A- ជួយច្របាច់ទឹកដោះម្តាយដោយដៃ B- ស្ត្រីដោយដាក់ស្បែកនៅលើដោះ C- ស្ត្រីដោយដាក់ស្បែកជាក់នៅលើដោះ D- ឲ្យផ្ទាំបំបាត់ការហើមដោះ	C
36	តើសកម្មភាពមួយណាមិនមែនដែលជាវិធីសាស្ត្រជួយរំញោច ដល់Hormoneoxytocine ? A- ការញោចលើក្បាលដោះ B- ម៉ាស្សាដោះដោយសំភារៈជំនួយ C- ម្តាយច្របាច់ដោះខ្លួនឯងស្រាលៗ D- ញាំភេសជ្ជៈក្តៅខ្លាំងៗ	B
37	នៅពេលដែលស្ត្រីមានជំងឺបួសដោះ តើមានវិធីណាដែលត្រូវណែនាំដល់ស្ត្រីដែលកំពុងបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ? A- បន្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ B- ម្តាយច្របាច់ដោះខ្លួនឯងស្រាលៗដើម្បីបង្កឱ្យខ្ទុះ C- បញ្ឈប់ការបៅដោះកូន នៅពេលដោះម្តាយមានខ្ទុះ D- ពាក់អាវទ្រដោះដើម្បីកុំឲ្យឈឺដោះ	C
38	តើក្នុងទឹកដោះសិប្បនិម្មិតគ្មានសមាសធាតុមួយណា? A- ជាតិស្ករ B- ភាពស្អាត C- វីតាមីន D- ប្រូតេអ៊ីន	B

39	តើត្រូវណែនាំអ្តាយក្នុងឲ្យច្របាច់ដោះម្ខាងៗ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន? A- ១- ២នាទី B- ៣- ៥នាទី C- ៦- ១០នាទី D- ១១- ១៥នាទី	B
40	តើអ្តាយច្របាច់ទឹកដោះទុកឲ្យទារកចៅចាំបាច់ នៅពេលណា? A- អ្តាយមានជំងឺ B- អ្តាយសម្រាលដោយរះកាត់ C- ទារកមានទំងន់ទាបនិងមិនគ្រប់ខែ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
41	តើត្រូវប្រាប់អ្តាយពីរបៀបយ៉ាងដូចម្តេច ដែលអាចរក្សាទឹកដោះអ្តាយទុកឲ្យទារកចៅ? A- រយៈពេលយ៉ាងយូរ៨ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតា B- រយៈពេលយ៉ាងយូរ១០ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតា C- រយៈពេលយ៉ាងយូរ១២ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតា D- រយៈពេលយ៉ាងយូរ១៨ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតា	A
42	តើត្រូវណែនាំអ្តាយក្នុងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះអ្តាយឲ្យបានយូររហូតដល់ទឹកដោះចុងក្រោយសម្រាប់ការលូតលាស់ទារក? A- ទឹកដោះចុងក្រោយសំបូរសារជាតិស្ករ B- សំបូរសារជាតិវីតាមីន C- សំបូរសារជាតិប្រូតេអ៊ីន និងខ្លាញ់ D- សំបូរសារជាតិទឹក	C
43	តើវីតាមីនអ្វីដែលមានក្នុងទឹកដោះអ្តាយបានជួយអ្វីដល់ទារក? A- ការលូតលាស់ខួរក្បាល B- ការពារជំងឺស្លូតភ្នែកឬខ្នាត់មាត់ C- ការពារភាពក្រិនក្រិន D- បង្ការជំងឺតាមផ្លូវដង្ហើម	B

44	ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្ទាបដឹងចរាចរភ្នែក គេត្រូវ A- ឆ្លើយក្បាលឡើងបន្តិច B- ពេញស្មារឡើងបន្តិច C- ងាកក្បាលមកឆ្វេងឬមកស្តាំបន្តិច D- ចម្លើយ ក និង គ ត្រឹមត្រូវ	D
45	នៅតំណាក់កាលមុនៗកាត់តើបុគ្គលិកថែទាំ ត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកជំងឺ B- កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ C- ធ្វើតំរោងផែនការថែទាំ D- ប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺ	D
46	ដើម្បីបង្រៀនអ្នកជម្ងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តើឆ្មបត្រូវដឹងពីអ្វី? A- ការយល់ដឹងរបស់អ្នកជម្ងឺ B- សភាពទូទៅនៃអ្នកជម្ងឺ C- បង្ហាត់អ្នកជម្ងឺ ឲ្យចេះបន្ថយការឈឺចាប់ D- ផ្តល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជម្ងឺ	A
47	ហេតុអ្វីបានជាតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺក្រោយៗកាត់ ធ្វើលំហាត់ដំណកដង្ហើមវែងៗ? A- ជួយដល់ការបញ្ចេញស្បូន B- ជួយដល់ការដកដង្ហើមបានស្រួល C- ជួយដល់ដំណើរឈាមរត់បានល្អ D- ជួយដល់ការរំលាយអាហារ	B
48	ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជំរុញឲ្យអ្នកជម្ងឺប្រឹងក្អក ក្រោយពេលៗកាត់ ? A- ជួយក្នុងការបញ្ចេញស្បូន B- ជួយដល់ការដកដង្ហើមបានស្រួល C- ជួយឲ្យលេបអាហារបានស្រួល D- ដើម្បីកុំឲ្យមានការរលាកបំពង់ ក	A

49	អ្នកជម្ងឺហាមមិនឲ្យដក់បារីនៅពេលមុននិងក្រោយវះកាត់ព្រោះអ្វី? A- វាបណ្តាលឲ្យរលាកផ្លូវដង្ហើម B- ការផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នមិនបានល្អ C- នាំខាតថវិការក្នុងទីញបារី D- មានក្លិនមាត់មិនល្អ	B
50	ក្នុងការពិនិត្យកាយសម្បទារបស់អ្នកជម្ងឺមុនពេលវះកាត់ត្រូវពិនិត្យលើអ្វីខ្លះ? A- ស្ថានភាពចំណីអាហារអេលិកត្រូលីត្រ B- តុល្យភាពអេលិកត្រូលីត្រ C- មានរបស់អ្នកជម្ងឺ D- ចម្លើយ កនិងខ ត្រឹមត្រូវ	B
51	តើការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍រាល់មុនពេលវះកាត់មានអ្វី? A- វិភាគទឹកនោម និងវិភាគឈាម B- រាប់គ្រាប់ឈាមក្រហមនិងអេម៉ូក្លូប៊ីន C- វិភាគអេម៉ាតូគ្រីតនិងក្រេអាទីនីន D- ពិនិត្យមុខងាររបស់ថ្លើម	A
52	បើអ្នកជម្ងឺហូប មិនបានគ្រប់គ្រាន់តាមមាត់តើត្រូវផ្តល់អ្វីបង្គាប់? A- បញ្ចូលស្បែកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ B- បញ្ចូលបបររោតតាមស្តង់ដារក្រពះ C- បញ្ចូលពពួកប្លាស្ទាតាមសរសៃ D- ផ្តល់សារជាតិប្រូតេអ៊ីនខាប់និងគ្លុយកូស	B
53	តើគិលានុបដ្ឋាក- យិកាបន្ទប់វះកាត់ត្រូវដាក់ស្ថានភាពអ្នកជម្ងឺឲ្យត្រូវពេទ្យវះកាត់យ៉ាងដូចម្តេច? A- ដាក់ក្នុងស្ថានភាពដំណេកថ្ងា B- ដាក់ស្ថានភាពផ្អែកតាមប្រភេទវះកាត់ C- ដាក់ស្ថានភាពថ្ងាភ្នាលខ្ពស់បន្តិច D- ដាក់ស្ថានភាពដំណេកថ្ងាសុវត្ថិភាព	B

54	ក្រោយការវះកាត់ភ្លាមៗត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ សញ្ញានានា ដូចខាងក្រោម លើកលែងតែ A- តាមដានសញ្ញាជីវិត B- តាមដានសញ្ញានៃការហូរឈាម C- តាមដានសំពាធឈាម ៥នាទីម្តង D- តាមដានបំពង់បង្ហូរផ្សេងៗ	D
55	ក្រោយការវះកាត់ភ្លាមៗ អ្នកជម្ងឺមានការចុះថយនូវចលនាពោះវៀនដោយសារអ្វី? A- ដោយសារ ថ្នាំសណ្តា B- ដោយសារថ្នាំបំបាត់ការចុកចាប់ C- ដោយសារឈឺចាប់ខ្លាំងពេក D- ដោយសារអ្នកជម្ងឺគ្មានចលនា	A
56	ចាប់ផ្តើម២៤ម៉ោងក្រោយវះកាត់ការឈឺចាប់បណ្តាលមកពី A- ការកកិតនឹងបំពង់បង្ហូរ B- បង់ស៊ីម៉ង់ត៍ពេក C- ឈឺមុខកន្លែងវះកាត់ D- ក្លាយរោគនៅកន្លែងវះ	D
57	ចាប់ពី២៤ម៉ោងក្រោយការវះកាត់ទៅ ត្រូវកត់ត្រាក្នុងសន្លឹកតាមដានការឈឺចាប់ដូចខាងក្រោម លើកលែងតែ A- ទឹកន្លែងឈឺចាប់ B- កំរិតនៃការឈឺចាប់ C- ការរាលដាលនៃការឈឺចាប់ D- សំពាធឈាមធ្លាក់ចុះ	D
58	ដើម្បីសំរេចបាននូវគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងកាត់បន្ថយការចំលងរោគ សំខាន់គឺ A- លាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នា B- រៀបចំស្ថានភាពអ្នកជម្ងឺឲ្យសមស្របទៅតាមទំងន់ការវះកាត់ C- បញ្ជូនអ្នកជម្ងឺមកបន្ទប់វះកាត់ឲ្យទាន់ពេល D- សំអាតកាយអ្នកជម្ងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវ	A

59	តើក្រោយពេលសម្រាលភ្លាមៗឆ្លុះត្រូវពិនិត្យចំពោះអ្វីខ្លះ? A- ពិនិត្យពោះ, ទ្វារមាស B- ពិនិត្យពោះ, សម្ពាធឈាម C- ពិនិត្យ ទ្វារមាស D- ពិនិត្យពោះ ដោះ ទ្វារមាស	A
60	តើត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះទៅលើទារកបន្ទាប់ពីសម្រាលភ្លាមៗ? A- ពិនិត្យពណ៌ សំបុរ ចលនា B- ពិនិត្យ ពណ៌សំបុរ ចង្វាក់បេះដូង C- ពិនិត្យរាងកាយ, ចលនា, ពណ៌សំបុរ, ការយំ, សង្វាក់បេះដូង D- ពិនិត្យរាងកាយនិងការយំរបស់ទារក	C
61	តើឆ្លុះដាក់ឥរិយាបថស្រ្តីក្នុងស្ថានភាពរបៀបណាដើម្បីពិនិត្យរកការបង្ករោគ(Lochia)បន្ទាប់ពីពេលសម្រាល(ក្នុង២៤ម៉ោងក្រោយសម្រាល)? A- អង្គុយ B- ជ្រៀង C- ដេកថ្ងារសណ្តូកជើង D- ដេកថ្ងារ បញ្ឈរជង្គង់ទាំងពីរកន្លែក	D
62	ក្នុងអំឡុង២៤ ម៉ោងក្រោយសំរាល តើឆ្លុះពិនិត្យទ្វារមាសរបស់ស្រ្តីដើម្បីរកមើលអ្វី? A- ប៊ែរីណេ, ថ្នើរ Episiotomy- Lochia B- ថ្នើរ Episiotomy (ការកាត់ទ្វារ) C- ការហូរឈាម D- ស្នាមជាំជុំវិញប៊ែរីណេ	A
63	តើត្រូវពិនិត្យមើលដោះក្រោយពេលសំរាលរបៀបយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ? A- ពិនិត្យមើលដោះទាំងពីរ ឡើងល្មម លៀសដោះ ដោះខ្វាក់និង ការចេញរបស់ទឹកដោះទឹកដោះ B- ពិនិត្យមើលដោះទាំងពីរ ស្មើគ្នាឬលៀសដោះឬក្បាលដោះខ្វាក់ C- ពិនិត្យមើលដោះទាំងពីរ មានពណ៌ក្រហមឬផ្កាឈូក D- ពិនិត្យមើលដោះទាំងពីរ ដោយស្ទាបរកមើលការឡើងខ្លាំងឬល្មម	A

64	ក្រោយពេលសំរាល តើបុគ្គលិកឆ្លបត្រូវថែទាំទារកយ៉ាងដូចម្តេចមុននឹងបញ្ជូនទៅបន្ទប់សំរាក? A- រុំទារកនឹងកន្សែងស្អាតរួចទុករក្សាឲ្យឆ្ងាយពីម្តាយ B- រុំទារកនឹងកន្សែងស្អាតរួចរក្សាទុកឲ្យនៅជាប់ជាមួយម្តាយ C- ជូតសំអាតទារករួចរុំនឹងកន្សែងស្អាតទុកឲ្យឆ្លបថែទាំ D- ងូតទឹកឲ្យទារករួចរុំនឹងកន្សែងស្អាតទុកឲ្យអ្នកកំដរជួយមើល	B
65	តើបុគ្គលិកឆ្លបត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដឹងថាលាមកទារកមានសភាពធម្មតា ឬមិនធម្មតា ? A- សង្កេតមើលសភាពលាមករបស់ទារក B- សង្កេតមើលស្ថានភាពដុះរបស់ទារក C- កត់ត្រាពីចំនួនដងនិងលក្ខណៈដែលទារកដុះ D- កត់ត្រាបរិមាណលាមកដែលទារកដុះ	C
66	ដើម្បីបង្ហាត់ឲ្យមានការឆ្លងរោគទៅផ្ទៃទារក តើបុគ្គលិកឆ្លបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ដុសលាងដៃឲ្យស្អាតមុននឹងទៅប៉ះពាល់ផ្ទៃរបស់ទារក B- រុំផ្ទៃទារកឲ្យជិត C- មិនត្រូវឲ្យផ្ទៃទារកប៉ះនឹងទឹក D- ជូតលាងផ្ទៃទារកជាមួយនឹងអង់ទីសេប៊ីច	A
67	តើបុគ្គលិកឆ្លបត្រូវធ្វើអ្វីដំបូងគេ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្ករោគក្នុងឈាមរបស់ទារក? A- ផ្តល់ជាតិទឹកតាមសរសៃវ៉ែន B- បូមឈាមយកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ C- ឲ្យអង់ទីប៊ីយូទិកតាមសរសៃវ៉ែន D- ចាក់បញ្ចូលឈាម	A
68	ក្នុងពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះ តើសំណួរមួយណាបញ្ជាក់ថាម្តាយទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសបានត្រឹមត្រូវ? A- តើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសហើយឬនៅ B- តើអ្នកបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសតាមកាលបរិច្ឆេទដែរឬទេ C- តើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសប៉ុន្មានដងហើយ D- នៅពេលមានផ្ទៃពោះអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសដែរឬទេ	B

69	នៅពេលទារកកំពុងតែប្រកាច់ តើអ្នកជាបុគ្គលិកឆ្លបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? A- ដាក់អុកស៊ីសែនឲ្យទារក B- បីតស្លេសទារក C- ដាក់ទារកដេកផ្អៀង D- ផ្តល់ Phenobarbital តាមសសៃវ៉ែនយឺតៗតាមវេជ្ជបញ្ជា	D
70	ក្នុងករណីដែលទារកចុះកំដៅខ្លាំង តើឆ្លបត្រូវធ្វើអ្វីជាដំបូង? A- ផ្តល់កំដៅឲ្យទារកភ្លាមៗដោយប្រើឧបករណ៍ផ្តល់កំដៅ B- ដាក់ទារកលើទ្រូងម្តាយ C- វាស់កំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាម D- ព្យាបាលការបង្កោតក្នុងឈាម	A
71	ក្នុងរយៈពេល៦- ៨ ម៉ោងក្រោយសំរាល តើឆ្លបត្រូវអប់រំស្ត្រីឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីជួយដល់ការកន្ត្រាក់ស្បូនឲ្យបានល្អ និង ឈាមរំអិលឆាប់អស់? A- ឲ្យស្ត្រីដេកនៅស្ងៀម B- ឲ្យស្ត្រីហាត់ប្រាណ C- ឲ្យស្ត្រីផ្លាស់ប្តូរទីទ្រង់ទ្រាប់ឲ្យបានញឹកញាប់ D- ឲ្យស្ត្រីឆាប់ក្រោកឈរ និង ដើរ តិចៗ	D
72	ដើម្បីថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិង ស្ត្រីដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះឲ្យមានសុខភាពល្អ តើឆ្លបត្រូវផ្តល់ការអប់រំអ្វីខ្លះដល់ស្ត្រី ? A- ណែនាំស្ត្រីឲ្យសំរាកស្ងៀម B- ណែនាំស្ត្រីឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណបន្តិចបន្តួច C- ណែនាំស្ត្រីឲ្យបរិភោគយ៉ាងហោចផ្លែឈើឬ អាហារបន្ថែមប្រចាំថ្ងៃមួយពេលទៀត D- ណែនាំស្ត្រីឲ្យបរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃធម្មតា	C
73	ក្រោយពេលដែលទារកទទួលថ្នាំបង្ការរួច ស្រាប់តែទារកមានក្តៅខ្លួន កន្លែងចាក់មានក្រហម និង ហើម តើឆ្លបត្រូវថែទាំកុមារយ៉ាងដូចម្តេច ? A- ផ្តល់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅដល់ទារក B- លាបប្រេងកូឡាលើកន្លែងក្រហមនិង ហើម C- ស្ត្រីទឹកក្តៅខ្លួននៅកន្លែងចាក់ D- ជូតសំអាតកន្លែងចាក់ដោយអង់ទីស៊ីបទិក	A

74	ឆ្លុបបង្រៀនស្ត្រីពីការឲ្យទារកទទួលនូវទឹកដោះដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល៖ A- ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួច B- ២ទៅ៣ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួច C- ៤ទៅ៥ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួច D- ៥ទៅ៧ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួច	B
75	ដើម្បីការពារកុំឲ្យស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះស្វ័ះបំពង់បង្ហូរទឹកដោះ និងរលាកដោះឆ្លុបត្រូវជួយគាត់ដោយ៖ A- ឲ្យទឹកដោះហូរបានច្រើន និងឲ្យទារកបៅបានញឹកញាប់ B- លាបប្រេងជុំវិញក្បាលដោះក្រោយពេលបំបៅដោះ C- ម៉ាស្សាដោះក្រោយពេលបំបៅដោះរួច D- លាងដោះក្រោយពេលបំបៅដោះ	A
76	តើឆ្លុបត្រូវប្រាប់ម្តាយឲ្យបំបៅដោះកូនបានល្អក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេច? A- ឲ្យម្តាយអោបទារកជាប់នឹងខ្លួន និងមានការប្រុងប្រយ័ត្ន B- ឲ្យម្តាយអោបទារកជាប់នឹងខ្លួនហើយចង្ការបស់ទារកប៉ះគ្នានឹងដោះម្តាយ C- ដាក់ក្បាលទារកជិតនឹងខ្លួនម្តាយហើយចង្ការបស់ទារកប៉ះគ្នានឹងដោះម្តាយ D- ដាក់ក្បាលនិងដងខ្លួនទារកបិតនៅបន្ទាត់ស្របគ្នា ហើយដងខ្លួនជិតនឹងខ្លួនម្តាយ	D
77	ដើម្បីការពារកុំឲ្យស្ត្រីមានការឈឺក្បាលដោះនិងប្រេះចុងដោះ តើឆ្លុបត្រូវណែនាំស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេច? A- ឲ្យទឹកដោះហូរបានច្រើន និងកុំឲ្យកូនបៅខ្លាំងពេក B- លាបប្រេងជុំវិញក្បាលដោះក្រោយពេលបំបៅដោះ C- ដាក់ទារកបៅឲ្យបានជិតបង្គំ D- កុំឲ្យទារកដេញកំដោះយូរពេក	C
78	តើមធ្យោបាយមួយណាដែលល្អក្នុងការច្របាច់យកទឹកដោះម្តាយដើម្បីរក្សាទុក? A- ប្រើដៃច្របាច់យកទឹកដោះម្តាយ B- ប្រើស៊ីរ៉ាំងដើម្បីបិតយកទឹកដោះម្តាយ C- ការប្រើដបកំដៅសម្រាប់បិតយកទឹកដោះម្តាយ D- ការបិតដោយម៉ាស៊ីនយកទឹកដោះម្តាយ	A

79	ក្រោយពេលសម្រាលភ្លាមតើឆ្មបត្រូវជួយស្រ្តីបំបៅដោះកូនដើម្បីឲ្យមានរំញោចវេជ្ជិច អុកស៊ីតូស៊ីនយ៉ាងដូចម្តេច?	D
	A- ឲ្យគាត់ធ្វើម៉ាស្សាដោះដោយដៃនិង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ B- ឲ្យគាត់បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយឲ្យបានញឹកញាប់ និង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ C- ឲ្យគាត់ច្របាច់ទឹកដោះដោយដៃនិង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ D- ឲ្យគាត់រំញោចក្បាលដោះដោយខ្លួនឯង និង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ	
80	តើឆ្មបត្រូវជួយស្រ្តីបំបៅដោះកូនដើម្បីឲ្យមានរំញោចវេជ្ជិច អុកស៊ីតូស៊ីនយ៉ាងដូចម្តេច?	B
	A- ឲ្យគាត់ធ្វើម៉ាស្សាដោះដោយដៃនិង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ B- ឲ្យគាត់បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយឲ្យបានញឹកញាប់ និង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ C- ឲ្យគាត់ច្របាច់ទឹកដោះដោយដៃនិង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ D- ឲ្យគាត់រំញោចក្បាលដោះដោយខ្លួនឯង និង ហូបទឹកក្តៅឧណ្ហៗ	
81	ដើម្បីបន្ថយភាពហើមដោះនៅពេលមានលាសដោះក្រោយបំបៅទារក ឆ្មបត្រូវណែនាំម្តាយឲ្យ៖	C
	A- ឲ្យម្តាយសម្រាកបានច្រើន B- ឲ្យម្តាយហូបទឹកឲ្យបានច្រើន C- ដាក់ស្បែកជាក់លើដោះទាំង២ D- ជួយច្របាច់ដោះដោយដៃទាំង២	
82	តើឆ្មបត្រូវពន្យល់ទៅកាន់ស្រ្តីដែលគាត់បានត្អូញត្អែរពីការឈឺស្បូនពេលដែលគាត់បំបៅដោះកូនយ៉ាងដូចម្តេច?	D
	A- នេះជាភាពមិនប្រក្រតី និងតម្រូវឲ្យមានរុករកពីផលវិបាក B- បញ្ឈប់ការបំបៅដោះព្រោះវាបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់ស្បូនហើយនេះជាផលវិបាក C- ការឈឺចាប់មកពីការរលាកនៃស្បូនហើយវានឹងធម្មតាវិញ D- វាជាការធម្មតាពេលបំបៅដោះកូន ព្រោះការកន្ត្រាក់ស្បូនជួយឲ្យស្បូនត្រលប់មករកទំហំដើមវិញ	

83	តើឆ្មបត្រូវណែនាំម្តាយឲ្យបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ? A- យ៉ាងតិចបំផុតគឺរៀងរាល់ ១ទៅ២ម៉ោងម្តង B- យ៉ាងតិចបំផុតគឺរៀងរាល់ ២ទៅ៣ម៉ោងម្តង C- យ៉ាងតិចបំផុតគឺរៀងរាល់ ៣ទៅ៤ម៉ោងម្តង D.យ៉ាងតិចបំផុតគឺរៀងរាល់ ៤ទៅ៥ម៉ោងម្តង	B
84	ដើម្បីការពារការរលាកដោះ តើឆ្មបត្រូវណែនាំម្តាយយ៉ាងដូចម្តេច? A- ចាប់ផ្តើមបំបៅដោះភ្លាម ដោយមិនកំណត់ពេលវេលា និងជួយច្របាច់ដោះដោយដៃទាំង២ B- ចាប់ផ្តើមបំបៅដោះភ្លាមក្រោយសម្រាល ដោយមិនកំណត់ពេលវេលា និងដាក់ស្បែកដាក់លើដោះទាំង២ C- ចាប់ផ្តើមបំបៅដោះភ្លាមក្រោយសម្រាល ដោយមិនកំណត់ពេលវេលា និងត្រូវដាក់ទារកឲ្យបៅផ្អឹបបានល្អ D- ចាប់ផ្តើមបំបៅដោះភ្លាមក្រោយសម្រាល ដោយមិនកំណត់ពេលវេលា និងឲ្យម្តាយហូបទឹកឲ្យបានច្រើន	C
85	ដើម្បីព្យាបាលស្ត្រីដែលលាសដោះ តើដំបូងឆ្មបត្រូវជួយម្តាយយ៉ាងដូចម្តេច? A- ផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិក B- ច្របាច់យកទឹកដោះចេញ C- មិនឲ្យគាត់បំបៅដោះកូន D- លាងដោះឲ្យបានញឹកញាប់	B
86	តើឆ្មបត្រូវណែនាំម្តាយក្នុងការព្យាបាលក្បាលដោះសំប៉ែតឬ ក្បាលដោះខ្វាក់យ៉ាងដូចម្តេច? A- ច្របាច់ទឹកដោះដាក់ពែង B- ព្យាយាមទារកជញ្ជក់ដោះឲ្យបានច្រើន C- ដាក់ទារកផ្អឹបបានល្អពេលបំបៅដោះ D- ព្យាយាមទាញក្បាលដោះចេញដោយប្រើសេរ៉ាំង	D

87	ក្រោយការវះកាត់យកកូនភ្លាម តើឆ្អឹងត្រូវតាមដានសម្ពាធឈាមស្រ្តីដូចម្តេច? A- រៀងរាល់១៥នាទីម្តង/១ម៉ោងដំបូង B- រៀងរាល់ម៉ោង២០នាទីម្តង/១ម៉ោងដំបូង C- រៀងរាល់ម៉ោង៣០នាទីម្តង/១ម៉ោងដំបូង D- រៀងរាល់ម៉ោង៦០នាទី	A
88	នៅពេលព្យាបាលការក្លាយរោគដោយការកាត់ទ្វារមាសឆ្អឹងត្រូវ៖ A- លាងសំអាតបើរំលោមក្នុង១ថ្ងៃ កាត់ជេសនៅកន្លែង និងជំរាបគ្រូពេទ្យពីសភាពថ្មើរ B- លាងសំអាតបើរំលោមទៅ៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ និងជំរាបគ្រូពេទ្យពីសភាពថ្មើរ C- លាងសំអាតបើរំលោមទៅ៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ និង កាត់ជេសនៅកន្លែងហើមបង្ហូរខ្ទុះ D- លាងសំអាតបើរំលោមទៅ៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ កាត់ជេសដើម្បីបង្ហូរខ្ទុះ និងជំរាបគ្រូពេទ្យពីសភាពថ្មើរ	D
89	ប្រសិនបើមានការក្លាយរោគក្រោយសំរាល តើឆ្អឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? A- ផ្តល់អាម៉ុកស៊ីលីនគ្រាប់ ៥០០មក្រនិង មេត្រូនីដាសូលក្នុងកំរិត ៤០០ ឬ ៥០០មក្រ រាល់៨ម៉ោងម្តងរយៈពេល៧ថ្ងៃ B- ផ្តល់តេត្រាស៊ីគ្លីនគ្រាប់ ៥០០មក្រនិង មេត្រូនីដាសូលក្នុងកំរិត ៤០០ ឬ ៥០០មក្រ រាល់៨ម៉ោងម្តងរយៈពេល៧ថ្ងៃ C- ផ្តល់អាម៉ុកស៊ីលីនគ្រាប់ ៥០០មក្រនិង មេត្រូនីដាសូលក្នុងកំរិត ២០០ រាល់៨ម៉ោងម្តងរយៈពេល៧ថ្ងៃ D- ផ្តល់តេត្រាស៊ីគ្លីនគ្រាប់ ២០០មក្រនិង មេត្រូនីដាសូលក្នុងកំរិត ២០០ រាល់៨ម៉ោងម្តងរយៈពេល៧ថ្ងៃ	A
90	តើឆ្អឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបង្ការការក្លាយរោគក្រោយសំរាល ? A- ប្រើបច្ចេកទេសរំងាប់មេរោគលើសម្ភារៈក្នុងរយៈពេលធ្វើការពិនិត្យទ្វារមាស B- ប្រើបច្ចេកទេសរំងាប់មេរោគលើសម្ភារៈនៅពេលធ្វើការសំរាលកូន C- ប្រើបច្ចេកទេសរំងាប់មេរោគលើសម្ភារៈនៅពេលស្រ្តីបែកស្រោមទឹកភ្លោះរយៈពេលយូរ D- ប្រើបច្ចេកទេសរំងាប់មេរោគលើសម្ភារៈនៅពេលសិកបញ្ចូលឧបករណ៍ទៅក្នុងយោនី	B

91	ជម្ងឺតេតាណូសក្រោយសំរាល គឺជាការបង្ករោគចំពោះមាតា ឬ ទារកដែលបណ្តាលពីមេរោគ Clostridium តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបង្ការជម្ងឺតេតាណូសក្រោយសំរាល ? A- ត្រូវផ្តល់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺតេតាណូសដល់ស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលក្រោយសម្រាល B- ផ្តល់អង់ទីប៊ីយូទិកចំពោះស្ត្រីដែលបែកស្រោមទឹកភ្លោះ លើសពី១២ម៉ោង C- ត្រូវសម្អាតដៃ សំលៀកបំពាក់ និងមិនត្រូវលាបឬ បិទវត្ថុផ្សេងៗលើផ្ទៃទារក D- ត្រូវផ្តល់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺតេតាណូសដល់ទារកក្នុងអំឡុងពេលក្រោយសម្រាលភ្លាម	C
92	ការបង្ករោគនៅកន្លែងរំហែកឬកន្លែងកាត់ទ្វារមានពេលសំរាលអាចរាលដាលទៅដល់ស្រទាប់ក្រោមនៃ ជាលិកា ដូចនេះឆ្លុប A- ត្រូវទប់ឈ្នាន់ប្រសូត្រឡបានល្អនៅពេលសម្រាល B- មិនត្រូវធ្វើឲ្យស្ត្រីមានរបួសនៅទ្វារមាសទេ C- មិនត្រូវលាបថ្នាំផ្តុសផ្តាសនៅលើមុខរបួសទេ D- មិនត្រូវកាត់ទ្វារមាសគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់នៅពេលសំរាលទេ	D
93	គោលការណ៍ថែទាំនិងការពារការឆ្លងរាលដាល នៃការបង្ករោគទៅស្ត្រីផ្សេងៗទៀត និងទៅលើកូនរបស់ គាត់ឆ្លុប៖ A- ត្រូវដាក់ស្ត្រីដែលត្រូវធ្វើការថែទាំព្យាបាលឱ្យនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគេ B- មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមគ្រួសារស្ត្រីមកសួរសុខទុក្ខអ្នកជម្ងឺទេ C- ត្រូវបង្គាត់បង្រៀនអំពីគោលការណ៍នៃការការពារការឆ្លងរោគ D- ត្រូវផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក ឱ្យបានសមរម្យគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា	A
94	ប្រសិនបើស្ត្រីសំរាលដោយរក្សាភ័យកក្កើត ឬ បើសង្ស័យថាមានការបង្ករោគដោយពួកបាក់តេរីក្លាមីឌីយ៉ា តើឆ្លុបត្រូវផ្តល់ប្រភេទថ្នាំ និងកំរិតប្រើដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចម្តេច? A- ផ្តល់Benzylpénicillin ៥ លាន (IM ឬ IV) រាល់៦ម៉ោងម្តង , Gentamicin 100mg មេត្រូវនឹងជាស្វ័យក្នុងកំរិត 400mg ឬ 500mg ដោយលេបរៀងរាល់ ៨ម៉ោងម្តង B- ផ្តល់Benzylpénicillin ៥ លាន (IM ឬ IV) រាល់៨ម៉ោងម្តង , Gentamicin 100mg មេត្រូវនឹងជាស្វ័យក្នុងកំរិត 400mg ឬ 500mg ដោយលេបរៀងរាល់ ៦ម៉ោងម្តង C- ផ្តល់Benzylpénicillin ៥ លាន (IM ឬ IV) រាល់ ១២ម៉ោងម្តង , Gentamicin 100mg មេត្រូវនឹងជាស្វ័យក្នុងកំរិត 400mg ឬ 500mg ដោយលេបរៀងរាល់ ១២ម៉ោងម្តង D- ផ្តល់Benzylpénicillin ៣លាន (IM ឬ IV) រាល់៦ម៉ោងម្តង , Gentamicin 100mg មេត្រូវនឹងជាស្វ័យក្នុងកំរិត ២០០mg ឬ ៣០០mg ដោយលេបរៀងរាល់ ៨ម៉ោងម្តង	A

95	ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺមិនបានធ្វើស្បើយក្នុងរយៈពេល៤៨ម៉ោងក្រោយទទួលការព្យាបាល ឬ របាយការណ៍របស់ មន្ទីរពិសោធន៍បញ្ជាក់ថា ពួកបាក់តេរីទាំងនោះធន់ជាមួយនឹងថ្នាំដែលយើងកំពុងប្រើនោះយើងត្រូវ ៖ A- ប្តូរអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកផ្សេងវិញដោយ IV បន្ត យ៉ាងហោច៤៨ ម៉ោងរួចឲ្យលេបរហូតដល់ស្ថាប័នបន្ទាប់ B- ផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកែសម្រួល ឬ ការពារភាពខ្សោះជាតិទឹក និង ជួយបញ្ចុះកំដៅ C- ត្រូវបញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានសំភារៈទំនើបគ្រប់គ្រាន់ D- អនុវត្តវិធានការការពារ ការឆ្លងរាលដាល និងការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀត	A
96	ការសល់ កំទេចសុក ប្រសិនបើស្បូនកាន់តែមានទំហំរីកធំ ទន់ ហើយទឹកអិល (Lochia) ធ្លាក់ច្រើន និងមានលាយដុំឈាម ។ ក្នុងករណីបែបនេះ ឆ្លើយត្រូវ ៖ A- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដោយ ផ្តល់សារធាតុរាវ និង កោសសំអាតស្បូន B- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដោយ ផ្តល់សារធាតុរាវ និង លូកបារសុកដោយដៃ C- តាមដានសញ្ញាជីវិត វាយតម្លៃការបញ្ចូល បញ្ចេញចោល និង កោសសំអាតស្បូន D- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានសំភារៈគ្រប់គ្រាន់និងមានឆ្លបបានទទួលការ បណ្តុះបណ្តាលផ្នែក កោស សំអាតស្បូន	D
97	ចំពោះការព្យាបាលការរលាកស្រោមពោះ ឆ្លើយត្រូវ A- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញក្នុងការព្យាបាល និង ផ្តល់សារធាតុរាវ B- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញក្នុងការព្យាបាល និង តាមដានសញ្ញាជីវិត C- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញក្នុងការព្យាបាល និង ជួយធ្វើការវះកាត់បន្ទាន់ D.បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញក្នុងការព្យាបាល និង ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់	C
98	ចំពោះការរលាកដោះ (Mastitis)ក្រោយសម្រាលឆ្លើយត្រូវផ្តល់ Antibiotic សំរាប់ព្យាបាលតាមវេជ្ជបញ្ជាគឺ៖ A- Cloxacilline 500mg លេប ៤ដង/ថ្ងៃសំរាប់១០ថ្ងៃ ឬ Erythromycin 250mg លេប៣ដង/ថ្ងៃ សំរាប់១០ ថ្ងៃ B- Ampicilline 500mg លេប ៤ដង/ថ្ងៃសំរាប់១០ថ្ងៃ ឬ Erythromycin 250mg លេប៣ដង/ថ្ងៃ សំរាប់១០ ថ្ងៃ C.Cloxacilline 500mg លេប ៤ដង/ថ្ងៃសំរាប់១០ថ្ងៃ ឬ Gentamycine 250mg លេប៣ដង/ថ្ងៃ សំរាប់១០ ថ្ងៃ D- Ampicilline 500mg លេប ៤ដង/ថ្ងៃសំរាប់១០ថ្ងៃ ឬ Gentamycine 250mg លេប៣ដង/ថ្ងៃ សំរាប់១០ ថ្ងៃ	A

99	ចំពោះការថែទាំស្ត្រីក្នុងការរលាកដោះ ឆ្លុបត្រូវជួយជំរុញស្ត្រីឱ្យគាត់៖ A- បញ្ឈប់បំបៅដោះកូន ទ្រដោះនឹងអាវទ្រនាប់ស្អាត និងដាក់ក្រណាត់ស្អាតត្រជាក់លើដោះចន្លោះពេលកូនបៅ B- បន្តបំបៅដោះកូន ទ្រដោះដោយអាវទ្រនាប់ស្អាត និងដាក់ក្រណាត់ស្អាតត្រជាក់លើដោះចន្លោះពេលកូនបៅ C- បន្តបំបៅដោះកូន ទ្រដោះដោយអាវទ្រនាប់ស្អាត និងដាក់ក្រណាត់ស្អាតក្តៅខ្លះៗលើដោះពេលកូនបៅ D- បញ្ឈប់បំបៅដោះកូន ទ្រដោះដោយអាវទ្រនាប់ស្អាត និងដាក់ស្បែកក្តៅត្រជាក់លើដោះចន្លោះពេល	B
100	ប្រសិនបើស្ត្រី មានការក្លាយរោគដោះធ្ងន់ធ្ងរ មានមុខរបួសរលួយ ឆ្លុបត្រូវណែនាំស្ត្រីឲ្យ៖ A- សំរាកស្ងៀមនៅផ្ទះ និងសំអាតមុខរបួស២ដង រៀងរាល់ថ្ងៃ B- សំរាកស្ងៀមនៅផ្ទះ បញ្ឈប់ការបំបៅដោះ និងសំអាតមុខរបួស២ដង រៀងរាល់ថ្ងៃ C- សំរាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ បន្តការបំបៅដោះ និងសំអាតមុខរបួស២ដង រៀងរាល់ថ្ងៃ D- សំរាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីព្យាបាលនិងសំអាតមុខរបួស២ដង រៀងរាល់ថ្ងៃ	D
101	ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្លុកភ្លាមៗ តើឆ្លុបត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងដូចម្តេច? A- វាស់សញ្ញាជីវិត ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង ស្រែករកជំនួយ ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ B- ស្រែករកជំនួយ វាស់សញ្ញាជីវិត ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ C- ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង ស្រែករកជំនួយ វាស់សញ្ញាជីវិត ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ D- ស្រែករកជំនួយ ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ វាស់សញ្ញាជីវិត ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង	B
102	ចំពោះការគ្រប់គ្រងដោយឡែកដល់ស្ត្រីស្លុក តើជាដំបូងឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A. យកសញ្ញាជីវិត ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ B.បញ្ចូលសេរ៉ូម(Normal saline /Ringers lactate)យ៉ាងតិចណាស់២លីត្រ ក្នុង១ម៉ោងដំបូង C.ចាប់ផ្តើមបញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃដោយមូលលេខ១៦ដោយបូមឈាមមុននឹងបញ្ចូលសេរ៉ូម D- បញ្ចូលសេរ៉ូមឱ្យលឿន(Normal saline /Ringers lactate) ដំបូងក្នុងល្បឿន១លីត្រក្នុងរយៈពេល១៥-២០នាទី	C

103	ក្នុងការតាមដានគ្រប់គ្រងបន្តចំពោះស្ត្រីមានស្ទុក តើឆ្លុះបញ្ចាំងធ្វើអ្វីខ្លះ? A- បន្តតាមដានសញ្ញាជីវិត ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ B.បន្តបញ្ចូលសេរ៉ូមឱ្យលឿនតាមសរសៃ និងដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ C.បន្តបញ្ចូលសេរ៉ូមឱ្យលឿនតាមសរសៃ និងដាក់អុកស៊ីហ្សែន ៦- ៨ លីត្រ/១នាទីតាមmask D- បន្តតាមដានសញ្ញាជីវិត (រាល់ ១៥ នាទីម្តង) និងដាក់អុកស៊ីហ្សែន ៦- ៨ លីត្រ/១នាទីតាមmask	D
104	ប្រសិនបើការធ្លាក់ឈាមច្រើនត្រូវបានសង្ស័យជាមូលហេតុស្ទុក ជំហានដំបូងឆ្លុះបញ្ចាំង៖ A.ស្រែករកជំនួយ វាស់សញ្ញាជីវិត ដាក់ស្រ្តីដេកផ្អៀង ដណ្តប់ឱ្យស្រ្តីកក់ក្តៅ និងលើកជើងឱ្យខ្ពស់ B.បញ្ឈប់ការធ្លាក់ឈាម បញ្ចូលសេរ៉ូមនិង ឈាមហើយ ឱ្យ Antibiotic ពីមុខចូលគ្នា C.បញ្ឈប់ការធ្លាក់ឈាម បញ្ចូលសេរ៉ូម ឈាមយ៉ាងឆាប់បំផុតហើយ វិនិច្ឆ័យមូលហេតុស្ទុក និង គ្រប់គ្រង D.តាមដានសញ្ញាជីវិត (រាល់ ១៥ នាទីម្តង) និងដាក់អុកស៊ីហ្សែន ៦- ៨ លីត្រ/១នាទីតាមmask	C
105	ប្រសិនបើស្ទុកសង្ស័យថាបណ្តាលមកពីស្បូនមានរូសគ្រាំគ្រាឆ្លុះបញ្ចាំង ៖ A- រៀបចំធ្វើការវះកាត់ B- តាមដានសញ្ញាជីវិត C- បញ្ចូលសេរ៉ូមយ៉ាងតិចណាស់២លីត្រ D- ដាក់អុកស៊ីហ្សែន ៦- ៨ លីត្រ/១នាទីតាមmask	A
106	ក្នុងការវាយតម្លៃសារឡើងវិញ ចំពោះស្ត្រីមានស្ទុកឆ្លុះបញ្ចាំង ៖ A- វាយតម្លៃថា តើសភាពស្រ្តី មានការឆ្លើយតបនឹងការបញ្ចូល ឈាម ក្នុងរយៈពេល៣០នាទី ឬទេ B.វាយតម្លៃថា តើសភាពស្រ្តី មានការឆ្លើយតបនឹងការបញ្ចូលសេរ៉ូម ក្នុងរយៈពេល៣០នាទី ឬទេ C.វាយតម្លៃថា តើសភាពស្រ្តី មានការឆ្លើយតបនឹងការបញ្ចូលឈាម ក្នុងរយៈពេល៦០នាទី ឬទេ D.វាយតម្លៃថា តើសភាពស្រ្តី មានការឆ្លើយតបនឹងការបញ្ចូលសេរ៉ូម ក្នុងរយៈពេល៦០នាទី ឬទេ	B

107	ក្នុងការវាយតម្លៃស្ត្រីមានស្ទុក បើសភាពស្ត្រីបានធូរស្រាល ឆាប់ត្រូវ ៖ A- បន្ថយសេរ៉ូម ត្រឹម ១លីត្រក្នុង៦ម៉ោង បន្តការគ្រប់គ្រងមូលហេតុស្ទុក B- បន្ថយសេរ៉ូម ត្រឹម ១លីត្រក្នុង៤ ម៉ោង បន្តការគ្រប់គ្រងមូលហេតុស្ទុក C- បន្ថយសេរ៉ូម ត្រឹម ១លីត្រក្នុង៦ម៉ោង បន្តបញ្ចូលឈាម ក្នុងរយៈពេល៦០នាទី D- បន្ថយសេរ៉ូម ត្រឹម ១លីត្រក្នុង៦ម៉ោង បន្តដាក់អុកស៊ីហ្សែន ៦- ៨ លីត្រ/១នាទី	A
108	ក្នុងការវាយតម្លៃស្ទុក ប្រសិនបើសភាពស្ត្រី មិនធូរស្រាល ឆាប់ត្រូវអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដូចជា ៖ A- បន្តដាក់សេរ៉ូម ដាក់អុកស៊ីហ្សែន តាមដានសភាពទូទៅស្ត្រីឱ្យជាប់ និង តាមដានសញ្ញាជីវិត B- បន្តដាក់សេរ៉ូម ដាក់អុកស៊ីហ្សែន តាមដានសភាពទូទៅស្ត្រីឱ្យជាប់ និងបញ្ចូលឈាមជួសវិញ C- បន្តដាក់សេរ៉ូម ដាក់អុកស៊ីហ្សែន តាមដានសភាពទូទៅស្ត្រីឱ្យជាប់ និងតាមដានទឹកនោម D- បន្តដាក់សេរ៉ូម និង អុកស៊ីហ្សែន តាមដានសភាពទូទៅស្ត្រីឱ្យជាប់ មើលសេរ៉ូមនិង pH ក្នុងឈាម	D
109	តើរបៀបច្របាច់ទឹកដោះត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ច្របាច់ពីខាងក្រោយក្បាលដោះនិងអាវ៉ែអូលដោយមេដៃ B- ច្របាច់គល់ដោះដោយមេដៃ C- ច្របាច់ចុងដោះដោយមេដៃ D- ច្របាច់ដោយសង្កត់ខ្លាំងៗ	A
110	មុនបំបៅដោះកូន ម្តាយត្រូវភ្លេចវេត្តិចអុកស៊ីតូស៊ីនជាមុនសិន ។ តើសកម្មភាពខាងក្រោមណាមួយដែលមិនមែនជាវិធីភ្លេចវេត្តិចអុកស៊ីតូស៊ីន? A- ស្តុកន្សែងក្តៅខណ្ឌៗលើក្បាលដោះ B- ម៉ាស្សាខ្នងរបស់ម្តាយថ្មមៗ C- ម៉ាស្សាដោះថ្មមៗ D- ស្តុកន្សែងត្រជាក់លើក្បាលដោះ	A

111	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីឲ្យការបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយពេញលេញ? A- ដាក់មាត់ទារកគ្របលើអាវម្អូល B- ដាក់មាត់ទារកលើចុងដោះម្តាយ C- ដាក់មាត់ទារកប៉ះដោះម្តាយ D- ដាក់មាត់ទារកឲ្យជញ្ជក់ដោះ	A
112	ប្រសិនបើទារកមានជំងឺមិនអាចបៅដោះម្តាយបាន តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយទារកអាចបៅបាន ? A- ជួយម្តាយធ្វើការបំបៅដោះដោយប្រើស្លាបព្រា ឬពែង B- ជួយម្តាយធ្វើការបំបៅដោះដោយដបទឹកដោះគោ C- ជួយម្តាយធ្វើការបំបៅដោះដោយប្រើសីរ៉ាំង D- ជួយម្តាយធ្វើការបំបៅដោះដោយលាយជាមួយទឹកដោះគោ	A
113	តើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារក ពេលដែលមានជំងឺ? A- លើកទឹកចិត្តម្តាយឲ្យបំបៅទារកញឹកញាប់ B- ជួយធ្វើការបំបៅដោយប្រើពែង ឬ ស្លាបព្រា C- ផ្តល់ទឹកដោះដែលច្របាច់ហើយ ដាក់តាមសុងពីច្រមុះដល់ក្រពះ D- ណែនាំអោយម្តាយបន្ថយការបំបៅដោះ	D
114	តើសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថា ស្រ្តីបំបៅដោះកូនមិនបានត្រឹមត្រូវ? A- ចង្កាទារកប៉ះនឹងដោះម្តាយ B- មាត់របស់វាបើកធំ C- បបូរមាត់វាបែរមកក្រៅ D- អាចមើលឃើញអាវម្អូលលើនិងក្រោមមាត់របស់កូន	D
115	តើឆ្មបត្រដាក់សុងដូចម្តេច ក្នុងការផ្តល់ចំណីអាហារដល់ទារកដែលមានជំងឺ? A- សិកសុងតាមរន្ធច្រមុះទៅក្រពះ B- សិកសុងតាមមាត់ទៅក្រពះ C- សិកសុងជាមួយសីរ៉ាំង D- សិកសុងដែលមានទឹកដោះគោ	A

116	តើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនមែនជារបៀបនៃការបញ្ចុកទឹកដោះម្តាយដល់ទារកអោយមានសុវត្ថិភាព? A- ដាក់ទារកបញ្ឈរ ឬ ទំពេត B- ផ្ទៀងមាត់ពេញដោយបិទបិទមាត់ទារក C- មាត់ពេញត្រូវនៅលើបបូរមាត់ខាងក្រោមនិងខាងលើរបស់ទារក D- ដាក់ទារកបញ្ឈររួច បង្ហូរទឹកដោះចូលមាត់ទារក	D
117	តើការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ? A- ជាអាហារល្អឥតខ្ចោះងាយរលាយ និង មានភាពស្អាត B- ជួយការពារសុខភាពម្តាយនិងជួយពន្យារការមានគភ៌ថ្មី C- បង្កើតចំណងស្និទ្ធស្នាលរវាងម្តាយនិងកូន D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
118	តើបញ្ហាណាមួយដែល មិនមែនជា គ្រោះថ្នាក់នៃការចិញ្ចឹមកូនតាមបែបសិប្បនិម្មិត ? A- មានការបង្ករោគ និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ B- មានការលូតលាស់ត្រឹមត្រូវល្អ C- មានប្រតិកម្មឡើងកន្ទួលៗលើស្បែក D- មានជម្ងឺរាករុំវ៉ៃ និង រលាកផ្លូវដង្ហើម	B
119	តើនៅក្នុងទឹកដោះម្តាយមានសមាសធាតុអ្វីខ្លះ ? A- មានប្រូតេអ៊ីន ,ខ្លាញ់ , ឡាក់តូស B- ជីវជាតិអា,សេ និងជាតិដែក C- ជាតិទឹក និង សារជាតិវ៉ៃ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
120	តើសមាសធាតុមួយណាដែលគ្មាននៅក្នុងទឹកដោះគោ ? A- ភាពស្អាត B- ជាតិស្ករ C- វីតាមីន D- ប្រូតេអ៊ីន	A

121	តើ ទឹកដោះដំបូង (Colostrum) មានពណ៌អ្វី ? A- ពណ៌សថ្លា B- ពណ៌លឿងឬថ្លា C- ពណ៌ខៀវថ្លា D- ពណ៌សខាប់	B
122	តើអ្វីមួយជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាការបំបៅដោះកូនមិនបានផ្តុំបដាប់ល្អ ? A- មាត់របស់ទារកហារធំ B- មាត់ទារកស្រួចទៅមុខ C- អណ្តាតមានចលនាដូចរលក D- ចង្ការបស់ទារកប្តូរគ្នាជាមួយដោះម្តាយ	B
123	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុអាចបណ្តាលឱ្យមានការឈឺចាប់ក្បាលដោះ និង ប្រេះចុងដោះ ? A- ទារកជញ្ជក់ដោះយូរពេក B- ការបៅមិនបានផ្តុំបដាប់ល្អ C- ម្តាយមិនបានបំបៅដោះកូន D- ពន្យារពេលបំបៅដោះកូន	B
124	តើវីតាមីន អា ដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះម្តាយជួយអ្វីដល់ទារក ? A- បង្ការជម្ងឺភ្នែកស្ងួត ឬជម្ងឺខ្វាក់មាត់ B- ការលូតលាស់ខួរក្បាល C- ការពារភាពក្រិន D- បង្ការជម្ងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម	A
125	តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលមកពីការដាក់ស្ថានភាពទារកមិនល្អក្នុងការបំបៅដោះ ? A- ប្រេះចុងដោះ និងលាសដោះ B- ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះមិនគ្រប់គ្រាន់ C- ទារកបៅមិនឆ្អែត ញ័រញ័រ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

126	តើចម្លើយមួយណាដែលមិនបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ពីការប្របាច់ទឹកដោះ ? A- រក្សាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះនៅពេលម្តាយ ឬទារកមានជម្ងឺ B- ធ្វើឱ្យធ្ងន់ស្រាលនូវការស្ទះបំពង់បង្ហូរទឹកដោះ C- ធ្វើឱ្យដោះមិនអាចផលិតទឹកដោះបន្តទៀតបាន D- ធ្វើឱ្យធ្ងន់ស្បើយបញ្ហាលាសដោះ	C
127	តើអ្វីខ្លះដែលម្តាយគួរធ្វើដើម្បីការពារការលាសដោះ ? A- ចាប់ផ្តើមបំបៅដោះភ្លាមក្រោយសម្រាលរួច B- ការបំបៅដោះត្រូវឱ្យផ្អឹបជាប់ដោះល្អ C- មិនត្រូវកំណត់រយៈពេលបំបៅដោះឡើយ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
128	តើត្រូវណែនាំម្តាយដូចម្តេច ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការព្យាបាលការឈឺក្បាលដោះ ? A- លាងដោះមួយថ្ងៃ១ដង និង ជៀសវាងប្រើសាប៊ូ B- ជៀសវាងប្រើប៉ូម៉ាត ឬ ថ្នាំទឹក C- យកទឹកដោះចុងក្រោយលាបលើក្បាលដោះក្រោយបំបៅរួច D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
129	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃជម្ងឺលាក់ដោះដែលមានការបង្ករោគ ? A- ដុំនៅលើដោះ និង ឈឺអួលៗ គ្មានគ្រុន មិនឈឺចាប់ B- ស្ត្រីមានដោះក្រហមដោយដុំ និង ហើមរឹង C- ហើមរឹង ឈឺខ្លាំង ក្រហម និង មានគ្រុនក្តៅ D- ស្ត្រីមានដោះក្រហមដោយដុំ និង មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់	C
130	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃការស្ទះបំពង់បង្ហូរទឹកដោះ? A- ដោះមានដុំ និងឈឺអួលៗ គ្មានគ្រុន មិនឈឺចាប់ B- ដោះមានពណ៌ក្រហមដោយដុំ និង ហើមរឹង C- ដោះហើមរឹង ឈឺខ្លាំង ក្រហម និង មានគ្រុនក្តៅ D- ដោះមានពណ៌ក្រហមដោយដុំ និង មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់	A

131	តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកដោះជាដំបូង ? A- ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ B- ធ្វើឱ្យទឹកដោះហូរចេញធម្មតា C- ស្ត្រីដាក់លើដោះ D- ផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	B
132	តើបច្ចេកទេសណាមួយដែលសមស្របសំរាប់ព្យាបាលក្បាលដោះសំប៉ែត និង លិបចូលក្នុង ? A- ច្របាច់ទឹកដោះដាក់ពែង B- ឱ្យម្តាយទាញក្បាលដោះចេញមកក្រៅដោយប្រើស៊ីរ៉ាំងបូម C- ឱ្យទារកជញ្ជាក់ដោះឱ្យបានច្រើន D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
133	តើអ្វីខ្លះជាមុខងាររបស់ អ័រម៉ូនប្រូឡាក់ទីន ? A- ការផលិតទឹកដោះ B- ថែរក្សាទឹកដោះ C- ការបញ្ចេញទឹកដោះ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
134	តើអ្វីខ្លះជាមុខងាររបស់ អ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន ? A- ការផលិតទឹកដោះ B- ថែរក្សាទឹកដោះ C- ការបញ្ចេញទឹកដោះ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
135	តើអ្វីខ្លះជាគោលបំណងនៃការដាក់ទារកឱ្យស្បែកប៉ះ នឹង ស្បែកម្តាយក្រោយសម្រាលភ្លាមៗ ? A- ជួយជំរុញការបំបៅទឹកដោះម្តាយ ផ្តល់កំដៅ និងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងម្តាយនិងទារក B- ជួយឱ្យទារកលូតលាស់រាងកាយបានល្អប្រសើរនិងផ្តល់កំដៅ C- ជួយជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងម្តាយនិងទារក និង បន្ថយការឈឺចាប់ D- ជួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែកអារម្មណ៍របស់ទារកផ្តល់កំដៅ	A

136	តើនៅពេលណាដែលអ័រម៉ូនប្រូឡាក់ទីន រំញោចឱ្យមានការផលិតទឹកដោះច្រើន ? A- ពេលថ្ងៃ B- ពេលយប់ C- ពេលកំពុងបៅ D- គ្រប់ពេលដែលទារកបៅ	B
137	តើអ្វីខ្លះជាសកម្មភាពនៃអ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន នៅពេលម្តាយបំបៅដោះកូនក្រោយសម្រាលភ្លាមៗ? A- ជួយបញ្ឈប់ការធ្លាក់ឈាម B- ជួយឱ្យស្បូនកន្ត្រាក់ C- ជួយឱ្យសុកឆាប់រហ័ស D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
138	តើសមាសធាតុមួយណា ដែលល្អប្រសើរក្នុងការជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់ទារក ? A- ប្រូតេអ៊ីន B- ជាតិខ្លាញ់ C- ជាតិឡាក់តូស D- ជាតិទឹក និងសារធាតុដែក	B
139	តើចម្លើយមួយណាមាននៅក្នុងទឹកដោះម្តាយដែលផ្តល់សារៈប្រយោជន៍ដល់ទារកមិនគ្រប់គ្នា ? A- មានប្រូតេអ៊ីនច្រើនសំរាប់ប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគ B- ជួយឱ្យបញ្ចេញឈាមក្រៃបាតល្អ C- ជួយឱ្យទារកឆាប់ឆ្អែត D- ជួយឱ្យទារកមានពណ៌សម្បុរស្អាត	A

140	តើស្ថានភាពដូចម្តេច ដែលល្អបំផុតសំរាប់នៃការបីទារកដល់ការបំបៅទារកដោយទឹកដោះម្តាយដែលកើតមិនគ្រប់គ្រាន់ ? A- បីកូនដាក់ទទឹងខ្លួនម្តាយ B- បីកូនឈ្លៀតកូនដាក់ជ្រុំបក្រោមភ្លៀក C- បីកូនដោយទ្រដៃទាំងពីរ D- បីដងខ្លួនទារកជ្រុំបនឹងខ្លួនម្តាយ ហើយដៃម្តាយទ្រខ្លួនទារកទាល់មុខគ្នា	D
141	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្តាយ ? A- ម្តាយបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើទឹកដោះរបស់ខ្លួន B- ទារកអាចមានជម្ងឺផ្សេងៗ C- ប៉ះពាល់ដល់ការបំបៅដោះ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
142	តើត្រូវណែនាំម្តាយឱ្យធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីជួយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះម្តាយ ? A- ច្របាច់ដោះម្តាយឱ្យបានញឹកញាប់ B- បង្កើនការបំបៅទារកដោយជញ្ជាក់ដោះម្តាយឱ្យបានញឹកញាប់ C- ដាក់ទារកឱ្យបៅទឹកដោះម្តាយឱ្យបានជ្រុំបល្អ D- ម្តាយត្រូវបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយកូន	B
143	តើម្តាយប្រភេទណាខ្លះ ដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែជួយគាត់ក្នុងការបំបៅដោះ ? A- ម្តាយបំបៅកូនជាលើកដំបូង និងម្តាយមានការលំបាកក្នុងការបំបៅដោះ B- ម្តាយដែលកើតកូនមានទម្ងន់មិនគ្រប់គ្រាន់ C- ម្តាយដែលមានជុំនៅដោះ និងកូនមានទម្ងន់តិច D- ម្តាយដែលមានកូនច្រើនដង	A
144	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបន្ថយភាពហើមដោះនៅពេលលាសដោះ ក្រោយពេលបៅដោះរួច ? A- ឱ្យម្តាយសំរាកឱ្យបានច្រើន B- ឱ្យម្តាយហូបទឹកឱ្យបានច្រើន C- ដាក់ស្បែកជាក់នៅលើដោះទាំងពីរ D- ជួយច្របាច់បញ្ចេញទឹកដោះដោយប្រើដៃទាំងពីរ	C

145	តើសកម្មភាពមួយណាដែល មិនមែនជា វិធីសាស្ត្រក្នុងការរំលោភបំពានអ្នកស៊ីតុស៊ីន ? A- ម៉ាស្សាលើដោះដោយប្រើសំភារៈជំនួយ B- រំលោភក្បាលដោះរបស់ម្តាយ C- ច្របាច់ឈ្លីក្បាលដោះខ្លួនឯងស្រាលៗ D- ហូបភេសជ្ជៈក្តៅខ្លាំងៗ	A
146	តើកន្លែងមួយណាដែលបាក់តេរី Clostridium របស់ដំបូងតែតាណូសច្រើនរស់នៅ? A- ក្នុងទឹកមានភក់ B- ក្នុងដីជាពិសេស ដីស្ងួត C- ដីស្ងួតសម្បូរលាមកសត្វ D- ដីសើមសម្បូរលាមកសត្វ	D
147	តើអ្វីមួយដែល មិនមែនជាពេគសញ្ញាគ្លីនិកនៃការឆ្លងរោគក្រោយសម្រាល? A- មានការឈឺចាប់នៅមុំឆ្អឹងត្រគាក B- ដោះឡើងតឹងនៅថ្ងៃទីមួយក្រោយសម្រាល C- ទំហំស្បូនរួមតូចទៅវិញមានការឈឺតយ៉ាវ D- បើរំលោភដែលកាត់មានខ្ទុះ ហើយឈឺ	B
148	ហេតុអ្វីបានជាតើមានការឆ្លងរោគមុនសម្រាល តាមរយៈទឹកភ្លោះ និងស្រោមទឹកភ្លោះ ? A- ទឹកភ្លោះ និងស្រទាប់កូរីយុងបានបែកពេលចាប់ផ្តើមឈឺពោះសម្រាល B- ទឹកភ្លោះ និងស្រទាប់កូរីយុងបានបែកអំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាល C- ទឹកភ្លោះ និងស្រទាប់កូរីយុងបានបែកអំឡុងពេលជាមួយទារកសម្រាល D- ទឹកភ្លោះ និងស្រទាប់កូរីយុងបានបែកច្រើនម៉ោងមុនចាប់ផ្តើមឈឺពោះសម្រាល	D
149	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឱ្យថ្មេរនៃការកាត់ទ្វារ(Episiotomy)មិនជាប់ល្អ ? A- របបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ B- ចរន្តឈាមឆ្លងកាត់មិនសូវបានល្អ C- ការបង្ករោគនៅកន្លែងដេរ D- ការដេរជុំវិញការមិនបានល្អ	C

150	តើអ្វីមួយដែល មិនមែន ជាសញ្ញាគ្លីនិកនៃការបង្កពេកនៅកន្លែង Episiotomy? A- ក្រហមពណ៌ត្នោតនៅតែមនៃដំបៅ B- រលាកកូនកណ្តុរ C- ហើម និងក្តៅខ្លួន D- ហូរទឹករងៃមានឈាម	B
151	តើអ្វីមួយអាចជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យដោះឈឺតឹងខ្លាំង ឡើងក្រហមនៅអាទិត្យ ៣- ៤ក្រោយសម្រាល ? A- បួសដោះ B- ឡើងដោះ C- រលាកដោះ D- មហារីកដោះ	C
152	តើបញ្ហាអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវគិតដល់ពេលណាមានសញ្ញាជាក់ច្បាស់៖ ដោះឈឺតឹងខ្លាំងទាំងសង្វាងឬតែម្ខាងក្នុងថ្ងៃទី ៣- ៥ក្រោយសម្រាល ? A- បួសដោះ B- លាសដោះ C- រលាកដោះ D- ឡើងដោះ	B
153	តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបែកស្រោមទឹកភ្លោះដែលយើងអាចប្រើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកបាន? A- ២ម៉ោង B- ៦ម៉ោង C- ១២ម៉ោង D- ២៤ម៉ោង	C
154	តើត្រូវថែទាំមុខរបួសលើពោះ និង បើរីណេដែលមានខ្ទុះ ទឹករងៃកំណកឈាមយ៉ាងដូចម្តេច? A- លាងសំអាតរាល់ថ្ងៃ B- លាងសំអាត ២ដង/ថ្ងៃ C- លាងសំអាត ២ថ្ងៃ/ម្តង D- លាងសំអាត ៣ថ្ងៃ/ម្តង	A

155	តើអ្វីមួយដែល មិនមែន ជាមូលហេតុនៃការឡើងកំដៅបណ្តាលមកពីការក្លាយរោគក្រោយសម្រាល ? A- បើរំលោភមានខ្លះ B- ឈឺចាប់នៅមុំឆ្អឹងត្រគាក C- ឈឺនៅស្បូន និង Lochia ធំក្លិនស្អុយ D- ឈឺដោយសារឡើងដោះ	D
156	តើអ្វីមួយជាសញ្ញានៃការរលាកសសៃរ៉ែនសើ និងសសៃរ៉ែនជ្រៅ? A- ឈឺចាប់កំភួនជើង ពិសេសឈឺពេលសំរាក B- រមួលកំភួនជើង ពិសេសឈឺពេលសំរាក C- ឈឺចាប់កំភួនជើង ពិសេសឈឺពេលដើរ D- រមួលកំភួនជើង ពិសេសឈឺពេលដើរ	C
157	តើអ្វីមួយសញ្ញាណាមួយដែល មិនមែន ជារោគសញ្ញានៃការរលាកដៃស្បូន? A- គ្រុនក្តៅ មាន Lochia ច្រើន B- ឈឺរាលដាលនៅផ្នែកក្រោមពោះ C- ឈឺចាប់នៅសង្វាងពោះ D- ឈឺរាលដាលនៅផ្នែកទ្វារមាស	D
158	តើការឡើងកំដៅក្នុងកម្រិតទាបច្រើនកើតឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយសម្រាល? A- ៦ម៉ោង B- ១២ម៉ោង C- ២៤ម៉ោង D- ៤៨ម៉ោង	B
159	តើមេរោគឈ្មោះអ្វីដែលមិនធ្វើឱ្យឡើងកំដៅពេលមានការក្លាយរោគ ? A- Clostridium B- Staphylococcus C- Meninggococcus D- Streptococcus	A

160	តើរបៀបពិនិត្យស្បូនដើម្បីរកមើលពីការចុះនៃកំពូលស្បូនឆ្លុះបញ្ចាំងឬមិន? A-យកម្រាមដៃដាក់លើកំពូលស្បូនដោយយកផ្ចិតជាគោល B-យកម្រាមដៃដាក់លើពោះស្រ្តី ដើម្បីរកកំពូលស្បូន C-យកម្រាមដៃដាក់លើផ្ចិតស្រ្តី ដើម្បីរកទំហំស្បូន D-យកម្រាមដៃដាក់លើពោះស្រ្តី ដើម្បីរកទំហំស្បូន	A
161	ដើម្បីរកមើលសញ្ញាបង្កពេទ្យនៃទ្វារមាស តើឆ្លុះបញ្ចាំងពិនិត្យមើលអ្វីខ្លះចំពោះស្រ្តីសម្រាលកូនរួច? A-ពិនិត្យមើលពីស្នាមជាំ ការហើមប៉ោង B-ពិនិត្យមើលពីស្នាមជាំ សភាពនៃថ្មេរ C-ពិនិត្យមើលពីការហើមប៉ោង សភាពថ្មេរ D-ពិនិត្យមើលពីការហើមប៉ោង ស្នាមជាំនិងថ្មេរ	D
162	តើចំណេះដឹងណាមួយដែលមិនមែនជាការអប់រំអំពីអនាម័យខ្លួនប្រាណក្រោយពីសម្រាលកូនរួច? A-សំអាតក្រចកដៃ និងកាត់ឲ្យខ្លី B-ឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្តូរសំឡីទ្រាប់ឲ្យបានញឹកញាប់ C-ឆាប់ក្រោកឈរនិងដើររយៈពេល៦-៨ម៉ោងក្រោយសម្រាល D-ឲ្យស្រ្តីសំរាកឲ្យបានច្រើន	D
163	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពិនិត្យដោះស្រ្តីដើម្បីរកមើលអ្វីក្រោយសម្រាលកូនរួច? A-ពិនិត្យដោះ រកមើលភាពហើម B-ពិនិត្យមើលភាពហើម ភាពស្លេកស្លាំង C-ពិនិត្យភាពមើលពណ៌របស់ ដោះនិង ភាពហើម D-ពិនិត្យដោះ ភាពស្លេកស្លាំង	C
164	តើសរីរាង្គណាមួយដែលមិនដំណើរការប្រសិនបើស្រ្តីមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្លេកឆ្ងល់? A-តំរង់នោម B-បេះដូង C-សួត D-ក្រពះ	A

165	តើឆ្មបត្រូវសាកសួរពីបញ្ហាសុខភាពអ្វីខ្លះដល់ស្រ្តីដែលសម្រាលកូនរួចរយៈពេល៦សប្តាហ៍? A-គ្រុនក្តៅ បញ្ហាដោះ B-ការឈឺអាងត្រគាក C-ការធ្លាក់ស ធ្លាក់ឈាម D-ចំណីយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
166	ឆ្មបត្រូវទ្រាប់សំឡើងនាម័យក្រោមតូចស្រ្តីមុនពេលដែលលាងសំអាតទ្វារមាសក្នុងគោលបំណង៖ A-ជៀសវាងការសើម B-ជៀសវាងការហូរឈាម C-ជៀសវាងការបង្កពេត D-ជៀសវាងការហូរខ្ទុះ	A
167	តើឆ្មបត្រូវពិនិត្យដោះស្រ្តីរកមើលពីអ្វីក្រោយសម្រាលកូនរួច? A-មើលក្បាលដោះក្រែងមានខ្វាក់ B-មើលទំហំដោះទាំងសងខាង C-មើលការលាសដោះនិងទំហំដោះ D-មើលលក្ខណៈនៃដោះទាំងសង្វាង	D
168	តើសញ្ញា និងរោគសញ្ញាខាងក្រោមណាមួយដែលជាការក្លាយរោគក្រោយពេលសម្រាល? A- ពិបាកបត់ជើង ទល់ឈាមក B- ឈឺក្បាល និងកករឈ្លោកជុំភ្លិន C- ឡើងដោះ D- វិបត្តិកំណកឈាម	B
169	តើរបៀបថែទាំណាមួយដែលត្រឹមត្រូវចំពោះស្រ្តីដែលមានជំងឺបួសដោះ? A-បន្តបំបៅដោះកូនទោះបីមានខ្ទុះក៏ដោយ B-យកក្រណាត់ស្អាតដាក់លើដោះចន្លោះពេលបៅ C-បញ្ឈប់ការបំបៅដោះកូនបើមានខ្ទុះ D-ទ្រដោះដោយពាក់អាវទ្រនាប់	C

170	តើរបៀបគ្រប់គ្រងទូទៅនៃការក្តៅខ្លួនក្រោយសម្រាលណាមួយដែលមិនសមស្របធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅតែក្តៅខ្លួន? A-ផ្តល់ថ្នាំបន្ថយកំដៅ B-បំពេញជាតិទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ C-ផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក D-ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យតមអាហារ	D
171	ចំពោះបច្ចេកទេសនៃការដេរជួសជុលទ្វារមាសដែលរំហែក តើឆ្នបត្រូវធ្វើអ្វីជាដំបូង? A-ចាក់ថ្នាំស្លឹកទៅជ្រុងទាំងពីរនៃទ្វារមាសដែលបានកាត់ឬរំហែក B-ដេរស្រទាប់សាច់ដុំបើរំណេរដោយថ្មេរដាច់ៗ C-ដេរស្បែកបើរំណេរដោយថ្មេរដាច់ៗ D-ដេរទ្វារមាសបន្តជាប់គ្នា(ប្រើcatgut 2\0)	A
172	គោលបំណងសំខាន់នៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនដែលមានការដាច់រំហែកនិងមានការហូរឈាមឆ្នបត្រូវ៖ A-ពិនិត្យមើលពីសភាពទ្វារមាស B-ពិនិត្យមើលសភាពពណ៌ឈាមដែលហូរចេញមក C-ពិនិត្យរកមើលកន្លែងដែលដាច់រំហែកឬដុំឈាមក្រោមស្បែក D-ពិនិត្យមើលពីការហូរឈាមចេញមកក្រៅទ្វារមាស	C
173	តើសកម្មភាពមួយណាដែលមិនមែនជាការពិនិត្យមើលតំបន់បើរំណេរស្ត្រីក្រោយសំរាលកូនរួចរហូតដល់៦សប្តាហ៍? A-យកមេដៃនិងចង្កៀលដៃញែកបម្រុង B-ពិនិត្យមើលកករណ៍ បរិមាណនិងក្លិន C-ពិនិត្យថ្មេររកមើលភាពក្រហម ហើម ខ្ទុះ D-ពិនិត្យសភាពរន្ធនោម	D

174	តើចំណេះដឹងណាមួយដែលមិនចាំបាច់ ចំពោះការពិនិត្យស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនក្នុងអំឡុង៦សប្តាហ៍? A-កាន់ក្បាលដោះពិនិត្យមើលសភាពប្រេះចុងដោះ B-ពិនិត្យមើលកករណ៍ក បរិមាណនិងក្លិន C-ពិនិត្យថ្លើមរកមើលភាពក្រហម ហើម ខ្ទុះ D-ពិនិត្យរកមើលរន្ធនោម	D
175	ការប៉ាន់ប្រមាណការវិវត្តរបស់ស្បូន ចំពោះស្ត្រីក្រោយសម្រាល ពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តទម្រង់ការនេះឆ្ងបត្រូវ៖ A. ឲ្យស្ត្រីគេងផ្លាស់ប្តូរជង្គង់ B. ឲ្យស្ត្រីគេងសណ្តូកជើងហើយស្លាបរកកំពូលស្បូន C. ឲ្យស្ត្រីបត់ជើងតូចជាមុនសិន D. ម៉ាស្សាថ្មមៗលើកំពូលស្បូនមុននឹងស្លាប	C
176	ឆ្ងបបានធ្វើការថែទាំលើស្ត្រីក្រោយសម្រាលបាន១ថ្ងៃ ចំនួន៤នាក់ ។តើស្ត្រីណាដែលឆ្ងបរកឃើញថាមានភាពមិនធម្មតា ដែលត្រូវការធ្វើអន្តរាគមន៍មុនគេ? A. ស្ត្រីដែលមានការឈឺស្បូនក្រោយសម្រាល B. ស្ត្រីដែលមានជំងឺពចរលោត៦០/នាទី C. ស្ត្រីដែលមានការឡើងដោះនឹងហៀរទឹកដោះ D. ស្ត្រីដែលមានធ្លាក់កករណ៍កពណ៌ក្រហម និងជុំក្លិន	D
177	នៅពេលធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណលើស្ត្រីក្រោយសម្រាលម្នាក់ ឆ្ងបកត់សម្គាល់ឃើញថាមានវត្តមាននៃដុំឈាមក្នុងកករណ៍ក ដែលធំជាង១ស.ម។ ចំពោះហេតុការណ៍នេះ តើសកម្មភាពណាមួយដែលឆ្ងបត្រូវធ្វើ? A. រាយការណ៍ជូនគ្រូពេទ្យ B. កត់ត្រាចូលក្នុងសំណុំលិខិត C. ធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង D. លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដឹកទឹកឲ្យបានច្រើន	A

178	ស្ត្រីម្នាក់ទើបតែសម្រាលកូន បាន៤ម៉ោង ហើយមានសុខភាពល្អ ។ ឆ្លុបបានយកសញ្ញាជីវិតលើស្ត្រីនោះឃើញថាមានកំដៅ ៣៨អង្សាសេ តើឆ្លុបត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាឲ្យសមស្រប?	D
	A. រាយការណ៍ជូនគ្រូពេទ្យ B. កត់ត្រាចូលក្នុងសំណុំលិខិត C. ធ្វើការយកកំដៅរៀងរាល់១៥នាទីម្តង D. លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដឹកទឹកឲ្យបានច្រើន	
179	ស្ត្រីកូនទី៣ម្នាក់ទើបតែសម្រាលកូនគ្រប់ខែ បាន៦ម៉ោង ហើយទារកមានសុខភាពល្អ។ ស្ត្រីនោះមានការត្អូញត្អែរថា គាត់មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង និងវិលមុខ។ តើឆ្លុបត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាឲ្យសមស្របជាងគេ?	C
	A. កល់ជើងស្ត្រីឲ្យរាងខ្ពស់បន្តិច B. កត់សម្គាល់ពីកំរិតនៃ អេម៉ូគ្លូប៊ីន និងអេម៉ាតូគ្រីត C. ណែនាំស្ត្រីឲ្យសុំអ្នកជំនួយជួយលើក ពេលគាត់ចង់ក្រោកពីគ្រែ D. ត្រូវយកទារកចេញពីម្តាយ រហូតដល់គាត់មានអារម្មណ៍ស្រួលឡើងវិញ	
180	ឆ្លុបរៀបចំផែនការថែទាំស្ត្រីក្រោយសម្រាលបាន២ម៉ោង ស្ត្រីនោះបានធ្វើការកាត់ទ្វារមាស និងមានឫសដូងបាតផង តើរោគវិនិច្ឆ័យថែទាំណាមួយដែលជាអទិភាពចំពោះស្ត្រីនេះ?	A
	A. ការឈឺចាប់ខ្លាំងក្លា B. ផលរំខានដល់រាងកាយរបស់គាត់ C. ការពិបាកបត់ជើងតូច D. ការប្រឈមទៅនឹងមិនមានតុល្យភាពជាតិទឹក	
181	ឆ្លុបបានធ្វើការណែនាំស្ត្រីក្រោយសម្រាលឲ្យពិនិត្យមើលពីកករណ៍ធម្មតា ដែលហូរចេញមក ទាំងចំណុះនិងភាពផ្លាស់ប្តូរនៃពណ៌ផ្សេងៗ។ ឆ្លុបធ្វើការណែនាំថាជាធម្មតាការផ្លាស់ប្តូរសំឡីអនាម័យ នៅថ្ងៃដំបូងគឺមិនត្រូវឲ្យលើសពី:	D
	A. ២ដុំក្នុងមួយថ្ងៃ B. ៤ដុំក្នុងមួយថ្ងៃ C. ៦ដុំក្នុងមួយថ្ងៃ D. ៨ដុំក្នុងមួយថ្ងៃ	

182	ឆ្លុបផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់ស្ត្រីក្រោយសម្រាលពីការបំបៅដោះកូន តើការណែនាំខាងក្រោមណាមួយដែលឆ្លុបគួរបន្ថែមក្នុងពេលនោះ? A. លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន B. វិភាមីនសម្រាប់ពេលមានផ្ទៃពោះគួរតែបញ្ឈប់ C. ត្រូវលាងដោះជាមួយសាប៊ូនិងទឹក D. មិនចាំបាច់ធ្វើការពន្យារកំណើតកូនទេ	A
183	ស្ត្រីក្រោយសម្រាលម្នាក់មានការរលាកផ្លែកនោម ឆ្លុបបានរៀបចំគម្រោងអន្តរាគមន៍ថែទាំស្ត្រីនោះដោយៈ A. ឧស្សាហ៍ឲ្យស្ត្រីងូតទឹកសំអាតខ្លួន B. លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន C. ស្តុំទឹកកកលើបើរីណេ D. តាមដានកំរិតអេម៉ូតូប៊ីន និងអេម៉ាតូគ្រីត	B
184	ឆ្លុបបានរៀបចំគម្រោងថែទាំលើស្ត្រីដែលទើបសម្រាលកូនរួច ដោយមានដុំឈាមក្រោមស្បែកនៅទ្វារមាស បន្តិច (Hematoma) តើអន្តរាគមន៍ណាមួយដែលឆ្លុបត្រូវបញ្ចូលសម្រាប់ថែទាំក្នុង១២ម៉ោងក្រោយសម្រាល? A. វាយតម្លៃសញ្ញាជីវិតរៀងរាល់៤ម៉ោងម្តង B. តាមដានកំពូលស្បូនរៀងរាល់៤ម៉ោងម្តង C. ស្តុំទឹកកកលើទ្វារមាស D. ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់	C
185	ឆ្លុបបានរៀបចំធ្វើការវាយតម្លៃពីការកន្ត្រាក់នៃស្បូនលើស្ត្រីក្រោយសម្រាលភ្លាមៗពេលកំពុងវាយតម្លៃនោះ ឃើញថា ស្បូនរបស់ស្ត្រីនោះទន់ តើឆ្លុបត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ណាមួយ? A. លើកជើងស្ត្រីឡើងខ្ពស់បន្តិច B. លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីបត់ជើងតូច C. ធ្វើការម៉ាស្សាស្បូនរហូតដល់ឡើងរឹង D. បញ្ជាក់ណែនាំឈាមចេញពីស្បូនឲ្យអស់	C

186	ឆ្លុះបញ្ចាំងការរៀបចំគំរោងថែទាំក្រោយសម្រាលចំពោះស្រ្តីដែលមានបញ្ហារលាកសរសៃរ៉ែនជ្រៅ(Dep veinous thrombophlebitis)នៅជើង តើសមាសភាគណាមួយដែលជាអន្តរាគមន៍ ក្នុងការថែទាំចំពោះ ស្រ្តីនោះ? A. ធ្វើការប្រែប្រួលចលនាឲ្យបាន៤ដងក្នុង១ថ្ងៃ B. ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ឈាមកក C. លើកជើងដែលមានបញ្ហាឲ្យខ្ពស់ជាងដងខ្លួន D. ស្តុំទឹកកកលើកន្លែងដែលមានបញ្ហា	C
187	ស្រ្តីក្រោយសម្រាលម្នាក់បានត្អូញត្អែរថាមានការឈឺទ្រូងភ្លាមៗ។ ពេលពិនិត្យឆ្មបកត់សម្គាល់ ឃើញថា ចង្វាក់បេះដូងនិងដង្ហើម របស់គាត់ញាប់ សង្ស័យថាគាត់មានបញ្ហា កំណកឈាមស្ទុះនៅសួត(Pulmonary embolism) តើសកម្មភាពណាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងធ្វើមុនគេ? A. ចាប់ផ្តើមចាក់បញ្ចូលសារធាតុរាវតាមសរសៃឈាម B. ធ្វើការយកសម្ភាធឈាម C. រៀបចំផ្តល់ឱសថ Morphine Sulfate D. ផ្តល់អុកស៊ីហ្សែន ៨ទៅ១០លីត្រតាមម៉ាស់	D
188	តើចំណុចសំខាន់នៃការតាមដានក្រោយសម្រាលពីសញ្ញាបំរុងគ្រោះថ្នាក់/គ្រោះថ្នាក់ A-វាយតម្លៃពីសភាពស្បូន B-ការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស C-សញ្ញាជីវិត D-ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
189	តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចបើស្បូននៅតែទន់ និងមានដក់កំណកឈាម ? A- ចាក់ Oxytocin B- មាស្យា ស្បូន C- ចាក់ស្បែក D- ទប់សង្កត់ស្បូន	B

190	កត្តាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចំបងណាមួយដែលបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកចំពោះស្ត្រីក្រោយសម្រាល ? A- ការក្លាយរោគ B- សល់កំទេចសុកក្នុងស្បូន C- ធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល D- បញ្ហាជំងឺស្លេកស្លាំង	D
191	តើការពិនិត្យរកការកន្ត្រាក់ស្បូនក្នុងអំឡុងម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វី ? A- ស្បូនកន្ត្រាក់ឡើងវិញ B-ការធ្លាក់ឈាម C-ការវិលត្រលប់មកធម្មតាវិញនៃស្បូន D- ការរំហែកមាត់ស្បូន	B
192	តើក្រោយពេលសម្រាលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ស្ត្រីអាចចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះម្តងទៀត ? A-៦សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាល B-៨សប្តាហ៍ C-១០សប្តាហ៍ D- ១២សប្តាហ៍	A
193	តើមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយក្រោយពីសម្រាល ដែលស្ត្រីត្រូវត្រឡប់មករកសេវាសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ ? A- រាគចុកពោះ និងក្អួតចង្កោរ B- ឈឺផ្សាត្រង់រន្ធនោម C- ធ្លាក់ឈាម ក្តៅខ្លួនខ្លាំង D- ធ្លាក់ឈាមដូចឈាមរដូវ	C
194	តើសកម្មភាពអ្វីដែលជាការថែទាំម្តាយបន្តក្នុងអម្បុងក្រោយសម្រាលមួយសប្តាហ៍ ? A-ពិនិត្យដោះ B-ការវិលត្រលប់មកធម្មតាវិញរបស់ស្បូន C-បរិមាណពណ៌ និងក្លិនរបស់ lochia D-ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

195	តើកន្លែងណាដែលជាប្រភពនៃការធ្លាក់ឈាមដោយស្បូនមិនកម្រិតក្រោយពេលទំលាក់សុក ? A- ទ្វារមាស B- មាត់ស្បូន C- កន្លែងសុកតោង D- ដៃស្បូន	C
196	តើកាលវិភាគនៃការថែទាំស្ត្រីក្រោយសម្រាលមានប៉ុន្មានលើក ? A- ចំនួន ៤លើក B- ចំនួន ៥លើក C- ចំនួន ៦លើក D- ចំនួន ៧លើក	A
197	ដើម្បីរក្សាកំដៅទារកទើបនឹងកើត, តើអ្នកត្រូវរង្វង់ទឹកឱ្យទារកនៅពេលណា ? A- ១ម៉ោងក្រោយសម្រាល B- ៦ម៉ោងក្រោយសម្រាល C- ១២ម៉ោងក្រោយសម្រាល D- ២៤ម៉ោងក្រោយសម្រាល	D
198	តើមានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះការមិនរំចង់ទង់ទ្វីតលើទារកទើបនឹងកើត ? A- ជួយឱ្យទង់ទ្វីតឆាប់ស្ងួត និងការពារក្លិនស្អុយ B- ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យ និងតាមដាន C- ជួយឱ្យទង់ទ្វីតឆាប់ស្ងួតនិងការពារការឆ្លងរោគ D- ងាយស្រួលសម្អាត	A
199	តើអ្វីជាសញ្ញានៃការបង្ករោគលើទង់ទ្វីតចំពោះទារកទើបកើត ? A- ក្តៅខ្លួន B- បៅតិចតួច ឬមិនបៅសោះ C- ទង់ទ្វីតក្រហមហូរខ្ទុះមានក្លិនស្អុយ D- ទង់ទ្វីតរលួយ មិនជ្រុះ	C

200	តើនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវផ្តល់វីតាមីន K1 ដល់ទារកទើបនឹងកើត ? A- ១ថ្ងៃក្រោយពេលកើត B- ពេលកើតមកភ្លាម C- ១ខែក្រោយពេលកើត D- រួមជាមួយការចាក់ថ្នាំបង្ការ	B
201	តើជាទូទៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយកើតដែលទង់ផ្ចិតទារកជ្រុះ ? A- ៩ ទៅ ១២ថ្ងៃ B- ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ C- ៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ D- ៣ ទៅ ៤ ថ្ងៃ	C
202	តើចំណុចសំខាន់ណាមួយដែលត្រូវធ្វើការអប់រំស្ត្រីក្រោយសម្រាល ? A- អនាម័យខ្លួនប្រាណ B- របបអាហារ និងការសម្រាក C- ការបំបៅដោះ និងការពន្យារកំណើត D- របបអាហារ និងការបំបៅដោះ	D
203	តើត្រូវជួយសម្រួលស្ត្រីដែលមានការពិបាកនោមក្រោយសម្រាលដូចម្តេច ? A- ឱ្យលេបថ្នាំ B- ដឹកទឹកឱ្យបានច្រើន C- ចាក់ទឹកក្តៅឧណ្ហាៗលើប្រដាប់ភេទ D- ចាក់សេរ៉ូម	C
204	តើការឆ្លងរោគចំពោះស្ត្រីក្រោយសម្រាលកើតមាននៅពេលណា ? A- អម្បងពេលសម្រាល B- មុនសម្រាល C- ក្រោយពេលសម្រាល D- មុនមានផ្ទៃពោះ	C

205	ឆ្លបបានធ្វើការថែទាំស្រ្តីក្រោយសម្រាលទារកបាន១ថ្ងៃ ។ តើចង្ហើយណាមួយខាងក្រោមបង្ហាញថាឆ្លបត្រូវការថែទាំបន្ថែមទៀត? A.អេម៉ូតូប៊ីន B.គ្រប់ឈាមស C.ជីពចរ D.កម្ដៅ	D
206	ស្រ្តីម្នាក់ក្រោយពីសម្រាលកូនដំបូងបាន២ម៉ោង ដោយមានការហែកទ្វារមាសកំរិត១ ។ ទ្វារមាសរបស់គាត់ហើមបន្តិច(កំរិត១) ហើយមានការឈឺកំរិត ៦/១០ តើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ដ៏សមរម្យណាមួយដែលឆ្លបត្រូវធ្វើនៅពេលនេះ? A.ចាប់ផ្ដើមងូតទឹកសម្អាតខ្លួន B.ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តាមវេជ្ជបញ្ជា C.ដាក់ស្ប៉ូទឹកកកនៅទ្វារមាស D.បាញ់ថ្នាំស្ពឹកលើកន្លែងឈឺចាប់	B
207	ថាវី មានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែ ទើបតែសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ថ្លោះ។ ឆ្លបកំណត់ពីកត្តាប្រឈមមុខបឋមចំពោះថាវី គឺ៖ A.ឱនភាពចំណេះដឹង B.ការឈឺចាប់ស្រួចស្រាវ C.មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបៅដោះកូន D.បាត់បង់ជាតិទឹក	D
208	ធីតាបានបំបៅកូនដោយទឹកដោះ រូបមន្ត ក្រោយពីសម្រាលកូនបាន១២ម៉ោងមក ។ ធីតាបានសួរទៅឆ្លបថា "តើពេលណាទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានរដូវឡើងវិញ" ឆ្លបឆ្លើយថា៖ A.រដូវនៃឈាមរដូវរបស់ប្អូននឹងមានវិញនៅ៣ទៅ៤អាទិត្យបន្ទាប់" B.អ្នកប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមមានរដូវនៅអាទិត្យទី ៦ទៅទី១០" C.អ្នកអាចរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមមានរដូវនៅអាទិត្យទី ១២ទៅទី១៤" D.រដូវរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមាននៅអាទិត្យទី ១៦ទៅទី១៨"	B

209	ក្រោយសម្រាលកូនបាន១ថ្ងៃស្រ្តីកូនដំបូងម្នាក់បានប្រាប់ឆ្លបថា នាងមានការឈឺចាប់ម្តុំប៉េរីណេកំរិតទី៥ (Scale of pain) ។២ម៉ោងក្រោយពីប្រើថ្នាំ Ibuprofen 800mg មិនបាត់ឈឺមក ឆ្លបធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពី៖ A.ការក្លាយរោគក្រោយសម្រាល B.មានការដាច់ថ្មេរនៅទ្វារមាស C.ប្រវត្តិនៃការញៀនថ្នាំ D.មានកំណកឈាមក្រោមស្បែក(Hematoma)	D
210	ចាន់នីទើបតែសម្រាលកូនដំបូងបាន៨ម៉ោង បានសម្រេចចិត្តឆ្លងទឹកសម្អាតខ្លួនដោយខ្លួនឯង ។ តើឆ្លបដែលកំពុងថែទាំស្រ្តីនៅសម្រាកក្បែរចាន់នីនោះ ត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីចាន់នីលើអ្វី? A.ភាពអស់កម្លាំង B.ឯងធិតមុខ C.ការបត់ជើងតូច D.តម្រូវការអនាម័យ	B
211	ក្រោយពីណែនាំស្រ្តីសម្រាលកូនដំបូងស្តីពី ការថែទាំការកាត់ទ្វារមាសក្រោយសម្រាល ឆ្លបធ្វើការវាយតម្លៃថាស្រ្តីមានការយល់ដឹងពីការថែទាំ ។ តើចម្លើយណាមួយដែលបង្ហាញថាស្រ្តីនោះមានការយល់ដឹង? A. ខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតតំបន់ដែលកាត់ទ្វារមាសដោយទឹកពពុះសាប៊ូ B.ខ្ញុំនឹងផ្តិតសម្អាតតំបន់ដែលកាត់ទ្វារមាសពីមុខទៅក្រោយដោយថ្មមៗ C.ខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតតំបន់ដែលកាត់ទ្វារមាសដោយទឹកត្រជាក់មុនពេលចូលគេង D.ខ្ញុំអាចស្តូរទឹកកក២ទៅ៣ថ្ងៃក្រោយសម្រាល	B
212	ក្រោយសម្រាលបាន១១ថ្ងៃ សុភាបានមកមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធ្វើការពិនិត្យតាមដានក្រោយសម្រាល សុភាប្រាប់ទៅឆ្លបថានាងមានសុខភាពល្អទេ ។ នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ តើកករណ៍របស់សុភាមានពណ៌ដូចម្តេច? A. ពណ៌ក្រហមក្រមៅ B.ពណ៌ផ្កាឈូក C.ពណ៌ត្នោត D.ពណ៌ស	B

213	សារៀនសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់ ដែលមានទម្ងន់ ៤.៣០គីឡូក្រាម ដោយសារកូនរបស់គាត់ថ្លោះពេក បណ្តាលឲ្យរហែកទ្វារមាសកំរិតទី៣ នឹងមានការដេរទ្វារមាសឡើងវិញ។ ២ថ្ងៃក្រោយសម្រាលឆ្លបបាន រៀបចំគម្រោងប៉ានប្រមាណដល់សារៀន តើចម្លើយណាមួយដែលជាការប៉ានប្រមាណដ៏សំខាន់ជាងគេ? A. ការទល់ឈាមក B. រាក C. ការធ្លាក់ឈាមខ្លាំង D. ការឆ្លុះរន្ធគូថ	A
-----	--	---