

សំណួរមានចម្លើយជ្រើសរើសច្រើន

1	តើទារកទើបកើត ត្រូវការទឹកដោះប្រចាំថ្ងៃចំនួនប៉ុន្មានមីលីលីត្រក្នុង១គីឡូក្រាមនៃទម្ងន់ខ្លួន? A- ៧០- ៩០ ម.ល B- ៨០- ១០០ ម.ល C- ៩០- ១០០ ម.ល D- ១០០- ១២០ ម.ល	B
2	តើក្រពះរបស់ទារកទើបនឹងកើតផ្ទុកបានចំណុះប្រហែលប៉ុន្មាន? A- ៦០ ម.ល B- ៧០ ម.ល C- ៨០ ម.ល D- ៩០ ម.ល	D
3	តើការបំបៅដោះរបស់ទារកមានចន្លោះពេលប៉ុន្មានម៉ោងម្តង? A- ២ម៉ោងកន្លះ- ៣ម៉ោង B- ២ម៉ោងកន្លះ- ៤ម៉ោង C- ២ម៉ោងកន្លះ- ៥ម៉ោង D- ២ម៉ោងកន្លះ- ៦ម៉ោង	B
4	តើកុមារអាយុ៥ឆ្នាំ មានទម្ងន់ជាមធ្យមប៉ុន្មានគីឡូក្រាម? A- ១០ គ.ក្រ B- ២០ គ.ក្រ C- ២៥ គ.ក្រ D- ៣០ គ.ក្រ	B
5	តើកុមារអាយុ៥ឆ្នាំ ត្រូវការសារធាតុរាវចំនួនប៉ុន្មានក្នុង២៤ម៉ោង? A- ៧៥០ម.ល B- ១.០០០ម.ល C- ១.៥០០ ម.ល D- ២.០០០ ម.ល	C

6	តើអាហារមួយណាដែលជាអាហារពេលព្រឹកល្អជាងគេ ចំពោះកុមារក្នុងវ័យសិក្សា ? A- ទឹកដោះគោ B- ទឹកសណ្តែក C- បបរគ្រឿង D- ផ្លែឈើ	C
7	តើកុមារក្នុងវ័យសិក្សា ត្រូវការថាមពលប៉ុន្មានគីឡូកាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ ? A- ២៤០០គីឡូកាឡូរី B- ២០០០គីឡូកាឡូរី C- ១៥០០គីឡូកាឡូរី D- ១២០០គីឡូកាឡូរី	A
8	តើកុមារមានសុខភាពល្អ អាយុ៨ឆ្នាំមានទម្ងន់ប្រហែលប៉ុន្មាន ? A- ២០ គ.ក្រ B- ២៥ គ.ក្រ C- ៣០ គ.ក្រ D- ៣៥ គ.ក្រ	C
9	តើកុមារដែលមានអាយុពី៦- ១២ឆ្នាំ ត្រូវការជាតិទឹកប្រហែលប៉ុន្មានមីលីលីត្រក្នុង១ថ្ងៃ? A- ១១២០ ម.ល B- ១២៥០ ម.ល C- ១៥២៥ ម.ល D- ១៧៥០ ម.ល	D
10	តើមនុស្សដែលមានអាយុពី១២- ១៨ឆ្នាំ ត្រូវការកាឡូរីសរុបប្រហែលប៉ុន្មានក្នុង១ថ្ងៃ? A- ១០០០- ១២០០មក្រ B- ១១០០- ១៣០០មក្រ C- ១២០០- ១៥០០មក្រ D- ១២០០មក្រ- ១៦០០មក្រ	C

11	តើស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះកូន ត្រូវការថាមពលបន្ថែមប្រហែលប៉ុន្មានកាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ? A- ២០០គីឡូកាឡូរី B- ៣០០គីឡូកាឡូរី C- ៤០០ គីឡូកាឡូរី D- ៥០០គីឡូកាឡូរី	D
12	តើស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះកូន ត្រូវការប្រូតេអ៊ីនបន្ថែមរាល់ថ្ងៃប្រហែលប៉ុន្មានក្រាមក្នុង១ថ្ងៃ ? A- ១២- ១៥ក្រាម B- ១៨- ២២ក្រាម C- ២០- ២៥ក្រាម D- ២៥- ៣០ក្រាម	B
13	តើសារជាតិអាហារអ្វីខ្លះជាសារជាតិពិសេសសំរាប់មនុស្សចាស់ ? A- ប្រូតេអ៊ីន B- ជាតិរ៉ែ (កាល់ស្យូម) C- វីតាមីន និងអាហារសរសៃ D- ចម្អើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
14	តើបុរសដែលមានសុខភាពល្អត្រូវចំណាយថាមពលចំនួនប៉ុន្មានកាឡូរីក្នុង១ គ.ក្រនៃទម្ងន់ខ្លួនក្នុង២៤ម៉ោង ? A- ០.៥០កាឡូរី B- ០.៧៥កាឡូរី C- ០.៩កាឡូរី D- ១កាឡូរី	D
15	តើស្ត្រីដែលមានសុខភាពល្អត្រូវចំណាយថាមពលចំនួនប៉ុន្មានកាឡូរីក្នុង១ គ.ក្រនៃទម្ងន់ខ្លួនក្នុង២៤ម៉ោង ? A- ០.៥កាឡូរី B- ០.៧៥កាឡូរី C- ០.៩កាឡូរី D- ១កាឡូរី	C

16	តើមនុស្សនៅពេលដេកលក់ត្រូវចំណាយថាមពលប៉ុន្មានភាគរយធៀបទៅនឹងថាមពលពេលសំរាក(REE)? A- ៧០% B- ៨០% C- ៩០% D- ១០០%	C
17	តើពេលធ្វើការងារផ្ទះស្រាលៗត្រូវចំណាយថាមពលប៉ុន្មានភាគរយធៀបទៅនឹងថាមពលពេលសំរាក ? A- ១៨០% B- ២១០% C- ២២០% D- ២៥០%	B
18	តើនៅពេលធ្វើការងារធ្ងន់ត្រូវចំណាយថាមពលប៉ុន្មានភាគរយធៀបទៅនឹងថាមពលពេលសំរាក(REE)? A- ២០០% B- ៣០០% C- ៤០០% D- ៥០០%	C
19	តើពេលធ្វើការបញ្ចេញពលកម្មត្រូវចំណាយថាមពលប៉ុន្មានភាគរយធៀបទៅនឹងថាមពលពេលសំរាក ? A- ៤០០% B- ៥០០% C- ៦០០% D- ៧០០%	B

20	តើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលម៉ាស់រាងកាយមានកម្រិតតូចជាង១៦ ? A- កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ B- ធម្មតា C- ស្គម D- លើសទម្ងន់	A
21	តើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលម៉ាស់រាងកាយមានកម្រិតចាប់ពី ១៦- ១៩ ? A- ធម្មតា B- កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ C- ធាត់ D- ស្គម	D
22	តើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលម៉ាស់រាងកាយមានកម្រិតចាប់ពី២៦- ៣០ ? A- លើសទម្ងន់ B- ធម្មតា C- ស្គម D- ធាត់ល្មម	A
23	តើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលម៉ាស់រាងកាយមានកម្រិតចាប់ពី៣១- ៤០ ? A- ធម្មតា B- ធាត់ខ្លាំង C- ធាត់ល្មម D- លើសទម្ងន់	C
24	តើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលម៉ាស់រាងកាយមានកម្រិតលើសពី៤០ ? A- ធម្មតា B- លើសទម្ងន់ C- ធាត់ល្មម D- ធាត់ខ្លាំង	D

25	តើជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ(Body IA- I)មានប៉ុន្មានភាគរយ ចំពោះស្ត្រីមានសុខភាពល្អក្នុងអាយុ ចន្លោះពី ១៨- ៣៩ឆ្នាំ ? A- ១៨- ២០% B- ២១- ៣២% C- ២៥- ៣៥% D- ៣០- ៤០%	B
26	តើជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ(Body IA- I)មានប៉ុន្មានភាគរយ ចំពោះបុរសមានសុខភាពល្អក្នុងអាយុ ចន្លោះពី ១៨- ៣៩ឆ្នាំ ? A- ៥- ១៥% B- ៧- ១៥% C- ៨- ១៥% D- ១០- ២០%	C
27	តើអាហារមួយណាដែលភាគច្រើនមានកាបូអ៊ីដ្រាត ? A- ខ្លាញ់ B- សាច់ - ស៊ីត C- ស្រូវសាឡី D- ត្រីសមុទ្រ	C
28	តើអាហារមួយណាដែលសំបូរដោយកាល់ស្យូម ? A- ឆ្អើមតោ B- ប្រាម៉ា C- សាច់មាន់ D- ក្រូឡែន	B
29	តើអាហារមួយណាដែលផ្តល់នូវជាតិដែកច្រើនជាងគេ? A- ឆ្អើមតោ B- ត្រីសមុទ្រ C- សាច់ទ្រូងមាន់ D- កំពឹស	A

30	តើអាហារមួយណាដែលសំបូរដោយជាតិសរសៃ ? A- ស្រូវសាឡី B- សណ្តែកបារាំង C- សណ្តែកដី D- សណ្តែកសៀង	B
31	តើសារធាតុណាខ្លះដែលជួយសារពាង្គកាយក្នុងការបំប្លែង និងប្រើប្រាស់ វីតាមីន អា ? A- ខ្លាញ់ វីតាមីន អ៊ី និង ប្រូតេអ៊ីន B- ខ្លាញ់ សង្ក្រឹល និង វីតាមីន អ៊ី C- ខ្លាញ់ ប្រូតេអ៊ីន និង សង្ក្រឹល D- ខ្លាញ់ ប្រូតេអ៊ីន សង្ក្រឹល និង វីតាមីន អ៊ី	D
32	តើវីតាមីនមួយណា ដែលជួយឱ្យភ្នែកភ្លឺល្អ ? A- វីតាមីន អា B- វីតាមីន សេ C- វីតាមីន អ៊ី D- វីតាមីន ដេ	A-
33	តើសារពាង្គកាយត្រូវការវីតាមីន ហ្វូឡាត(folA- te) ឬអាស៊ីតហ្វូលិច ដើម្បីធ្វើអ្វី ? A- ដុតសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងការបង្កើតថាមពល B- ជំរុញមេតាបូលីសកាល់ស្យូម និងជួយជំរុញឱ្យបង្កើតអេម៉ូក្លូប៊ីន C- ជួយឱ្យសារពាង្គកាយរីកចម្រើន និងធ្វើឱ្យគោលិតកម្មមានសុខភាពល្អ D- ជំរុញមេតាបូលីសជាតិស្ករ និងកាល់ស្យូម	C
34	តើសារពាង្គកាយត្រូវការវីតាមីន សេ ដើម្បីធ្វើអ្វី ? A- ដើម្បីកសាងផ្លែ និងសរសៃឈាម B- ជំរុញមេតាបូលីសកាល់ស្យូម C- ជួយជំរុញឱ្យបង្កើតអេម៉ូក្លូប៊ីន D- ជំរុញមេតាបូលីសជាតិស្ករ និងកាល់ស្យូម	A

35	តើសារពាង្គកាយត្រូវការវីតាមីន ដេ ដើម្បីធ្វើអ្វី ? A- ជួយសារពាង្គកាយឱ្យប្រើប្រាស់កាល់ស្យូម និង ជីវជាតិដែក B- ជំរុញមេតាបូលីសកាល់ស្យូម និងជួយជំរុញឱ្យសារពាង្គកាយអម្ពក្ខប៊ីន C- ជួយឱ្យសារពាង្គកាយរីកធំធាត់ និងធ្វើឱ្យគោលិតក្រហមមានសុខភាពល្អ D- ជួយសារពាង្គកាយឱ្យស្រូប និងប្រើប្រាស់កាល់ស្យូម ហើយនិងហ្វូស្វ័រ	D
36	តើអាហារមួយណា ដែលជាប្រភពសំបូរ ប្លូតាស្យូម ? A- ចេក និង បន្លែពណ៌បៃតង B- ចេក និងទឹកដូង C- ចេក និង កាវ៉ាត D- ចេក និងដំឡូង	B
37	តើនៅពេលណាខ្លះដែលស្ត្រីខ្លះគោលិតក្រហម ត្រូវការជាតិដែកបន្ថែម ? A- ពេលមានផ្ទៃពោះ B- ពេលមានការហូរឈាមមកក្រៅ C- ក្រោយពេលសម្រាល D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
38	តើតាមរយៈអ្វី ដែលសារពាង្គកាយយើងបញ្ចេញជាតិដែកដែលសល់ពីការបំបែកស្រូបចូលចោល ? A- លាមក B- ទឹកនោម C- ទឹកមាត់ D- ញើស	A
39	តើអ័រម៉ូនមួយណាដែលក្រពេញទីរ៉ក្សប្រើប្រាស់អ៊ុយ៉ុនដើម្បីបង្កើតវា ? A- អាំងស៊ុយលីន B- ទីរ៉កស៊ីន C- អាដ្រេណាលីន D- អ៊ីសូសែន	B

40	តើអាហារដែលសំបូរអ៊ីយ៉ូឌីន (iodine) មានប្រភពមកពីតំបន់ណា? A- តំបន់ភ្នំ B- តំបន់ទំនាប C- ខ្ពង់រាប D- សមុទ្រ	D
41	តើផ្លឹង និងធ្មេញ ផ្សំឡើងដោយសារអ្វីខ្លះ ? A- ប្រូតេអ៊ីន និង កាល់ស្យូម B- ស័ង្កសី និង ជាតិដែក C- ប្លាស្ទិក និង Fluoride D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
42	ហេតុអ្វីបានជាក្មេងកំពុងលូតលាស់ត្រូវការកាល់ស្យូម ? A- បង្កើតអេម្បូកូប៊ីន B- បង្កើតគោលិកាក្រហម C- បង្កើតគោលិកាផ្លឹងថ្មី D- ចម្លើយ ក ខ ត្រឹមត្រូវ	C
43	តើជម្ងឺមួយណាដែលបង្កឡើងដោយសារកង្វះជាតិកាល់ស្យូម ចំពោះស្ត្រីដែលអស់រដូវ ? A- ជម្ងឺបេះដូង B- ជម្ងឺពុកផ្លឹង C- ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ D- ជម្ងឺខ្សោយតម្រង់នោម	B
44	តើបញ្ហាណាខ្លះដែលបណ្តាលមកពីកង្វះជាតិស័ង្កសី ចំពោះកុមារ ? A- ការរីកលូតលាស់យឺត B- ការប្រឈមមុខនឹងការបង្កពេត C- រាករូស D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

45	តើក្រុមមនុស្សប្រភេទណា ដែលត្រូវការជាតិស័ង្កសី ច្រើនជាងគេ ? A- កុមារដែលកំពុងលូតលាស់ B- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ C- ស្ត្រីបំបៅដោះកូន D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
46	តើការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិប្រៃ ប្រឈមនឹងជម្ងឺអ្វីខ្លះ ? A- សម្ពាធឈាមកើនឡើង B- ទឹកនោមផ្អែម C- ទឹកនោមប្រៃ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	A
47	តើមនុស្សទម្ងន់៥០ គក្រ មានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនប្រហែលប៉ុន្មានលីត្រ ? A- ២១ លីត្រ B- ២៥ លីត្រ C - ៣១ លីត្រ D- ៣៥ លីត្រ	C
48	តើក្មេងទម្ងន់ ១០គក្រ មានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនប្រហែលប៉ុន្មានលីត្រ ? A- ៨លីត្រ B- ៦ លីត្រ C - ៥ លីត្រ D- ៣ លីត្រ	A-
49	តើអាហារណាខ្លះដែលជាអាហារសំបូរជាតិដែក ? A- សាច់ B- បន្លែបៃតង C- គ្រាប់ធញ្ញជាតិ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D

50	តើសារពាង្គកាយត្រូវការជាតិស័ង្កសី ប្រហែលប៉ុន្មានមីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ? A- ២- ៣ មីលីក្រាម B- ៤- ៦ មីលីក្រាម C- ៨- ១០ មីលីក្រាម D- ១០- ១៥ មីលីក្រាម	B
51	តើសារធាតុណាខ្លះ ដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមផ្តល់ជាមពលខ្ពស់ ? A- កាបូអ៊ីប្រាត និង ខ្លាញ់ B- ខ្លាញ់ និង ប្រូតេអ៊ីន C- ប្រូតេអ៊ីន និង កាបូអ៊ីប្រាត D- ខ្លាញ់ កាបូអ៊ីប្រាត និង ប្រូតេអ៊ីន	D
52	តើស្ត្រីដែលអស់រដូវគួរតែញាំឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នូវអាហារដែលសំបូរជាតិអ្វី ដើម្បីការពារជម្ងឺពុកឆ្អឹង ? A- កាល់ស្យូម និងវីតាមីនអ៊ី B- កាល់ស្យូម និងវីតាមីនដេ C- កាល់ស្យូម និងវីតាមីនបេ២ D- កាល់ស្យូម និងវីតាមីនអា	B
53	តើកង្វះវីតាមីន B២ អាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហា អ្វី ? A- ងងឹតភ្នែក B- ស្លឹកស្រពន់ C- ប្រេះមាត់ ដំបៅមាត់ D- ជម្ងឺសើរស្បែក	C
54	តើការរំលោភមាននៅក្នុងអ្វី? A- ទឹកដោះមនុស្ស B- ទឹកដោះសត្វ C- ផ្លែស្វាយ ល្អង D- គ្រាប់ធញ្ញជាតិ	C

55	តើអាស៊ីតហ្វូលិកជួយសារពាង្គកាយដើម្បីផលិតអ្វី ? A- គោលិកាស B- គោលិកាក្រហម C- ប្លាតែត D- ប្លាស្មា	B
56	តើ វីតាមីន គឺជាអ្វី ? A- ជាសមាសធាតុគីមីដែលសរីរាង្គត្រូវការដើម្បីឱ្យសារពាង្គកាយមានដំណើរការ B- ជាថាមពលដែលសរីរាង្គត្រូវការដើម្បីឱ្យសារពាង្គកាយមានដំណើរការ C- ជាវ៉ែ ខនីដដែលសរីរាង្គត្រូវការដើម្បីឱ្យសារពាង្គកាយមានដំណើរការ D- ជាប្រូតេអ៊ីនដែលសរីរាង្គត្រូវការដើម្បីឱ្យសារពាង្គកាយមានដំណើរការ	A
57	តើអាហារសរសៃ(fiber)មានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ? A- ពន្លឺតការរំលាយអាហារ B- ពន្លឺតការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម C- ធ្វើឱ្យលាមកទន់ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
58	តើវីតាមីន បេ ១ ឬគ្យាមីន ជួយសារពាង្គកាយឱ្យដុតសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីអ្វី ? A- បញ្ចេញថាមពល B- បញ្ចេញជាតិពុល C- បញ្ចេញញើស D- បញ្ចេញទឹកមាត់	A-
59	តើសរីរាង្គណាមួយ ដែលផ្សំឡើងដោយសាច់ដុំអនន្ទ:(Involuntary)? A- ស្បូន B- ថ្លើម C- អណ្តើក D- លំពែង	A-

60	តើកម្រិតចង្វាក់ដង្ហើមប៉ុន្មានដែលចាត់ទុកថាញាប់ចំពោះកុមារអាយុពី២ខែ ដល់ក្រោម ១២ខែ ? A- ចាប់ពី ៣០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ B- ចាប់ពី ៤០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ C- ចាប់ពី ៥០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ D- ចាប់ពី ៦០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ	C
61	តើកម្រិតចង្វាក់ដង្ហើមប៉ុន្មានដែលចាត់ទុកថាញាប់ចំពោះកុមារអាយុពី ១២ខែដល់ក្រោម៥ឆ្នាំ? A- ចាប់ពី ៣០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ B- ចាប់ពី ៤០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ C- ចាប់ពី ៥០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ D- ចាប់ពី ៦០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ	B
62	តើកម្រិតចង្វាក់ដង្ហើមប៉ុន្មានដែលចាត់ទុកថាញាប់ចំពោះកុមារអាយុក្រោម ២ខែ ? A- ចាប់ពី ៣០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ B- ចាប់ពី ៤០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ C- ចាប់ពី ៥០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ D- ចាប់ពី ៦០ដង ក្នុង១នាទីឡើងទៅ	D
63	តើគេត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងណាដើម្បីសម្រេចថាកុមារមានទារ៉ាស៍? A- ផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទាំងទ្រូងកុមារផតចូលពេលដកដង្ហើមចេញ B- ផ្នែកទ្រូង និង ពោះកុមារផតចូលពេលដកដង្ហើមចេញ C- ផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទាំងទ្រូងកុមារផតចូលពេល ដកដង្ហើមចូល D- ផ្នែកទ្រូង និង ពោះកុមារផតចូលពេលដកដង្ហើមចូល	C
64	ដូចម្តេចដែលហៅថាស្រ្តាយខ័រ (Stridor) ? A- សម្លេងធ្ងន់រឹងៗនៅពេលកុមារដកដង្ហើមចូល B- សម្លេងធ្ងន់រឹងៗនៅពេលកុមារដកដង្ហើមចេញ C- សម្លេងដូចហូចនៅពេលកុមារដកដង្ហើមចូល D- សម្លេងដូចហូចនៅពេលកុមារដកដង្ហើមចេញ	A

65	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្តាប់រកសម្លេងស្រ្តាយដំរ? A- យកស្តេតូស្កូបស្តាប់ផ្នែកទ្រូងខាងលើពេលកុមារដកដង្ហើមចេញ B- ស្តាប់ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រអប់ទ្រូងកុមារពេលដកដង្ហើមចូល C- យកស្តេតូស្កូបស្តាប់ផ្នែកទ្រូងខាងលើពេលកុមារដកដង្ហើមចូល D- ស្តាប់ដោយដាក់ត្រចៀកនៅជិតមាត់កុមារពេលកុមារនៅស្ងៀមហើយមិនយំ	D
66	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ នៅពេលកុមារមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅ ? A- រកមូលហេតុដែលកើតមានចំពោះកុមារ B- បញ្ជូនកុមារទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ C- ព្យាបាលទៅតាមរោគសញ្ញាដែលបានរកឃើញ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	B
67	តើក្នុងករណីមួយណាដែល អ្នកអាចចាត់ថ្នាក់កុមារថាពកជាប់បន្ត ? A- រក១០ថ្ងៃឡើងទៅ B- រក១៤ថ្ងៃឡើងទៅ C- រក២០ ថ្ងៃឡើងទៅ D- រក ២៥ថ្ងៃឡើងទៅ	B
68	តើអ្នកអាចចាត់ថ្នាក់កុមារថាមានជម្ងឺអ្វី បើកុមាររោគមានឈាមលាយក្នុងលាមក ? A- រកអាសន្នរោគ B- រកស្រួចស្រាវ C- រកជាប់បន្ត D- រកមូល	D
69	តើគេចាត់ទុកថាស្បែករលាយរាំងដូចម្តេច ពេលណាផ្នត់ស្បែកពោះរលាយរាំងជាង ២ វិនាទី ? A- រលាយរាំង B- រលាយរាំងណាស់ C- រលាយរាំងស D- រលាយធម្ម	B

70	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃការរលាកផ្លូវចិត្តមាស្តូអ៊ីដ ចំពោះកុមារអាយុចាប់ពី ២ខែ ដល់ក្រោម ៥ឆ្នាំ ? A- មានខ្ទុះហូរចេញពីត្រចៀក B- មានឈឺចាប់នៅត្រចៀក C- មានហើមប៉ោង ឈឺក្រោយត្រចៀក D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
71	តើសញ្ញាមួយណាជាសញ្ញានៃជម្ងឺរលាកត្រចៀកស្រួចស្រាវចំពោះកុមារអាយុចាប់ពី ២ខែដល់ក្រោម៥ឆ្នាំ ? A- ខ្ទុះហូរចេញពីត្រចៀកតិចជាង១៤ថ្ងៃ ឬ មានឈឺចាប់នៅត្រចៀក B- ហើមប៉ោង ឈឺក្រោយត្រចៀក C- ខ្ទុះហូរចេញពីត្រចៀកច្រើនជាង១៤ថ្ងៃ ឬ មានឈឺចាប់នៅត្រចៀក D- ឈឺចាប់នៅត្រចៀកធ្ងន់ធ្ងរ	A
72	តើអ្នកត្រូវចាត់ថ្នាក់ថាដូចម្តេច បើឃើញមានសញ្ញា ភ្នែកខ្វែង និងមិនអាចដឹក ឬបៅបាន ក្នុងពេលពិនិត្យ និង រាយការណ៍កុមារដែលរាក ? A- រាកមានខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម B- រាកគ្មានខ្សោះជាតិទឹក C- រាកមានខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ D- ចម្លើយ ក និង គ ត្រឹមត្រូវ	C
73	តើអ្នកត្រូវចាត់ថ្នាក់ថាដូចម្តេច បើឃើញមានសញ្ញាស្រែកទឹកខ្លាំង ដឹកត្រហោបត្រហាប និងភ្នែកខ្វែង ក្នុង ពេលពិនិត្យ និងរាយការណ៍កុមារដែលរាក ? A- រាកមានខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម B- រាកគ្មានខ្សោះជាតិទឹក C- រាកមានខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ D- ចម្លើយក និង គ ត្រឹមត្រូវ	A-

74	តើអ្នកអាចចាត់ថ្នាក់យ៉ាងដូចម្តេច បើអ្នកពិនិត្យឃើញមានសញ្ញាទារពរស្ថិតក្នុងពេលវាយតម្លៃកុមារ ដែលក្អក ឬពិបាកដកដង្ហើម ? A- លោកស្លូត B- គ្មានលោកស្លូត ក្អក ឬ ផ្កាសាយ C- លោកស្លូតធ្ងន់ធ្ងរ ឬ ជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
75	តើសញ្ញាណាខ្លះដែលអាចឱ្យអ្នកចាត់ថ្នាក់ថាលោកស្លូតធ្ងន់ធ្ងរបានចំពោះកុមារអាយុចាប់ពី ២ខែដល់ ក្រោម៥ឆ្នាំ ? A- មានទារពរ B- មានស្រ្តាយដំរ C- មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅណាមួយ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
76	តើសញ្ញាមួយណាដែលអាចឱ្យអ្នកចាត់ថ្នាក់ថាលោកស្លូតបានចំពោះកុមារអាយុចាប់ពី ២ខែ ដល់ក្រោម៥ ឆ្នាំ? A- មានចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ B- គ្មានសញ្ញាលោកស្លូត ឬជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង C- មានទារពរ ឬ ស្រ្តាយដំរ D- មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅណាមួយ	A-
77	តើសញ្ញាមួយណាដែលអាចឱ្យអ្នកចាត់ថ្នាក់ថាគ្មានលោកស្លូត គ្រាន់តែក្អក ឬផ្កាសាយ ចំពោះកុមារអាយុ ចាប់ពី ២ខែ ដល់ក្រោម ៥ឆ្នាំ ? A- មានចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ B- គ្មានសញ្ញាលោកស្លូតឬ ជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង C- មានទារពរ ឬ ស្រ្តាយដំរ D- មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅណាមួយ	B

78	តើអ្នកត្រូវចាត់ថ្នាក់ជាជម្ងឺអ្វី ចំពោះកុមារអាយុចាប់ពី ២ខែ ដល់ក្រោម៥ឆ្នាំ ដែលកើតកញ្ជិលហើយ ឃើញមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅណាមួយ ឬ កញ្ជិលក្នុងស្រទាប់ ឬ ដំបៅមាត់ខ្វែងជ្រៅ ឬរលង ? A- លាបកញ្ជិលធ្ងន់ធ្ងរ B- លាបកញ្ជិលនៅក្នុង ឬមាត់ C- កញ្ជិលកំពុងវិវត្តិ D- លាបកញ្ជិលធម្មតា	A-
79	តើអ្វីមួយជាសញ្ញានៃជម្ងឺរលាកត្រចៀកកុំរ៉ៃ ចំពោះកុមារអាយុចាប់ពី ២ខែ ដល់ក្រោម៥ឆ្នាំ ? A- ខ្ទុះហូរចេញពីត្រចៀកតិចជាង១៤ថ្ងៃ B- ខ្ទុះហូរចេញពីត្រចៀកច្រើនជាង១៤ថ្ងៃ C- ហើមប៉ោង ឈឺក្រោយត្រចៀកយូរថ្ងៃ D- ឈឺចាប់នៅត្រចៀកធ្ងន់ធ្ងរយូរថ្ងៃ	B
80	តើចម្លើយណាមួយដែលចាត់ទុកថាកុមារមាន ទម្ងន់ទាបខ្លាំងធៀបនឹងអាយុ ? A- បើកុមារអាយុ ៧ខែ ទម្ងន់៧ គីឡូ B- បើកុមារអាយុ ១២ ខែ ទម្ងន់ ៥.៥ គីឡូ C- បើកុមារអាយុ ១៨ ខែ ទម្ងន់ ៩ គីឡូ D- បើកុមារអាយុ៣៦ ខែ ទម្ងន់១៣ គីឡូ	B
81	ហេតុអ្វីបានជាត្រូវផ្តល់ជីវជាតិអា ដល់កុមារដែលកើតកញ្ជិល ? A- ការការពារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ B- ដើម្បីបង្ការជម្ងឺខ្វាក់មាត់ C- ដើម្បីប្រឆាំងជម្ងឺផ្សេងៗ D- ដើម្បីបង្ការជម្ងឺរាក	B

82	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកដែលតែងជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេ ចំពោះកុមារកើតដម្លីកញ្ជ្រូល ? A- រាក B- គ្រុនក្តៅ C- កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ D- ចម្លើយ ក និងគ ត្រឹមត្រូវ	C
83	តើចង្វាក់ដង្ហើមធម្មតារបស់ទារកអាយុពី១សប្តាហ៍ ដល់ក្រោម ២ខែមានចំនួនប៉ុន្មាន? A- ៣០- ៣៩ ដង ក្នុង ១នាទី B- ៤០- ៤៩ ដង ក្នុង ១នាទី C- ៥០- ៥៩ ដង ក្នុង ១នាទី D- ៦០- ៦៩ ដង ក្នុង ១នាទី	C
84	តើសម្លេងដូចហូច (Wheezing) ត្រូវបានគេស្តាប់នៅពេលណា ? A- ពេលកុមារនៅស្ងៀម B- ពេលកុមារដកដង្ហើមចេញ C- ពេលកុមារដកដង្ហើមចូល D- ពេលកុមារឃុំ	B
85	តើគប្បីត្រូវរាប់ចង្វាក់ដង្ហើមយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះទារកឈឺអាយុចាប់ពី១អាទិត្យដល់ក្រោម២ខែដែល មានចង្វាក់ដង្ហើមចាប់ពី៦០ដងក្នុង១នាទីឡើងទៅ ? A- រាប់ពេញមួយនាទី តែ១ ដង B- រាប់ពេញមួយនាទី រាប់២ ដង យ៉ាងតិច C- រាប់ពេញមួយនាទី រាប់៣ដងយ៉ាងតិច D- រាប់ពេញមួយនាទី រាប់ ៤ ដងយ៉ាងតិច	B

86	តើអ្វីមួយជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាទារកអាយុចាប់ពី១សប្តាហ៍ដល់ក្រោម២ខែមានខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ ? A- ឡេះឡះញ៉ាំញ្ចាំ និង ភ្នែកខ្វែង B- សន្លឹម ឬបាត់ស្មារតី និងភ្នែកខ្វែង C- ផ្ចាត់ស្បែកពោះរលាយឥតឬ ឡេះឡះ D- ស្រែកទឹកខ្លាំងនិងផ្ចាត់ស្បែកពោះរលាយឥត	B
87	តើពួកមេរោគមួយណាដែលបង្កឱ្យផ្ទិតរបស់ទារកអាយុចាប់ពី១ សប្តាហ៍ដល់ក្រោម២ខែឡើងក្រហមឬមានខ្ទុះ? A- បាក់តេរី B- ប៉ារ៉ាស៊ីត C- វីរុស D- ផ្សិត	A
88	តើសញ្ញាណាមួយដែលជាសញ្ញានៃការបង្កមេរោគធ្ងន់ធ្ងរដោយបាក់តេរីចំពោះទារកអាយុចាប់ពី១ សប្តាហ៍ដល់ក្រោម ២ខែ ? A- ផ្ទិតក្រហមព្រៀងៗ B- កន្ទាលត្រអាកលើស្បែក C- ហូរខ្ទុះចេញពីត្រចៀក D- ឈាមនៅស្បែក	C
89	តើចម្លើយណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់ស្ថានភាពបីកូន ដើម្បីបំបៅដោះម្តាយ ? A- ឱ្យក្បាលនិងដងខ្លួនទារកត្រង់គ្នា B- ទ្រខ្លួនទារកនៅជាប់នឹងខ្លួនម្តាយ C- ឱ្យច្រមុះទារកបែរចេញពីសណ្តាប់ដោះម្តាយ D- តម្រង់មាត់ទារកទៅរកដោះម្តាយ	C

90	តើម្តាយត្រូវបិទក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបំបៅដោះកូន ? A- ឱ្យក្បាល និងដងខ្លួនទារកត្រង់គ្នា B- ទ្រខ្លួនទារកនៅជាប់នឹងខ្លួនម្តាយ C- ខ្លួនទារកជ្រួបជាប់នឹងខ្លួនម្តាយ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
91	តើកុមារប្រភេទមួយណាដែលយើងមិនត្រូវពិនិត្យរាយការណ៍អំពីការផ្តល់អាហារទេ ? A- មានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបញ្ជូនជាបន្ទាន់ B- មានទម្ងន់ទាបធៀបនឹងអាយុ C- មានការលំបាកក្នុងការផ្តល់អាហារ D- កុមារដែលទទួលបានការផ្តល់អាហារឬជាតិទឹកផ្សេងទៀត	A-
92	ក្រោយពេលកើតភ្លាមត្រូវរាយការណ៍អំពីអាយុក្មេងទារកក្នុងអំឡុងពេល៖ A- ៣០និង៦០វិនាទី B- ១នាទី និង៥ នាទី C- ១នាទី និង១០ នាទី D- ៥នាទី និង២០ នាទី	B
93	វិធានការគឺជាសារធាតុមួយដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអាហារហើយមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការ៖ A- ធ្វើឲ្យឈាមកក B- បំបែក ជាតិGlucose ទៅជាGlycogen C- បង្ការជំងឺKernicterus D- បញ្ចេញBillirubin	A
94	តើក្បាលរបស់ទារកមាននៃក្រឡាផ្ទៃសរុបប៉ុន្មាន%របស់ទារក? The baby's head comprises how much of the total surface area ? A- - 5% B- 10% C- 20% D- 25%	D

95	តើសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលគួរថិតនៅចន្លោះប៉ុន្មាន? A- 18 – 20°C B- 21 – 25°C C- 26 - 28°C D- 29 - 30°C	C
96	សារធាតុស្អិតពណ៌សដែលមាននៅលើស្បែកទារក គេហៅថា៖ A- Lanugo B- Vernix caseosa C- Milia D- Coloboma	B
97	ចង្វាក់ដង្ហើមធម្មតារបស់ទារកទើបកើត៖ A- 18- 20 /នាទី B- 20- 30 /នាទី C- 30- 60 /នាទី D- 60- 100 /នាទី	C
98	អត្រាអម្ពូក្លូប៊ីនរបស់ទារកគឺ៖ A- 8- 9g/dl B- 10- 12g/dl C- 13- 20g/dl D- ដូចអត្រារបស់មនុស្សពេញវ័យ	C
99	ចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកគឺ៖ A- 60- 80 ដងក្នុងមួយនាទី B- 80- 100 ដងក្នុងមួយនាទី C- 100- 160 ដងក្នុងមួយនាទី D- 160 ដងក្នុងមួយនាទី	C

100	តើបង្ហើយក្រោយរបស់ទារក (Posterior Fontanelle)បិទជិតនៅពេលទារកអាយុបានប៉ុន្មាន? A- 2- 4 សប្តាហ៍ ក្រោយសម្រាល B- 6- 8 សប្តាហ៍ ក្រោយសម្រាល C- 12 សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាល D- 18 សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាល	B
101	បង្ហើយមុខរបស់ទារក(Anterior Fontanelle)បិទនៅពេលទារកអាយុ៖ A- 2- 4 សប្តាហ៍ ក្រោយសម្រាល B- 6- 8 សប្តាហ៍ ក្រោយសម្រាល C- 12 សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាល D- 18 សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាល	D
102	សរសៃឈាមនៅក្នុងទងសុកមាន៖ A- សរសៃអាក់ទែរ១ និងវ៉ែន១ B- សរសៃអាក់ទែរ២ និងវ៉ែន២ C- សរសៃអាក់ទែរ២ និងវ៉ែន១ D- សរសៃអាក់ទែរ១ និងវ៉ែន២	C
103	បន្ទាប់ពីឡើងទំងន់មកវិញចំពោះទារកទើបកើត តើទារកគួរឡើងទំងន់ប៉ុន្មានក្នុង១សប្តាហ៍? A- 0- 50g B- 50- 100g C- 150- 200g D- 250- 300g	C
104	តើចំនួនឈាមរត់នៅក្នុងទារកធម្មតាយ៉ាងដូចម្តេច? A- 80 ml ក្នុង១គីឡូក្រាមនៃទម្ងន់ខ្លួន B- 90 ml ក្នុង១គីឡូក្រាមនៃទម្ងន់ខ្លួន C- 100 ml ក្នុង១គីឡូក្រាមនៃទម្ងន់ខ្លួន D- ១២០ ml ក្នុង១គីឡូក្រាមនៃទម្ងន់ខ្លួន	A

105	តើចម្លើយមួយណាខាងក្រោមដែលមិនមែនជាReflex របស់ទារក? A- - Moro B- Glomerulus C- Rooting D- Gag	B
106	យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក តើម្តាយគួរបំបៅដោះកូនតែ១មុខគត់ ឲ្យបានរយៈពេលប៉ុន្មាន? A- ១ខែ B- ៣ខែ C- ៦ខែ D- ១ឆ្នាំ	C
107	ចម្លើយ៣ខាងក្រោមគឺជាការធានានូវការបំបៅដោះកូនរបស់ម្តាយដែលមានសុខភាពល្អត្រូវការចាំបាច់ លើកលែងតែ ៖ A- អនុវត្តស្បែកប៉ះស្បែកក្រោយសម្រាលឲ្យបានឆាប់ហើយមិនឲ្យមានការរំខាន B- ការបំបៅដោះដំបូងត្រូវធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពេលម្តាយ និងទារកបានត្រៀមខ្លួនរួច C- ត្រូវប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាការបំបៅដោះក្នុងមាត់ទារកគ្មានការឈឺចាប់ និងមានប្រសិទ្ធភាព D- បើមានទឹកដោះច្រើនពេកគួរផ្អាកបន្តិចសិន ទើបបន្តបំបៅទៀត	D
108	ម្តាយដែលកើតទារកមិនគ្រប់ខែ ហើយមានចេញទឹកដោះក្នុងរយៈពេល១២ម៉ោង(colostrums) គួរតែត្រូវបានលើកទឹក ចិត្តដូចខាងក្រោម៖ A- បំបៅកូន២- ៤ដងក្នុង២៤ម៉ោង B- បំបៅកូន៤- ១០ដង ក្នុង២៤ម៉ោង C- បំបៅកូន១២- ១៤ដង ក្នុង២៤ម៉ោង D- បំបៅកូន១ម៉ោងម្តង	B

109	តើគោលការណ៍អ្វីដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាល ការស្ទះទឹកដោះ:(blocked ducts)? A- យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកក្តៅខ្សោយដាក់លើដោះ និងច្របាច់ទឹកដោះផ្ទុម B- យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកក្រដាក់ដាក់លើដោះ និងបញ្ឈប់ការបំបៅ C- យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកក្តៅដាក់លើដោះ និងផ្តល់ការបំបៅ មានកំរិត D- យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកក្តៅខ្សោយដាក់លើដោះ និងផ្តល់អាហារក្រៅ	A
110	តើជំងឺមួយណាដែលមិនសូវកើតមានចំពោះម្តាយដែលបានបំបៅដោះកូន? A- ជំងឺពុកឆ្អឹង B- ជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ C- ដុះដុំសាច់ D- ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល	A
111	តើទឹកដោះគោប្រភេទណាដែលគួរណែនាំម្តាយឲ្យផ្តល់ទៅទារកអាយុតិចជាង១ឆ្នាំដែលមិនបានបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ? A- ម្សៅទឹកដោះគោដែលសំបូរជាតិCasein B- ម្សៅទឹកដោះគោដែលចំពង់ជាសេរ៉ូមូត C- ម្សៅទឹកដោះពពែ D- ម្សៅទឹកសណ្តែក	B
112	ចម្លើយមួយណាដែលមិនមែនជានិយាមទាំង១០នៃការស្រឡាញ់ទារក? A- ជួយស្រ្តីចាប់ផ្តើមបំបៅដោះភ្លាមបន្ទាប់ពីសម្រាល B- អនុញ្ញាតឲ្យបំបៅទារកដោយក្បាលដោះសិប្បនិម្មិត C- អនុវត្តដាក់ទារកឲ្យនៅជិតម្តាយ D- ផ្តល់ព័ត៌មានដល់ស្រ្តីអំពីផលប្រយោជន៍នៃការបំបៅដោះកូន	B
113	តើតម្រូវការថាមពលរបស់ទារកសមាមាត្រពីសារធាតុខ្លាញ់មានប៉ុន្មាន? A- 25% B- 50% C- 75% D- 90%	B

114	បរិយាកាសដើម្បីថែទាំទារកដែលមានទំងន់ទាបគួរតែ៖ A- ពន្លឺភ្លឺពេលថ្ងៃ B- ពន្លឺពេលព្រឹក C- មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ D- ពន្លឺភ្លឺពេលរសៀល	B
115	តើ Polycythaemia អាចបណ្តាលឲ្យទារកមានរោគសញ្ញាអ្វី? A- ចុះកំដៅ B- ឡើងកំដៅ C- ចុះជាតិស្ករ D- ចុះផ្លាវែត	C
116	តើការរកឃើញមួយណាដែលនាំឲ្យអ្នកសង្ស័យថាទារកមានបញ្ហាដង្ហើម? A- កំដៅរាងកាយមិនថេរ B- ស្រែកថ្ងូរដូចជាឈឺ C- ទន់ខ្លួន D- ស្បែកស្ងួត	B
117	ទារកក្តៅច្រើន ត្រូវសង្ស័យពី៖ A- ស្ទះបំពង់វិលាយអាហារ B- ស្ទះឧបយអូដេនុម (Duodenum) C- ការដកដង្ហើមញាប់បណ្តោះអាសន្នរបស់ទារក D- មានការបង្ករោគ	A-
118	អាណាព្យាបាលរបស់ទារកដែលនៅក្នុងផ្នែកថែទាំទារកគួរត្រូវចូលរួមថែទាំទារក៖ A- ភ្លាមបន្ទាប់ពីទារកត្រូវបានបញ្ជូនចូលមកផ្នែកថែទាំទារក B- នៅពេលដែលទារកលែងត្រូវការការថែទាំជិតដល់ C- នៅពេលដែលទារកត្រូវការការបំបៅក្នុងរយៈពេល៣ទៅ៤ម៉ោងម្តង D- នៅពេលដែលថ្ងៃបញ្ជូនចេញត្រូវបានពិភាក្សា	A

119	ទារកឡើងលឿងក្នុងអំឡុងពេល១២ម៉ោង(ក្រោយសម្រាល) អាចមានបញ្ហាដូចជា៖ A- ទារកមានទំហំតូច B- អាចមានការបង្កពេត C- ស្ទះពោះវៀន D- ឡើងលឿងដោយសារប្រព័ន្ធសរីរាង្គ	B
120	តើសញ្ញាមួយណាដែលជាសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមរបស់ទារក? A- ភ្លើក B- ថ្ងូរ និងច្រមុះរីកធំពេលដកដង្ហើម C- ក្អកបន្ទាប់ពីបៅរួច D- ដកដង្ហើម ៣០ ទៅ៦០ក្នុង១នាទី	B
121	តើការសម្រាលណាមួយដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើផ្លូវដង្ហើមរបស់ទារក? A- ការសម្រាលកូនបញ្ជ្រាស Breech birth B- ការសម្រាលដោយការវះកាត់ C- ការសម្រាលដោយការបូម D- ការសម្រាលដោយដង្ហៀប	B
122	តើវីតាមីនK1 មានសំបូរនៅក្នុងទឹកដោះប្រភេទណា? A- ទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ B- ទឹកដោះបានពីគោសុទ្ធ C- ទឹកដោះរូបមន្ត D- ទឹកដោះម្តាយ លាយម្សៅទឹកដោះ	C
123	ការហូរឈាមដោយសារកង្វះវីតាមីនK កើតមានជាបឋមនៅលើ៖ A- ទារកបៅដោះដោះម្តាយ B- ទារកមិនគ្រប់ខែ C- ទារកគ្រប់ខែ D- ទារកដែលបៅទឹកដោះរូបមន្ត	A

124	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ម្តាយយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាទារកបោសជ្រុល? A- ទារកបីត្រូវជញ្ជក់ញាប់ៗ B- ចង្ការទារកមិនប៉ះដោះម្តាយ C- ទារកបើកមាត់និងហាមាត់ធំ D- មាត់ទារកបិទខ្ចីប	C
125	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ម្តាយយ៉ាងដូចម្តេច បញ្ជាក់ថាទារកបោសជ្រុល? A- ទារកបីត្រូវជញ្ជក់ញាប់ៗ B- ទារកបើកមាត់និងហាមាត់ធំ C- បបូរមាត់ខាងក្រោមរលាចេញក្រៅ D- ទារកជញ្ជក់មួយៗខ្លាំង	A
126	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ម្តាយយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីឲ្យមានលំហូរទឹកដោះបានល្អ? A- ឲ្យម្តាយសំរាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយភ្លេចអ្វីមុន B- ឲ្យម្តាយសំរាកនិង ជួយធ្វើម៉ាស្សាទៅលើខ្នងម្តាយ C- ច្របាច់ដោះយកទឹកដោះ D- ម្តាយត្រូវបរិភោគចំណីឲ្យបានច្រើន	B
127	ដើម្បីវាយតម្លៃពិន្ទុអាប៉េហ្គាតើឆ្មបត្រូវពិនិត្យលើអ្វី? A- ចង្កាក់ដង្ហើម ចង្កាក់បេះដូង ពណ៌សម្បុរ កំលាំងសាច់ដុំ និងវេន្តិចរបស់ទារក B- ចង្កាក់ដង្ហើម ចង្កាក់បេះដូង ពណ៌សម្បុរ និងវេន្តិចរបស់ទារក C- ភាពមិនធម្មតាពីកំណើតរបស់ទារកនិងវេន្តិចរបស់ទារក D- ចង្កាក់ដង្ហើម ចង្កាក់បេះដូង កំលាំងសាច់ដុំ និងវេន្តិចរបស់ទារក	A
128	ការងូតទឹកដល់ទារកក្រោយពេលសម្រាល២៤ម៉ោង ត្រូវធ្វើឡើង៖ A- មិនត្រូវឱ្យប៉ះទង្គិច B- សព្វខ្លួនរបស់ទារក C- មិនឱ្យត្រូវបង្ហើយរបស់ទារក D- មិនត្រូវឱ្យចូលទឹកក្នុងភ្នែក	B

129	មុនឆ្លងទឹកឱ្យទារក តើឆ្លងត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- លាងទឹកឱ្យមានកម្ដៅខ្ពស់ៗ B- រៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់មុនឆ្លងទឹកទារក C- យកកម្ដៅរាងកាយទារក D- ធានាសីតុណ្ហភាពបន្ទប់កុំឱ្យត្រជាក់ពេក	C
130	តើឆ្លងត្រូវផ្តល់វីតាមីនKឱ្យទារកទើបកើត តាមផ្លូវណា ? A- ចាក់សាច់ដុំ B- ចាក់ក្រោមស្បែក C- ចាក់សើរស្បែក D- លេប	A
131	ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង BCG ឱ្យទារកទើបកើត ឆ្លងត្រូវធ្វើតាមរបៀបណា? A- ចាក់សាច់ដុំ B- ចាក់ក្រោមស្បែក C- ចាក់សើរស្បែក D- លេប	C
132	ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង Hepatitis B ឱ្យទារកទើបកើត ឆ្លងត្រូវធ្វើតាមរបៀបណា? A- - ចាក់សាច់ដុំ B- ចាក់ក្រោមស្បែក C- ចាក់សើរស្បែក D- លេប	A
133	ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនស្វិតដៃជើង ឱ្យទារកទើបកើត ឆ្លងត្រូវធ្វើតាមរបៀបណា? A- ចាក់សាច់ដុំ B- លេប C- ចាក់សើរស្បែក D- បន្តក់តាមមាត់	D

134	នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ តើឆ្មបត្រូវថែទាំទងផ្ចិតឱ្យទារកយ៉ាងដូចម្តេច? A- មិនត្រូវលាបថ្នាំនិងរំទងផ្ចិតទេ B- ត្រូវលាបថ្នាំនិងរំទងផ្ចិត C- សម្អាតទងផ្ចិតនិងលាបថ្នាំ D- ត្រូវរំទងផ្ចិតរហូតដល់ជ្រុះ	A
135	ទារកទើបនឹងកើតដែលមានចង្វាក់បេះដូងល្អធម្មតាហើយមានសំបុរពណ៌ផ្កាឈូក គ្មានលាមកព្រៃក្នុងទឹក ភ្លោះ តើឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- មិនត្រូវការសង្គ្រោះជីវិតទេ B- ផ្តល់អុកស៊ីសែនដល់ទារក C- សប់បញ្ចូលខ្យល់ D- ផ្តល់ថ្នាំ Epinephrine	A
136	ទារកទើបនឹងកើតដែលមានចង្វាក់បេះដូងតិចជាង១០០ ហើយមានសំបុរពណ៌ស្វាយ តើ ឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- វាយតម្លៃពីការដកដង្ហើម B- ផ្តល់កម្ដៅ និងរំញោច C- ផ្តល់អុកស៊ីសែន D- បីតស្លេស	B
137	ក្រោយពីសង្គ្រោះទារកជំហានទីមួយមក ឃើញថាចង្វាក់បេះដូងទារកមាន៨០ដង/នាទី មិនទាន់ដកដង្ហើម និង មានពណ៌ស្លេកស្លាំង តើឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀត? A- បន្តធ្វើរំញោច B- ផ្តល់កំដៅដល់ទារក C- បូមសំអាតស្មៅស្មៅ D- សប់បញ្ចូលខ្យល់តាមបាឡុងនិងម៉ាស់	D

138	តើសកម្មភាពរំញោចមួយណាដែលត្រឹមត្រូវជាងគេសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើត? A- យកអាល់កុលរឹតទ្រូងទារក B- ត្រដុះបាតជើងឬអង្គែលខ្នងទារក C- ច្របាច់ប្រអប់ឆ្អឹងជំនីទារក D- ត្រដុះទ្រូងទារក	B
139	ជំហានសង្គ្រោះទារកដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងសារសំខាន់ជាងគេគឺ៖ A- ផ្តល់កំដៅដល់ទារក B- បូមសំអាតស្បូន C- សំបប់ពូលខ្យល់តាមបាឡុងនិងម៉ាស D- ម៉ាស្សាទារក	C
140	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាលាមកទារកមានលាយឈាម? A- ដោយការមើលផ្ទាល់ភ្នែក B- តាមការប្រាប់របស់មាតា C- ឲ្យក្មេងជុះដាក់កន្ត្រោងស្អាត រួចពិនិត្យផ្ទាល់ភ្នែក D- តាមការពិនិត្យក្រោយពេលបន្ទោរបង់រួច	C
141	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាទារកបានបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើន? A- ភ្នែកខ្វែង ផ្ចាត់ស្បែករលាយរឹតណាស់ B- ទារកមិនចង់ដឹកទឹក C- ក្លាសភ្នែកស្លេកស្លាំង D- ទារកចង់ដឹកទឹកខ្លាំង	A
142	ចំពោះកុមារមានអាយុចាប់ពី២ខែដល់ក្រោម៥ឆ្នាំ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាកុមារ មានរលាកត្រចៀកស្រួច? A- ពិនិត្យមើលការហូរទឹករងៃចេញពីត្រចៀកដែលតិចជាង ១សប្តាហ៍ B- ពិនិត្យមើលការហូរខ្ទុះចេញពីត្រចៀកដែលតិចជាង ១សប្តាហ៍ C- ពិនិត្យមើលការហូរខ្ទុះចេញពីត្រចៀកដែលច្រើនជាង ២សប្តាហ៍ D- ពិនិត្យមើលការហូរខ្ទុះចេញពីត្រចៀកហើយឈឺខ្លាំងនៅពេលប៉ះ	B

143	ចំពោះកុមារមានអាយុចាប់ពី២ខែដល់ក្រោម៥ឆ្នាំ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាកុមារ មានរលាកសួត ឬទេ? A- ស្តាប់សំលេងស្រាយដ៏រ B- ពិនិត្យរកមើលទារាស៍ C- ពិនិត្យមើលចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ D- ពិនិត្យមើលរន្ធច្រមុះវីកធំ	B
144	តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្តាប់សំលេងដូចហូច(Wheezing)? A- ស្តាប់សួតដោយផ្ទាល់នឹងត្រចៀក B- ស្តាប់សួតដោយប្រើស្តេតូស្កូប C- ស្តាប់សួត និងពិនិត្យការដកដង្ហើម D- ស្តាប់សួត និង ពិនិត្យមើលទារាស៍	B
145	ដើម្បីមើលទារាស៍ឲ្យឃើញច្បាស់តើឆ្មបត្រពិនិត្យកុមារក្នុងពេលណា? A- មើលពេលកុមារកំពុងប្រឹងក្អកខ្លាំង B- មើលពេលកុមារយំខ្លាំង C- មើលពេលកុមារដកដង្ហើមចូល D- មើលពេលកុមារដកដង្ហើមចេញ	C
146	កំណត់ការព្យាបាលចំពោះទារកមានជម្ងឺត្រូវក្តៅធ្ងន់ខ្លាំង មុនពេលបញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ចំពោះទារក១- ៧សប្តាហ៍ឆ្មបត្រធ្វើដូចម្តេច? A- អោយអង់ទីប៊ីយូទិកមួយដូស ព្យាបាលការកង្វះជាតិស្ករ និងអេឡិចត្រូលីតក្នុងឈាមនិងរក្សាកំដៅទារក B- អោយថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ព្យាបាលការកង្វះជាតិស្ករ និងអេឡិចត្រូលីតក្នុងឈាមនិងរក្សាកំដៅទារក C- បញ្ជាក់ទឹកអ្វីកំដៅអោយបានញឹកញាប់ ព្យាបាលការកង្វះជាតិស្ករ និងអេឡិចត្រូលីតក្នុងឈាមនិងរក្សា កំដៅទារក D- អោយទឹកនិងថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ព្យាបាលការកង្វះជាតិស្ករ និងអេឡិចត្រូលីតក្នុងឈាមនិងរក្សាកំដៅទារក	A

147	ចំពោះជម្ងឺរលាកសួតឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកសញ្ញាសំខាន់ពី? A- រកសញ្ញាទារាសំ និង ការហើមបំពង់ក B- ស្តាប់សំលេងឮក្នុងសួត និង ការហើមបំពង់ក C- រកមើលដង្ហើមញាប់ និង ទារាសំ D- ស្តាប់សំលេងស្រាយដរី និង ការហើមបំពង់ក	C
148	ដើម្បីស្វែងរកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅ ចំពោះកុមារមានអាយុ ៤ខែ ដែលមានគ្រុនក្តៅតើអ្នកត្រូវសួរដូចម្តេច? A- . តើកុមារអាចចៅ ឬ ជិតទឹកបានឬទេ? B- តើកុមារមានប្រកាច់កាលពី២ខែមុនឬទេ? C- តើកុមារមានក្អកប៉ុន្មានដងក្នុង២៤ម៉ោងកន្លងទៅ? D- តើកុមារមានរាកប៉ុន្មានដងក្នុង២៤ម៉ោងកន្លងទៅ?	A
149	កុមារកណ្តុះសំ មានអាយុ ៤ឆ្នាំកន្លះត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានក្អក ២ថ្ងៃហើយ។ ប្រោយពិនិត្យ កុមារគ្រាន់តែមានចង្វាក់ ដង្ហើម៤៦ដងក្នុងមួយនាទី ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺដូចម្តេច? A- . គ្មានរលាកសួត៖ ក្អកឬផ្តាសាយ B- រលាកសួត C- រលាកសួតធ្ងន់ ឬជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង D- រលាកទងសួត	B
150	កុមារកណ្តុះ បូណាត អាយុ ៣ឆ្នាំ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានក្អក ៣ថ្ងៃហើយ។ កុមារមាន ចង្វាក់ដង្ហើម ៤៦ដងក្នុងមួយនាទី និងមានទារាសំ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺបូណាតដូចម្តេច? A- . គ្មានរលាកសួត៖ ក្អកឬផ្តាសាយ B- រលាកសួត C- រលាកសួតធ្ងន់ ឬជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង D- រលាកទងសួតធ្ងន់	C

151	សុខាមានអាយុ ២៤ខែ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានរាក ១សប្តាហ៍ហើយ។ ក្រោយពិនិត្យ កុមារ គ្រាន់តែមាន ភ្នែកខ្វែងប៉ុណ្ណោះ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺសុខាដូចម្តេច? A- .រាកមូល B- ខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម C- ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ D- គ្មានខ្សោះជាតិទឹក	D
152	កុមារពិសីអាយុ២ឆ្នាំ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានរាក២ថ្ងៃហើយ។ ក្រោយពិនិត្យ កុមារគ្រាន់តែ មានភ្នែកខ្វែងនិងស្រែកទឹកដឹកត្រហេបត្រហាប។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺពិសីដូចម្តេច? A- .គ្មានខ្សោះជាតិទឹក B- ខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម C- ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ D- ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់និងរាកមូល	B
153	កុមារទូច អាយុ ១៨ខែត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានរាក ២សប្តាហ៍ហើយ។ ក្រោយពិនិត្យ កុមារ គ្រាន់តែស្រែកទឹក និងដឹកត្រហេបត្រហាបប៉ុណ្ណោះ ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺទូចដូចម្តេច តើច? A- .គ្មានខ្សោះជាតិទឹក B- ខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម C- ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ D- គ្មានខ្សោះជាតិទឹក និង រាកជាប់បន្ត	D

154	កុមារឈ្មោះ នារី អាយុ ៤៩ខែត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះឈឺត្រចៀក។ ពេលពិនិត្យ បុគ្គលិកសុខាភិបាលឃើញថា កុមារមានហើមប៉ោង ហើយឈឺនៅក្រោយត្រចៀក ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺនារីដូចម្តេច? A- . លោក ឆ្អឹងម៉ាសូអ៊ីត B- ការបង្ករោគនៅនឹងត្រចៀកស្រួច C- ការបង្ករោគនៅនឹងត្រចៀកកុំដៃ D- ឈឺធ្មេញ	A-
155	កុមារឈ្មោះ សុវិឃា អាយុ ៥០ខែត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាព ។ កុមារមានហើមប្រអប់ជើងទាំងសង្វាង និងគ្មានសញ្ញាអ្វីផ្សេងទៀត។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺសុវិឃាដូចម្តេច? A- . កង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ ឬស្លេកស្លាំងធ្ងន់ B- ស្លេកស្លាំង ឬ ទំងន់ទាបខ្លាំងធៀបនឹងអាយុ C- គ្មានស្លេកស្លាំង និង គ្មានទំងន់ទាបខ្លាំងធៀបនឹងអាយុ D កង្វះវីតាមីន អ	A
156	កុមារអាយុ ៣ឆ្នាំត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានគ្រុនក្តៅ ២ថ្ងៃហើយ។ កុមារមកពីតំបន់មានគ្រោះគ្រុនចាញ់ ឱបស្លឹកវិជ្ជមានប្លាស្ទិកមហាលស៊ីប៉ារីម។តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺនេះដូចម្តេច? A- .ជំងឺគ្រុនក្តៅ B- គ្រុនចាញ់ ប្លាស្ទិកមហាលស៊ីប៉ារីម C- គ្រុនចាញ់ ប្លាស្ទិកមហាលស៊ីប៉ារីម D- ជំងឺគ្រុនឈាម	B

157	កុមារអាយុ ៤ឆ្នាំត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានគ្រុនក្តៅ ២ថ្ងៃហើយ។ កុមារមកពីតំបន់មានគ្រោះគ្រុនចាញ់ ឱបស្លឹកវិជ្ជមានប្លាស្ទិកជ្រូមរីវ៉ាក់។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺនេះដូចម្តេច? A- . ជំងឺគ្រុនក្តៅ B- គ្រុនចាញ់ ប្លាស្ទិកជ្រូមហ្វាល់ស៊ីប៉ារីម C- គ្រុនចាញ់ ប្លាស្ទិកជ្រូមរីវ៉ាក់ D- គ្រុនចាញ់ ប្លាស្ទិកជ្រូមរីវ៉ាក់ និងហ្វាល់ស៊ីប៉ារីម	C
158	កុមារអាយុ ១ឆ្នាំកន្លះត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានគ្រុនក្តៅ ៥ថ្ងៃហើយ។ កុមារមានស្នាមកន្ទួលក្រហមពាសពេញ មានភ្នែកក្រហម ហូរសំបោរ និងក្អក ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ជំងឺនេះដូចម្តេច? A- កញ្ជ្រិល B- គ្មានរលាកសួត៖ ក្អកឬផ្តាសាយ C- រលាកសួត D- គ្រុនឈាម	A
159	ទារកអាយុ ៣អាទិត្យ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើម។ ទារកមានដង្ហើមញាប់ ដោយមានចង្វាក់ដង្ហើម៧០ដងក្នុង១នាទី គ្មានខ្ទុះលើស្បែក និងគ្មានរាកទេ ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ទារកនេះដូចម្តេច? A- . ជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង B- ការបង្ករោគនៅនឹងកន្លែង C- រលាកសួត D- មិនទំនងជាមានជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង ឬការបង្ករោគនៅនឹងកន្លែង	A

160	ទារកអាយុ ៥អាទិត្យ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានចេញរោលកន្ទួលលើខ្លួន។ ទារកមាន ចង្វាក់ដង្ហើម ៥៥ ដងក្នុង១នាទី គ្មាន ទាវាស់ ផ្ចិតធម្មតា តែមានរោលកន្ទួល និង ពងខ្ទុះលើស្បែក។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ទារកនេះ: ដូចម្តេច? A- ជំងឺធ្ងន់ខ្លាំងជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង B- ការបង្កពេតនៅនឹងកន្លែង C- រលាកសួត D- មិនទំនងជាមានជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង ឬការបង្កពេតនៅនឹងកន្លែង	B
161	ទារកអាយុ ២អាទិត្យ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះផ្ចិតក្រហម។ ទារកមានកំដៅនៅភ្លើក ៣៦,៥ អង្សាសេ,ចង្វាក់ដង្ហើម ៥០ ដងក្នុង១នាទី គ្មាន ទាវាស់ ផ្ចិតមានខ្ទុះនិងក្រហមនៅចុងតិចតួច ទារកមិនមានរាកទេ។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ទារកនេះដូចម្តេច? A- . រាកគ្មានខ្សោះជាតិទឹក B- ការបង្កពេតនៅនឹងកន្លែង C- ជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង D- ជំងឺគ្រុនក្តៅ	B
162	ទារកអាយុ ៧ អាទិត្យ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានរាក។ ទារកមានកំដៅនៅភ្លើក ៣៦,៤អង្សាសេ,ចង្វាក់ដង្ហើម ៥៨ ដងក្នុង១នាទី គ្មាន ទាវាស់ ផ្ចិតមិនក្រហមទេ ម្តាយប្រាប់ថាកូនគាត់រាក៣ថ្ងៃ និងមានឈាមក្នុងលាមកផង ពេលឮស្បែកពោះរលាយិត។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ទារកនេះដូចម្តេច? A- រាកខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម B- ការបង្កពេតនៅនឹងកន្លែង C- រាកមូល D- ជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង	D

163	ទារកអាយុ ៦ អាទិត្យ ត្រូវនាំមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានរាក។ ទារកមានកំដៅនៅត្បូង ៣៦.៤អង្សា សេ,ចង្វាក់ដង្ហើម ៥០ ដងក្នុង១នាទី មានទាត់សមធម៌ ដូចមិនក្រហមទេ ម្តាយប្រាប់ថាកូនគាត់រាក៧ថ្ងៃ និងគ្មានឈាមក្នុង លាមក ពេលច្រើនស្បែកពោះរលាយរីកណាស់ និងមានភ្នែកខ្វែង។ តើអ្នកចាត់ចំណាត់ ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ទារកនេះដូចម្តេច? A- . រាកខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម B- រាកមូល C- ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ D- ជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង	C
164	កុមារម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជំងឺធ្ងន់ខ្លាំង ។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- .ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	D
165	កុមារអាយុ២ឆ្នាំត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមានរលាកសួត។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	C
166	កុមារមកមណ្ឌលសុខភាពព្រោះមានគ្រុនក្តៅ ៨ថ្ងៃហើយ ។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	B

167	កុមារម្នាក់ស្តុកខ្លាំងមើលឃើញច្បាស់ ។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	A
168	កុមារីសុខា មានអាយុ១១ខែ នាងគ្មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅទេ។ នាងត្រូវចាត់ថ្នាក់ថា មានរោគសញ្ញា មានការបង្ករោគនៅនឹងត្រចៀកស្រួច និងគ្មានចំណាត់ថ្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	C
169	កុមារីណារី មានអាយុ១៣ខែ នាងគ្មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទូទៅទេ។ នាងត្រូវចាត់ថ្នាក់ថា មានរោគខ្សោះជាតិ ទឹកធ្ងន់នៅមណ្ឌលសុខភាពអាចដាក់បំពង់ក្រពះ និងដាក់សេរ៉ូមបាន និងគ្មានចំណាត់ថ្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	C
170	កុមារីរៈ មានអាយុ២ឆ្នាំ ។ ម្តាយប្រាប់ថាវិវៈប្រកាច់កាលពីព្រឹកមិញ និង មិនសូវញាំ ។ គេមានចំណាត់ថ្នាក់ គ្មានស្លេកស្លាំង និង គ្មានចំណាត់ថ្នាក់ដទៃទៀតទេ។តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ធ្វើការតាមដាន B- បញ្ជូនមិនបន្ទាន់ C- មិនបញ្ជូន D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	D

171	កុមារមានរាកគ្មានខ្សោះជាតិទឹក ។ តើត្រូវបង្កប់ជាតិទឹកដូចម្តេច? A- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ក B- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ខ C- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ គ D- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ឃ	A
172	កុមារមានរាកហើយខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម ។ តើត្រូវបង្កប់ជាតិទឹកដូចម្តេច? A- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ក B- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ខ C- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ គ D- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ឃ	B
173	កុមារមានរាកមានខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ ។ តើត្រូវបង្កប់ជាតិទឹកដូចម្តេច? A- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ក B- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ខ C- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ គ D- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ឃ	C
174	កុមារត្រូវចាត់ថ្នាក់គ្រុនឈាមមានស្តុក- គ្រុនឈាម។ តើត្រូវបង្កប់ជាតិទឹកដូចម្តេច? A- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ក B- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ខ C- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ គ D- បង្កប់ជាតិតាមប្លង់ ឃ	D
175	កុមារសំ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ រលាកស្ងួត មកពិនិត្យលើកដំបូង ។ តើអ្នកធ្វើការណាត់ជួបសំដូចម្តេច? A- ត្រឡប់មកតាមដាន២ថ្ងៃក្រោយ បើមិនធូរស្រាល B- ត្រឡប់មកតាមដាន២ថ្ងៃក្រោយ C- ត្រឡប់មកតាមដាន ៣ ថ្ងៃក្រោយ D- ត្រឡប់មកតាមដាន ៥ ថ្ងៃក្រោយ	B

176	កុមារអាយុ ៦ខែ ទំងន់ ៧ គ.ក្រ ត្រូវការអង់ទីប៊ីយោទិក ១ ដូសដំបូងសម្រាប់រលាកក្អមមាស្បូន។ តើអ្នកត្រូវផ្តល់ដូចម្តេច? A- អាម៉ុកស៊ីស៊ីលីន ២៥០ម.ល ផ្តល់អោយ ១៧៥ម.លតែម្តង B- ស៊ីប្រូផ្លុកសាស៊ីន៥០០ម.ល ផ្តល់អោយ កន្លះគ្រាប់ C- ស៊ីប្រូផ្លុកសាស៊ីន២៥០ម.ល ផ្តល់អោយ ១គ្រាប់ D- មេត្រីនីដាស្រុល២៥០ម.លផ្តល់អោយ កន្លះគ្រាប់	A-
177	កុមារម្នាក់មាន ទំងន់ ១៦ គ.ក្រ ត្រូវការ អង់ទីប៊ីយោទិកសម្រាប់ រាកមូល ។ តើអ្នកត្រូវផ្តល់ដូចម្តេច? A- .អាម៉ុកស៊ីស៊ីលីន ២៥០ម.ល ផ្តល់អោយ ១៧៥ម.លតែម្តង B- ស៊ីប្រូផ្លុកសាស៊ីន៥០០ម.ក្រ ផ្តល់អោយ កន្លះគ្រាប់ C- ស៊ីប្រូផ្លុកសាស៊ីន២៥០ម.ក្រ ផ្តល់អោយ ១គ្រាប់ D- មេត្រីនីដាស្រុល២៥០ម.ក្រផ្តល់អោយ កន្លះគ្រាប់	C
178	កុមារអាយុ១៦ខែ មិនដែលទទួលម៉េបង់ជាហ្សលសោះ តើអ្នកត្រូវផ្តល់ម៉េបង់ជាហ្សលសំរាប់កុមារនេះដូចម្តេច? A- ម៉េបង់ជាហ្សល(៥០០ម.ក្រ) លេប កន្លះគ្រាប់ B- ម៉េបង់ជាហ្សល(៥០០ម.ក្រ) លេប ១ គ្រាប់ C- ម៉េបង់ជាហ្សល(៥០០ម.ក្រ) លេប ២ គ្រាប់ D- ម៉េបង់ជាហ្សល(៥០០ម.ក្រ) លេប ៣ គ្រាប់	A
179	កុមារអាយុ១១ខែ មិនដែលទទួលជីវជាតិអាសោះ។ តើអ្នកត្រូវផ្តល់ឱសថយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដូចម្តេចសំរាប់កុមារនេះ? A- .ជីវជាតិ អា(១០០ ០០០UI) លេប១គ្រាប់ និងរៀងរាល់៦ខែម្តងៗ B- ជីវជាតិ អា(១០០ ០០០UI) លេប១គ្រាប់ និង រៀងរាល់១២ខែម្តងៗ C- ជីវជាតិ អា(២០០ ០០០UI) លេប១គ្រាប់ និងរៀងរាល់៦ខែម្តងៗ D- ជីវជាតិ អា(២០០ ០០០UI) លេប១គ្រាប់ និងរៀងរាល់៩ ខែម្តងៗ	A

180	កុមារី អាយុ ១២ ខែ ទំងន់ ១១គីឡូក្រាម មានរាក ចំណាត់ថ្នាក់គ្មានខ្សោះជាតិទឹក ។ កុមារី គួរទទួលបាននូវអ្វីលីត្រ ២ កញ្ចប់ និង ថ្នាំគ្រាប់សង្កសី បន្ថែមទៀត។ តើអ្នកត្រូវផ្តល់ ថ្នាំគ្រាប់សង្កសីដូចម្តេចឲ្យកុមារី? A- . ថ្នាំគ្រាប់សង្កសី (២០ម.ក្រ) លេប១គ្រាប់ ម្តងក្នុង១ថ្ងៃ លេបរយៈពេល ១០ថ្ងៃ B- ថ្នាំគ្រាប់សង្កសី (២០ម.ក្រ) លេបកន្លះគ្រាប់ ម្តងក្នុង១ថ្ងៃ លេបរយៈពេល ១០ថ្ងៃ C- ថ្នាំគ្រាប់សង្កសី (២០ម.ក្រ) លេបកន្លះគ្រាប់ ម្តងក្នុង១ថ្ងៃ លេបរយៈពេល ៣ថ្ងៃ D- ថ្នាំគ្រាប់សង្កសី (២០ម.ក្រ) លេបកន្លះគ្រាប់ ម្តងក្នុង១ថ្ងៃ លេបរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ	A
181	ឆ្មបម្នាក់ត្រូវចាក់ថ្នាំវីតាមីន K (aqua MEPHYTON) អោយទារកក្រោយពេលកើត ។ ថ្នាំនោះគឺមានកំហាប់ 2mg/ml ហើយចំនួនដូសនៃវេជ្ជបញ្ជា គឺ 0.5 mg ដែលត្រូវចាក់ស៊ើរសៀក ។តើឆ្មបត្រូវធ្វើការចាក់ថ្នាំនេះប៉ុន្មានមីលីលីត្រ ? A- 0.25ml B- 0.5ml C- 1.0ml D- 2.0ml	A
182	ស្ត្រីក្រោយសម្រាលម្នាក់បានសួរទៅឆ្មបថា តើចំឡើយមួយណា ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការបង្កពេកដល់ទារកដែលទើបនឹងកើត? ឆ្មបឆ្លើយថា: A- . ការជំរុញកំណើតដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន B- ប្រវត្តិនៃបង្កពេកពីផ្លូវទឹកនោមនៅអាយុគភ៌បាន២០សប្តាហ៍ C- ការធ្លាក់ឈាមក្នុងត្រីមាសដំបូង D- ការបែកទឹកភ្លោះលើសពី៧២ម៉ោងមុនពេលសម្រាល	D
183	ស្ត្រីដែលទើបសម្រាលកូនដំបូងម្នាក់ បានសួរទៅឆ្មបថាកូនរបស់គាត់មានស្នាមអុជស តូចៗនៅលើច្រមុះ និងថ្ងាស។ តើឆ្មបគួរដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេច? A- . ផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតក្លាម B- បញ្ជូនទារកទៅកាន់បន្ទប់ថែទាំពិសេស C- លាងស្នាមអុជស ដោយបេតាឌីនពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ D- បញ្ជាក់ជាមួយម្តាយថាវាពិតជាការធម្មតា	D

184	នៅពេលដែលទារកទើបកើតត្រូវបានពិនិត្យ តើការសង្កេតរបស់ឆ្មបខាងក្រោមមួយណាដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតី។ A- បង្ហើយខាងមុខមានរាងដូចជាដុំពេជ្រ B- ផ្នែកខាងក្រោយនៃបង្ហើយតូចជាងបង្ហើយខាងមុខ C- ផ្នែកខាងក្រោយនៃបង្ហើយពិបាកក្នុងការស្ទាប D- បង្ហើយខាងមុខឡើងប៉ោង	D
185	ស្រ្តីដែលទើបនឹងឆ្លងទន្លេបាន២- ៣ថ្ងៃដំបូងហើយទារកគាត់មានសុខភាពល្អ គាត់សួរទៅឆ្មបថា តើ ២ ទៅ ៣ថ្ងៃដំបូងក្រោយសម្រាលកូនរបស់គាត់ បានបាត់បង់ទម្ងន់ខ្លួនប៉ុន្មានភាគរយ? ឆ្មបឆ្លើយថា: A- .1% B- 5% C- 10% D- 15%	C
186	ឆ្មបបានពន្យល់ទៅកាន់ស្រ្តីដែលទើបនឹងសម្រាលបាន២- ៣ថ្ងៃ ទារករបស់គាត់មានសុខភាពល្អ ថាជាធម្មតាទម្ងន់នឹងស្រកក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៃកំណើតបណ្តាលពី: A- . ការបញ្ចេញនូវលាមកព្រៃ B- ការបំបៅមិនបានល្អ C- ការបាត់បង់កោសិកានៃសារធាតុរាវ D- ការប្រើប្រាស់សារធាតុខ្លាញ់ពតិក្ខោត	C
187	ពេលថែទាំទារកដែលទើបនឹងកើតមានអាយុ៥ថ្ងៃដែលកើតជម្ងឺខាន់ល្បឿន កំពុងទទួលការព្យាបាលដោយពន្លឺ តើឆ្មបនឹងរំពឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដល់ទារកនេះ? A- . ក្រឡាប់ចុះឡើងទារកទើបនឹងកើតជារៀងរាល់ ៦ ម៉ោងម្តង B- លើកទឹកចិត្តដល់ម្តាយឲ្យបញ្ឈប់ការបំបៅដោះកូន C- ជូនដំណឹងដល់គ្រូពេទ្យប្រសិនបើស្បែកទារកមានពណ៌សំរិទ្ធ D- ពិនិត្យមើលសញ្ញាជីវិតជារៀងរាល់ ២ ទៅ ៤ ម៉ោងម្តង	D

188	នៅពេលធ្វើការវាយតម្លៃទារកទើបនឹងកើត ឆ្មបត្រូវយកសញ្ញាជីវិតទៅតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ៖ A- ជីពចរ ចង្វាក់ដង្ហើម សីតុណ្ហភាព B- សីតុណ្ហភាព ជីពចរ ចង្វាក់ដង្ហើម C- ចង្វាក់ដង្ហើម សីតុណ្ហភាព ជីពចរ D- ចង្វាក់ដង្ហើម ជីពចរ សីតុណ្ហភាព	D
189	ដើម្បីការពារការចុះកំដៅរបស់ទារកទើបនឹងកើតនៅសហគមន៍ឆ្មបត្រូវ អនុវត្តលើ៖ A- . ការរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យបានកក់ក្តៅ B- ការរក្សាការបំបៅដោះ C- វិធីសាស្ត្រកង់ហ្វូរី D- ការរក្សាម្តាយកុំឲ្យនៅបែកពីទារក	C
190	បើទឹកភ្លោះមានលាមកព្រៃឆ្មបត្រូវ៖ A- បូមសំអាតពីមាត់មុនច្រមុះ ពេលដែលក្បាលទារកលូន ចេញផុតពីទ្វារមាស B- បូមសំអាតពីមាត់មុនច្រមុះ ពេលដែលលូនទារកលូន ចេញផុតពីទ្វារមាស C- បូមសំអាតពីច្រមុះមុនមាត់ ចាប់ពីក្បាលទារក ចេញផុតពីទ្វារមាស D- បូមសំអាតពីច្រមុះមុនមាត់ ចាប់ពីខ្លួនទារក ចេញផុតពីទ្វារមាស	A
191	ក្នុងការសង្គ្រោះទារកទើបនឹងកើត តើឆ្មបត្រូវផ្តល់កំដៅអោយទារកដូចម្តេច ? A- រុំទារកឲ្យមានភាពកក់ក្តៅ B- បិទទ្វារ និងបង្អួចបន្ទប់ឲ្យអស់ C- ដាក់ទារកស្បែកទល់ស្បែក D- ដាក់ទារកនៅត្រង់កន្លែងមានភាពកក់ក្តៅ	D
192	បើសិនជានៅមានលាមកព្រៃនៅក្នុងមាត់ ច្រមុះទារក ឆ្មបត្រូវរៀបចំស្ថានភាពទារកដូចម្តេច? A- ក្បាលទារកដេកផ្ទាល់និង បូមសំអាតមាត់មុនច្រមុះ B- ក្បាលទារកដេកផ្ទៀងនិង បូមសំអាតមាត់មុនច្រមុះ C- ក្បាលទារកដេកផ្ទៀងនិង បូមសំអាតច្រមុះ មុន មាត់ D- ក្បាលទារកដេកផ្ទាល់និង បូមសំអាតមាត់មុនច្រមុះ	B

193	បន្ទាប់ពីសំអាតក្នុងមាត់ និងច្រមុះទារកហើយ ឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ជូតសំបូតទារក និងដាក់ស្ពានភាពទារកឆ្អើយហិត B- ជូតសំបូតទារកប្តូរកន្សែងសើមចេញ និងដាក់ស្ពានភាពទារកដេកផ្អៀង C- ជូតសំបូតទារកប្តូរកន្សែងសើមចេញ និងដាក់ស្ពានភាពទារកឆ្អើយហិត D- ជូតសំបូតទារកប្តូរកន្សែងសើមចេញ និងដាក់ស្ពានភាពទារកដេកថ្ងារ	C
194	បើទារកមិនដកដង្ហើមទេ តើឆ្មបត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? A- រំញោចទារក ក្នុងស្ពានភាពឆ្អើយហិត B- រុំទារក រួចដាក់ក្នុងស្ពានភាពឆ្អើយហិត C- រំញោចទារក ដាក់ក្នុងស្ពានភាពដេកផ្អៀង D- រំញោចទារក រួចដាក់ក្នុងស្ពានភាពដេកថ្ងារ	A
195	បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពសង្គ្រោះបាន៣០ វិនាទី ហើយ ឆ្មបត្រូវរាយការណ៍ឡើងវិញនូវ៖ A- ចង្វាក់ដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូង និង កម្លាំងសាច់ដុំ B- ចង្វាក់ដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូង និង ពណ៌សម្បុរ C- ចង្វាក់ដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូង និង ឆ្អើត D- ចង្វាក់ដង្ហើម កម្លាំងសាច់ដុំ និង ពណ៌សម្បុរ	B
196	ចំពោះការសំរេចចិត្តក្នុងការសង្គ្រោះ បើទារកនៅតែមិនដកដង្ហើម ឬ ចង្វាក់បេះដូងតិចជាង ១០០ដង /វិនាទី ឆ្មបត្រូវ៖ A- បន្តការសង្គ្រោះដោយការបូមស្បូនស្មាម B- បន្តការសង្គ្រោះដោយការរំញោចស្មាម C- បន្តការសង្គ្រោះដោយការដាក់អុកស៊ីហ្សែនស្មាម D- បន្តការសង្គ្រោះដំណាក់កាលទី ២ ស្មាម	D
197	ឆ្មបត្រូវឈរក្នុងស្ពានភាពដូចម្តេចក្នុងពេលសង្គ្រោះទារក? A- . ឈរពីចំហៀងទារកខាងស្តាំ ឬ ខាងឆ្វេង B- ឈរនៅចុងជើងទារកខាងស្តាំ ឬ ខាងឆ្វេង C- ឈរពីលើក្បាលទារកខាងស្តាំ ឬ ខាងឆ្វេង D- ឈរពីក្រោយទារកខាងស្តាំ ឬ ខាងឆ្វេង	C

198	ចំពោះចង្វាក់នៃការសប់បាឡុងក្នុងពេលសង្គ្រោះទារកឆ្លុះស្រូវសប់ដោយរាប់: A- . សប់ ១,២ ដើម្បីរក្សាចង្វាក់ នៃការសប់ពី ៤០ ទៅ ៦០ដងក្នុងមួយនាទី B- សប់ ២,៣ ដើម្បីរក្សាចង្វាក់ នៃការសប់ពី ៤០ ទៅ ៦០ ដងក្នុងមួយនាទី C- សប់ ១,២ ដើម្បីរក្សាចង្វាក់ នៃការសប់ពី ២០ ទៅ ៣០ ដងក្នុងមួយនាទី D- សប់ ២,៣ ដើម្បីរក្សាចង្វាក់ នៃការសប់ពី ២០ ទៅ ៣០ ដងក្នុងមួយនាទី	B
199	ក្នុងការសង្គ្រោះទារក បើមិនឃើញចលនាទ្រូងឡើងចុះ ពេលច្របាច់បាឡុងដោយសារសំពាធមិនគ្រប់ ឆ្លុះស្រូវត្រូវគូរដូររំលងឬចម្លើយ A- ដាក់ស្ថានភាពទារកថ្លើយហិត B- បង្កើនកំលាំងច្របាច់បាឡុង C- វាយតំលៃទារកសារជាថ្មី D- ពិនិត្យមើលម៉ាស់ម្តងទៀត	B
200	បើទារកដែលកំពុងសប់ខ្យល់បញ្ចូលនេះ អាចដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងទៀងទាត់ហើយ ឆ្លុះស្រូវ: A- ឈប់សប់បញ្ចូលខ្យល់ ហើយដាក់អុកស៊ីហ្សែន B- ឈប់សប់បញ្ចូលខ្យល់ ហើយរំញោចថ្មមៗ C- ឈប់សប់បញ្ចូលខ្យល់ ហើយផ្តល់កំដៅ D- ឈប់សប់បញ្ចូលខ្យល់ ហើយដាក់ទារកក្នុងស្ថានភាពដេកផ្អៀង	B
201	ចំពោះទារកដែលផុតពីការសង្គ្រោះ អាចមានសភាពល្អត្រឹមត្រូវហើយឆ្លុះស្រូវ A- . រៀបចំរុំទារកដោយទុកចំហមុខ និងទ្រូង B- រៀបចំរុំទារកដោយទុកចំហមុខ និងដាក់អុកស៊ីហ្សែន C- រៀបចំរុំទារកដោយទុកចំហមុខ និងរំញោចថ្មមៗ D- រៀបចំរុំទារកដោយទុកចំហមុខ និងដាក់ទារកក្នុងស្ថានភាពដេកផ្អៀង	A-
202	អ្នកត្រូវស្តាប់សំលេងស្រ្តាវខ្នងដោយ: A- យកស្តេតូដាក់លើបេះដូងហើយស្តាប់រកសំឡេងពេលកុមារដកដង្ហើមចេញ B- ស្តាប់ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រអប់ទ្រូងកុមារពេលដកដង្ហើមចូល C- ដាក់ស្តេតូលើស្បែកហើយស្តាប់រកសំលេងពេលកុមារដកដង្ហើមចូល D- ស្តាប់ដោយដាក់ត្រចៀកជិតមាត់ពេលនៅស្ងៀមហើយមិនយំ	C

203	២- សំរាប់ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅនៅផ្ទះ តើអ្វីដែលត្រូវ ធ្វើមុនគេ? A- អោយផ្តាំបំបាត់ការឈឺចាប់ B- ស្ត្រីដាក់ C- អោយជីកទឹកអោយបានច្រើន D- ចាក់សេរ៉ូមតាមសរសៃ	B
204	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើមានកុមារឈឺភ្នែក? A- សំអាតភ្នែកទាំងសងខាងនិងដាក់ថ្នាំភ្នែក៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ B- ប្រើថ្នាំចាក់ដល់កុមារ C- ជូតភ្នែកទាំងសងខាងជាមួយសំឡីសើម D- ជូតសំអាតភ្នែកនិងផ្តល់ថ្នាំគ្រាប់	A
205	តើការថែទាំកុមារកំពុងប្រកាច់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចលើកលែងតែ: A- ជ្រៀងកុមារចៀសវាងការឈ្លក់ B- បិតស្នូសក្នុងមាត់និងបំពង់ក C- បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ D- ចាក់សេរ៉ូមតាមសរសៃ	D
206	តើត្រូវផ្តល់អាហារបន្ថែមរបៀបណាដល់កុមារដែលមានជំងឺ? A- ផ្តល់អាហារតិចជាងធម្មតា B- ផ្តល់អាហារច្រើនជាងធម្មតាតែរាប C- ផ្តល់អាហារស្រាល D- ផ្តល់ទឹកអោយបានច្រើន	C
207	នៅពេលដែលកុមារមានរាកជាប់បន្តតើអាហារប្រភេទណាដែលបានហាមឃាត់? A- បបរគោកខាប់ B- ទឹកបបរ C- បំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ D- បំបៅដោយទឹកដោះតោម្សៅ	D

208	នៅពេលដែលយើងដឹងថាកុមារមានទំងន់ទាបខ្លាំងធៀបនឹងអាយុតើត្រូវធ្វើអ្វី នៅដំណាក់កាលដំបូង? A- អោយម្តាយយកកូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ B- អប់រំម្តាយបំប៉នអាហារដល់កូន C- តាមដានទំងន់ជាប្រចាំ D- ផ្តល់ការបំបៅដោយទឹកដោះគោខាប់	B
209	តើយើងត្រូវសួរពីអ្វីជាសំខាន់ពេលដឹងថាកុមាររោគ? A - រយៈពេលនិងការដោះស្រាយកន្លងមក B- កុមារបៅញ៉ាំបានឬទេ? C- លាងដៃមុនផ្តល់ចំណីទៅអោយកុមារ D- លាងដៃ- ពេលបន្ទោរបង់រួច	A-
210	ពេលដែលយើងពិនិត្យនិងចាក់ថ្នាំដល់កុមារមានបញ្ហាខ្សោះជាតិទឹកមធ្យម តើយើងត្រូវផ្តល់អ្វីជាសំខាន់ ក្រោយពេលកុមារទទួលការព្យាបាលដំបូង ដើម្បីកុំអោយ កុមារធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ? A- ណែនាំអោយម្តាយបន្តការបំបៅដោះកូន B- ណែនាំអោយម្តាយត្រឡប់មកតាមដានដង្ហែកក្រោយ C- ណែនាំអោយម្តាយយកកូនទៅមន្ទីរពេទ្យ D- ណែនាំម្តាយមិនផ្តល់អាហារដល់កូន	B
211	ពេលដែលកុមារមានសញ្ញាខ្សោះជាតិទឹកមធ្យមត្រូវបានទទួលការព្យាបាលក្នុង ចំណាត់ថ្នាក់ថាធ្ងន់ធ្ងរ ធុបត្រអនុវត្តដូចចំណាយ៣ខាងក្រោមលើកលែងតែ៖ A- បញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យ B- អោយម្តាយបញ្ជាក់ទឹកអ្វីលីត្រអោយបានញឹកញាប់នៅតាមផ្លូវ C- ណែនាំអោយម្តាយបន្តការបំបៅដោះ D- ណែនាំអោយម្តាយបញ្ឈប់ការបំបៅដោះ	D

212	តើយើងត្រូវថែទាំនិងព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលកុមារមានបញ្ហា? A- ប្រើប្លង់គប្បបញ្ញូនជាបន្ទាន់និងណែនាំម្តាយបន្តការបំបៅដោះ B- ប្រើប្លង់គប្បបញ្ញូនជាបន្ទាន់និងណែនាំអោយបញ្ឈប់ការបំបៅដោះ C- ប្រើប្លង់គជាការគ្រប់គ្រាន់ D- ប្រើប្លង់គទេគ្រាន់តែបញ្ញូន	A
213	ឆ្លុបត្រូវសួរម្តាយដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ពីបញ្ហាគ្រឿងកដល់កុមារដូចចម្លើយ៣ខាងក្រោម លើកលែងតែ៖ A- តើមានខ្ទះឬទឹកចេញពីគ្រឿងកឬទេ? B- មានការណែនាំទៅទទួលការដោះស្រាយទេ? C- តើមានការព្យាបាលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ? D- តើមានការហើមប៉ោងនិងឈឺចាប់ឬទេ?	B
214	ដើម្បីកំណត់រកភាពស្តុកស្តម្ភនិងហើមប្រអប់ជើងទាំង២ ឆ្លុបត្រូវពិនិត្យដូចម្តេចដើម្បីវាយតម្លៃលើកុមារ? A- ពិនិត្យមើលសកម្មភាពកុមារ B- ពិនិត្យមើលគ្រង់សាច់ដុំកំភួនជើង C- ពិនិត្យមើលគ្រង់សាច់ដុំដើមដៃ D- ពិនិត្យមើលគ្រង់សាច់ដុំស្មា ដៃ កំប៉េះគូចនិងជើង	D
215	ស្ត្រីម្នាក់បាននាំកូនគាត់ដែលមានអាយុ៩ ខែមកទទួលថ្នាំបង្ការ តើឆ្លុបត្រូវផ្តល់ប្រភេទថ្នាំបង្ការអ្វីដល់កូនគាត់? A- កញ្ច្រើល B- ប៊ូលីយ៉ូ C- រលាកស្រោមខួរក្បាល D- ដេតេសេ៣និងប៊ូលីយ៉ូ៣	A

216	ដើម្បីបន្តកំថ្នាំប្លង់យ៉ូ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- - ដៃកាន់ដបថ្នាំនិងទ្រចង្កា B- ដៃម្ខាងកាន់ដបថ្នាំនិងទប់ក្បាល C- ដៃម្ខាងកាន់ដបថ្នាំនិងដៃម្ខាងទៀតច្របាច់មាត់ក្តោបចង្កា D- ដៃម្ខាងកាន់ដបថ្នាំនិងច្របាច់ច្រមុះ	C
217	ដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការអោយបានត្រឹមត្រូវដល់កុមារ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ដៃម្ខាងកាន់ស៊ីរ៉ាំងនិងទ្រដើមដៃផ្នែកខាងក្រោម B- ដៃម្ខាងកាន់ស៊ីរ៉ាំងនិងទប់កែងដៃ C- ដៃម្ខាងកាន់ស៊ីរ៉ាំងនិងទប់ចុងប្រអប់ដៃ D- ដៃម្ខាងកាន់ស៊ីរ៉ាំងនិងច្របាច់ដុំដៃ	A
218	តើអ្វីខ្លះដែលឆ្លបត្រូវចៀសវាងក្នុងករណីបញ្ជូនកុមារមានជំងឺធ្ងន់ ទៅមន្ទីរពេទ្យ? A- ពន្យល់ម្តាយអំពីការចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនកុមារ B- សំរួលអារម្មណ៍ម្តាយនិងលើកទឹកចិត្តគាត់កុំអោយខ្លាច C- ពន្យល់ម្តាយបន្តការផ្តល់អាហារ D- ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់នានាដល់ម្តាយនិងណែនាំគាត់ពីរបៀបថែទាំកូន	C
219	តើត្រូវណែនាំម្តាយអោយផ្តល់អ្វី ដែលមានជាសុភកភាពដល់ទារកដើម្បីកាត់បន្ថយការក្អក? A- - ទឹកដោះម្តាយ ទឹកក្តៅឧណ្ហាៗ B- ទឹកដោះម្តាយ ទឹកក្តៅឧណ្ហាៗបន្ថែមស្ករឬបន្លិច C- ទឹកដោះម្តាយ ទឹកក្តៅឧណ្ហាៗបន្ថែមខ្ទឹបបន្លិច D- ទឹកដោះម្តាយ ទឹកក្តៅឧណ្ហាៗបន្ថែមក្រូចឆ្មារឬស្ករឬទឹកឃ្មុំ	D
220	ក្នុងករណីកុមារត្រូវបានទទួលយកការព្យាបាលប្រកាច់ដោយឧសថ ឌីយ៉ាហ្សេប៊ាម តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យស្ទះផ្លូវដង្ហើម? A- ដាក់កុមារផ្អៀងទៅម្ខាងនិងបីតស្មេស(មាត់ បំពង់ក) B- ដាក់កុមារផ្អៀងទៅម្ខាងនិងមិនចាំបាច់បីតស្មេស C- ផ្តល់ឧសថពង្រីកទងសួត D- បញ្ជូនកុមារទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតជាបន្ទាន់	A

221	ក្នុងករណីកុមាររោគស្រាល តើឧបត្ថម្ភវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដល់ម្តាយដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការថែទាំ និងតាមដានបន្ត ? A- បន្ថយការផ្តល់អាហារនិងបំបៅដោះ B- បន្តការផ្តល់អាហារនិងបំបៅដោះ C- ស្គាល់ពីសញ្ញាដែលត្រូវនាំកូនត្រឡប់មកវិញជាបន្ទាន់ D- ផ្តល់ថ្នាំទៀងទាត់តាមវេជ្ជបញ្ជា	C
222	ក្នុងករណីមានជំងឺរាកក្នុងកូន តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាសំខាន់ដើម្បីកុំអោយកុមារបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងកូន? A- បញ្ចូលជាតិទឹកតាមសរសៃ B- បញ្ចូលជាតិទឹកតាមសរសៃ+បន្តការបំបៅដោះ C- ផ្តល់ទឹកអ្វីក៏ល្អ+ផ្តល់អាហាររាវ D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅគ្លីនិកណាដែលនៅជិត	B
223	ដើម្បីបង្ការកុមារកង្វះជាតិស្ករក្នុងឈាម តើអនុសាសន៍ណាមួយ ដែលឧបមិនត្រូវអនុវត្ត? A- កុមារអាចបៅបានអោយម្តាយបន្តការបំបៅ B- កុមារអាចលេបបានអោយម្តាយបញ្ចុកទឹកដោះគោ C- ចាក់សៀមគ្រឿងកូសតាមសរសៃ D- ត្រូវផ្តល់ទឹកស្ករដល់កុមារ	C
224	តើវិធានការសំខាន់ជាងគេណាមួយខាងក្រោមដែលយើងត្រូវផ្តល់អោយម្តាយទទួលយកក្នុងករណីគាត់ចិញ្ចឹមកូនដោយប្រើដបទឹកដោះគោ? A- ណែនាំអោយប្រើតែដបទឹកនិងបង្ហាញពីរបៀបបញ្ចុក B- បង្ហាញពីរបៀបថែទាំដប C- ការរក្សាទុកទឹកដោះគោដែលនៅសល់ក្នុងដប D- ពន្យល់ពីចំនួនដែលត្រូវផ្តល់	A

225	ប្រការដែលត្រូវចៀសវាងសមស្របក្នុងករណីប្រើឱសថឌីឃ៉ាហ្សេប៊ាម (តាមបាត) ដើម្បីព្យាបាល កុមារកំពុងប្រកាច់នោះគឺ៖ A- ផ្តល់សារធាតុរាវតាមសរសៃ B- មិនត្រូវឱ្យកុមារផឹក ឬលេបឱសថអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ C- មិនត្រូវបំបៅដោះកុមារ D- មិនត្រូវច្របាច់ ឬម៉ាស្សាសាច់ដុំកុមារឡើយ	B
226	អន្តរាគមន៍សមស្របជាងគេណាមួយដែលយើងត្រូវអនុវត្តន៍ដោយខានមិនបានក្នុង ខណៈដែលកុមារ កំពុងក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយ ប្រកាច់នោះគឺ៖ A- ផ្តល់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ B- ផ្តល់សារធាតុរាវតាមមាត់ C- ជួយធ្វើម៉ាស្សាតិចៗនិងបញ្ជូន D- ដណ្តប់ត្រជាក់លើខ្លួនកុមារ	D
227	តើនៅកន្លែងភ្នែកណាមួយដែលជម្រុញឱ្យមានការដកដង្ហើមដំបូងរបស់ទារកទើបកើត ? A- មជ្ឈមណ្ឌលដកដង្ហើមនៅស្តួត B- មជ្ឈមណ្ឌលដកដង្ហើមនៅបេះដូង C- មជ្ឈមណ្ឌលដកដង្ហើមនៅ Medulla D- មជ្ឈមណ្ឌលដកដង្ហើមនៅសាច់ដុំពោះ	C
228	តើទារកទើបកើតមានកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីនប៉ុន្មាន ? A- ១១ g/dl B- ១៣ g/dl C- ១៥ g/dl D- ១៧ g/dl	A
229	តើប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើតទើបទារកចុះលាមកព្រៃ Meconium អស់ ? A- ២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកើត B- ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកើត C- ៤ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកើត D- ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកើត	A-

230	តើត្រូវផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ទារកទើបនឹងកើតភ្លាមរបៀបយ៉ាងដូចម្តេច ? A- រុំទារកដោយកន្សែងស្អាត B- ដាក់ម្តាយ និងកូននៅក្បែរគ្នា C- ដាក់ឱ្យស្បែកទារកប៉ះជាមួយស្បែកម្តាយ D- ដាក់ឱ្យប៉ះគ្នាប្រកាយពេលកើត	C
231	តើទារកឡើងទម្ងន់ជាមធ្យមប្រហែលប៉ុន្មាន ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃក្រោយពេលកើត ? A- - ១០០ ក្រ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ B- ២០០ ក្រ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ C- ៣០០ ក្រ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ D- ៤០០ ក្រ ក្នុងមួយសប្តាហ៍	B
232	តើVernix Caseosa អាចជួយការពារអ្វីដល់ស្បែកទារក ? A- ការប្រែប្រួលរបស់ស្បែក B- ការជ្រាបចូលសារធាតុខ្លាញ់ C- ការបកស្បែក D- ការបង្កពេកលើស្បែក	D
233	តើទូទៅទង់ផ្ចិតទារកជ្រុះរយៈពេលណាក្រោយពេលកើត ? A- ៨- ១០ ថ្ងៃក្រោយពេលកើត B- ៥- ៧ ថ្ងៃក្រោយពេលកើត C- ៤- ៦ ថ្ងៃក្រោយពេលកើត D- ២- ៤ ថ្ងៃក្រោយពេលកើត	B
234	តើអ្វីមួយដែលអ្នកគួរតែត្រូវធ្វើនៅពេលបង្កើតក្បាលទារករួចភ្លាម ? A- ជូតសំអាតទឹកអ៊ីលនៅមាត់ទារកដោយថ្មមៗ B- ជូតសំអាតទឹកអ៊ីលនៅក្បាលទារកដោយថ្មមៗ C- ជូតសំអាតទឹកអ៊ីលនៅភ្នែក និង ច្រមុះ ទារកដោយថ្មមៗ D- ជូតសំអាតទឹកអ៊ីលនៅភ្នែក ច្រមុះ មាត់ ទារក ដោយថ្មមៗ	D

235	ហេតុអ្វីបានជាគេផ្តល់ វីតាមីន K ឱ្យដល់ទារកនៅក្រោយពេលសម្រាល ? A- បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការហូរឈាមនៃទារកទើបកើត B- បន្ថយចរាចរឈាមនៃទារកទើបកើត C- បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការជាំស្បែករបស់ទារកទើបកើត D- បន្ថយការកើតជម្ងឺខាន់លៀងនៃទារកទើបកើត	A
236	តើកំដៅប៉ុន្មានដែលគេចាត់ទុកថាជាកំដៅរាងកាយចុះទាបមិនធម្មតា ចំពោះទារក? A- <36.5°C B- 37 °C C- 37.5°C D- 38°C	B
237	តើអ្វីមួយជាពេលសញ្ញាសំខាន់នៃជម្ងឺគោលស្លូត ? A- ការសន្លឹម B- ការថប់ដង្ហើម C- សាច់ដុំទន់ D- ការកម្រោក	D
238	តើកម្រិតជាតិស្ករមានប៉ុន្មានដែលចាត់ទុកថាទាបក្នុងឈាម ចំពោះទារកទើបកើត ? A- <45mg/dl (២,៦mmo/l) B- <55mg/dl (២,៦mmo/l) C- <60mg/dl (៣,៥mmo/l) D- <80mg/dl (៤,៧mmo/l)	A
239	តើអ្វីខ្លះជាពេលសញ្ញានៃការហូរឈាមនៅក្នុង Ventricle ពេលទារកទើបកើត ? A- កំដៅរាងកាយ <36°C B- ការប្រកាច់ ការកោងឆ្អឹងខ្នង C- ប្រកាច់ ឬបាត់បង់ស្មារតី ពិបាកដកដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ D- ក្តៅខ្លួន ចៅតិច ឬមិនចៅសោះ អស់កំលាំង	C

240	តើអ្វីខ្លះជាពោធិសញ្ញានៃជំងឺឱរក្សាលដោយ Bilirubin នៅតំណាក់កាលបន្ទាប់ពេលទារកទើបកើត? A- ការប្រកាច់ ការកោងឆ្អឹងខ្នង B- ការកោងឆ្អឹងខ្នង យំខ្លាំង និងមានប្រកាច់ C- បៅតិច ឬមិនបៅសោះ អស់កំលាំង D- អស់កំលាំង ទន់ខ្សោយ និង បៅបានតិចតួច	C
241	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃការបង្កពោធិលើទងដូត ? A- អស់កំលាំង ក្តៅខ្លួន B- ទងដូតក្រហម ហើម ហូរខ្ទុះ ឬគ្លិនស្អុយ C- បៅតិច ឬមិនបៅសោះ D- ទងដូតរលួយ ស្ងួត និង ជ្រុះ	B
242	តើទារកប្រភេទមួយណាដែលច្រើនកើតជំងឺខាន់លឿង ? A- ទារកតូច (២,៥កង កើត < ៣៧ សប្តាហ៍) B- ទារកតូច (២,៥កង កើត > ៣៧សប្តាហ៍) C- ទារកតូច (២,៧កង កើត < ៣៨ សប្តាហ៍) D- ទារកតូច (២,៧កង កើត > ៣៩ សប្តាហ៍)	A
243	តើអ្វីខ្លះជាពោធិសញ្ញានៃជំងឺខាន់លឿងដោយបែកគ្រាប់ឈាម ? A- ខាន់លឿង ស្លេកស្លាំង ស្រកទម្ងន់ B- ខាន់លឿងធ្ងន់ធ្ងរ ស្លេកស្លាំង ដេកច្រើន C- ខាន់លឿងធ្ងន់ធ្ងរ ស្លេកស្លាំង ហើមពេញខ្លួន D- ខាន់លឿងផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយ អស់កំលាំង	C
244	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញាមូលដ្ឋានដែលគេត្រូវផ្អែកលើដើម្បីកំណត់ថាទារកត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ? A- ចង្វាក់ដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូង និង វ៉េដ្រីច B- ចង្វាក់ដង្ហើម ចលនាសាច់ដុំ និង ពណ៌សម្បុរ C- ចង្វាក់ដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូង និង ពណ៌សម្បុរ D- ចង្វាក់ដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូង និង ចលនាសាច់ដុំ	C

245	តើសកម្មភាពមួយណាជាជំហានទី២សម្រាប់សង្គ្រោះទារកទើបកើតដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត? A- ផ្តល់កំដៅទារក B- ការសប់បញ្ចូលខ្យល់ចូលក្នុងសួត C- រុំទារកឱ្យមានភាពកក់ក្តៅ D- ការរំញោចទារក	B
246	តើឧបករណ៍ ឬសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលគេត្រូវប្រើក្នុងការសង្គ្រោះទារកទើបកើតនៅជំហានទី២? A- សង្កត់លើទ្រូង B- បំពង់បញ្ចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់ C- បាឡុង និង ម៉ាស់ D- ការរំញោចទារក	C
247	តើនៅពេលណាខ្លះដែលគេត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃពិន្ទុអាប៉េហ្គា ចំពោះទារកសុខភាពល្អ ? A- ១នាទីដំបូង រួច ៥នាទី B- ១នាទីដំបូង រួច ១០នាទី C- ៥នាទីដំបូង រួច ៥នាទី D- ១នាទីដំបូង រួច ១៥នាទី	A
248	តើរបៀបមួយណាដែលអ្នក មិនត្រូវប្រើ ដើម្បីរំញោចទារកឱ្យដកដង្ហើម ? A- ជូតសំបុត្រទារកដោយកន្លែង B- ចាប់យួរជើងទារកឡើងលើរូចទះកំប៉េះគូទ C- ត្រដុសខ្នងទារកថ្មមៗ D- ផ្លាត់ ឬ ទះបាតជើងទារក	B
249	តើនៅពេលណាដែលអ្នកអាចបញ្ឈប់ការសប់បញ្ចូលខ្យល់ក្នុងការសង្គ្រោះទារក ? A- ចង្វាក់បេះដូង មាន៨០ ដង/នាទី និងសំបុរទារកពណ៌ខៀវ B- ចង្វាក់បេះដូងមាន ៨០ ដង/នាទី និង ទារកទន់ C- ចង្វាក់បេះដូងមាន ១០០ ដង/នាទី និង ទ្រូងមិនមានចលនាឡើងចុះ D- ចង្វាក់បេះដូងមាន១២០ ដង/នាទី និងដកដង្ហើម ឬ ស្រែកយំ	D

250	តើអ្នកត្រូវរាប់ចង្វាក់បេះដូងទារករយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី នៅពេលសង្កេតទារក? A- រយៈពេល៦វិនាទី B- រយៈពេល១៥ វិនាទី C- រយៈពេល៣០វិនាទី D- រយៈពេល៦០វិនាទី	C
-----	---	---