

សំណួរមានចម្លើយជ្រើសរើសច្រើន

1	ហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសម្រាប់ស្ត្រីមុនរះកាត់យកកូន ? A-ការពារការគេចវេសមិនបង់ថ្លៃ B-ការពារការចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលបង្ខំឱ្យរះកាត់ C-កុំឱ្យអ្នកជម្ងឺមានការភ័យខ្លាច D-បង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកជម្ងឺ	B
2	តើនៅកន្លែងណាដែលឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរះកាត់ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងអំឡុងពេលរះកាត់? A-ក្នុងបន្ទប់រះកាត់ B-ក្នុងការិយាល័យបច្ចេកទេស C-ជាមួយឯកសារអ្នកជម្ងឺ D-ទុកក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាល	C
3	តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រមូលពីអ្នកជម្ងឺក្នុងដំណាក់កាលមុន និងក្រោយរះកាត់? A-ស្ថានភាពគ្រួសារមាន ឬក្រ B-ស្ថានភាពសុខភាព និង វត្តមាននៃជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ C-ប្រវត្តិគ្រួសារស្នូត ឬគោងកាច D-ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារឬទេ	B
4	តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងមុនធ្វើការរះកាត់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ការផ្តល់អាហារ និងទឹកដល់អ្នកជម្ងឺ ? A-១-២ ម៉ោងមុនពេលរះកាត់ B-២-៣ ម៉ោងមុនពេលរះកាត់ C-៣-៤ ម៉ោងមុនពេលរះកាត់ D-៤-៨ ម៉ោងមុនពេលរះកាត់	D

5	តើអ្វីសំខាន់ជាងគេដែលអ្នកឯកទេសដាក់ថ្នាំសណ្តាត្រូវបន្តតាមដានក្រោយពេលវះកាត់ ? A-សភាពស្លេកស្លាំង B-សញ្ញាជីវិត C-សភាពស្ងួត D-ស្ថានភាពកង្វះអុកស៊ីសែន	B
6	តើស្ថានភាពបែបណាក្រោយការវះកាត់ដែលអ្នកត្រូវដាក់អ្នកជម្ងឺ ដើម្បីជួយឱ្យមានជាសុភាពក្នុងការដកដង្ហើម? A-ឱ្យអ្នកជម្ងឺដាក់បាតដៃតាមបណ្តោយតែម្ខាងលើ និងខាងមុខឆ្អឹងជំនីរ B-ឱ្យអ្នកជម្ងឺដាក់បាតដៃតាមបណ្តោយតែម្ខាងក្រោម និងខាងមុខឆ្អឹងជំនីរ C-ឱ្យអ្នកជម្ងឺដាក់បាតដៃតាមបណ្តោយតែម្ខាងលើ និងខាងក្រោយឆ្អឹងជំនីរ D-ឱ្យអ្នកជម្ងឺដាក់បាតដៃតាមបណ្តោយតែម្ខាងលើ និងចំហៀងឆ្អឹងជំនីរ	B
7	តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលប្រឈមមុខ និងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលវះកាត់ ? A-អាយុ សុខភាពទូទៅ ស្ថានភាពសង្គម កត្តាចិត្តសាស្ត្រ B-អាយុ សុខភាពទូទៅ កត្តាសេដ្ឋកិច្ច សុខភាពផ្លូវចិត្ត C-ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ កត្តាចិត្តសាស្ត្រ ការប្រើថ្នាំ D-អាយុ សុខភាពទូទៅ អាហារូបត្ថម្ភ ការប្រើថ្នាំ សុខភាពផ្លូវចិត្ត	D
8	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកដែលអ្នកជម្ងឺបេះដូងត្រូវប្រឈមក្នុងពេលទទួលការវះកាត់ ? A-ខ្វះឈាមខ្លាំងពេលធ្វើការវះកាត់ B-អាចរងគ្រោះថ្នាក់ពេលទទួលថ្នាំសណ្តា C-មាន Hypovolemie ពេលវះកាត់ D-សម្ពាធឈាមឡើងខ្លាំង	B
9	តើអ្នកជម្ងឺប្រភេទណា ដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការទទួលថ្នាំសណ្តា ពេលកំពុង និងក្រោយវះកាត់ ? A-អ្នកមានជម្ងឺតម្រងនោម B-អ្នកមានជម្ងឺក្រពះ ពោះវៀន C-អ្នកមានជម្ងឺប្រព័ន្ធបេះដូង D-អ្នកមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ	C

10	សញ្ញាបញ្ជាក់ ពីការក្លាយរោគក្រោយការវះកាត់គឺ៖ A-អ្នកជម្ងឺរើរវាយ សន្លប់មិនដឹងខ្លួន B-មុខរបួសស្លុតតែមានការឈឺចាប់ C-មុខរបួសក្រហម ក្តៅ ហើម និងការឈឺចាប់ D-មុខរបួសហូរទឹករងៃតែគ្មានការឈឺចាប់	C
11	តើត្រូវដាក់អ្នកជម្ងឺក្នុងស្ថានភាពណាក្រោយការវះកាត់ភ្លាមៗពេលអ្នកជម្ងឺស្ថិតនៅក្នុងភាពសណ្តំនៅឡើយ ? A-ក្នុងស្ថានភាពផ្លាស់ B-ក្នុងស្ថានភាពក្បាលផ្អៀង C-ក្នុងស្ថានភាពផ្តាច់មុខ D-ក្នុងស្ថានភាពផ្អៀងដាក់មុខផ្លាស់មើលទៅលើ	B
12	តើនៅពេលណាទើប Tube endotracheal ត្រូវបានដកក្រោយពេលវះកាត់ ? A-ពេលអ្នកជម្ងឺ មិនអាចលេបទឹកមាត់ ឬហាមតាមមាត់បាន B-ពេលអ្នកជម្ងឺមិនទាន់ ដឹងខ្លួន C-នៅពេលអ្នកជម្ងឺមានសញ្ញាជីវិតល្អ D-ពេលបញ្ជូន អ្នកជម្ងឺចេញពីបន្ទប់វះកាត់	C
13	តើត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ចំពោះអ្នកជម្ងឺវះកាត់របៀបណាដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ? A-ប្រើប្រាស់ទៀងទាត់តាមកាលកំណត់ B-ប្រើប្រាស់ឱ្យបានមុនការឈឺចាប់ខ្លាំងកើតឡើង C-ប្រើប្រាស់នៅពេលការឈឺចាប់កើតឡើង D-ផ្តល់ថ្នាំជាប់ជានិច្ចរាល់២ម៉ោងក្នុង២៤ម៉ោង	A
14	តើអ្នកជម្ងឺដែលបានចាក់ថ្នាំស្លឹក Spiral anesthetic តាមធម្មតាត្រូវដកក្នុងស្ថានភាពដូចម្តេច? A-ផ្អៀងរយៈពេល ២ម៉ោងក្រោយវះកាត់ B- ផ្អៀងរយៈពេល៨-១២ម៉ោងក្រោយវះកាត់ C- រាបស្មើរយៈពេល ២ម៉ោងក្រោយវះកាត់ D- រាបស្មើរយៈពេល៨-១២ម៉ោងក្រោយវះកាត់	D

15	តើនៅពេលណាដែលគួរផ្តល់ទឹក និងអាហារដល់អ្នកជម្ងឺក្រោយពេលវះកាត់ ? A-ក្រោយពេលអ្នកជម្ងឺមានក្អក B-ក្រោយពេលអ្នកជម្ងឺងើបអង្គុយបាន C-ក្រោយពេលពោះវៀនចាប់មានចលនាឡើងវិញ D-ក្រោយពេលសម្ពាធឈាមធម្មតាឡើងវិញ	C
16	តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូន ? A- ភាពស្រងូតស្រងាត់ B- ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត C- ជម្ងឺវិកលចរិត D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
17	តើនៅត្រីមាសទីប៉ុន្មាន ដែលស្ត្រីមានគភ៌គួរជៀសវាងប្រើថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺផ្លូវចិត្ត ? A- ត្រីមាសទី២ និង ត្រីមាសទី៣ B- ត្រីមាសទី៣ C- ត្រីមាសទី២ D- ត្រីមាសទី១	D
18	តើបញ្ហាមួយណាទាក់ទងនឹងកូនដែលនាំឱ្យស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាល ? A- កូនកើតមកមិនសមបំណង B- កូនមិនគ្រប់លក្ខណៈ C- កូនកើតមកឈឺ D- កូនកើតមកតូចពេក	B
19	ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីសម្រាលហើយ តើអ្នកត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅជួបផ្នែកណា? A- ផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្ត B- ផ្នែកសុខាភិបាល C- ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ D- ផ្នែកផ្តល់ប្រឹក្សា	A

20	តើអ្វីខ្លះអាចជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យកុមារអាប់ប្រាជ្ញា ? A- ម្តាយមានអាយុតិចពេក B- ម្តាយមានអាយុច្រើនពេក C- ម្តាយខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
21	តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកចំពោះកូន បណ្តាលមកពីម្តាយហូបស្រាច្រើនក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ? A- កូនថ្លោស B- កូនកើតមិនគ្រប់ខែ C- កូនអាប់ប្រាជ្ញា D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	C
22	ឆ្អឹងអាងត្រគាកមិនពិត (False pelvis) គឺជា: A. ឆ្អឹងអាងត្រគាកដែលខូចទ្រង់ទ្រាយ B. ផ្នែកខាងលើនៃច្រកចូលរបស់ឆ្អឹងអាងត្រគាក (Inlet) C. ផ្នែកកណ្តាលនៃច្រកចូលរបស់ឆ្អឹងអាងត្រគាក D. ផ្នែកក្រោមនៃច្រកចូលរបស់ឆ្អឹងអាងត្រគាក	B
23	ទំរង់ច្រកលើ នៃឆ្អឹងអាងត្រគាករបស់ស្ត្រី(gynaecoid pelvis) រួមមាន: A. មានតែមន្ទីររាងមូល (a rounded brim) B. មានតែមន្ទីររាងស្រួច C. មានតែមន្ទីររាងត្រីកោណ D. មានតែមន្ទីររាងសំប៉ែត	A
24	ចំនុចទាំងអស់ខាងក្រោមណាមួយដែលមិនមែនជាមុខងាររបស់សាច់ដុំតំបន់អាងត្រគាក (pelvic floor): A. ទ្រទម្ងន់នៃសិរីរៈនៅក្នុងពោះនិងឆ្អឹងអាងត្រគាក B. ទទួលខុសត្រូវ ការគ្រប់គ្រងនៃការបត់ជើងតូច និងបត់ជើងធំ C. ជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងពេលរួមភេទ D. រំញោចដើម្បីបញ្ចេញកាកសំណល់	D

25	ខាងក្រោមនេះមួយណាមិនមែន ជាមុខងាររបស់សុក្រ៖ A. ផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័ន B. ចិញ្ចឹមទារកក្នុងផ្ទៃ C. បញ្ចេញកាកសំណល់ពីទារក D. ផ្ទុកគោលិកាឈាមក្រហម	D
26	តើពេលណាដែលអាចញែកការឈឺពោះសម្រាលរយៈសកម្ម ពីរយៈយឺត? A- ពេលភ្នាសទឹកភ្លោះមានការដាច់រលាត់ B- ពេលមាត់ស្បូនបើកបាន៣ទៅ៤សង់ទីម៉ែត្រជាមួយនឹងការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់ C- ពេលដែលការកន្ត្រាក់ស្បូនកើតមានជាទៀងទាត់ D- ពេលដែលស្រ្តីត្រូវការថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់	B
27	តើគុណប្រយោជន៍អ្វី នៅក្នុងការរក្សាមិនឲ្យមានការបែកទឹកភ្លោះនៅក្នុងរយៈយឺត នៃការឈឺពោះសម្រាល ? A- ពន្យារពេលសម្រាល B- កាត់បន្ថយបំបែរូលល្បឿននៃការលូតលាស់របស់ក្បាលទារក C- កាត់បន្ថយរយៈពេលសម្រាល D- កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃទងសុករុក	B
28	តើអ្នកណាដែលមិនមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យស្រ្តីក្នុងការរះកាត់យកកូន? A- គ្រូពេទ្យផ្នែកសម្ភពប្រសិនបើមានការគំរាមដល់ជីវិតរបស់ស្រ្តី B- មានតែស្រ្តីខ្លួនឯងទេប្រសិនបើគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្ត C- សាច់ញាតិរបស់ស្រ្តីប្រសិនបើគាត់សន្សំ D- ធូបនៅផ្នែកសម្ភព	D
29	ការរុញខ្លីនៃមាត់ស្បូនហៅថា៖ A- Replacement B- Effacement C- Infusion D- Displacement	B

30	ពេលដែលការកម្រិតស្បូនសម្រាក សាច់ដុំរលានៅពេលសម្រាល គេហៅថា: A- Retraction B- Contraction C- Dilatation D- Reaction	A
31	តើវិធីមួយណាដែលអាចគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ខ្លាំងពេលសម្រាល ? A- ព្យាបាលដោយទឹក B- ព្យាបាលដោយក្លិន C- ការសិក្សាពីវេជ្ជថ្ន D- ព្យាបាលដោយចាក់ថ្នាំស្ពឹកតាមផ្លូវចង្កេះ	D
32	ចង្វាក់បេះដូងធម្មតារបស់ទារកគឺ : A- ៩០ - ១៤០ ក្នុង១នាទី B- ១១០- ១៥០ ក្នុង១នាទី C- ១២០ - ១៦០ ក្នុង១នាទី D- ១៣០ - ១៧០ ក្នុង១នាទី	C
33	ពេលទារកមានអាចម៍ព្រៃ គឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទារកមានកង្វះ : A- អុកស៊ីសែន B- ប្លូតាស្យូម C- ជាតិស្ករ D- កាល់ស្យូម	A
34	នៅពេលឆ្មបធ្វើការលូកពិនិត្យទ្វារមានសព្វល្អឈឺពោះសម្រាល ចំពោះទំរង់បង្ហាញធម្មតា គឺអាចប៉ះ ៖ A- បង្ហើយទារកខាងមុខស្ទើរតែនៅចំកណ្តាល B- បង្ហើយទារកផ្នែកខាងក្រោយស្ទើរតែនៅចំកណ្តាល C- បង្ហើយទារកផ្នែកខាងមុខ D- បង្ហើយទារកផ្នែកខាងក្រោយ	B

35	តើពេលណាដែលជារយៈសកម្មនៃការឈឺពោះសម្រាលកើតមានឡើង ? A- ពេលបែកស្រោមទឹកភ្លោះ B- ពេលមាត់ស្បូនបើកបាន៣-៤សម និងការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់ C- ពេលស្បូនកន្ត្រាក់ទៀងទាត់ D- ពេលម្តាយត្រូវការថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់	B
36	តើកម្រិតនៃការបើកមាត់ស្បូនប៉ុណ្ណា ក្នុងរយៈសកម្ម ដែលចាត់ទុកថាជាការឈឺពោះសម្រាល ធម្មតា កើតមានឡើង ? A- ០.៥ស.ម ក្នុង១ម៉ោង B- ០.៧ស.មក្នុង១ម៉ោង C- ១ ស.ម ក្នុង១ម៉ោង D- មិនអាចកំណត់បាន	C
37	តើអ្នកណាដែលអាចផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់ស្ត្រីក្នុងការរៀនកាត់យកកូនបាន ? A- បើសិនស្ត្រីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រូពេទ្យផ្នែកសម្ភពជាអ្នកផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀង B- ស្ត្រីផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ C- បើស្ត្រីទទួលថ្នាំសណ្តមានតែសាច់ញាតិគាត់ជាអ្នកផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀង D- អ្នកជិតខាងរបស់ស្ត្រីជាអ្នកផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀង	B
38	ក្នុងពេលឈឺពោះសម្រាល ឲ្យស្ត្រីញ៉ាំទឹករាល់ម៉ោង និងការធ្វើឱ្យញោចនោមទទេ អាចជៀសវាងនូវ៖ A- ការបាត់បង់ថាមពល B- ការបាត់បង់ជាតិស្ករ C- ការបាត់បង់កាល់ស្យូម D- ការបាត់បង់ជាតិទឹក	D
39	ការរុញខ្លីនៃមាត់ស្បូនចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងនៃអង្គត់ក្រោម(Lower Segment) ហៅថា៖ A- ភាពប្រែប្រួលមាត់ស្បូន B- ភាពរលុបនៃមាត់ស្បូន C- ភាពមិនប្រែប្រួលមាត់ស្បូន D- ភាពរលានៃមាត់ស្បូន	B

40	តើវិធីសាស្ត្របំបាត់ការឈឺចាប់ពេលឈឺពោះសម្រាលណាមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ : A- ការព្យាបាលដោយទឹក B- ការព្យាបាលដោយផ្លាស់ប្តូរចលនា C- ការព្យាបាលដោយផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ D- ការព្យាបាលដោយចលនា (Kinesthesia therapy)	D
41	ការផ្លាស់ប្តូរចលនានៅក្នុងអំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាលអាចជួយសម្រួល៖ A- ស្ត្រីឱ្យសម្រាលបានរហ័ស B- ស្ត្រីបត់ជើងតូចមិនស្រួល C- សុករបេះមុនកូនកើត D- ធ្លាក់ទងសុក មកមុន	A
42	តើដូចម្តេចដែលហៅថាដំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាល ? A- នៅពេលស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាមានការសំរុកចុះខ្លាំង B- នៅពេលដែលទារកចុះចូលក្នុងអាងត្រគាក C- នៅចន្លោះមាត់ស្បូនបើកអស់ និងទារកសម្រាលផុត D- នៅពេលសម្រាលដែលស្ត្រីប្រឹងខ្លាំងបំផុត	C
43	ការប្រឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាលសម្រាប់ម្តាយនិងទារកដែលមានសុខភាពល្អដោយមិនចាំបាច់ដាក់ថ្នាំសណ្តាំគឺ : A- គ្រប់គ្រងការប្រឹងដោយប្រើដង្ហើមវែង B- ការប្រឹងដោយធម្មជាតិរបស់ម្តាយ C- ការប្រឹងដោយធម្មជាតិ និងការបង្ខំប្រឹង D- ការពន្យារពេលនៃការប្រឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន	B
44	តើនៅពេលណាដែលត្រូវធ្វើការកាត់ទ្វារមាស ? A- គ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ B- គ្រប់ស្ត្រីដែលមានកូនដំបូងទាំងអស់ C- នៅពេលដែលស្ត្រីជាម្តាយ ឬទារក មានតម្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ D- នៅពេលសម្រាលលើសពីរយៈពេលដែលបានកំណត់	C

45	ការរំហែកទ្វារមាសក្នុងកម្រិតទី៨ គឺជាការខូចខាតរួមមាន A- ការរំហែកសាច់ដុំទ្វារមាស B- ការរំហែកសាច់ដុំស្បែកទ្វារលាមក ជាមួយនឹងការរំហែកគ្នាសទ្វារលាមក C- ការរំហែកប្រើស ឬការរំហែកសាច់ដុំស្បែកទ្វារធំ D- ដោយសារការប្រើដង្កៀប (Fourchette) និងផ្ទៃខាងលើនៃសាច់ដុំប៊ែរីណេ	B
46	តើការទម្លាក់សុកនិងស្រោមទឹកភ្លោះ ដែលគួរតែត្រូវធ្វើឡើង លើកលែងតែ : A- ថ្នាំពន្លឺនការទម្លាក់សុកត្រូវបានផ្តល់ B- ស្បូនកន្ត្រាក់បានល្អ C- ការលាតសន្ធឹងត្រូវបានធ្វើឡើង D- ធ្វើការលូតបារដោយដៃ	D
47	តើចម្លើយណាមួយដែលបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការធ្លាក់សុក ? A- ស្ថានភាពផ្តុក B- ផ្លោកនោមពេញដោយទឹកនោម C- ការកាត់ទ្វារមាស D- ការទទួលទាននៅក្នុងអំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាល	B
48	ស្ត្រីធ្លាក់ឈាមក្រោយពីសម្រាលកូនរួចអាចបណ្តាលមកពី៖ A- ស្បូនខ្វះអុកស៊ីសែន B- ស្បូនមិនកន្ត្រាក់ល្អ C- ការកន្ត្រាក់មកវិញនៃស្បូន D- ស្បូនកន្ត្រាក់បានល្អ	B
49	កត្តាប្រឈមមុខជាងគេដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលចំពោះស្ត្រីដែល ៖ A- មានកូនច្រើន B- មិនធ្លាប់មានកូន C- សម្រាលមុនកំនត់ D- រំហែកទ្វារមាសកម្រិតទី៣ពីមុន	A

50	ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល តើឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វី ? A- ម៉ាស្សាជួយឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់ B- លូកបារសម្អាតស្បូន C- ពិនិត្យសុកឡើងវិញ D- ប៉ាន់ប្រមាណឈាមបាត់បង់	A
51	តើចម្លើយណាមួយដែលហាមឃាត់នៅក្នុងការចាក់ថ្នាំឲ្យស្ត្រីពេលឈឺពោះសម្រាល ? A- សម្អាតឈាមឡើងខ្ពស់ B- ក្បាលទារកមិនសមាមាត្រអាងត្រគាក C- ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ D- សុករបេះចេញពីស្បូន	B
52	គ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងពីការចោះបំបែកទឹកភ្លោះគឺ: A- ទងសុកធ្លាក់មកមុន B- ទងសុកមានគំនូច C- ហូរឈាមក្នុងខួរក្បាលរបស់ទារក D- ម្តាយមានការធ្លាក់ឈាម	A
53	ការគ្រប់គ្រងការឈឺពោះសម្រាលយូរគឺ : A- ការពិនិត្យទ្វារមាសរាល់ម៉ោង B- ការផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្របំបាត់ការឈឺចាប់ដោយមិនប្រើថ្នាំ C- ការធានាថាម្តាយមិនខ្វះជាតិទឹក D- ការហាមឃាត់ការបំលាស់ទី	C
54	កំណត់ឲ្យច្បាស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងដំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាល : A- ការកន្ត្រាក់ស្បូនមិនមានប្រសិទ្ធភាព B- ការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងអាងត្រគាកម្តាយ និងទម្រង់បង្ហាញរបស់ទារក C- Occipito-anterior position D- Hydrotherapy	A

55	តើទំរង់មិនប្រក្រតីរបស់ Occiput មួយណាដែលកើតឡើងញឹកញាប់ ? A- អុកស៊ីពីតនៅផ្នែកខាងមុខ B- អុកស៊ីពីតនៅទទឹង C- អុកស៊ីពីតនៅផ្នែកខាងក្រោយ D- អុកស៊ីពីតសាកក្រេ	C
56	នៅក្នុងទំរង់បង្ហាញមុខ អង្កត់ផ្ចិតដែលយើងឃើញគឺ : A- Suboccipitofrontal B- Occipitofrontal C- Mentoverical D- Submentoverical	C
57	ទំរង់ Frank breech គឺ : A- ការបញ្ជ្រាសទាំងស្រុង B- ការបញ្ជ្រាសដោយជើងទារកសន្ធឹងទៅលើ C- បញ្ជ្រាសចេញជើង D- ការបញ្ជ្រាសចេញជង្គង់	B
58	តើកាលៈទេសៈណាមួយដែលទារកងាយនឹងមានទំរង់បញ្ជ្រាស ? A- ផ្ទៃពោះដំបូង B- ផ្ទៃពោះច្រើនដង C- ការដាច់សុកពីស្បូន D- ផ្ទៃពោះដែលក្រកើត	B
59	ការបង្វិលពីក្រៅដើម្បីបង្វែរក្បាលទារកត្រូវបានហាមឃាត់នៅពេលដែល A- ទឹកភ្លោះតិច B- ផ្ទៃពោះតិចជាង៣៨សប្តាហ៍ c- ផ្ទៃពោះច្រើនដង D- មិនមានចម្លើយត្រឹមត្រូវ	A

60	ចម្លើយខាងក្រោមគឺជាផលវិបាកនៃការសម្រាលបញ្ជ្រាស លើកលែងតែ៖ A- ទារកបាក់ឆ្អឹង clavicle B- ទារកពិការអវៈវៈយៈវៈ C- ពិន្ទុអាប៉េហ្គា7 D- ទារកជាប់ក្បាល	C
61	តើចម្លើយខាងក្រោមនេះណាមួយដែលអាចបណ្តាលឱ្យស្ថានភាពទារកក្នុងផ្ទៃខុសធម្មតា ? A- អាងឆ្អឹងត្រួតតាមរូបតូច B- ទឹកភ្លោះច្រើន C- សុកពាំងមាត់ស្បូន D- សាច់ដុំពោះវែង	B
62	ក្នុងពេលសម្រាលដោយប្រើដង្កៀបមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកគឺ ៖ A- រៀចមុខ B- សម្លាកមុខ C- ដុំឈាមកកកក្នុងខួរក្បាល D- សម្លាកក្បាល	A
63	តើអ្វីដែលជាផលវិបាកនៃការសម្រាលដោយបូម (vacuum delivery)? A- រៀចមុខ B- សម្លាកមុខ C- ដុំឈាមកកកក្នុងខួរក្បាល D- សម្លាកក្បាល	C
64	តើបញ្ហាមួយណានៃការឈឺពោះសម្រាលដែលតម្រូវឱ្យមានការវះកាត់ ? A- សុកពាំងមាត់ស្បូន B- ទម្រង់បញ្ជ្រាស C- ទម្រង់បង្ហាញ Occipito posterior D- ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម	A

65	តើបញ្ហាមួយណានៃការឈឺពោះសម្រាលដែលតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់ជាបន្ទាន់ ? A- ការឈឺពោះសម្រាលយឺត B- ទងស្កកធ្លាក់ចេញនៅដំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសម្រាល C- បំរុងក្រឡាភ្លើង D- កូនភ្លោះដែលមិនអាចកំណត់បាន	B
66	តើផលវិបាកអ្វីដែលកើតមានក្រោយការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់ ? A- ឆ្អឹងត្រកៀតរួមតូច B- ដុំឈាមកកនៅសរសៃវ៉ែន C- ស្រុតស្បូន D- ឈឺនៅពេលរួមភេទ	B
67	តើចម្លើយខាងក្រោមមួយណាដែលមិនចាំបាច់កត់ត្រាចូលបន្ទាប់ពីការវះកាត់យកកូនដែលធ្វើឡើងតាមការដាក់ថ្នាំសណ្តាតាមឆ្អឹងខ្នង? A- ចង្វាក់ដង្ហើម B- ចង្វាក់បេះដូង C- សម្ពាធឈាម D- ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម	D
68	ការសម្រាលកូនមិនរួចដោយជាប់ស្មាអាចនឹងកើតមាននៅ៖ A- ផ្ទៃពោះលើកដំបូង B- ផ្ទៃពោះច្រើនដង C- ទារកលើសទំងន់ D- ស្ត្រីជាមាតារក្សាពេក	C
69	តើអ្វីដែលជាសញ្ញានិងរោគសញ្ញាចំបងគេនៅក្នុងការកំណត់ថាស្បូនពន្លាត់ស្រួចស្រាវ? A- សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ B- ស្កក និងឈឺជាប់ជាបន្ត C- នៅសល់កំទេចស្កក D- ស្ទាបស្បូនមិនកន្ត្រាក់	B

70	ការគ្រប់គ្រងស្តុកដែលបង្កដោយការក្លាយជាគ្រួសារមានចម្លើយទាំង៣ខាងក្រោមលើកលែងតែ៖ A- យកវត្ថុវិភាគឈាមទៅបណ្តុះ B- ចាក់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកតាមសរសៃ C- បង្កប់សារធាតុរាវក្នុងខ្លួនវិញ D- សម្អាតកំទេចស្តុក ដែលនៅសល់ចេញ	D
71	ដើម្បីធានាថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចដកដង្ហើមបាន បន្ទាប់ពីប្រកាច់ តើឆ្លើយត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-ដាក់ស្រ្តីឲ្យដេកផ្អៀង B- ផ្តល់អុកស៊ីសែន C-សំអាតផ្លូវខ្យល់និងនៅក្បែរស្រ្តី D-ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
72	ការគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ឈាមនៅរយៈដំបូងនៃគភ៌ តើឆ្លើយត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- វាយតម្លៃហ្វេសមួយ និងវាយតម្លៃសញ្ញាជីវិត B- ព្យាបាលការធ្លាក់ឈាម C- ព្យាបាលបំពេញជាតិទឹក D- តាមដានការធ្លាក់ឈាម	A
73	តើឆ្លើយត្រូវប្រាប់ស្ត្រី ឲ្យចេះបន្ទុករាងកាយ ដើម្បីសម្រួលពេលឈឺពោះសម្រាលយ៉ាងដូចម្តេច? A- ពន្យល់ស្ត្រីឲ្យចេះបន្ទុកផ្នែកណាមួយនៃដងខ្លួន រហូតដល់ខ្លួនទាំងមូល B- ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យឈរ ឬ អង្គុយនៅស្ងៀម-ដេកបិទភ្នែក C- ម៉ាស្សាជុំវិញចន្លោះស្បូនកន្ត្រាក់ ឈ្លីនៅលើប្រអប់ជើង D-ដកដង្ហើមចូលយឺតៗនិងវែងៗ ដៃកធ្វើឲ្យទ្រូងនិងពោះប៉ោង	A
74	តើឆ្លើយត្រូវប្រាប់ស្ត្រី ឲ្យចេះបន្ទុកអារម្មណ៍ដើម្បីសម្រួលនៅពេលឈឺពោះសម្រាលយ៉ាងដូចម្តេច? A- ពន្យល់ស្ត្រីឲ្យចេះបន្ទុកផ្នែកណាមួយនៃដងខ្លួន រហូតដល់ខ្លួនទាំងមូល B- ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យឈរ ឬ អង្គុយនៅស្ងៀម-ដេកបិទភ្នែក C- ម៉ាស្សាជុំវិញចន្លោះស្បូនកន្ត្រាក់ ឈ្លីនៅលើប្រអប់ជើង D-ដកដង្ហើមចូលយឺតៗនិងវែងៗ ដៃកធ្វើឲ្យទ្រូងនិងពោះប៉ោង	B

75	ឆ្លបត្រូវប្រាប់ស្ត្រី ពីសារៈសំខាន់នៃការស្ទាប អង្អែល ដើម្បីសម្រួលដល់ការឈឺពោះសម្រាលយ៉ាងដូចម្តេច? A-ពន្យល់ស្ត្រីឲ្យចេះបន្ទុះផ្នែកណាមួយនៃដងខ្លួន រហូតដល់ខ្លួនទាំងមូល B-ពន្យល់ស្ត្រីឲ្យចេះបន្ទុះផ្នែកណាមួយនៃដងខ្លួន រហូតដល់ខ្លួនទាំងមូល C- ម៉ាស្សា និងឈ្លីនៅលើប្រអប់ជើង ក្នុងចន្លោះពេលស្សនកន្ត្រាក់ D-ដកដង្ហើមចូលយឺតៗនិងវែងៗ ដៃកធ្វើឲ្យទ្រូងនិងពោះប៉ោង	C
76	ស្ត្រីដែលមានគភ៌កូនច្រើន តើឆ្លបត្រូវធ្វើការថែទាំពិសេសដូចម្តេច? A- ទទួលអាហារសំបូរសារជាតិសាច់ B- ណែនាំការសម្រាកឲ្យបានច្រើនពិសេសចាប់ពីខែទី៦នៃគភ៌ C- ណែនាំការសម្រាកចាប់ពីខែទី២ D- ការពិនិត្យថែទាំមុនពេលសម្រាល	B
77	តើឆ្លបត្រូវគ្រប់គ្រងនិងតាមដាន ការធ្លាក់ឈាមមុនគេយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងដំណាក់កាលទី៣-ទី៤ ? A- បូមទឹកនោម B- ព្យាយាមទំលាក់សុកតាមធម្មតា C- ត្រួតពិនិត្យការកន្ត្រាក់ស្បូននិងការហូរឈាម D- តាមដានរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឈាម	A
78	ដើម្បីអនុវត្តទម្រង់ការបូមទឹកនោមរបស់ស្ត្រី ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តើឆ្លបត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើអ្វីខ្លះ? A- បច្ចេកទេសគ្មានមេរោគ B- ការកំណត់ទីតាំងរន្ធនោមឲ្យត្រឹមត្រូវ C- យល់ពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រី D-ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
79	តើឆ្លបធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាស្ត្រីមានការឈឺពោះសម្រាលមិនពិត? A- នៅពេលស្ទាប ស្បូនមិនឃើញកន្ត្រាក់ឬកន្ត្រាក់មិនញឹកញាប់ B- នៅពេលស្ទាប ស្បូនឃើញកន្ត្រាក់ឬកន្ត្រាក់មិនញឹកញាប់ C- នៅពេលស្ទាប ស្បូនឃើញកន្ត្រាក់ឬកន្ត្រាក់ញឹកញាប់ D-នៅពេលស្ទាប ស្បូនកន្ត្រាក់ឬកន្ត្រាក់កើនឡើង	A

80	តើឆ្មបធ្វើដូចម្តេចទើបបញ្ជាក់ថាស្រ្តីមានការឈឺពោះសម្រាលចិតក្នុងរយៈពេលយឺតអូសបន្លាយ? A- នៅពេលស្លាប ស្បូនមិនឃើញកន្ត្រាក់ឬកន្ត្រាក់មិនញឹកញាប់ B- មាត់ស្បូនបើកមិនលើស៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់ C- មាត់ស្បូនបើកលើស៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់ D- មាត់ស្បូនបើកងាកទៅខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ប្រកាសអសន្ននៃប៉ាតូក្រាហូ	B
81	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបបញ្ជាក់ថាស្រ្តីចិត ក្នុងការសម្រាល មិនសមាមាត្ររវាងក្បាលទារក និងអាងត្រគៀក? A- ពិនិត្យមាត់ស្បូនបើកមិនលើស៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់ B- មាត់ស្បូនបើកងាកទៅខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ប្រកាសអសន្ននៃប៉ាតូក្រាហូ C-មាត់ស្បូនឈប់បើកបន្តនិងផ្នែកនៃទម្រង់ចុះល្អពេលស្បូនកន្ត្រាក់ D-មាត់ស្បូនបើកលើស៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់	C
82	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំពេញការខ្វះជាតិទឹកចំពោះស្រ្តីនៅពេលកំពុងឈឺពោះសម្រាលធម្មតា? A- បញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃ B- ឲ្យស្រ្តីទទួលទានទឹកឲ្យបាន១កែវរៀងរាល់ម៉ោង C- ឲ្យស្រ្តីញ៉ាំអាហាររៀងរាល់ម៉ោង D- ឲ្យស្រ្តីទទួលទានទឹក ឲ្យបាន៣កែវរៀងរាល់ម៉ោង	B
83	តើឆ្មបត្រូវណែនាំ អ្នកណាជាអ្នកផ្តល់ការថែទាំគាំទ្រល្អជាងគេ ដល់ស្រ្តីកំពុងឈឺពោះសម្រាល ? A- ឆ្មបខ្លួនឯង B- អ្នកជិតខាងរបស់ស្រ្តី C- ដៃគូរបស់ស្រ្តីសម្រាលកូន D- ឆ្មបបូរណជាអ្នកជូនស្រ្តីមកមន្ទីរពេទ្យ	C

84	តើឆ្មបត្រូវណែនាំស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រាល? A-សុំឲ្យម្តាយបត់ជើងតូចរៀងរាល់២-៤ម៉ោងម្តង B-សុំឲ្យម្តាយបត់ជើងតូចរៀងរាល់ ៥-៦ម៉ោងម្តង C-សុំឲ្យម្តាយបត់ជើងធំរៀងរាល់២-៤ម៉ោងម្តង D-សុំឲ្យម្តាយបត់ជើងធំរៀងរាល់៥-៦ម៉ោងម្តង	A
85	នៅក្នុងការសម្រាលដោយប្រើដង្កៀប តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ដឹងពីលក្ខណៈដែលត្រូវធ្វើ B- ផ្តល់ការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្ត C- ត្រូវដាក់ដង្កៀបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ D- ត្រូវស្គាល់ទីតាំងនៃការដាក់ដង្កៀប	B
86	នៅក្នុងការសម្រាលដោយការបូម តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ប្រាប់ស្ត្រីពីតម្រូវការដែលត្រូវធ្វើការបូមទារកដើម្បីជួយការសម្រាល B- ដឹងពីលក្ខណៈដែលត្រូវធ្វើការបូមទារក C- ត្រូវស្គាល់ទីតាំងនៃការដាក់ក្បាលបូម D- ដើម្បីជួយបូមទារកមិនគ្រប់ខែឲ្យទាន់ពេលវេលា	A
87	ដើម្បីបូមទារក តើឆ្មបត្រូវបង្កើតសំពាធបូមយ៉ាងដូចម្តេច? A- សំពាធបូម0,2kg/cm2 - 0,8Kg/cm2ដោយពិនិត្យក្បាលបូមនិងសាច់ជុំវិញ B- សំពាធបូម0,9Kg/cm2-10kg/cm2ដោយពិនិត្យក្បាលបូមនិងសាច់ជុំវិញ C- សំពាធបូម11Kg/cm2-12kg/cm2ដោយពិនិត្យក្បាលបូមនិងសាច់ជុំវិញ D- សំពាធបូម 13Kg/cm2-14kg/cm2ដោយពិនិត្យក្បាលបូមនិងសាច់ជុំវិញ	A
88	នៅពេលបូមទារក តើឆ្មបត្រូវទាញក្បាលបូមរបៀបយ៉ាងដូចម្តេច? A- ដៃស្តាំទាញរោង ដៃឆ្វេងបង្វិលលើក្បាលបូមដៃស្តាំ B- ទាញរោង ដៃឆ្វេងសង្កត់លើក្បាលបូម C- ដៃស្តាំទាញរោងនៅពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់ ដៃឆ្វេងសង្កត់លើក្បាលបូម D- ទាញនៅពេលក្បាលបូមត្រូវបានភ្ជាប់លើក្បាលទារក	B

89	នៅពេលបូមទារក តើឆ្មបត្រូវបញ្ឈប់ការទាញក្បាលបូមយ៉ាងដូចម្តេច? A-នៅពេលក្បាលកូនមិនចុះ B-នៅពេលឮសំលេងស៊ីតដែលជាសញ្ញាបាត់បង់សំពាធបូម C- រហូតក្បាលបូមដងឬទាញយ៉ាងយូរ៣០នាទី D-ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
90	នៅពេលបូមទារក តើឆ្មបត្រូវទាញក្បាលបូមលើកទី១យ៉ាងដូចម្តេច? A- ទាញនៅពេលស្បូនកន្ត្រាក់ B- ទាញដើម្បីទិសត្រឹមត្រូវនិងការរំកិលរបស់ក្បាលទារក C- ទាញដើម្បីបង្ហាញពីការរំកិលពិតប្រាកដរបស់ក្បាលទារក D-ទាញដើម្បីបញ្ចេញក្បាលទារក	B
91	នៅពេលបូមទារក តើឆ្មបត្រូវទាញក្បាលបូមលើកទី២យ៉ាងដូចម្តេច? A-ទាញនៅពេលស្បូនកន្ត្រាក់ B-ទាញដើម្បីទិសត្រឹមត្រូវនិងការរំកិលរបស់ក្បាលទារក C-ទាញដើម្បីបង្ហាញពីការរំកិលពិតប្រាកដរបស់ក្បាលទារក D-ទាញដើម្បីបញ្ចេញក្បាលទារក	C
92	ក្រោយពេលសម្រាលដោយការបូមភ្លាម តើឆ្មបត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេច? A-ត្រូវធានាថាស្បូនកន្ត្រាក់ល្អនិងមានការធ្លាក់ឈាមតិចតួច B- ពិនិត្យមើលរកការប៉ះទង្គិចលើប្រដាប់បន្តពូជ C- បើមានដាច់រំហែកត្រូវជួសជុលឡើងវិញ D-ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
93	ដំណាក់កាលទី១នៃការសម្រាល មានការអូសបន្លាយ តើឆ្មបត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងដូចម្តេច? A- បូមទឹកនោម B- ដាក់ស្បែកលាយអុកស៊ីតូស៊ីន C- បំបែកថង់ទឹកភ្លោះចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន D- បញ្ឈប់ការចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន	A

94	ដំណាក់កាលទី២នៃការសម្រាល មានការអូសបន្លាយ ក្នុងទម្រង់បង្ហាញកូនល្អ តើឆ្មបត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងដូចម្តេច? A-បូមនោមនិងការចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន B-បំបែកថង់ទឹកភ្លោះចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន C-បំបែកថង់ទឹកភ្លោះ បញ្ចូលអុកស៊ីតូស៊ីនលាយស្បែកនិងតាមដានការរីកចម្រើនទៅមុខនៃការឈឺពោះសម្រាល D-បំបែកថង់ទឹកភ្លោះចាក់អុកស៊ីតូស៊ីននិងតាមដានសញ្ញាជីវិត	C
95	ក្នុងករណីមានការហែកស្បូន តើឆ្មបត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ដូចម្តេច? A- ត្រូវតាមដានសំពាធឈាមនិងសញ្ញាជីវិត B- ចាប់ផ្តើមចាក់សរសៃនូវ Lactate Ringer 1លីត្រ C- ត្រៀមអ្នកផ្តល់ឈាម D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
96	នៅពេលបូមទឹកនោមឲ្យស្ត្រី បើសិនជាស្ទះដោយក្បាលទារក តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ដៃញែកបបូរទ្វារមាស សិកសុងបញ្ចូលក្នុងរន្ធនោម B- សិកថ្មមៗដើម្បីចៀសវាងមានរបូសដល់បង្ហូរនោមសិកសុងបញ្ចូលក្នុងរន្ធនោម C- យកម្រាមដៃលូកចូលក្នុងទ្វារមាស រុញក្បាលទារកឡើងលើទើបសិកសុងបញ្ចូលក្នុងរន្ធនោម D- ពេលសិកសុងត្រូវលាងសំអាតទ្វារមាសជាមុន	C
97	តើដំហានណាមួយដែលត្រូវធ្វើមុនគេក្នុងការបូមនោមដោយសុងហ្វូឡីចំពោះស្ត្រី? A-លាងដៃ និងពាក់ស្រោមដៃស្ទើរិល B-គ្របកំពាលប្រហោងសូន្យបនៅតំបន់ប៉េរីណេ C- សុំជំនួយហែកថង់សុង និងចាក់ប្រេងរំអិលលើកំប្រេស្ទើរិល D- ពាក់ស្រោមដៃស្អាតលាងសំអាតប៉េរីណេ	D

98	នៅជំហានទី៧ពេលកាន់និងសិកស្សដោយគោរពគោលការណ៍អាសិបស៊ី តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- សិកស្សបញ្ចូលក្នុងន្ទនាមថ្មីៗ ដោយរក្សាភាពស្មើលើហើយទាញស្រោមស្រង់ខាងក្នុងចេញបន្តិចម្តងៗ B- ចាប់យកស្រង់ដោយច្បាស់ ហើយផ្តាច់ស្រោមស្រង់ដោយមិនឲ្យចុងស្រង់ប៉ះវត្ថុមិនស្មើល C- គ្របក្រណាត់ស្ទន្យបលើតំបន់ប៉េរីណេ D- ជូតស្រង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រវែង៣៩៤ស.ម	A
99	ក្នុងការភ្ជាប់ស្រង់ទៅនឹងថង់ទឹកនោម តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ដាក់កន្ទុយស្រង់នៅក្នុងប្រអប់ដៃ B- ដៃម្ខាងទៀតចាប់យកថង់ទឹកនោមមកភ្ជាប់ជាមួយក្បាលស្រង់ C- មូលបិទផ្ចិតគូថថង់ទឹកនោម D- ទាញស្រង់ថ្មីៗសាកមើល	B
100	នៅពេលភ្ជាប់ស្រង់នោមរួចហើយ តើឆ្មបត្រូវចងព្យួរថង់យ៉ាងដូចម្តេច? A- ចងព្យួរថង់ទឹកនោមនៅលើគ្រែអ្នកជំងឺ B- ចងព្យួរថង់ទឹកនោមនៅជើងស្បូនអ្នកជំងឺ C- ចងព្យួរថង់ទឹកនោមឲ្យទាបជាងខ្លួនអ្នកជំងឺ D- ចងព្យួរថង់ទឹកនោមនៅជិតភ្លើងអ្នកជំងឺ	C
101	តើឆ្មបបាញ់បញ្ចូលទឹកបំបោងបាឡុងយ៉ាងដូចម្តេច? A- បាញ់ទឹកស្មើលបញ្ចូលក្នុងខ្នែងចំណុះ៥-១០CC តាមទំហំស្រង់ B- បាញ់ទឹកស្មើលបញ្ចូលក្នុងខ្នែងចំណុះ១១-១៥CC តាមទំហំស្រង់ C- បាញ់ទឹកស្មើលបញ្ចូលក្នុងខ្នែងចំណុះ១៦-២០CC តាមទំហំស្រង់ D- បាញ់ទឹកស្មើលបញ្ចូលក្នុងខ្នែងចំណុះ២១-២៥CC តាមទំហំស្រង់	A

102	តើឆ្មបត្រូវគ្រប់គ្រងការសម្រាលអូសបន្លាយនិងមានឧបសគ្គយ៉ាងដូចម្តេច ? A- វាយតម្លៃការវិវត្តរបស់មាត់ស្បូន B- វាយតម្លៃហ្វេសអំពីលក្ខណៈរបស់ម្តាយនិងទារកនិងផ្តល់ការគាំទ្រ C- វាយតម្លៃពីចលនារបស់ទារក D- វាយតម្លៃពីការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន	B
103	តើឆ្មបត្រូវគ្រប់គ្រងរយៈពេលយឺតអូសបន្លាយក្នុងករណីឈឺពោះចោល យ៉ាងដូចម្តេច? A- វាយតម្លៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន B- ពិនិត្យផ្លូវទឹកនោមនិងការបង្កពេកផ្សេងៗ C- វាយតម្លៃការរួចខ្ចីរបស់មាត់ស្បូន D- វាយតម្លៃពីចលនារបស់ទារក	B
104	បើស្ត្រីមិនក្នុងដំណាក់កាលយឺតលើសពី៨ម៉ោង តើឆ្មបត្រូវវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច? A- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតទៅលើមាត់ស្បូន B- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតរបស់ទារក C- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតទៅលើការបង្កពេក D- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាលដល់ស្ត្រីដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន	A
105	ក្នុងដំណាក់កាលសកម្មអូសបន្លាយនៃការសម្រាល បើគ្មានសញ្ញាមិនសមាមាត្ររវាងក្បាលនិងអាងត្រគាក ចង់ទឹកភ្លោះបែក តើឆ្មបត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? A- តាមដានការកន្ត្រាក់របស់ស្បូននិងទារក B- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតទៅលើមាត់ស្បូន C- វាយតម្លៃពីស្ថានភាពស្ត្រីម្តងទៀតទៅលើការបង្កពេក D- វាយតម្លៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូនដោយបង្កើនការឈឺពោះដោយអុកស៊ីតូស៊ីន	D
106	ការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅដំណាក់កាលស្ងៀមស្ងាត់អូសបន្លាយ តើឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A- វាយតម្លៃហ្វេសមួយ រួមមាន សញ្ញាជីវិត B- ឲ្យដៃគូស្ត្រីផ្តល់ការគាំទ្រ C- ផ្តល់ការបង្រៀនជាតិទឹកដល់ស្ត្រី D- ការផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	C

107	ដើម្បីរក្សាចំណុះធម្មតារបស់ឆ្មាស្នា និងបង្ហាបញ្ចេញការខ្សោះជាតិទឹកដល់ស្រ្តី តើឆ្មាត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ចាក់បញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃដោយប្រើម្ជុលចំលេខ១៨ B- ផ្តល់សេរ៉ូមប្រែធម្មតា១លីត្ររយៈពេល៤-៦ម៉ោង C- ផ្តល់សេរ៉ូមប្រែធម្មតា១លីត្រយ៉ាងលឿននិងបន្ថែម១លីត្ររៀងរាល់២០នាទី D-ផ្តល់សេរ៉ូមប្រែធម្មតា១លីត្ររយៈពេល៨ម៉ោង	D
108	ការគ្រប់គ្រងនៅដំណាក់កាលស្ងៀមស្ងាត់អូសបន្លាយ តើឆ្មាត្រូវប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដែលល្អជាងគេ ក្នុងការគាំទ្រដល់ស្រ្តីពេលកំពុងឈឺពោះ? A- បុគ្គលិកសុខាភិបាល B- ដៃគូរបស់ស្រ្តី C- ឆ្មាបុរាណដែលមកជាមួយស្រ្តី D- ញាតិមិត្តរបស់ស្រ្តី	B
109	នៅក្នុងប៉ាតូក្រាហ្វ តើមានសញ្ញាអ្វីដែលឆ្មាបានតាមដានឃើញឧបសគ្គនៃការសម្រាលចំពោះការបើកមាត់ស្បូន? A- មាត់ស្បូនចិតនៅលើបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន B- មាត់ស្បូនចិតនៅពាក់កណ្តាលបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ននិងបន្ទាត់សកម្មភាព C- មាត់ស្បូនចិតនៅលើបន្ទាត់សកម្មភាព D- មាត់ស្បូនចិតនៅខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន	D
110	នៅពេលសម្រាលកូនបញ្ច្រាស តើអ្វីដែលឆ្មាមិនត្រូវធ្វើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទារក? A- ទុកឲ្យម្តាយប្រឹងបញ្ចេញទារកដោយខ្លួនឯង B- ចាប់កង្វើងយ៉ាងជាប់រួចសម្រាលប្រអប់ជើងនិងជើង C- ចាប់ទាញទារកដោយកាន់ចង្កេះឬពោះទារកនៅពេលសម្រាលជើង D- ចាប់កាន់និងលើកទារកដោយកាន់ជើងឡើងលើថ្នមៗ	C

111	នៅពេលសម្រាលកូនបញ្ចេញស្រទាប់ តើឆ្មាបត្រូវឲ្យម្តាយប្រឹងបញ្ចេញទារកនៅពេលណា? A- ឲ្យម្តាយប្រឹងបញ្ចេញទារកនៅពេលគាត់ចង់ប្រឹង B- ឲ្យម្តាយប្រឹងបញ្ចេញទារកនៅពេលឃើញជើងទារកចេញមក C- ឲ្យម្តាយប្រឹងបញ្ចេញទារកនៅពេលមាត់ស្បូនបើកអស់ រង់ចាំស្បូនកន្ត្រាក់ ២-៣ដង D- ឲ្យម្តាយប្រឹងបញ្ចេញទារកនៅពេលជើងទារកធ្លាក់	C
112	ការសម្រាលដែលមានឧបសគ្គ ឆ្មាបត្រូវបានតាមរយៈការស្ទាបពោះឃើញ៖ A- ស្ទាបឃើញវិជ្ជមានត្រង់ជាងគេរបស់ក្បាលនៅលើតែមឆ្អឹងថ្ងាស B- ស្ទាបឃើញដុំតូចៗទន់នៅលើតែមឆ្អឹងថ្ងាស C- ស្ទាបឃើញវិជ្ជមានត្រង់ជាងគេរបស់ក្បាលចុះចូលក្នុងអាងត្រគាក D- ស្ទាបឃើញក្បាលរបស់ទារកនៅក្នុងអាងត្រគាក	A
113	ការសម្រាលដែលមានឧបសគ្គ ឆ្មាបត្រូវបានតាមរយៈការពិនិត្យទ្វារមាសឃើញ៖ A- ហើមនៅទ្វារមាសជាពិសេសស្រ្តីដែលប្រឹងយូរ B- អាចស្ទាបឃើញការហើមប៉ោងនៃលលាដ៏ក្បាល C- ការហើមមាត់ស្បូន D- ចម្លើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
114	តើសញ្ញាអ្វីដែលឆ្មាបត្រូវប្រាប់ម្តាយពីវិសមភាពក្បាលទារកនិងអាងត្រគាកម្តាយ? A- លូកទ្វារមាសឃើញឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលទារកឃ្លាតពីគ្នា ឆ្អឹងនៅប៉ះគ្នា B- លូកទ្វារមាសឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលទារកឃ្លាតពីគ្នា ស្ទាបឃើញមុខតំណាងនាក់ឆ្អឹង C- លូកទ្វារមាសឃើញឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលទារកត្រួតស៊ីគ្នា ប៉ុន្តែអាចញែកគ្នាបាន D-លូកទ្វារមាសឃើញឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលទារកត្រួតស៊ីគ្នាក្បាលទារកនៅខ្ពស់	D
115	តើឆ្មាបត្រូវប្រាប់ស្រ្តីជាម្តាយពីរបៀបយ៉ាងណាក្នុងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ? A- ការចិញ្ចឹមទារកដោយបន្តក់ទឹកដោះម្តាយលាយជាមួយទឹក B- ការចិញ្ចឹមទារកដោយបន្តក់ទឹកដោះម្តាយលាយជាមួយទឹកដោះសិប្បនិម្មិត C- ការចិញ្ចឹមទារកដោយបៅទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ D- ការចិញ្ចឹមទារកដោយបៅទឹកដោះម្តាយលាយជាមួយអាហារបន្ថែម	C

116	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយពីលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការបំបៅកូនដែលបៅមិនបាន ផ្អែមល្អ? A- បបូរមាត់ហាជំ B- បបូរមាត់ខាងក្រោមលៀនចេញក្រៅ C- បបូរមាត់ខ្លីបច្ចូលក្នុង D- ទារកលេបទឹកដោះឮសូរក្អក	C
117	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយពេលណាដែលត្រូវបំបៅកូនក្រោយពេលសម្រាល? A- កើតភ្លាមបៅភ្លាម B- កន្លះម៉ោងក្រោយពេលសម្រាល C- ១ម៉ោងក្រោយសម្រាល D- ២៤ម៉ោងក្រោយសម្រាល	B
118	តើឆ្មបត្រូវប្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះទារកច្រើនជាងគេក្នុងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះសិប្ប និមិត្តចំពោះទារកយ៉ាងណា? A- ការលូតលាស់រាងកាយយឺតយ៉ាវ B- ការលូតលាស់ផ្នែកស្មារតីយឺតយ៉ាវ C- អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនិងបណ្តាលឲ្យរាកញឹកញាប់ D- បណ្តាលឲ្យកើតជំងឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ	C
119	ដើម្បីគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីពេលឈឺពោះសំរាលឲ្យមានភាពកក់ក្តៅ និងមានសុវត្ថិភាព ឆ្មបត្រូវ៖ A- មានកន្លែងសម្តែងនិងរាល់អ្នកចូលរួមស្អាត B- មានសំភារៈនិងបរិក្ខារសម្រាប់បង្កើតត្រូវស្អាតគ្មានមេរោគ C- ពិនិត្យមើលសំភារៈ និងទីកន្លែងសំរាល D- រកអ្នកណាមួយឲ្យមកជួយក្នុងពេលសំរាល	D

120	ស្ត្រីឈឺពោះសំរាល មានការបែកទឹកភ្លោះដោយមានលាយលាមកព្រៃ ស្ថានភាពនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីខ្លះដែលសំខាន់ជាងគេ៖ A- រាល់អ្នកដែលចូលរួមត្រូវស្អាតគ្មានមេរោគ B- មានទឹកនៃឆ្អឹង និងសំភារៈបរិក្ខាស្អាតគ្មានមេរោគ C- មានការពិនិត្យមើលសំភារៈ សំរាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ D- គ្រៀមសំភារៈ និងអ្នកជំនាញសង្គ្រោះទារក	D
121	ចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការសំរាលមានសុវត្ថិភាព ឆ្លុះបញ្ចាំងពី៖ A- មានកន្លែងសម្អាតនិងរាល់អ្នកចូលរួមស្អាត B- មានទឹកនៃឆ្អឹង និងសំភារៈបរិក្ខាស្អាតគ្មានមេរោគ C- ពិនិត្យមើលសំភារៈ និងទឹកនៃឆ្អឹងសំរាល D- រកអ្នកណាមួយឲ្យមកជួយក្នុងពេលសំរាល	B
122	ពេលដែលស្ត្រី ឈឺពោះសំរាលចូលមកមណ្ឌលសុខភាព តើអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីជាដំបូង? A- សួរស្ត្រីតើធ្លាប់មកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និងពិនិត្យសៀវភៅសុខភាពមាតា B- សាកសួរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ C- សង្កេតរកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងសួរព័ត៌មានពីការសំរាលពីមុន D- ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីការឈឺពោះពេលសំរាល និងក្រោយសំរាល	A
123	ក្នុងការថែទាំស្ត្រីពេលឈឺពោះសំរាល ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដូចម្តេចដើម្បី ឲ្យម្តាយនិង កូនមានសុខភាព៖ A- ផ្តល់ជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ B- ឲ្យស្ត្រី ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព C- ផ្តល់ជាតិទឹក អាហារូបត្ថម្ភ និងឲ្យស្ត្រី ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព D- ឲ្យស្ត្រីសំរាលផ្ទាល់ និងឲ្យស្ត្រី ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព	C
124	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៅនាមស្ត្រី គ្មានទឹកនោម នៅពេលឈឺពោះពេលសំរាល គោលបំណង៖ A- ស្រួលក្នុងការពិនិត្យស្បូន B- ការឈឺពោះសំរាលឆាប់ C- កុំឲ្យមានឧបសគ្គដល់ការចុះនៃក្បាលកូន និងការបើកមាត់ស្បូន D- មិនមានការឈឺពោះ	C

125	ឥរិយាបថដូចម្តេច ដែលឆ្លបតែងតែពន្យល់ស្ត្រីភាគច្រើនឲ្យធ្វើ? A- ធ្វើចលនា ដើរចុះឡើងតាមជណ្តើរ B- ទ្រោបលើបង្កាន់ដៃ ឬរបស់អ្វីមួយពេលឈឺពោះនិងដើរតិចៗពេលបាត់ការកន្ត្រាក់ស្បូន C- អង្គុយអោបពោះកុំឲ្យឈឺ D- ដេក បញ្ឈរជង្គង់	B
126	តើឆ្លបត្រូវពិនិត្យដូចម្តេច ដើម្បីដឹងថាមាត់ស្បូនបើកអស់ ដោយពុំចាំបាច់លូកពិនិត្យទ្វារមាស? A- ស្រ្តីឈឺពោះ ខ្លាំងមិនឈប់ B- គាត់ស្រេកទឹកខ្លាំង និងកូតចង្កោរ C- ទ្វារមាសបើកចំហរ ឃើញក្បាលទារកនៅនឹង រន្ធទ្វារមាស D- រន្ធទ្វារមាសបើកចំហរ	C
127	តើឆ្លបត្រូវសាកសួរ និងពិនិត្យដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាស្រ្តីឈឺពោះសំរាលពិត? A- ការកន្ត្រាក់ស្បូនទៀងទាត់ព្រមទាំងមានការធ្លាក់ទឹករំអិល មានឈាមត្រា B- ការកន្ត្រាក់ស្បូនមិនទៀងទាត់ បាត់ពេលឈប់ស្ងៀម C- ការកន្ត្រាក់ខ្លាំង ហើយម្តងៗពី 3-4 នាទី D - អាចឈឺ ឬមិនឈឺចង្កេះ	A
128	តើឆ្លបត្រូវសាកសួរ និងពិនិត្យដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាស្រ្តីឈឺពោះសំរាលមិនពិត? A- ការកន្ត្រាក់ស្បូន មានចង្វាក់ទៀងទាត់ B- ចង្វាក់នៃការកន្ត្រាក់មិនទៀងទាត់ C- កន្ត្រាក់ស្បូនមិនទៀងទាត់ បាត់ឈឺពេលឈប់ស្ងៀម D- នាំមកនូវការឈឺចង្កេះញឹកញាប់	C
129	ដំនាក់កាលទី១ នៃការឈឺពោះសំរាល កំណត់ដូចម្តេច? A- ចាប់ផ្តើមតាំងពីឈឺពោះ (ស្បូនចាប់កន្ត្រាក់) រហូតដល់មាត់ស្បូនបើកអស់ B- ចាប់ផ្តើមពីមាត់ស្បូនបើកអស់ រហូតដល់កូនចេញផុត C- ចាប់ផ្តើមពីកូនចេញផុតដល់សុកបានទំលាក់ចេញរួច D- ចាប់ពីសុកចេញផុត និង តាមដានការហូរឈាមក្រោយសំរាល	A

130	ឆ្លុបត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ប្រសិនបើទឹកភ្លោះបែកលើសពី១២ ម៉ោងនៅមណ្ឌលសុខភាព? A- ផ្តល់អង់ទីយូទិក និងរង់ចាំការសំរាល B- តាមដានការវិវឌ្ឍនៃការបើកមាត់ស្បូន C- ផ្តល់អង់ទីយូទិក មុនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានសុវត្ថិភាព D- ពិនិត្យមើលរកសញ្ញានៃការចំលងរោគ	C
131	តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាទារកស្ថិតក្នុងទំរង់បង្ហាញក្បាល ពេលឈឺពោះសម្រាល? A-បែរមុខស្របម្តាយ B-បែរមុខផ្ទុយពីម្តាយ C-បែរមុខចំហៀងម្តាយ D-បែរមុខទៅពោះម្តាយ	B
132	ឆ្លុបអាចវាយតម្លៃការឈឺពោះសំរាលបានល្អ ដោយប្រើវិធី៖ A-វាស់ ទំរង់អាងត្រតាក B-ថ្លឹងទំងន់ វាស់កំពស់ C- ប្រើប័ណ្ណតាមដានការឈឺពោះសំរាល (បាតូក្រាហ្វ) D-ការស្ទាបពោះពិនិត្យទំរង់ទារកក្នុងផ្ទៃ	C
133	នៅពេលឆ្លុបផ្តល់ថ្នាំCorticosteroids (Betamethasone, dexamethasone) ទៅម្តាយពេលគភ៌អាយុតិចជាង៣៧ អាទិត្យ តើត្រូវតាមដានអ្វីខ្លះ? A. ការធ្វើឲ្យសួតកូនបានចាស់ខែ B. ទារកលូតលាស់បានល្អ C. ម្តាយមានកំលាំងមាំមួន D. ទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ឈាមពេលសម្រាល	A
134	ការថែទាំស្រ្តីមានគ្រុនក្តៅ(កម្ដៅខ្លួនលើស៣៨០C)ពេលមានគភ៌ឬពេលឈឺពោះសម្រាលមានដូចខាងក្រោមលើកលែងតែ៖ A. អោយស្រ្តីសំរាកលើគ្រែ B. ជំរុញឲ្យស្រ្តីផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន C. ផ្តល់ថ្នាំបំបាត់កំដៅ D. ប្រើកង្ហារឬក្រណាត់សើមដើម្បីបន្ថយកម្ដៅ	C

135	ការសង្កត់លើពោះស្រ្តីជាមាតា នៅពេលកំពុងសំរាលនាំមកនូវបញ្ហាដូចម្តេច? A- សុកដាច់រលកពីដៃស្បូន ឲ្យស្រ្តីស្អុក B- សុកដាច់រលកដាច់ពីស្បូន អាចធ្វើឲ្យស្បូនដាច់រលក C- ស្បូនដាច់រលក ឬមានការធ្លាក់ឈាមខ្លាំង D- ស្បូនស្រុត និងបែកទឹកភ្លោះមុនសំរាល	B
136	តើឆ្មបត្រូវធ្វើតេស្ត Nitrazine នៅទ្វារមាស ស្រ្តីពេលឈឺពោះសំរាលដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានបែកទឹកភ្លោះ? A. វត្តមានទឹកភ្លោះ តាមរយៈការប្រែពណ៌ក្រដាស Nitrazine ពីលឿងទៅខៀវ B. វត្តមានទឹកនោម តាមរយៈការប្រែពណ៌ក្រដាស Nitrazine ពីលឿងទៅខៀវ C. វត្តមានឈាម តាមរយៈការប្រែពណ៌ក្រដាស Nitrazine ពីលឿងទៅខៀវ D. ការក្លាយរោគ តាមរយៈការប្រែពណ៌ក្រដាស Nitrazine ពីលឿងទៅខៀវ	A
137	នៅពេល អ្នកលូកពិនិត្យតាមទ្វារមាស ហើយកំណត់ថា ទារកមានទំងន់បង្ហាញក្បាល អ្នកស៊ីពុតមុខដោយ៖ A-ប្រមាណដៃប៉ះ បង្ហើយធំនៅពីខាងក្រោមឆ្អឹងពុយប៊ីស B-ប្រមាណដៃប៉ះ បង្ហើយតូចនៅលើឆ្អឹងពុយប៊ីស C-ប្រមាណដៃប៉ះ បង្ហើយធំ នៅលើឆ្អឹងពុយប៊ីស D-ប្រមាណដៃប៉ះ បង្ហើយតូច នៅពីខាងក្រោមឆ្អឹងពុយប៊ីស	D
138	តើការទំលាក់សុកបែបសកម្ម ឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-ចាក់ Oxytocin 10 ul មុនពេលកូនកើតមិនឲ្យលើសពី 1 នាទីទេ B-ចាក់ Oxytocin នៅពេលកូនចេញផុតដោយប្រាកដថាគ្មានកូនទី2 ក្នុងពោះ C-រង់ចាំសុកធ្លាក់ដោយខ្លួនឯង មិនឲ្យលើសពី 1 នាទីទេ D-ចាក់ Oxytocine នៅពេលមាត់ស្បូនបើកអស់	B
139	ស្រ្តីម្នាក់មកសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យ តើឆ្មបត្រូវរៀបចំសំភារៈដូចម្តេចដើម្បីការពារការចម្លងរោគ? A. ចាក់ សូលុយស្យុងបេតាឌីន ២.៥% សំរាប់ត្រាំសំភារៈដែលប្រើប្រាស់រួចចូលក្នុងចានក្តាំ B . ចាក់ សូលុយស្យុងបេតាឌីន ១០% សំរាប់ត្រាំសំភារៈដែលប្រើប្រាស់រួចចូលក្នុងចានក្តាំ C. ចាក់ សូលុយស្យុងក្លរូមីន សំរាប់ត្រាំសំភារៈដែលប្រើប្រាស់រួចចូលក្នុងចានក្តាំ D. ចាក់ សូលុយស្យុងអ៊ុយឌីន សំរាប់ត្រាំសំភារៈដែលប្រើប្រាស់រួចចូលក្នុងចានក្តាំ	C

140	ដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល តើឆ្លុបត្រូវបូមថ្នាំអុកស៊ីតុកស៊ីនដូចម្តេច ? A. បូមថ្នាំអុកស៊ីតុកស៊ីនចំនួន ១ មីលីលីត្រទុកសំរាប់ចាក់ឲ្យស្រ្តីក្រោយទារកកើតរួចភ្លាម B. បូមថ្នាំអុកស៊ីតុកស៊ីនចំនួន ១ អំពូលទុកសំរាប់ចាក់ឲ្យស្រ្តីក្រោយទារកកើតរួចភ្លាម C. បូមថ្នាំអុកស៊ីតុកស៊ីនចំនួន ៥ មីលីលីត្រទុកសំរាប់ចាក់ឲ្យស្រ្តីក្រោយទារកកើតរួចភ្លាម D. បូមថ្នាំអុកស៊ីតុកស៊ីនចំនួន ១០ មីលីលីត្រទុកសំរាប់ចាក់ឲ្យស្រ្តីក្រោយទារកកើតរួចភ្លាម	D
141	ក្នុងការវាយតម្លៃពី សំភារៈដែលរៀបចំសំរាប់ សំរាលកូនជាប្រាកដជាស្អាតគ្មានមេរោគឆ្លុបពិនិត្យដូចម្តេច? A. ពិនិត្យមើលកញ្ចប់សំភារៈដែលបានរំងាប់មេរោគត្រឹមត្រូវ B. ពិនិត្យមើលថ្ងៃខែឆ្នាំនៅលើកញ្ចប់សំភារៈដែលបានរំងាប់មេរោគត្រឹមត្រូវ C. ពិនិត្យមើលសភាពនៅលើកញ្ចប់សំភារៈដែលបានរំងាប់មេរោគត្រឹមត្រូវ D. ពិនិត្យមើលសំភារៈថាបានរំងាប់មេរោគត្រឹមត្រូវឬទេ	B
142	ក្នុងការរៀបចំស្ថានភាពស្រ្តីពេលសំរាល ឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A. ប្រាប់ស្រ្តីឲ្យគេងថ្ងារបញ្ឈប់ដង្កែកកន្លែងជើងបន្តិច B. ពេលស្រ្តីគេងរួចត្រូវស្លាបមើលសភាពនៃប្លោកនោមមានទឹកនោមឬអត់ C. ពេលស្រ្តីគេងរួចត្រូវស្លាបមើលសភាពនៃប្លោកនោមមានឈាមឬអត់ D. ប្រាប់ស្រ្តីឲ្យគេងតាមស្ថានភាពសុខស្រួលនៃការសំរាល	B
143	តើឆ្លុបត្រូវធ្វើការលាងសំអាតទ្វារមាសរបស់ស្រ្តី មុនពេលសំរាលដូចម្តេចឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេស? A. យកសំឡីស្តើវីលជ្រលក់បេតាឌីន ៥% លាងសំអាតចំណុចទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម B. យកសំឡីស្តើវីលជ្រលក់បេតាឌីន ១០% លាងសំអាតពុយប៊ីសជាដង្កូវតូចខ្យង C. យកសំឡីស្តើវីលជ្រលក់បេតាឌីន ១៥% លាងសំអាតចំណុចទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម D. យកសំឡីស្តើវីលជ្រលក់បេតាឌីន ២.៥% លាងសំអាតពុយប៊ីសជាដង្កូវតូចខ្យង	B

147	តើឆ្មបត្រូវវាយតម្លៃពីសភាពនៃការបែកទឹកភ្លោះដូចម្តេច? A. ពាក់ស្រោមដៃស្អាត ប្រើម្រាមដៃ២ ចង្អុលដៃនិងម្រាមកណ្តាលលូកចូលក្នុងទ្វារមាស B. ពាក់ស្រោមដៃស្តេរីល ប្រើម្រាមដៃ២ ចង្អុលដៃនិងម្រាមកណ្តាលលូកចូលក្នុងទ្វារមាសពិនិត្យ C. ពាក់ស្រោមដៃស្តេរីល ប្រើម្រាមដៃ២ លូកចូលក្នុងទ្វារមាស ពិនិត្យសភាពទឹកភ្លោះ D. ពាក់ស្រោមដៃស្តេរីល ប្រើចង្អុលដៃលូកចូលក្នុងទ្វារមាសពិនិត្យសភាពទឹកភ្លោះ និងជួសបំបែកវា	B
148	ដំណាក់កាលទី២ តើឆ្មបត្រូវពន្យល់ស្ត្រីពីរបៀបប្រឹងដូចម្តេច? A. ដកដង្ហើម និងប្រឹងខ្លីខ្លាំងៗ ក្នុងរយៈពេលនៃការឈឺពោះស្បូនកន្ត្រាក់ម្តងៗ B. ដកដង្ហើម និងប្រឹងវែងខ្លាំងៗ ក្នុងរយៈពេលនៃការឈឺពោះស្បូនកន្ត្រាក់ម្តងៗ C. ដកដង្ហើមវែង និងប្រឹងខ្លីខ្លាំងៗ ក្នុងរយៈពេលនៃការឈឺពោះស្បូនកន្ត្រាក់ម្តងៗ D. ដកដង្ហើមចូលវែង ២ដងរួចអត់ដង្ហើមលើកទី២ ពេលនៃការឈឺពោះស្បូនកន្ត្រាក់	A
149	ដើម្បីឲ្យការប្រសូត្រក្បាលទារកឲ្យមានសុវត្ថិភាព តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A. ពេលស្បូនកន្ត្រាក់ ដៃម្ខាងទប់ក្បាលទារកថ្នមៗដៃម្ខាងទៀតទប់ប៉េរីនេ B. ដៃម្ខាងទប់ក្បាលទារកថ្នមៗដៃម្ខាងទៀតទប់ប៉េរីនេដោយទុកចន្លោះរវាងមេដៃនិងម្រាមដើម្បីងាយមើលឃើញក្បាលទារក C. ដៃម្ខាងទប់ខ្លួនទារកថ្នមៗដៃម្ខាងទៀតទប់ប៉េរីនេដោយទុកចន្លោះរវាងមេដៃនិងម្រាមដើម្បីងាយមើលឃើញក្បាលទារក D. ពេលស្បូនកន្ត្រាក់ដៃម្ខាងទប់ខ្លួនដៃម្ខាងទៀតទប់ប៉េរីនេដោយទុកចន្លោះរវាងមេដៃនិងម្រាមដើម្បីងាយមើលឃើញក្បាលទារក	B
150	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចពេលក្បាលទារកចេញផុត ? A. ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យប្រឹង រួចឲ្យស្ត្រីដកដង្ហើមវែងៗ B. ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យប្រឹង រួចបង្ខំឲ្យស្ត្រីដកដង្ហើមវែងៗ C. ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យឈប់ប្រឹង រួចឲ្យស្ត្រីដកដង្ហើមវែងៗ D. ប្រាប់ស្ត្រីឲ្យឈប់ប្រឹង រួចឲ្យស្ត្រីដកដង្ហើមតិចៗ	C

151	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះទារកពេលក្បាលចេញផុតភ្លាម? A. យកព័រមូមស្នេស្នពីមាត់ និងច្រមុះទារកយ៉ាងឆាប់រហ័ស B. យកកុំប្រេសជូតមុខទារកឲ្យឆាប់រហ័ស ពីលើចុះក្រោមថ្មមៗ C. យកម្រាមដៃ២ រាវរកទងសុកពង្វែកទារក D. មិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការប្រសូតស្នា	B
152	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះទារកមានទងសុករុំក? A. យកព័រមូមស្នេស្នពីមាត់ និងច្រមុះទារកយ៉ាងឆាប់រហ័ស B. យកកុំប្រេសជូតមុខទារក ពីលើចុះក្រោមថ្មមៗឲ្យឆាប់រហ័ស C. យកម្រាមដៃ២ រាវរកទងសុកពង្វែកទារក D. បើមានភាពតឹង ត្រូវយកបាំងមកកៀប និងយកកន្ត្រៃកាត់ជាបន្ទាន់	D
153	ជាដំបូង តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលក្បាលទារកចេញផុតភ្លាម? A. យកម្រាមដៃ២ រាវរកទងសុកជុំវិញករបស់ទារក B. បើការរុំមានភាពធ្ងន់ត្រូវបន្ទុះ និងរំកិលដោះចេញពីក្បាលទារកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិង ឆាប់រហ័ស C. បើការរុំមានភាពធ្ងន់ត្រូវបន្ទុះនិងរំកិលដោះចេញពីក្បាលទារកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងយឺតៗ D. បើមានភាពតឹង ត្រូវយកបាំងមកកៀប ជាបន្ទាន់	A
154	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចក្នុងពេលបញ្ចេញស្នា? A. យកម្រាមដៃ២ សង្កត់ក្បាលទារកចុះក្រោម ដើម្បីសំរាលស្នាលើ B. លើកក្បាលទារកថ្មមៗ ដើម្បីសំរាលស្នាលើ C. ទុកឲ្យស្នាទារកវិលដោយឯកឯង អំឡុងពេល១ទៅ២នាទី D. បើមានទងសុកពង្វែក ត្រូវយកបាំងមកកៀប ជាបន្ទាន់	C
155	មុនពេលប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះម្តាយ ពេលទារកប្រសូតចេញផុតភ្លាម ? A. ពិនិត្យពីការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស B. ពិនិត្យពីការដាច់រំហែកទ្វារមាស C. ចាត់សាច់ដុំ ថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីន ១ ម.ល យ៉ាងរហ័ស D. ស្ទាបពោះដោយប្រាកដថាគ្មានកូននៅក្នុងស្បូនទៀតទេ	D

156	ពេលដាក់ទារកនៅលើពោះម្តាយភ្លាមនោះ តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A. ពិនិត្យចលនាដង្ហើមវា B. ជូតសំបុត្រខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួចពិនិត្យចលនាទ្រូង C. ជូតសំបុត្រខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួចយកសំឡីស្តើងជូតសំអាតភ្នែក D. ស្ទាបពោះដោយប្រាកដថាគ្មានកូននៅក្នុងស្បូនទៀតទេ	C
157	ការវាយតម្លៃពិន្ទុអាប៉ូហ្គា តើឆ្មបត្រូវវាយតម្លៃអ្វីខ្លះ? A. ជិពចរ បេះដូង ពណ៌សំបុរ កំលាំងសាច់ដុំ និង វេជ្ជិច B. ចង្វាក់ដង្ហើម បេះដូង ពណ៌សំបុរ កំលាំងសាច់ដុំ និង វេជ្ជិច C. ចង្វាក់ដង្ហើម ជិពចរ ពណ៌សំបុរ កំលាំងសាច់ដុំ និង វេជ្ជិច D. ចង្វាក់ដង្ហើម បេះដូង ការយំ កំលាំងសាច់ដុំ និង វេជ្ជិច	B
158	ក្រោយពីពិនិត្យអាប៉ូហ្គាទារក តើឆ្មបត្រូវរៀបចំផ្ចិតដូចម្តេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ? A. បាំងទី១ត្រូវរៀបឲ្យគ្រឿងនឹងទ្វាមាសរបស់ម្តាយ បាំងទី២គ្រឿងបន្លោះពាសម ពីបាំងទី១ B. បាំងទី១ត្រូវរៀបឲ្យគ្រឿងនឹងទ្វាមាសរបស់ម្តាយ បាំងទី២គ្រឿងបន្លោះពាសម ពីបាំងទី១ C. ពិនិត្យអាប៉ូហ្គាទារក រួចយកបាំងមកគ្រឿងបន្លោះពាសម ហើយកាត់ D. បាំងទី១ត្រូវរៀបនៅនឹងទ្វាមាសរបស់ម្តាយ បាំងទី២គ្រឿងបន្លោះពាសម ពីបាំងទី១	A
159	នៅដំណាក់កាលទី៣នៃការសំរាល តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? A. ធ្វើការទំលាក់សុកជាបន្ទាន់ B. ធ្វើការសំអាតទារករួច ទើបទម្លាក់សុក C. ទម្លាក់សុកភ្លាម ពេលទារកកើតចេញផុត D. ពិនិត្យមើលសញ្ញានៃការរលើសុក	D
160	តើឆ្មបត្រូវទំលាក់សុកដូចម្តេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ? A. រង់ចាំស្បូនកន្ត្រាក់ស្បូនខ្លាំងម្តងទៀត B. ពេលស្បូនកន្ត្រាក់ខ្លាំងទាញទងសុកថ្មមៗ ដៃម្ខាងទៀតដាក់លើផ្ចឹងថ្ងាសស្រ្តីទប់ស្បូន C. លូកដៃចាប់ទាញសុកដោយថ្មមៗ D. ពេលសុកលូនចេញមកក្រៅយកដៃទាំងពីរទ្រទប់ តែកុំទាញ	B

161	តើក្រោយទំលាក់សុករួច ឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្លាក់ឈាម? A. ម៉ាស្សាស្សនរហូតដល់វាឡើងវិញ និងបន្តម៉ាស្សារៀងរាល់៥នាទីម្តងអំឡុងកន្លះម៉ោងដំបូង ក្រោយសំរាល B. ម៉ាស្សាស្សនរហូតដល់វាឡើងវិញ និងបន្តម៉ាស្សារៀងរាល់៥នាទីម្តងអំឡុង១ម៉ោងដំបូង ក្រោយសំរាល C. ម៉ាស្សាស្សនរហូតដល់វាឡើងវិញ និងបន្តម៉ាស្សារៀងរាល់៥នាទីម្តងអំឡុង១ម៉ោងកន្លះដំបូង ក្រោយសំរាល D. ម៉ាស្សាស្សនរហូតដល់វាឡើងវិញ និងបន្តម៉ាស្សារៀងរាល់៥នាទីម្តងអំឡុង២ម៉ោងដំបូង ក្រោយសំរាល	A
162	តើឆ្មបតាមដានការកន្ត្រាក់ស្បូន ក្រោយទំលាក់សុករួចដូចម្តេច? A. ម៉ាស្សាស្សនរហូតដល់វាឡើងវិញ និងបន្តម៉ាស្សារៀងរាល់៥នាទីម្តងអំឡុងពេលសំរាល B. ស្ទាបលើកំពូលស្បូន តាមដានការហូរឈាមរៀងរាល់១ម៉ោងម្តង C. តាមដានការកន្ត្រាក់ស្បូន សំរួលដល់កន្លែងសុករបេះចេញពីស្បូន D. តាមដានការកន្ត្រាក់ស្បូន ដើម្បីធានាថាស្បូននៅតែកន្ត្រាក់ល្អ នៅពេលដែលយើងឈប់ម៉ាស្សា	D
163	ក្នុងការសម្រាលកូនធម្មតា តើឆ្មបតាមដានការហូរឈាម ក្រោយទំលាក់សុករួចដូចម្តេច? A. តាមដានការហូរឈាមរៀងរាល់១ម៉ោងម្តង ដោយសង្កេតមើលពីចំនុះនិងពណ៌ B. តាមដានការហូរឈាមរៀងរាល់១៥ នាទីម្តងដោយសង្កេតមើលពីចំនុះនិងពណ៌ C. តាមដានការហូរឈាមរៀងរាល់៥នាទីម្តង ដោយសង្កេតមើលពីចំនុះនិងពណ៌ D. តាមដានការហូរឈាមរៀងរាល់៥នាទីម្តង ដោយសង្កេតមើលពីដុំឈាមដែលធ្លាក់មក	C
164	តើឆ្មបត្រូវពិនិត្យសុកដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានសល់កំទេចសុកក្នុងស្បូន? A. ពិនិត្យស្រោមទឹកភ្លោះ សាច់សុក និងទងសុក B. កាន់ទងសុកយូរឡើងពិនិត្យសភាពស្រោមទឹកភ្លោះ សាច់សុក និងទងសុក C. ពិនិត្យស្រោមទឹកភ្លោះរួច សាច់សុក និងសរសៃឈាមទងសុក D. ពិនិត្យស្រោមទឹកភ្លោះ សាច់សុក និងសរសៃឈាមនៅទងសុក	D

165	តើឆ្មបត្រូវលូកពិនិត្យតាមទ្វារមាសដូចម្តេច ដើម្បីវាយតម្លៃ ទំហំច្រកលើអាងត្រគាកស្ត្រីដែលអាចធ្វើការសំរាលទារកតាមក្រោមបាន ? A- ម្រាមដៃស្តាំ២ លូកជួមៗទៅក្នុងរន្ធទ្វារមាស តាមទិសទៅលើ និងទៅក្រោយ B- ម្រាមដៃស្តាំ២ លូកជួមៗទៅក្នុងរន្ធទ្វារមាស តាមទិសត្រង់ទៅមុខ C-ម្រាមដៃស្តាំ២ លូកជួមៗទៅក្នុងរន្ធទ្វារមាស តាមទិសទៅលើ និងទៅក្រោម D-ម្រាមដៃស្តាំ២ លូកជួមៗទៅក្នុងរន្ធទ្វារមាស តាមទិសទៅក្រោម និងទៅក្រោយ	A
166	តើរបៀបខាងក្រោមណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណវិជ្ជមានត្រីមុខទៅក្រោយនៃច្រកលើអាងត្រគាក? A- ត្រូវប្រឹងលូកម្រាមដៃឲ្យដល់ប៉ះឆ្អឹងប្រូម៉ុងទ័ររបស់សាក្រូម(Promontory of sacrum) B- ត្រូវប្រឹងលូកម្រាមដៃឲ្យដល់ប៉ះឆ្អឹងកុកស៊ុកដែលនៅខាងក្រោមម្រាមដៃ C- បើលូកទៅមិនប៉ះឆ្អឹងនេះទេ មានន័យថាវិជ្ជមានត្រីមុខទៅក្រោយ មានប្រវែងគ្រប់គ្រាន់ D- ពេលលូកត្រូវដាក់ម្រាមដៃក្នុងស្ថានភាពស្ទើរផ្ដេក (កុំលូកចុះក្រោមពេក)	B
167	ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណ ទំហំច្រកក្រោម ឬ ច្រកចេញនៃអាងត្រគាកតើឆ្មប ត្រូវធ្វើដូចម្តេចជាដំបូង? A- ពេលពិនិត្យទ្វារមាស គេលូកស្នាបប៉ះឆ្អឹងពកអ៊ីស្យុងជាទូទៅឆ្អឹងនេះពកលៀនតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ B- បើវាលៀនចេញខ្លាំង នោះបញ្ជាក់ថាច្រកចេញអាងត្រគាកនេះតូច C- មុននឹងដកដៃចេញ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យកំណោងឆ្អឹងថ្ងាស D- ជាទូទៅ គេអាចប្រើម្រាមដៃ២ សំរាប់លូកកំពូលកំណោងឆ្អឹងថ្ងាស	A
168	តើរបៀបខាងក្រោមណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យ លើទំរង់ និងស្ថានភាពទារក ពេលឈឺពោះសម្រាល ? A- តាមការពិនិត្យពោះ (តាម Leopold's maneuver) B- តាមការស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារក C- តាមការលូកពិនិត្យទ្វារមាស D- តាមការកត់សំគាល់ទៅលើឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាលទារក	B

169	តើចំណុចខាងក្រោមណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ ក្នុងការកំណត់សំគាល់ទៅលើឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាលទារកពេលលូកពិនិត្យទ្វារមាស? A- ស្ថានភាពសាច់លលាដ៍ក្បាលទារក B- ស្ថានភាពបង្ហើយ C- តំណឆ្អឹងលលាដ៍ក្បាល D- កំពូលលលាដ៍ក្បាលខាងក្រោយ(អុកស៊ីពុត= Occiput)	A
170	ក្នុងទំរង់បង្ហាញកំពូលក្បាលរបស់ទារក តើត្រូវវាយតម្លៃ ពីអ្វីខ្លះ? A- ស្ថាប័នបង្ហើយក្រោយរបស់ទារក B- ស្ថាប័នរកថ្នលលលាដ៍ក្បាលទារក C- ស្ថាប័នបញ្ជាក់ពីអុកស៊ីពុតនៅខាងណា D- ចំលើយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
171	ការលូកពិនិត្យតាមទ្វារមាស ប៉ះដង្កង់ទារកតើឆ្លុះវាយតម្លៃការសំរាលទារកដូចម្តេច? A- សំរាលតាមទ្វារក្រោម ក្នុងទំរង់បញ្ជ្រាស B- សំរាលតាមទ្វារក្រោម ក្នុងទំរង់ទទឹង C- សំរាលដោយរះយកកូន ក្នុងទំរង់បញ្ជ្រាស D- សំរាលដោយរះយកកូន ក្នុងទំរង់ទំរង់ទទឹង	A
172	តើចំណុចខាងក្រោមណាមួយដែលមិនអាចស្ថាប័នឃើញ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពទារក តាមការពិនិត្យយពោះ ? A- ទំរង់បង្ហាញ (Presentation) B- ភាពមិនធម្មតានៃរូបរាងទារក C- ការចុះចូលក្នុងអាងត្រគាក (Engagement) D- ស្ថានភាពរបស់ទារក (position)	B
173	ឆ្លុះត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ ចំពោះស្រ្តីពេលឈឺពោះសំរាលនូវចំណុចដូចខាងក្រោមនេះ លើកលែងតែ ៖ A- សញ្ញាជីវិត B- ការវិវត្តន៍ប្រែប្រួលនៃទម្ងន់ទារក C- ការវិវត្តន៍នៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន D- ការវិវត្តន៍នៃការបើកមាត់ស្បូន	B

174	ពេលឈឺពោះសំរាល តើឆ្មបស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកឮដូចម្តេច ពេលស្សូនកន្ត្រាក់? A- ស្តាប់មិនសូវឮ ហើយចង្វាក់បេះដូងថយចុះ B- ស្តាប់ឮច្បាស់ តែចង្វាក់បេះដូងថយចុះ C- ស្តាប់មិនសូវឮ ហើយចង្វាក់បេះដូងធម្មតា D- ស្តាប់ឮច្បាស់ ហើយចង្វាក់បេះដូងធម្មតា	A
175	ស្ត្រីឈឺពោះសំរាលកូនគ្រប់ខែធម្មតា ក្នុងរយៈសកម្ម តើឆ្មបវាស់កំពស់ស្សូនឃើញដូចម្តេច? A- កំពស់ស្សូន ប្រែប្រួលទៅតាមស្ត្រីម្នាក់ៗ B- កំពស់ស្សូនគ្មានការប្រែប្រួល C- កំពស់ស្សូនទាបជាង ពេលមិនទាន់ឈឺពោះ D- កំពស់ស្សូនខ្ពស់ជាង ពេលមិនទាន់ឈឺពោះ	C
176	តើចំណុចណាមួយដែលមិនមែន ជាការប៉ាន់ប្រមាណនៃដំណើរការនៃការឈឺពោះសំរាល? A- សកម្មភាពកន្ត្រាក់របស់ស្សូន B- ការចុះរបស់ក្បាលទារក ក្នុងអាងត្រគាក C- ភាពរីកចំរើននៃការបើកមាត់ស្សូន D- ភាពរីកចំរើននៃសញ្ញាជីវិតរបស់ទារក	D
177	នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ត្រូវតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នប្រយោងលើកលែងតែ៖ A- ការកន្ត្រាក់ស្សូន B- ការចុះ និង បង្វិលរបស់ទារក C- លក្ខខណ្ឌម្តាយ និងទារក D- ភាពរីកចំរើននៃការបើកមាត់ស្សូន	D

178	ការវាយតម្លៃ ថាសុកនាក់ចេញមកក្រៅតាមរបៀប Schultze (មុខខាងក្នុងចេញមុន) លើកលែងតែ ចំណុចមួយ៖ A- ការបេះដាច់ ចាប់ផ្តើមនៅកណ្តាលសុក B- ទំងន់សុកជួយ បេះផ្តាច់នៅជ្រុងចំហៀងនិងបកស្រោមចេញពីជញ្ជាំងស្បូន C- សុកជ្រុះធ្លាក់និងអិលតាមចំហៀង D- ការបេះដាច់របៀបនេះវាធ្វើអោយមានការបាត់បង់ឈាមតិចតួច	C
179	ការវាយតម្លៃ ថាសុកនាក់ចេញមកក្រៅតាមរបៀប Matthews Duncan(មុខខាងម្តាយចេញមុន) លើកលែងតែ ចំណុចមួយ៖ A- ការបេះដាច់ ចាប់ផ្តើមនៅកណ្តាលសុក B- សុកចាប់ផ្តើមបេះចេញពីជ្រុងចំហៀងណាមួយ C- សុកជ្រុះធ្លាក់និងអិលតាមចំហៀង D- ការបញ្ចេញស្រោមទឹកភ្លោះមិនអស់ធ្វើអោយមានការបាត់បង់ឈាមច្រើន	A
180	នៅដំណាក់កាលទី៣ នៃការសំរាល ការទាញទងសុកថ្មីៗ មិនអាចធ្វើបានទេពេលដែល៖ A. បានប្រើថ្នាំ Oxytocin ដើម្បីឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់រួចហើយ B. មានសញ្ញាថាសុកបានបេះ ហើយលូនចុះ C. ស្បូនកន្ត្រាក់បានល្អហើយ D. ស្បូនសំរាក មិនទាន់ឈឺពោះទៀត	D
181	សញ្ញាមានសុខភាពល្អ ក្រោយពេលសំរាលមានដូចខាងក្រោមលើកលែងតែមួយគឺ៖ A. ស្ត្រីមានស្មារតី ពុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទារករបស់គាត់ B. ស្ត្រីមានស្មារតីរឹងរ៉ាវ និងចាប់អារម្មណ៍លើទារករបស់គាត់ C. ធ្លាក់ឈាមតិចតួច D. ស្បូនឡើងវិញតឹង និង ពុំធំឡើងទេ	A
182	សញ្ញាមានគ្រោះថ្នាក់ ក្រោយពេលសម្រាលមានដូចខាងក្រោមលើកលែងតែមួយគឺ៖ A. ស្ត្រីមានធ្លាក់ឈាមច្រើនជាងឈាមដែលធ្លាប់មករដូវប្រចាំខែ B. ស្ត្រីមានការឈឺចាប់នៅតំបន់ផ្លូវសម្រាល ឬ មានដុំឈាមនៅក្នុងទ្វារមាស C. ធ្លាក់ឈាមតិចតួច ហើយស្បូនឡើងវិញតឹង និង ពុំធំឡើងទេ D. ស្ត្រីទទួលអារម្មណ៍ដូចជាគ្រុន ដឹងចរដើរលឿន ស្បូនទន់	C

183	តើចំណុចណាស់ខាន់ជាងគេ ក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំដល់ម្តាយនៅដំណាក់កាលទី ៤ នៃការសម្រាល? A. ការពារការធ្លាក់ឈាមខ្លាំងក្លា B. ការសំអាតសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្ត្រី C. ការត្រួតពិនិត្យការដាច់រំហែក និងបញ្ហា ដទៃទៀត D. ការតាមដានការបត់ដើងតូចរបស់មាតា	A
184	ឆ្លុបតាមដានទារកនៅដំណាក់កាលទី ៤ ឃើញសញ្ញាមានសុខភាពល្អ លើកលែងមួយចំណុចគឺ៖ A. ទារកចាប់ផ្តើមបៅដោះ B. ទារកមានពណ៌សំបុរល្អ C. ទារកមាននោម D. មិនមានចលនាពោះរៀន	D
185	ទង់សុកធ្លាក់មកក្រៅពេលសម្រាល អាចឲ្យទារកមានគ្រោះថ្នាក់ពេល៖ A. ទារកច្បង់ក្បាលចុះក្នុងអាងត្រតាក B. ទារកបង្វិលក្បាល ក្នុងអាងត្រតាក C. ទារកសម្រាលបញ្ជ្រាសដើងចេញផុត ក្បាលសង្កត់ទង់សុក D. ផ្នែកណាមួយនៃការបង្ហាញកៀបសង្កត់លើទង់សុក	D
186	ករណីទង់សុកធ្លាក់មកក្រៅពេលឈឺពោះសម្រាល តើត្រូវរៀបចំស្ថានភាពស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេច? A. ដាក់ស្ត្រីដេកផ្តាច់មុខ ហើយបញ្ជូនទៅបន្ទប់វះកាត់បន្ទាន់ B. ដាក់ស្ត្រីដេកផ្តាច់មុខ និងចំតិតគូថអោយខ្ពស់ C. ដាក់ស្ត្រីដេកផ្អៀង និងចំតិតគូថអោយខ្ពស់ D. ដាក់ស្ត្រីដេកផ្ទាវ និងលើកគូថអោយខ្ពស់	B

187	ករណីទង់សុកធ្លាក់មកក្រៅមុនទារក ហើយជិពចរនៅទង់សុកទារកឈប់លោត តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A. បញ្ជូនទៅបន្ទប់រក្សាភ័យបន្ទាន់ B. ដាក់ស្រ្តីដេកផ្តាច់មុខ និងចំតិតគូថអោយខ្ពស់ C. បង្កើតកូនដោយធម្មតា (មានន័យថាទារកបានស្លាប់ហើយ) D. តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក ដោយម៉ាស៊ីនស្តាប់បេះដូង	C
188	ដំណាក់កាលទី២អូសបន្លាយនៅលើស្រ្តីមានគភ៌លើកទី៦តើមូលហេតុអ្វីដែលឆ្លុបត្រូវតាមដាន ? A. ភាពមិនស្មើគ្នារវាងត្រីកោណមុខ និងទំហំកូន B. ការកន្ត្រាក់ស្បូន ដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព C. ការអស់កម្លាំងខ្លាំង របស់ម្តាយ D. ការកន្ត្រាក់ស្បូន និង ការអស់កម្លាំងខ្សោយ របស់ម្តាយ	D
189	ដំណាក់កាលទី២ អូសបន្លាយនៅលើស្រ្តីមានគភ៌លើកដំបូង តើមូលហេតុអ្វីដែលឆ្លុបត្រូវតាមដាន ? A. ភាពមិនសមាមាត្រ គ្នារវាងត្រីកោណមុខ និងទំហំកូន B. ការកន្ត្រាក់ស្បូន ដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព C. ការអស់កម្លាំងខ្លាំង របស់ម្តាយ D. ការកន្ត្រាក់ស្បូន និង ការអស់កម្លាំងខ្លាំង របស់ម្តាយ	A
190	សញ្ញាណាមួយដែលមិនមែន ជាសញ្ញាស្បូនជិតរហែក ? A. ស្បូនកន្ត្រាក់ជាប់ និង ឈឺពោះជាប់រហូត B. ពិនិត្យពោះឃើញមានពីរគន្លាក់ C. ស្រ្តីមានទឹកមុខស្ងួត រសេះរសោះអស់កម្លាំង D. ស្រ្តីមានទឹកមុខធម្មតា និងរសេះរសោះអស់កម្លាំង	D

191	សញ្ញាណាមួយដែលសំខាន់ជាងគេ បញ្ជាក់ថា ស្បូនរំហែក ? A. ស្បូនកន្ត្រាក់ដាច់ និង ឈឺពោះដាច់រហូត B. ស្បូនលែងកន្ត្រាក់ ស្ទាបឃើញទំរង់កូន C. ហូរឈាមតាមទ្វារមាស D. ស្រ្តីមានសញ្ញាបំរុងស្នូក	B
192	តើសកម្មភាព របស់ឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលទារកក្នុងផ្ទៃខ្សោយ ? A. ប្តូរស្ថានភាព សម្រាករបស់មាតាអោយគាត់គេងផ្អៀងខាងឆ្វេង B. បើការឈឺពោះ ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ ត្រូវរៀបចំបញ្ជូនទៅធ្វើការវះកាត់ C. បើការឈឺពោះ ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ ត្រូវធ្វើការបូម ឬ កៀបយកទារកចេញ D. ផ្តល់អុកស៊ីសែនឲ្យទារកតាមទុយោ	A
193	បញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅពេលសម្រាល កូនភ្លោះឬកូនច្រើនក្នុងស្បូន មានដូចខាងក្រោមលើកលែងតែ៖ A. ការធ្លាក់ទងស្នូក B. មាត់ស្បូនត្រូវបិទមុនពេលសម្រាលកូនបន្ទាប់ C. ទម្រង់បញ្ជ្រាសនៃកូនទី២ D. ទម្រង់ទទឹងនៃកូនទី២	C
194	ឆ្មបសន្មត់ថាជា ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលចំពោះស្រ្តីធម្មតា លុះណាឃើញមានធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស៖ A. មានចំនួនលើសពី ៥០០ម.ល B. មានចំនួនលើសពី ៤០០ម.ល C. មានចំនួនលើសពី ៣០០ម.ល D. មានចំនួនលើសពី ២០០ម.ល	A
195	តើមូលហេតុណា ដែលឆ្មបមិនអាចស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលសម្រាល ? A. ស្បូនខ្សោយ B. នៅសល់ស្នូកក្នុងស្បូន C. ការរំហែកដាច់ប្រដាប់បន្តពូជ - មាត់ស្បូន D. ជម្ងឺមានកំណកឈាម	D

196	ឆ្លបធ្វើតាមដាន ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល មានដូចខាងក្រោមលើកលែង៖ A. ធ្វើការវាយតម្លៃ សញ្ញាជីវិត ការធ្លាក់ឈាម ឲ្យបានឆាប់រហ័ស (តិចជាង ៣០វិនាទី) B. រកមើលមានជម្ងឺផ្សេងៗទៀតឬអត់ C. រកមើលការហែកនៅផ្លូវបន្តពូជ D. មើលស្បូន ថាតើកន្ត្រាក់ ឬមិនកន្ត្រាក់	B
197	រយៈពេល៣០នាទី បើមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល សុកមិនទាន់ធ្លាក់ តើឆ្លបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A. តាមដាន សញ្ញាជីវិត និង ការធ្លាក់ឈាមបន្ត B. រកមើលមានសញ្ញារបេះសុកដើម្បីធ្វើការទម្លាក់សុក C. ត្រូវធ្វើការបាញ់សុកដោយដៃ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងឆាប់រហ័សបំផុត D. មើលស្បូន ថាតើកន្ត្រាក់ ឬមិនកន្ត្រាក់	C
198	ពេលមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល បើសុកធ្លាក់ហើយស្បូនមិនកន្ត្រាក់ តើឆ្លបមិនត្រូវធ្វើអ្វី? A. បូមទឹកនោមចេញបើមាន B. ផ្តល់ Oxytocin 10ui តាមសរសៃ ឬ Ergometrine 0.25mg តាមសាច់ដុំ C. ធ្វើម៉ាស្សាស្បូន D. ផ្តល់ Ergometrine 0.25mg តាមសាច់ដុំចំពោះស្ត្រីដែលមានលើសសម្ពាធឈាម	D
199	ពេលមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល បើសុកទម្លាក់ហើយស្បូនកន្ត្រាក់(ស្បូនរឹងតែឈាមនៅតែហូរ)តើឆ្លបត្រូវធ្វើអ្វី? A. ពិនិត្យ បើរំលោ ទ្វារមាស មាត់ស្បូន ក្រែងមានរហែក បើមានរហែកត្រូវដេរបាញ់បន្ទាន់ B. Ergometrine 0.25mg តាមសាច់ដុំ ចំពោះស្ត្រីដែលមានលើសសម្ពាធឈាម C. រកមើល ការឆ្លងមេរោគ D. បើគ្មានការរហែក ហើយឈាមធ្លាក់តិចតួច	A

200	ពេលមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល មណ្ឌលសុខភាពដែលគ្មានឆ្លបជំនាញ និងសំភារៈគ្រប់គ្រាន់ តើឆ្លបមិនត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលណា? A. ការហូរឈាម មិនអាចគ្រប់គ្រងបាន B. ស្រ្តីស្ថិតក្នុងសភាពស្ងួត C. សង្ស័យថា មានជំងឺកំណកឈាម D. មិនទាន់ធ្វើការទំលាក់សុក និងឈ្លីម៉ាស្យាស្យូន	D
201	ក្នុងការតាមដាន បរិមាណនៃការធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាល ដោយសារស្បូនខ្សោយ តើឆ្លបមិនត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះស្រ្តី? A. ដាក់ដុំសំឡីអនាម័យ នៅក្រោមគូថស្រ្តី B. ដាក់ក្រណាត់ស្អាតនៅក្រោមគូថស្រ្តី C. ដាក់ដុំកំប្រេសចូលក្នុងទ្វារមាស D. មិនត្រូវដាក់ដុំកំប្រេសចូលក្នុងទ្វារមាស	C
202	ពេលបញ្ជូនស្រ្តីមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាល ដែលសុកបានធ្លាក់ហើយ ដើម្បីរក្សាការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន តើឆ្លបមិនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះស្រ្តី? A. ការម៉ាស្យាស្យូន ឬពិនិត្យប្លោកនោម B. ការសង្កត់ស្បូនដោយដៃទាំង២ ឬសង្កត់ទៅសរសៃអាអ៊ីក C. ប្រើ Oxytocin 10UI ចាក់តាមសាច់ដុំ ប្រសិនបើចាំបាច់ D. មិនត្រូវប៉ះពាល់ឬធ្វើអ្វីទៅលើស្បូនស្រ្តីទេ	D
203	តើឆ្លបមិនត្រូវធ្វើអ្វីចំពោះស្រ្តី នៅពេលបញ្ជូនដោយការធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាល ? A. ធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានសម្តេច B. ពិនិត្យពណ៌សំបុរ ជីពចរ សំពាធឈាម C. បរិមាណឈាមដែលបាត់បង់ កំរិតស្មារតី D. តាមដានការកន្ត្រាក់ស្បូន	A
204	ការកាត់ទ្វារមាស ពី កណ្តាល ទៅ ចំហៀង តើមានគុណសម្បត្តិ យ៉ាងដូចម្តេច? A. ការដេរជួសជុល មានរយៈពេលយូរ B. មិនសូវមាន ការប្រឈម និងការរំហែកដល់សាច់ដុំខ្លីបន្តគូថ C. ឆាប់ ជាសះស្បើយ D. មានសរសៃឈាមតិច ហើយមានការបាត់បង់ ឈាមតិច	B

205	ការកាត់ទ្វារមាស នៅ ចំកណ្តាល តើមានគុណសម្បត្តិ យ៉ាងដូចម្តេច? A. ការដេរជួសជុល មានរយៈពេលយូរ B. មិនសូវមាន ការប្រឈម និងការរំហែកដល់សាច់ដុំខ្លីបន្តគូថ C. អាចចៀសវាង ការខូចខាតដល់ក្រពេញ Bartholin D. មានសរសៃឈាមតិច ហើយមានការបាត់បង់ ឈាមតិច	D
206	ការកាត់ទ្វារមាស នៅ ចំកណ្តាល តើមានគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេច? A. ការដេរជួសជុល មានរយៈពេលយូរ B. ងាយរំហែក ដល់សាច់ដុំខ្លីបន្តគូថ C. មានការឈឺចាប់ ខ្លាំងក្រោយពេលកាត់ D. បាត់បង់ ឈាមច្រើន	B
207	ការកាត់ទ្វារមាស នៅពីកណ្តាល ទៅចំហៀង មានគុណវិបត្តិ ដូចខាងក្រោមលើកលែងតែមួយ៖ A. បាត់បង់ ឈាមច្រើន B. រយៈពេល នៃការដាស់ស្បើយយូរបន្តិច C. មានការឈឺចាប់ ខ្លាំងក្រោយពេលកាត់ D. ងាយរំហែក ដល់សាច់ដុំខ្លីបន្តគូថ	D
208	តើឆ្មបត្រូវធ្វើការកាត់ទ្វារមាសនៅពេលណា ? A. នៅពេលបើរំណេរស្តើង និង លាតសន្ធឹងដែលមិនអាចមើលឃើញក្បាលទារក B. នៅពេលបើរំណេរស្តើង និង លាតសន្ធឹងដែលអាចមើលឃើញក្បាលទារក C. នៅពេលបើរំណេរប៉ោង និង លាតសន្ធឹងដែលមិនអាចមើលឃើញក្បាលទារក D. នៅពេលបើរំណេរប៉ោង ទូលឡើងដោយក្បាលទារក	B
209	តើរបៀបណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ ក្នុងទំរង់ការចាក់ថ្នាំស្តីកមុនកាត់ទ្វារមាស ? A. ចាក់មូលទៅតាមកន្លែងដែលកាត់បើរំណេរក្នុងមុំ ៤៥ អង្សា B. ចាក់មូលឲ្យជ្រៅ បាញ់ថ្នាំបញ្ចូលឲ្យលឿន C. បាញ់ថ្នាំបញ្ចូលបណ្តើរៗនៅពេលដកស៊ីរ៉ាំងចេញយឺតៗ D. ត្រូវបាញ់ ថ្នាំស្តីកមុនប្រមាណ ១០cc និង រង់ចាំរយៈពេល ២ នាទី	B

210	ទន្ទឹមនឹងការលូនចុះរបស់ក្បាលកូនឆ្លងកាត់ច្រកលើនៃឆ្អឹងអាងត្រគាក តើសញ្ញាអ្វីដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យ? A- មានធ្លាក់ទឹកអំពិលលាយឈាម (ឈាមប្រា) B- ការលូនចេញនៃក្បាលកូនមកក្រៅ C- ក្អិត និងចង្កោរ D- ស្រ្តីងងុយគេង	A
211	នៅពេលមាត់ស្បូនបើកអស់ តើឆ្មបត្រូវលូកពិនិត្យទ្វារមាសរកអ្វីមុនគេ? A- ការលូប និងការបើកនៃមាត់ស្បូន B- ការបង្ហាញរបស់កូន និងទម្រង់ C- ការបង្ហាញផ្នែករបស់កូន D- ស្រោមទឹកភ្លោះបែកឬនៅ	D
212	ក្នុងការតាមដានពេលឈឺពោះសម្រាល តើឆ្មបត្រូវពិនិត្យឃើញដូចម្តេច នៅពេលមានការកន្ត្រាក់នៃស្បូន? A- ការសំរាកនៃស្បូន B- ការសំរាកនៅចន្លោះការកន្ត្រាក់ C- ការកើនឡើងនៃចង្វាក់ស្ទូរបេះដូងកូន D- ការស្តាប់មិនឮស្ទូរបេះដូងកូន	D
213	ស្រីម្នាក់មកសំរាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសម្រាល តើឆ្មបត្រូវតាមដានការឈឺពោះរបស់គាត់យ៉ាងសកម្មនៅពេលណា? A- ឈឺពោះក្នុងរយៈសកម្ម B- ឈឺពោះក្នុងរយៈយឺត C- ឈឺពោះក្លែងក្លាយ D- ចាប់ផ្តើមឈឺពោះ	A

214	ស្រីម្នាក់មកសំរាកពេទ្យដោយបែកទឹកភ្លោះមុនពេលកំណត់ តើឆ្លុះត្រូវរាយការណ៍ អ្វីខ្លះរាល់២ម៉ោងម្តង? A- សំពាធឈាម សីតុណ្ហភាព ទម្រង់របស់ទារក B- សំពាធឈាម សីតុណ្ហភាព ទឹកនោម C- សីតុណ្ហភាព ជីពចរ ទម្រង់របស់ទារក D- សីតុណ្ហភាព ជីពចរ សំពាធឈាម	D
215	នៅពេលកំពុងឈឺពោះសម្រាល តើឆ្លុះត្រូវផ្តល់យោបល់អ្វីខ្លះដល់ស្រ្តីអំពីការញ៉ាំអាហាររឹងៗ? A- មានការចុះថយនៃការការបឺតស្រួប B- បង្កើននូវការក្អិតចង្កោរ C- ហាមញ៉ាំពេលត្រូវធ្វើការរះកាត់ D- ចំណង់នៃការចង់ហូប និងបាត់ក្នុងពេលកំពុងឈឺពោះ	D
216	តើឆ្លុះជួយផ្តល់ការគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តមាតានៅពេលឈឺពោះសំរាលមានអ្វីខ្លះ? A- ផ្តល់ឱ្យមាតានូវទឹកបន្តិចៗរៀងរាល់ម៉ោង B- ផ្តល់អាហារឱ្យគាត់ហូបពេលសំរាកការឈឺពោះ C- ណែនាំឱ្យមាតាដើរតិចៗ និងផ្លាស់ប្តូរជំហរ D- ជួយគាំទ្រមាតានោះពេលឈឺពោះស្បូនកន្ត្រាក់	A
217	តើការលូកពិនិត្យទ្វារមាសក្នុងរយៈពេលសកម្មអាចលូកប៉ះអ្វីមុនគេពេលស្រោមទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក? A- ស្ទាបប៉ះទងសុក B- ស្ទាបប៉ះសុក C- ស្ទាបប៉ះស្រោមទឹកភ្លោះប៉ោងឡើង D- ស្ទាបប៉ះក្បាលកូន	C

218	ក្នុងចំណោមសញ្ញាខាងក្រោមនេះ តើសញ្ញាមួយណាដែលអ្នកត្រូវតែបញ្ជូន គាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យចាំបាច់? A- ទារកហាក់ដូចជាតូចជាង ២ គីឡូក្រាម B- ស្រ្តីជាមាតាមានសញ្ញានៃការឆ្លងរោគ C- ស្រ្តីជាមាតាមានការធ្លាក់ឈាមតិចតួច D- ស្រោមទឹកភ្លោះស្រ្តីជាមាតាត្រូវឆ្លាយ	B
219	ប្រសិនបើទឹកភ្លោះពណ៌ត្នោត ចំពោះទារកបង្ហាញតូច តើអ្នកដឹងដោយវិធីណា ទើបសន្មត់ថាទារកកើតមកនេះខ្សោយ (fetal distress)? A- ទារកបំរះធម្មតា B- ទារកឡេះឡាស់ដូចរកខ្យល់ដកដង្ហើម C- ទារកស្ងាត់ស្ងៀម D- ទារកបំរះម្តងម្កាល	B
220	តើវិធីសាមញ្ញមួយណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងស្តុក? A- ដាក់ក្បាលស្រ្តីឱ្យទាបជាងជើង ចង្កេះឱ្យខ្ពស់ជាងក្បាល B- ដាក់បញ្ចូលសេរ៉ូមប្រែ C- ចាក់បញ្ចូលសេរ៉ូម Lactate Ringer D- បញ្ជូនឈាម	A
221	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីឱ្យសាច់ញាតិគ្រួសារមកជួយលើកទឹកចិត្តស្រ្តីឈឺពោះដូចម្តេច? A- បញ្ជាក់អាហារពេលស្រ្តីកំពុងឈឺពោះ B- ជួយអង្អែលខ្នងនិងចង្កេះកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ C- ជួយលើកដាក់ស្រ្តី D- ជួយផ្លាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់	B
222	តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំរាកពេទ្យនៅពេលពិនិត្យឃើញដូចម្តេច? A- ទារកមិនទាន់ឆ្លងចូលច្រកលើនៃអាងត្រគាក B- ទារកឆ្លងចូលច្រកលើនៃអាងត្រគាក C- ពិបាកពន្យល់ និងកំណត់ D- ការអណ្តែតរបស់ទារក	B

223	នៅពេលមានទឹកនោមពេញផ្លាកនោម តើឆ្លុបត្រូវពន្យល់ប្រាប់ស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់ទៅនោមគ្រប់ម៉ោង? A- បញ្ឈប់ការលូនចុះនៃកូន និងការកន្ត្រាក់នៃស្បូន B- បង្កើតគ្រោះថ្នាក់នៃការស្រុតរបស់ទងសុក C- ទឹកនោមកល់ក្នុងផ្លាកនោម និងធ្វើឲ្យកូនពុំលូនចុះបាន D- បង្កើតគ្រោះថ្នាក់នៃការហៀរទឹកនោម	C
224	តើឆ្លុបដាក់ស្រ្តីក្នុងស្ថានភាពដូចម្តេចក្នុងពេលប្រឹងសម្រាល? A- ពាក់កណ្តាលអង្គុយ B- គេងផ្អៀងទៅខាងស្តាំ C- គេងផ្អៀងទៅខាងឆ្វេង D- គេងថ្លា	A
225	តើឆ្លុបកំណត់ថា ដំណាក់កាលទី២ ចាប់ផ្តើមពិតប្រាកដស្ត្រីមានសភាពដូចម្តេច? A- ស្ត្រីឈឺពោះខ្លាំងដោយការកន្ត្រាក់ស្បូនយ៉ាងខ្លាំង B- ស្ត្រីមានអារម្មណ៍មានសំពាធនៅបើរីណេ រន្ធតូច និងមានអារម្មណ៍ចង់បត់ជើងធំ C- ទ្វារមាសស្រ្តីឡើងបោងចំហរ D- រន្ធតូចស្រ្តីចំហរ	B
226	តើឆ្លុបត្រូវជួយបញ្ចេញទារកដូចម្តេច នៅដំណាក់កាលទី២នៃការសម្រាល? A- លើកទឹកចិត្តម្តាយឱ្យប្រឹង B- ត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងទារក C- បញ្ចេញក្បាលទារកតិចៗដោយទប់បើរីណេ D- បញ្ចេញស្មាទារកឲ្យបានលឿន	C
227	តើឆ្លុបធ្វើការសំអាតផ្លូវដង្ហើមរបស់ទារករបៀបណា? A- សំអាតមាត់ B- សំអាតច្រមុះ C- សំអាតមាត់រួចច្រមុះ D- សំអាតច្រមុះរួចមាត់	C

228	តើឆ្មបត្រូវកាត់ទងសុករបៀបណា? A- ខ្សែ ឬដង្កៀបប្រហែល ២ ទៅ ៣ សម ពីគល់ផ្ចិតទារក B- ខ្សែ ឬដង្កៀបប្រហែល ៣ ទៅ ៤ សម ពីគល់ផ្ចិតទារក C- ខ្សែ ឬដង្កៀបប្រហែល ៥ សម ពីគល់ផ្ចិតទារក D- ខ្សែ ឬដង្កៀបប្រហែល ៤ ទៅ ៥ សម ពីគល់ផ្ចិតទារក	A
229	តើឆ្មបពន្យល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចម្តេច នៅពេលកូនរបស់គាត់ពុំអាចសំរាល តាមផ្លូវក្រោមបាន? A- ក្បាលកូនគាត់ធំពេក B- អាងត្រគាករបស់គាត់ធំផ្នែកខាងលើ C- ក្បាលរបស់កូនមិនសមាមាត្រនឹងឆ្អឹងអាងត្រគាកម្តាយ D- ឆ្អឹងអាងត្រគាករបស់ម្តាយរៀច	C
230	តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើពេលសំរាលមានទងសុកព័ទ្ធជុំវិញកូន? A- សាកល្បងដោះដោយដៃតាមក្បាល B- ដោះដោយបង្វិលស្មាកូនហើយកាត់ទងសុកដោយកន្ត្រៃ C- ដោះដោយដៃតាមក្បាលបើធ្ងន់ ឬកាត់ទងសុកដោយកន្ត្រៃ បើវាតឹងពេក D- ដោះដោយបង្វិលក្បាលកូនហើយកាត់ទងសុកដោយកន្ត្រៃ	C
231	ពេលស្ត្រីចូលមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការវះកាត់ តើបុគ្គលិកឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបំផុត? A-បង្ហាញប្រាប់អ្នកជម្ងឺនូវអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើនិងការ ពិនិត្យអមវេជ្ជសាស្ត្រ B-កំណត់ពីភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកជម្ងឺ C-ឆ្លើយនូវសំណួរទាំងឡាយនិងផ្តល់ព័ត៌មានដល់គាត់ D-គាំទ្រអ្នកជម្ងឺបន្ថែម	A
232	ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពខ្លាចរបស់ស្ត្រីមុនពេលវះកាត់តើបុគ្គលិកឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូសារស្ត្រី B-ធ្វើការវិភាគអមវេជ្ជសាស្ត្រ C-អោយអ្នកជម្ងឺដកដង្ហើមវែងៗនិងក្អក D-សិក្សាភាពព្រួយបារម្ភរណ៍និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ស្ត្រី	D

233	ដើម្បីកែលំអHypoventilation បុគ្គលិកឆ្លបត្រូវដាក់ស្ថានភាពអ្នកជំងឺដូចម្តេច ? A-ដាក់ស្ថានភាពពាក់កណ្តាលអង្គុយបីតស្មើស្មនិងផ្តល់អុកស៊ីសែន B-ដាក់ស្ថានភាពអ្នកជំងឺរាបស្មើក្បាលផ្អៀង,បីតស្មើស្មនិងផ្តល់អុកស៊ីសែន C-ដាក់ស្ថានភាពអ្នកជំងឺរាបស្មើរកល់ក្បាលខ្ពស់បន្តិច បីតស្មើស្មនិងផ្តល់អុកស៊ីសែន D-ដាក់ស្ថានភាពអ្នកជំងឺរាបស្មើរកល់ស្មាខ្ពស់បន្តិច បីតស្មើស្មនិងផ្តល់អុកស៊ីសែន	B
234	នៅតំណាក់កាលក្រោយរះកាត់ បើសិនជាស្ត្រីមិនទាន់មានស្មារតីច្បាស់លាស់ បុគ្គលិកឆ្លបត្រូវដាក់ស្ថានភាពស្ត្រីដូចម្តេច? A-ដាក់ស្ថានភាពរាបស្មើក្បាលផ្អៀងបន្តិច B-ដាក់ស្ថានភាពក្បាលទាបជាងជើងបន្តិច C-ដាក់ស្ថានភាពអ្នកជំងឺរាបស្មើរកល់ស្មាខ្ពស់បន្តិច D-ដាក់ស្ថានភាពរាបស្មើរកល់ក្បាលខ្ពស់បន្តិច	A
235	នៅក្នុងករណីស្ត្រីមានការឈឺចាប់នៅលើមុខរបួសរះកាត់ភ្លាមៗតើបុគ្គលិកឆ្លប ត្រូវធ្វើដូច ម្តេចដើម្បីអោយស្ត្រីមានសុខភាព? A-អោយថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់រាល់ ៤ម៉ោងម្តង B-ដាក់ទឹកក្តៅឧណ្ឌៗ ស្តុំនៅលើមុខរបួស C-ស្តុំត្រជាក់នៅពីលើមុខរបួស D-ធ្វើម៉ាស្សាថ្មមៗនៅជុំវិញរបួស	A
236	បើស្ត្រីមានក្លាយរោគនៅបើរីណេ បុគ្គលិកឆ្លបត្រូវសំអាតបើរីណេជាមួយនឹង៖ A-Chlorhexidine 4% ឬ សាប៊ូ ២ដង/១ថ្ងៃ B-Chlorhexidine 4%ឬសាប៊ូ ៣ដង/១ថ្ងៃ C-Chlorhexidine 4%ឬសាប៊ូ ៤ដង/១ថ្ងៃ D-Chlorhexidine 4%ឬ សាប៊ូ៥ដង/១ថ្ងៃ	C
237	តើឆ្លបត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីតាមដានការសម្រាលទារកក្នុងផ្ទៃពេលដែលល្អបំផុតក្នុងការស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារក A- ដំណាក់កាលនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនបានចប់ភ្លាម B - ដំណាក់កាលនៃស្បូនកំពង់ចាប់ផ្តើមកន្ត្រាក់ C- ដំណាក់កាលនៃការឈឺពោះខ្លាំងភ្លាម D- ដំណាក់កាលនៃពេលដែលទឹកភ្លោះបែករួច	A

238	តើឆ្នបត្រូវដូចម្តេចដើម្បីកត់ត្រាចង្វាក់បេះដូងទារកនៅក្នុងប៉ាតូក្រាហូ? A- រៀងរាល់១៥នាទីម្តង B- រៀងរាល់២០នាទីម្តង C- រៀងរាល់២៥នាទីម្តង D- រៀងរាល់៣០នាទីម្តង	D
239	ក្នុងប៉ាតូក្រាហូនៅពេលដែលចង្វាក់បេះដូងទារកចុះខ្សោយ តើឆ្នបត្រូវតាមដានដូចម្តេច? A- រៀងរាល់ ១៥នាទីម្តង B- រៀងរាល់ ២០នាទីម្តង C-រៀងរាល់ ២៥នាទីម្តង D- រៀងរាល់ ៣០នាទីម្តង	A
240	ពេលឈឺពោះសំរាល តើឆ្នបរៀបចំស្ថានភាពស្រ្តីដូចម្តេចក្នុងពេលស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារក? A- ស្ថានភាពដេកផ្លាស់លូកជើង B- ស្ថានភាពដេកផ្អៀង C- ស្ថានភាពដេកពាក់កណ្តាលអង្គុយ D- ស្ថានភាពដេកថ្ងាបញ្ឈរដង្កង់	A
241	តើឆ្នបបញ្ជាក់ថាទារកចុះខ្សោយ ដោយរាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកឃើញដូចម្តេច? A- ចង្វាក់បេះដូងតិចជាងឬស្មើ១០០ដង/នាទី B - ចង្វាក់បេះដូងលើសឬស្មើពី១១០/នាទី C- ចង្វាក់បេះដូងលើសឬស្មើពី១២០/នាទី D- ចង្វាក់បេះដូងលើសឬស្មើពី១៣០/នាទី	A
242	ក្នុងការវាយតម្លៃសភាពទឹកភ្លោះ តើឆ្នបត្រូវកត់ត្រានៅលើប៉ាតូក្រាហូយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្រោមទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក? A- (meconium) M B- (Clear) C C- (Intact) I D- (Absence) A	C

243	ដើម្បីវាយតម្លៃសភាពពីទឹកភ្លោះ តើឆ្មបត្រូវកត់ត្រានៅលើប៉ាតូក្រាហ្វយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកភ្លោះបែកមានលាយពណ៌អាចម៍ព្រៃ? A - (Intact) I B- (Clear) C C- (meconium) M D- (Absence) A	C
244	ដើម្បីវាយតម្លៃសភាពពីទឹកភ្លោះ តើឆ្មបត្រូវកត់ត្រានៅលើប៉ាតូក្រាហ្វយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកភ្លោះបែកមានពណ៌ដូចម្តេច? A- (Intact) I B- (Clear) C C- (meconium) M D- (Absence)	B
245	ដើម្បីវាយតម្លៃសភាពពីទឹកភ្លោះ តើឆ្មបត្រូវកត់ត្រានៅលើប៉ាតូក្រាហ្វយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកភ្លោះមានលាយឈាម? A- (Blood) B B- (Clear) C C- (meconium) M D- (Absence) A	A
246	ក្នុងការវាយតម្លៃសភាពទឹកភ្លោះ ដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានទឹកភ្លោះ តើឆ្មបត្រូវកត់ត្រានៅលើប៉ាតូក្រាហ្វយ៉ាងដូចម្តេច? A- (Intact) I B- (Clear) C C- (meconium) M D- (Absence) A	D

247	ក្នុងទំរង់កូនបង្ហាញក្បាល ពេលឆ្លបលូកពិនិត្យទ្វារមាស ឃើញមានអាចម៍ព្រៃនៅក្នុងទឹកភ្លោះតើឆ្លបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A -តាមដានការកន្ត្រាក់ស្បូនញឹកញាប់ B -តាមដានការបើកមាត់ស្បូនញឹកញាប់ C-តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក ញឹកញាប់ D -តាមដានការចុះនៃក្បាលទារកញឹកញាប់	C
248	ការបំពេញប៉ាត្រាក្រាហ្វ ក្នុងការតាមដានការវិវត្តន៍នៃការឈឺពោះសម្រាល ដំណាក់កាលទី១ រយៈពេល ការបើកមាត់ស្បូន ៖ A-ចាប់ពី ០ - ១ស.ម B-ចាប់ពី ០ - ២ស.ម C-ចាប់ពី ០ - ៣ស.ម D-ចាប់ពី ០ - ៤ស.ម	C
249	ការបំពេញប៉ាត្រាក្រាហ្វ ក្នុងការតាមដានការវិវត្តន៍នៃការឈឺពោះសម្រាល ដំណាក់កាលទី១ សកម្ម ការបើកមាត់ស្បូន ៖ A-ចាប់ពី ៣ - ៥ស.ម B-ចាប់ពី ៣ - ៧ស.ម C-ចាប់ពី ៣ - ៨ស.ម D-ចាប់ពី ៣- ១០ស.ម	D
250	តើឆ្លបលូកពិនិត្យទ្វារមាសដើម្បីវាយតម្លៃអ្វី ដំបូងគេ នៅក្នុងពេលឈឺពោះសម្រាល? A -ឆ្អឹងអាងត្រគាក B -ការចុះនៃក្បាលទារក C-ការបើកមាត់ស្បូន D- សភាពទឹកភ្លោះ	A

251	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យឈឺពោះសម្រាលរយៈសកម្ម ផ្នែកលើប៉ាតូក្រាហ្វក្នុងដំណាក់កាលសកម្ម តូមបប្រាប់ដល់ស្ត្រីថា ដំណើរការបើកមាត់ស្បូនបានវិវត្តល្អលុះត្រា៖ A -បើកបាន១ស.ម/ម៉ោង B -បើកបាន២ស.ម/ម៉ោង C-បើកបាន៣ស.ម/ម៉ោង D-បើកបាន៤ស.ម/ម៉ោង	A
252	ឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីវាយតម្លៃការសំរាលតាមទ្វារក្រោមបាន « បើស្ទាបផ្នែកក្បាលនៅសល់ពីលើតែម្ខាងអាងត្រតាកឃើញ៖ A- ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃ១/៥ B -ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃទាំង៣/៥ C -ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃទាំង៤/៥ D-ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃទាំង៥/៥	A
253	ឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីវាយតម្លៃការសំរាលតាមក្រោមមិនបាន បើស្ទាបផ្នែកក្បាលនៅសល់ពីលើតែម្ខាងអាងត្រតាកឃើញ៖ A- ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃ០/៥ B -ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃទាំង១/៥ C -ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃទាំង២/៥ D-ស្មើប្រវែងទទឹងនៃម្រាមដៃទាំង៤/៥	D
254	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលតើឆ្មបត្រូវយកសញ្ញាជីវិតកត់ត្រាចូលប៉ាតូក្រាហ្វដូចម្តេច? A-រៀងរាល់៣០នាទីម្តង B-រៀងរាល់ ១ ម៉ោងម្តង C -រៀងរាល់ ១ ម៉ោងកន្លះម្តង D -រៀងរាល់ ២ ម៉ោង	D

255	ស្ត្រីសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលមាត់ស្បូនបើកបាន៧ស.ម ក្បាលនៅក្នុងកំរិត៣/៥ ពីលើតែមឆ្អឹងអាងត្រគាក ហើយការកន្ត្រាក់មាន៥ដង ដែលមានរយៈពេលម្តងៗចន្លោះពី២០-៤០វិនាទីតើឆ្លបត្រូវគូសចូល ប៉ាតូក្រាហូដូចម្តេច?	B
	A-គូសជាចំនុច B -គូសជាឆ្នូត C -គូសជាខ្វែង D -គូសជាផាត់ពណ៌ខ្មៅ	
256	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលមាត់ស្បូនបើកបាន៨ស.ម ក្បាលនៅក្នុងកំរិត៣/៥ ពីមាត់ឆ្អឹងត្រគាកហើយការកន្ត្រាក់មាន៥ដង/១០នាទី ដែលមានរយៈពេល ម្តង ៗ លើស៤០វិនាទីតើឆ្លបត្រូវគូសចូល ប៉ាតូក្រាហូដូចម្តេច?	D
	A -គូសជាចំនុច B -គូសជាឆ្នូត C -គូសជាខ្វែង D -គូសជាផាត់ពណ៌ខ្មៅ	
257	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលមាត់ស្បូនបើកបាន៣ស.ម ក្បាលនៅក្នុងកំរិត៤/៥ ពីមាត់ឆ្អឹងត្រគាកហើយការកន្ត្រាក់មាន៣ដង/១០នាទី ដែលមានរយៈពេលម្តងៗតិចជាង ២០វិនាទីតើឆ្លបត្រូវគូសចូល ប៉ាតូក្រាហូដូចម្តេច?	A
	A -គូសជាចំនុច B-គូសជាឆ្នូត C -គូសជាខ្វែង D -គូសជាផាត់ពណ៌ខ្មៅ	
258	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលទឹកភ្លោះមិនទាន់បែកតើឆ្លបធ្វើការបំបែកទឹកភ្លោះនៅពេលណា?	D
	A -រយៈពេលសកម្ម B -រយៈពេលឃឹត C -ពេលស្បូនបើកអស់ D -ទុកឲ្យស្រោមទឹកភ្លោះបែកដោយខ្លួនឯង	

259	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលទឹកភ្លោះមិនទាន់បែកគឺឆ្លុះបញ្ចាំងស្រទាប់ធ្វើការបំបែកទឹកភ្លោះនៅពេល? A -រយៈពេលសកម្ម B -រយៈពេលឈឺត C -ពេលស្បូនបើកអស់ D -គ្រប់ពេលដែលស្ត្រីឈឺពោះ	B
260	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ មានការបែកទឹកភ្លោះមុន ឈឺពោះសម្រាលគឺឆ្លុះបញ្ចាំងធ្វើដូចម្តេច? A -ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ក្រោយពេលឃើញទឹកភ្លោះបែកពី៣ម៉ោងឬលើស B -ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ក្រោយពេលឃើញទឹកភ្លោះបែកពី៤ម៉ោងឬលើស C ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ក្រោយពេលឃើញទឹកភ្លោះបែកពី៥ម៉ោងឬលើស D -ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ក្រោយពេលឃើញទឹកភ្លោះបែកពី៦ម៉ោងឬលើស	D
261	ស្ត្រីឈឺពោះសម្រាលម្នាក់ ដោយផ្ទៃពោះមានអាយុតិចជាង៣៧សប្តាហ៍ គឺឆ្លុះបញ្ចាំងធ្វើការថែទាំដូចម្តេច? A -ថែទាំដូចការសម្រាលកូន មិនគ្រប់ខែ B-ថែទាំដូចការសម្រាលកូន លើសខែ C-ថែទាំដូចការសម្រាលកូន មិនគ្រប់លក្ខណៈ D-ថែទាំដូចការសម្រាលកូន ធម្មតា	A
262	គឺឆ្លុះបញ្ចាំងធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដឹងថាទឹកភ្លោះមានច្រើន? A-ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយគោះលើពោះ B-ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយស្ទាបលើពោះ C-ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយស្ទាបលើពោះពេលស្បូនកន្ត្រាក់ D-ដាក់ប្រអប់ដៃនៅចំហៀងពោះម្ខាងហើយគោះនៅចំហៀងពោះទៀត	D
263	ស្ត្រីសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាល នៅពេលឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញព្រោះនោមឡើងប៉ោងខ្លាំង គឺទឹកនោមពេញនោមឡើងអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដល់ការសម្រាល? A-ការកន្ត្រាក់នៃស្បូនមានសភាពខ្លាំង B-ការកន្ត្រាក់នៃស្បូនមានសភាពខ្សោយ C-ការឈឺពោះសម្រាលត្រូវអូសបន្លាយ D-មានធ្លាក់ឈាមមុនពេល សម្រាល	C

264	ពេលឈឺពោះសម្រាល តើឆ្មបត្រូវណែនាំពី ស្ថានភាពរបស់ស្រ្តីយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីសម្រួលដល់ការបើកមាត់ស្បូន ? A - ដេកផ្អៀង ដោយកល់ត្រង់ជើង ឬកល់ត្រង់ខ្នងដើម្បីឲ្យផ្នែកលើដងខ្លួនខ្ពស់ B- ដេកជ្រាបមុខដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនាំឈាមទៅចិញ្ចឹមទារកស្រួល C- ដេកផ្តាប់មុខដើម្បី ងាយស្រួលដល់ការលូតចុះនៃទារក D- ដេកផ្អៀងធម្មតាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនាំឈាមទៅចិញ្ចឹមទារកស្រួល	A
265	ស្រ្តីកូនដំបូងចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលដោយមានការកន្ត្រាក់ស្បូន ក្នុងរយៈពេល តើមាត់ស្បូនមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច? A - មាត់ស្បូនចាប់ផ្តើមរួញខ្លី B- មាត់ស្បូនរីកប៉ោងធំ C- មាត់ស្បូន រួញខ្លី និងបើក D- មាត់ស្បូនស្តើង និងបើក	A
266	ស្រ្តីកូនច្រើនដងចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលដោយមានការកន្ត្រាក់ស្បូន ក្នុងរយៈពេលសកម្ម តើមាត់ស្បូនមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច? A - មាត់ស្បូនចាប់ផ្តើមរួញខ្លី B- មាត់ស្បូនរីកប៉ោងធំ C- មាត់ស្បូន រួញខ្លី និងបើក D- មាត់ស្បូនស្តើង និងបើក	C
267	ដើម្បីសន្មត់ថាការឈឺពោះសម្រាលពិត តើឆ្មបត្រូវដឹងពីសញ្ញាគ្លីនិកយ៉ាងដូចម្តេច? A - ឈឺពោះគតិអាយុលើស១៨សប្តាហ៍មានឈាមធ្លាក់ឈាមតិចៗលាយរំអិល B- ឈឺពោះបាត់ៗគតិអាយុលើស២៥សប្តាហ៍ C- ឈឺពោះគតិអាយុលើស២៥សប្តាហ៍មានឈាមធ្លាក់ឈាមតិចៗលាយរំអិល D- ឈឺពោះគតិអាយុលើស៣៨សប្តាហ៍មានឈាមធ្លាក់តិចៗលាយរំអិល	D

268	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឈឺពោះសម្រាលនៅក្នុងរយៈសកម្មគំនូសដៅនៃការបើកមាត់ស្បូនស្ថិតនៅលើឬនៅខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន នៅលើប៉ាតូក្រាហ្វ តើការឈឺពោះសម្រាលដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេច? A -ឈឺពោះសម្រាលធម្មតា B -ឈឺពោះសម្រាលអ្វីយបន្លាយ C -ឈឺពោះសម្រាលវះកាត់ D-ឈឺពោះសម្រាលបញ្ជូន	A
269	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យឈឺពោះសម្រាលនៅក្នុងរយៈសកម្មគំនូសដៅនៃការបើកមាត់ស្បូនស្ថិតនៅលើឬនៅខាងស្តាំនៃបន្ទាត់សកម្មភាពនៅលើប៉ាតូក្រាហ្វតើឆ្លុបត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? A -ធ្វើការសម្រាលធម្មតា B -ធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ C -ទុកតាមដានសិន D- រង់ចាំការបញ្ជូន	B
270	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមណ្ឌលសុខភាព ពុំមានសំភារៈគ្រប់គ្រាន់ មើលតាមប៉ាតូក្រាហ្វ រយៈសកម្ម គំនូសដៅនៃការបើកមាត់ស្បូន ឆ្លងកាត់ទៅខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A - ស្ត្រីសម្រាលធម្មតានៅមណ្ឌលសុខភាព B - រង់ចាំរហូតមាត់ស្បូនបើកអស់ C - ឈឺពោះសម្រាលផ្តល់អុកស៊ីតូស៊ីន D- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យ	D
271	ស្ត្រីចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដែលមានសំភារៈគ្រប់គ្រាន់ មើលតាមប៉ាតូក្រាហ្វ រយៈសកម្ម គំនូសដៅនៃការបើកមាត់ស្បូន ឆ្លងកាត់ទៅខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A - រង់ចាំតាមដានការសម្រាល B - តាមដាន រហូតមាត់ស្បូនបើកអស់ C - វាយតម្លៃឡើងវិញនិងរកមូលហេតុនៃការឈប់វិវត្តន៍ D- តាមដានការកន្ត្រាក់នៃស្បូន	C

272	ស្រ្តីឈឺពោះសម្រាល បានប្រើអុកស៊ីតូស៊ីនក្នុងសេរ៉ូមលើស៨ម៉ោងហើយ តែរយៈសកម្មនៅមិនមានការវិវត្តន៍ទៅមុខ តើឆ្លុបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A - រង់ចាំតាមដានការសម្រាល B - តាមដាន រហូតមាត់ស្បូនបើកអស់ C - វាយតំលៃឡើងវិញនិងរកមូលហេតុនៃការឈប់វិវត្តន៍ D- បញ្ជូនទៅកន្លែងវះកាត់	D
273	ស្រ្តី ក ឈឺពោះសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលកំពុងប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន តើឆ្លុបត្រូវតាមដានចង្វាក់បេះដូងទារកដូចម្តេច? A -រៀងរាល់១០នាទីម្តង B -រៀងរាល់ ២០នាទីម្តង C -រៀងរាល់ ៣០ នាទីម្តង D -រៀងរាល់ ៤០ នាទីម្តង	C
274	ស្រ្តីឈឺពោះសម្រាល តើឆ្លុបធ្វើការលូកពិនិត្យទ្វារមាសដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបើកមាត់ស្បូនញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? A- រៀងរាល់១ម៉ោងម្តង B -រៀងរាល់ ២ម៉ោង ម្តង C -រៀងរាល់ ៣ ម៉ោងម្តង D -រៀងរាល់ ៤ម៉ោងម្តង	D
275	ពេល បញ្ចូលសេរ៉ូមដែលមានអុកស៊ីតូស៊ីនដល់ស្រ្តីឈឺពោះសម្រាល ហើយ មានការកន្ត្រាក់ស្បូនខ្លាំង ហួស តើអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាអ្វី? A -មាត់ស្បូនដូចជារូញខ្លី B -មាត់ស្បូនបើកបានល្អ C-ចង្វាក់បេះដូងទារកខ្សោយ D-ចង្វាក់បេះដូងទារកធម្មតា	C

276	តាមប៉ាត្រាហ្វូបើកនូវសំណើមាត់ស្បូនឈានចូលដល់បន្ទាត់សកម្មភាព ឆ្លុះត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយជំរុញល្បឿនការឈឺពោះសម្រាល តើត្រូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីមុននិងប្រើអុកស៊ីតូស៊ីនលាយជាមួយសេរ៉ូម?	C
	A -ពិនិត្យការបើកមាត់ស្បូន B -ពិនិត្យការកន្ត្រាក់ស្បូន C -ការបំបែកទឹកភ្លោះ D -ពិនិត្យសភាពទឹកភ្លោះ	
277	ឆ្លុះបង្រៀនស្ត្រីពេលឈឺពោះសម្រាលឲ្យអនុវត្តលំហាត់ពីការបន្ធូររាងកាយ និងបន្ធូរអារម្មណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃដោយ៖	A
	A. អោយស្ត្រីអង្គុយ ឬដេកនៅក្នុងឥរិយាបថដ៏ស្រួលមួយ ដៃគូត្រូវអង្គុយទល់មុខគាត់ B. អោយស្ត្រីអង្គុយ ឬឈរនៅក្នុងឥរិយាបថដ៏ស្រួលមួយ ដៃគូត្រូវអង្គុយទល់មុខគាត់ C. អោយស្ត្រីដើរ ឬឈរនៅក្នុងឥរិយាបថដ៏ស្រួលមួយ ដៃគូត្រូវឈរទល់មុខគាត់ D. អោយស្ត្រីអង្គុយ ឬដើរនៅក្នុងឥរិយាបថដ៏ស្រួលមួយ ដៃគូត្រូវឈរទល់មុខគាត់	
278	វិធីល្អបំផុតនៃការបង្រៀនទៅស្ត្រីជាមាតា និង ដៃគូជំនួយពីរបៀបស្ថាបអង្គលពេលឈឺពោះសំរាល ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចខ្លះនៃការស្ថាបអង្គលដែលមានប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រី លើកលែងតែ ៖	D
	A. ស្ថាបយ៉ាងខ្លាំងឬ ថ្មមៗ និងដោយស្ងប់ស្ងៀមទៅលើដងខ្លួន ក្នុងរយៈពេលនៃការកន្ត្រាក់ស្បូន B. ធ្វើម៉ាស្សាជ្រាលជ្រៅដោយដាក់ប្រេងបន្តិច នៅចន្លោះពេលនៃការកន្ត្រាក់ស្បូន C. គ្របក្រណាត់ក្តៅ ឬ គ្របដាក់លើផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្នង ឬលើពោះនិងលើថ្ងាសរបស់ស្ត្រី D. ស្ថាបឬតប យ៉ាងខ្លាំងនិងដោយស្ងប់ស្ងៀមទៅលើចង្កេះ ក្នុងរយៈពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់	
279	រយៈពេលនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនក្នុងពេលឈឺពោះសំរាល ឆ្លុះគួរតែធ្វើនូវឥរិយាបថណៗ ជួយស្ត្រីដើម្បីបន្ធូរការឈឺពោះ។ ចំណែកទាំង៣ខាងក្រោមត្រឹមត្រូវ លើកលែងតែ៖	A
	A. ឲ្យស្ត្រីដេកផ្ទាល់ B. ឲ្យស្ត្រីដើរឬ ឈរ C. ឲ្យស្ត្រីអង្គុយ កាច់ចង្កេះ D. ឲ្យស្ត្រីពត់ខ្នងទៅមុខ ទៅក្រោយ	

280	ក្រោយពីសំរាលកូនរួច ស្ត្រីបានសួរទៅឆ្លបថា តើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ត្រូវមកទទួលសេវាពន្យារកំណើត? ឆ្លបឆ្លើយថា: A. ភ្លាមៗក្រោយសំរាល B. ៤ សប្តាហ៍ ក្រោយសំរាល C. ៦សប្តាហ៍ក្រោយសំរាល D. ១២ សប្តាហ៍ក្រោយសំរាល	C
281	ដើម្បីជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ក្នុងការបង្កូរកំលាំងសំពាធសង្កត់ពីលើចុះក្រោម តើឆ្លបត្រូវឲ្យស្ត្រីលើកជើងយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនមានការហើម? A. លើកជើងស្ត្រីបន្តិច B. លើកជើងស្ត្រីឲ្យខ្ពស់ជាងក្រលៀន C. ដាក់ជើងស្ត្រីចុះក្រោម D. ដាក់ជើងស្ត្រីឲ្យត្រង់	B
282	តើករណីណាមួយដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមកជួបវិញជាបន្ទាន់មុនថ្ងៃណាត់ជួប? A. ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស B. នោមញឹក C. ទារកកំរើកខ្លាំងៗ D. ដេកមិនសូវលក់	A
283	អនុសាសន៍បានផ្តល់ថា ស្ត្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយធ្វើចលនាដោយសេរី នៅតំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសំរាល ។ ចំណេះខាងក្រោមគឺជាសារៈប្រយោជន៍នៃការលើកទឹកចិត្តនៅតំណាក់កាលនេះ លើកលែងតែ: A. ការកន្ត្រាក់ស្បូនមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយ ផ្លូវបញ្ចេញទារករីកធំ B. តំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសំរាលមានរយៈពេលខ្លីជាង C. លទ្ធផលរបស់ទារកទើបនឹងកើតកាន់តែល្អ D. សុភវេជ្ជចេញពីជញ្ជាំងស្បូន	D

284	ក្រោយពីឆ្លងកាត់បទបង្ហាញ ស្តីពីផលរំខាននៃការផលិតអុកស៊ីតូស៊ីន តើចំណេះដឹងណាមួយដែលឆ្លងកាត់ ថានិស្សិត ក មិនសូវយល់ច្បាស់? ដោយគាត់ឆ្លើយថា អាច A.ធ្វើការកាត់ទ្វារមាស និងការទំលាក់សុកដោយដៃ B.ធ្វើការបំបែកទារកពីម្តាយក្រោយសំរាល C.មានការភ័យខ្លាចពេលឈឺពោះសំរាល D.មានការព្រួយបារម្ភរបស់ម្តាយពីស្ថានភាពកូនក្រោយសំរាល	A
285	ស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះ៣៨សប្តាហ៍ ហើយមាត់ស្បូនបើកបាន៧ស.ម ក្បាលទារកចុះត្រឹម+ 1។ តើឆ្លងកាត់ធ្វើអ្វីបន្ទាប់ នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានប្រាប់ទៅគាត់ថា “ខ្ញុំដូចជាចង់អោយ ប្រឹង” ? A.ប្រាប់ស្ត្រីអោយប្រឹងបើសិនជាគាត់ចង់អោយប្រឹង B.លើកទឹកចិត្តអោយគាត់ដកដង្ហើមចេញអោយវែងៗ រាងដូចផ្លុំភ្លើង C.ប្រាប់ស្ត្រីអោយដើរដើម្បីជំនះនូវការចង់អោយប្រឹង D.បង្កើននូវតំណក់ស្បែក និងអុកស៊ីសែននៅពេលនេះ	B
286	ស្ត្រីកូនដំបូងម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងតំណក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាល អស់រយៈពេល១ម៉ោងហើយ តើឆ្លងកាត់ណាមួយស្ត្រីដូចម្តេចក្នុងតំណក់កាលនេះ? A.ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពស្ត្រី B.ព្យាយាមឲ្យស្ត្រីដកដង្ហើមវែងៗ C.ឲ្យស្ត្រីសម្រាកពេលស្បូនឈប់កន្ត្រាក់ D. ផ្តល់ជាតិទឹកដល់ស្ត្រី	C
287	ស្ត្រីម្នាក់ចូលសម្រាកពេទ្យដោយស្បូនបើកបាន ១០ស.ម។ ក្នុងតំណក់កាលនេះឆ្លងកាត់ត្រូវ តាមដាន និងកត់ត្រាចង្វាក់បេះដូងទារករៀងរាល់: A.៦០នាទីម្តង B.៣០នាទីម្តង C.១៥ នាទីម្តង D.មុនពេលស្បូនកន្ត្រាក់ម្តងៗ	C

288	ឆ្លបកំពុងថែទាំស្ត្រីម្នាក់ក្នុងពេលឈឺពោះសម្រាល។ ឆ្លបបានកំណត់ថាស្ត្រីនេះចាប់ផ្តើមចូលក្នុងតំណាក់កាលទី២ នៃការឈឺពោះសម្រាលដោយ៖ A. ការកន្ត្រាក់នៃស្បូនទៀងទាត់ B. មាត់ស្បូនបើកអស់ C. ស្រោមទឹកភ្លោះបានបែក D. មានការធ្លាក់រំអិលទឹកព្រៃតាមទ្វារមាស	B
289	ស្ត្រីម្នាក់ស្ថិតក្នុងវគ្គសកម្មតំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសម្រាល។ ឆ្លបបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឃើញថាមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីនេះមានការបើកយឺត តើឆ្លបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ? A. ផ្តល់អុកស៊ីហ្សែនតាមម៉ាស់ B. ឲ្យស្ត្រីដេកថ្ងារ C. ផ្តល់អុកស៊ីតូស៊ីនតាមសរសៃ D. កត់ត្រានៅរាល់អ្វីដែលបានតាមដាន	A
290	ស្ត្រីម្នាក់អាយុ ៥២ ឆ្នាំ បានប្រាប់ទៅឆ្លបពីការមករដូវចុងក្រោយរបស់គាត់កាលពី ៣ខែមុន។ គាត់បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាដែលចង្វាក់បេះដូងលោតមិនទៀងទាត់ និង មានអារម្មណ៍ ក្តៅក្រហលក្រហាយ នៅលើមុខ និងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់។ តាមរយៈរោគសញ្ញាដែលគាត់បានរៀបរាប់អ្នកសង្ស័យថាគាត់មានបញ្ហា៖ A. មហារីកស្បូន B. ដុំពកក្នុងសាច់ដុំនៃស្បូន C. ការបង្ករោគ D. ការអស់រដូវ	D
291	ស្ត្រីម្នាក់មានអាយុ ២៣ ឆ្នាំ គាត់បានរៀបការប្រមាណជា ១ឆ្នាំមុន ហើយបានប្រាប់ថាគាត់បានព្យាយាមអោយមានផ្ទៃពោះ។ គាត់បានសួរអ្នកថា តើពេលណាជាពេលសមស្របដែលគាត់នៅជាមួយស្វាមីរបស់គាត់ដើម្បីអាចនឹងមានកូនបាន។ តើយោបល់អ្វីដែលអាចជួយដល់ឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះរបស់គាត់បានប្រសើរឡើង ដោយផុតលំនូវការអប់រំដល់គាត់ពី ពេលនៃការបញ្ចេញពងរបស់អូវុល A. ការបញ្ចេញពងរបស់អូវុលកើតឡើង ១២ថ្ងៃ នៃវដ្តឈាមរដូវ២៨ថ្ងៃ B. ការបញ្ចេញពងរបស់អូវុលកើតឡើង ១៣ថ្ងៃ នៃវដ្តឈាមរដូវ២៨ថ្ងៃ C. ការបញ្ចេញពងរបស់អូវុលកើតឡើង ១៤ថ្ងៃ នៃវដ្តឈាមរដូវ២៨ថ្ងៃ D. ការបញ្ចេញពងរបស់អូវុលកើតឡើង ១៥ថ្ងៃ នៃវដ្តឈាមរដូវ២៨ថ្ងៃ	C

292	និស្សិតម្នាក់បានសួរទៅគ្រូឆ្លើយថា "តើការបង្កកំណើតរបស់អ្នក បានកើតឡើងនៅកន្លែងណា?" គ្រូឆ្លើយថា វាបង្កកំណើតនៅ៖ A. ក្នុងអូរ B. មួយភាគបីផ្នែកខាងក្រៅនៃដៃស្បូន C. មួយភាគពីរផ្នែកខាងក្រៅនៃដៃស្បូន D. ខាងក្នុងស្បូន	B
293	ឆ្លើយបានពន្យល់ទៅកាន់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះកូនដំបូងថា ចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃចាប់ផ្តើមមានតាំងពី៖ A. ៤ អាទិត្យនៃរយៈពេលមានគភ៌ B. ៨ អាទិត្យនៃរយៈពេលមានគភ៌ C. ១២ អាទិត្យនៃរយៈពេលមានគភ៌ D. ១៤ អាទិត្យនៃរយៈពេលមានគភ៌	A
294	ឆ្លើយបានសួរប្រវត្តិនិងកត់ត្រាស្រ្តីចូលសម្រាកពេទ្យនៅតំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសម្រាល។ ស្រ្តីនោះបានឆ្លើយថាគាត់មានផ្ទៃពោះកូនទី ៤ ហើយគាត់បានផ្តល់កំណើតកូន ២ ពីមុនមកតើចំឡើយណាមួយដែលឆ្លើយបានកត់ត្រា? A.Gravida 4 para 3 B. Gravida 4 para 2 C.Gravida 3, para 1 D. Gravida 3 para 0	B
295	ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ត្រូវបានគាត់មានការកើនឡើងនៃការបត់ជើងតូច ឆ្លើយបានពន្យល់ទៅគាត់វិញថា ជាធម្មតាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះតែងតែមានការបត់ជើងតូចញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងពេល៖ A. ៣ខែដំបូង និង ខែចុងក្រោយនៃការមានគភ៌ B. ៣ខែដំបូងនៃការមានគភ៌ C. ក្នុងចន្លោះពេល៣ ខែដែលកំពុងមានគភ៌ D. ខែចុងក្រោយនៃការមានគភ៌	A

296	ឆ្លុបកំពុងវាស់សម្ពាធឈាមឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ដែលមានសុខភាពល្អ។ស្ត្រីនោះបានសួរទៅឆ្លុបថាតើគាត់មានកំរិតបរិមាណឈាមកើនឡើងប្រមាណក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ?ឆ្លុបឆ្លើយថា: A. វាកើនឡើងពី 0-10% B. វាកើនឡើងពី 10-20% C. វាកើនឡើងពី 30-45% D. វាកើនឡើងពី 50-70%	C
297	ឆ្លុបបានធ្វើការស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃ នៅពេលដែលស្ត្រីកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរាបស្មើ លើគ្រែ ហើយគាត់បានឮញ័រពីការឈឺចាប់ភ្លាមៗទៅលើកំភួនជើងស្ត្រីរបស់គាត់។ តើការថែទាំណាមួយដែលឆ្លុបគប្បីផ្តល់អោយគាត់? A. ធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើសាច់ដុំកំភួនជើងរបស់គាត់ B. ធ្វើការស្តូទឹកកកទៅលើកំភួនជើងគាត់ C. ធ្វើការសង្កត់ទៅលើបាតជើងខាងស្តាំ ព្រមទាំងសង្កត់ទៅជង្គង់ចុះក្រោម D. ផ្តល់ដំណឹងទៅវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់	C
298	ក្នុងពេលថែទាំស្ត្រីមានគភ៌កូនភ្លោះ ឆ្លុបកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ត្រីនោះមានការកើនឡើងនូវ: A. ទំហំធំនៃដោះ B. សារធាតុរាវពីទ្វារមាស C. ការបង្កពេកតាមប្រព័ន្ធទឹកនោម D. ការរីកប៉ោងសរសៃឈាមវ៉ែន	D
299	ឆ្លុបកំពុងពន្យល់ទៅស្ត្រី ដែលមានគភ៌កូនភ្លោះពីកត្តាមួយដែលបណ្តាលអោយគាត់កើនឡើងនូវគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតកូនមិនគ្រប់ខែនោះដោយសារ: A ការបង្កពេកតាមប្រព័ន្ធនោមជារឿយៗ B. ការបង្កពេកតាមទ្វារមាសជារឿយៗ C. ការឡើងទំងន់ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងតែមានគភ៌ D. បរិមាណនៃទឹកភ្លោះច្រើនលើសពីធម្មតា	D

300	ស្ត្រីម្នាក់បានគ្លីញផ្តើរពី ការវិលមុខ និង ក្អិតចង្កោរ ក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃគភ៌។ តើឆ្លុបបានផ្តល់ ដំបូន្មានដល់គាត់យ៉ាងដូចម្តេច? A. ផឹកទឹកដោះគោរៀងរាល់ព្រឹកមុនពេលក្រោកចេញពីគ្រែ B. មិនអនុញ្ញាតអោយបរិភោគនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍វិលមុខ ចង់ក្អិតឡើយ C. បរិភោគអាហារតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ D. បរិភោគអាហារដែលមានសារជាតិកាបូនអ៊ីដ្រាត មុនពេលព្រឹកពេលក្រោកពីដំណេក	D
301	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់សួរទៅឆ្លុបថា តើមូលហេតុចម្បងអ្វីដែលបណ្តាលអោយមានការហូរឈាមតាមទ្វារមាសក្នុងរយៈពេល ២ខែដំបូង? ឆ្លុបឆ្លើយថា វាបណ្តាលមកពី៖ A. រលូតកូនដោយឯកឯង និង មានកូនក្រៅស្បូន B. មហារីកស្បូន C. ដុំសាច់ក្នុងស្បូន D. គភ៌កូនពង	A
302	ស្ត្រីម្នាក់កំពុងមានផ្ទៃពោះ ៩ខែ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដេករាបលើគ្រែ គាត់មានភាពស្លេកស្លាំង និង បែកញើស។ ការថែទាំដំបូងបង្អស់របស់ឆ្លុបគប្បី៖ A. ស្លាប់ទៅលើពោះសំរាប់ការកន្ត្រាក់ស្បូន B. ប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការឆ្លាយនៃស្បូន C. ផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិត D. ផ្ទៀងអ្នកជម្ងឺទៅខាងឆ្វេង	D
303	តើចំណុចខាងក្រោមមួយណាដែលឆ្លុបកំណត់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មានជំងឺបំប្រុងក្រឡាភ្លើង៖ A. ការនោមញឹកញាប់ B. ស្ករក្នុងឈាម C. ប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោម D. ការកើនឡើងនៃសម្ពាធឈាម	C

304	ស្ត្រីម្នាក់អាយុ ២៥ឆ្នាំ កំពុងមានគភ៌បានផ្តល់ដំណឹងថាគាត់មានការហូរឈាមពណ៌ក្រហមស្រស់ ប៉ុន្តែគ្មានការឈឺចាប់ទេ។ រោគវិនិច្ឆ័យដែលឆ្លងប៉ាន់ប្រមាណគឺ: A. ការសល់សុកក្នុងស្បូន B. សុកពាំងមាត់ស្បូន C. សុករបេះមុនកូនកើត D. ការបែកស្រោមទឹកភ្លោះ	B
305	ក្នុងអំឡុងពេលអប់រំសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឆ្លងបានធ្វើការណែនាំដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានសុខភាពល្អធម្មតាថា ស្ត្រីមិនគប្បីនឹងធ្វើ: A. ការរួមភេទ B. ធ្មេញ C. ការហែលទឹក និង ដើរលំហាត់ប្រាណ D. សូណា និង ស្ទីម	D
306	ក្នុងពេលថែទាំស្ត្រី ឈឺពោះសម្រាល ឆ្លងបានកំណត់ថា ស្ត្រីចាប់ផ្តើមស្ថិតនៅក្នុងតំណាក់កាលទី១ នៃការឈឺពោះសម្រាលដោយ: A. មានការកន្ត្រាក់ និង ឈឺពោះទៀងទាត់ B. មាត់ស្បូនបើកអស់ C. មានការបែកស្រោមទឹកភ្លោះ D. មានការសម្រាលនៃទារក	A
307	ក្នុងការថែទាំស្ត្រីពេលឈឺពោះសម្រាល ឆ្លងស្គាល់ថាការកន្ត្រាក់នៃស្បូនបានចាប់ផ្តើម នឹង បញ្ចប់ទៅវិញនោះគឺជា: A. កម្រិតនៃសកម្ម B. ភាពញឹកញាប់ C. ចន្លោះពេល D. រយៈពេល	D

308	ឆ្លបម្នាក់បានធ្វើការស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃ ពេលដែលម្តាយកំពុងតែចាប់ផ្តើមឈឺពោះសម្រាល។ ដោយចង្វាក់បេះដូងទារកឮនៅខាងលើនៃផ្ទៃត្រង់។ ឆ្លបបានសន្មត់ថាទារកស្ថិតក្នុងទំរង់៖ A. បង្ហាញបណ្តាស់ជើង B. បង្ហាញមុខ C. បង្ហាញអុកស៊ីពីត D. បង្ហាញថ្ងាស	A
309	ឆ្លបបានកំណត់ថាស្ត្រី ក ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ នៃការសម្រាលបានបញ្ចប់ដោយ៖ A. មាត់ស្បូនបើកអស់ B. ការបែកស្រោមទឹកភ្លោះ C. ការសម្រាលកូន D. ការទំលាក់សុក្រូច	D
310	ឆ្លបបានកំណត់ថាស្ត្រី ខ បិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២នៃការសម្រាលបានបញ្ចប់ដោយ៖ A. មាត់ស្បូនបើកអស់ B. ការបែកស្រោមទឹកភ្លោះ C. ការសម្រាលកូន D. ការទំលាក់សុក្រូច	C
311	ស្ត្រីម្នាក់បានចូលមកគ្លីនិកប្រាប់អ្នកថា រដូវគាត់បាត់២សប្តាហ៍ហើយ រួចគាត់បានធ្វើតេស្តទឹកនោម ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការមានផ្ទៃពោះ លទ្ធផលចេញមកគឺវិជ្ជមាន។ ក្នុងពេលស្ទាបពោះការរកឃើញដែលឆ្លបនោះរំពឹងទុកនោះគឺ៖ A. មិនអាចប៉ះស្បូនពេលដែលស្ទាបពោះ B. អាចស្ទាបប៉ះចំស្បូននៅកំពស់ ៣ស.ម ពីលើថ្ងាស C. អាចស្ទាបប៉ះចំស្បូននៅកំពស់ ៦ស.ម ពីលើថ្ងាស D. អាចស្ទាបប៉ះចំស្បូននៅកំពស់ ៩ស.ម ពីលើថ្ងាស	A

312	ឆ្លុះបញ្ចាំងការគ្រប់គ្រងស្ត្រីក្នុងដំណាក់កាលទី៤នៃការសម្រាល លើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសញ្ញាមានសុខភាពល្អគឺ: A.ស្ត្រីមិនមានឆ្លាក់ឈាម B.ស្ត្រីមានឆ្លាក់ឈាមតិចតួច (ដូចមករដូវ) C.ស្ត្រីមានឆ្លាក់ឈាមមធ្យម D.ស្ត្រីមានឆ្លាក់ឈាមខ្លាំង	B
313	ឆ្លុះបញ្ចាំងការគ្រប់គ្រងស្ត្រីក្នុងដំណាក់កាលទី៤នៃការសម្រាល លើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសញ្ញាមានគ្រោះថ្នាក់គឺ: A.ស្ត្រីមានគ្រុនក្តៅ ធុញថប់ B.ស្ត្រីមានឈឺក្បាល C.ស្ត្រីមាន ជំងឺចរដើរលឿន ស្បូនទន់ D.ស្ត្រីមានទឹកមុខស្លេកស្លាំង	C
314	ដើម្បីការពារការឆ្លាក់ឈាមខ្លាំងក្លាដល់ម្តាយនៅដំណាក់កាលទី៤ ឆ្លុះបញ្ចាំងការតាមដានដូចម្តេច? A.តាមដានក្នុង២ ទៅ ៣ម៉ោងក្រោយសំរាល B.តាមដានក្នុង៣ ទៅ ៤ម៉ោងក្រោយសំរាល C.តាមដានក្នុង៤ ទៅ ៥ម៉ោងក្រោយសំរាល D. តាមដានក្នុង៦ ទៅ ៨ម៉ោងក្រោយសំរាល	A
315	ដើម្បីការពារការឆ្លាក់ឈាមខ្លាំងក្លាដល់ម្តាយនៅដំណាក់កាលទី៤នៃការសម្រាល ឆ្លុះបញ្ចាំងការសង្កត់ទៅលើស្បូនថ្មមៗដើម្បី: A.ឲ្យកំទេចសុកឆ្លាក់អស់ B.ឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់ល្អ C.បញ្ចេញនូវកំណកឈាម D.កាត់បន្ថយការហូរឈាម	C

316	ក្រោយសំរាលកូនរួចឆាប់លើកទឹកចិត្តម្តាយឲ្យបំបៅដោះកូនដើម្បីជួយរាងកាយស្រ្តី: A.បន្ថយការធ្លាក់ឈាម B.បង្កើតអុកស៊ីតូស៊ីន C.ធ្លាក់ទឹកអំពិលឆាប់អស់ D.បង្កើនភាពស្មិតស្មាលម្តាយនិងកូន	B
317	ក្រោយសំរាលកូនរួចឆាប់ធ្វើការល្បិចម្តងៗ និងពិនិត្យទៅលើស្បូនស្រ្តី រៀលរាល់ : A.១ ទៅ ២នាទីម្តង B.២ ទៅ ៣នាទីម្តង C.៣ ទៅ ៤នាទីម្តង D.៤ ទៅ ៥នាទី ម្តង	A
318	របៀបសំអាតសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្រ្តីក្រោយសំរាលកូនរួចឆាប់៖ A.លាងសំអាតរន្ធកូចពីក្រោមឡើងលើ B.លាងសំអាតរន្ធកូចលើចុះក្រោម C.លាងសំអាតទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម D.លាងសំអាតទ្វារមាសពីក្រោមឡើងលើ	C
319	ក្រោយពេលសម្រាល ឆាប់ផ្តល់ប្រឹក្សាចំពោះស្រ្តីពីអនាម័យខ្លួនប្រាណ ការឆាប់ក្រោកឈរ និងដើរដើម្បីជួយឲ្យ: A.កន្ត្រាក់ស្បូនបានល្អ B.ឆាប់ឈឺបត់ជើងតូច C.ឆាប់ឃ្លានអាហារ D.ស្បូនចុះមកធម្មតាវិញ	A
320	ស្រ្តីកូនដំបូងម្នាក់កំពុងបិតក្នុងតំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាល គាត់ប្រឹងបញ្ចេញទារកអស់រយៈពេលជិតមួយម៉ោងហើយ ដោយទ្វារមាសតូចចង្អៀតពេក ឆាប់សម្រេចធ្វើការកាត់ទ្វារមាសដើម្បីជួយឲ្យ: A. ទ្វារមាសបើកធំសំរាប់ជួយសំរួលដល់ការឆ្លងកាត់របស់ទារក B. ទ្វារមាសបើកធំសំរាប់ជួយសំរួលដល់ការបារាយកសុក C. ម្តាយមិនបាច់ប្រឹងបញ្ចេញទារកយូរ D. ទ្វារមាសកុំឲ្យដាច់ស្តុកស្តាញ	A

321	ឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យបានច្បាស់ប្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះថា កត្តាគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ចំពោះការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដោយសារការកន្ត្រាក់ស្បូនមិនបានល្អគឺបណ្តាលមកពី៖ A. ស្ត្រីមានគតិច្រើនដង B. ស្ត្រីដឹកស្រាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ C. ស្ត្រីដក់បារីក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ D. ឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងដំណាក់កាលទី២	A
322	ក្នុងពេលអប់រំសុខភាពក្រោយសម្រាល ឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យបានច្បាស់ប្រាប់ស្ត្រីថា មូលហេតុនៃការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដោយសារស្បូនកន្ត្រាក់មិនបានល្អ អាស្រ័យទៅលើ ៖ A. សុកពាំងមាត់ស្បូន B. មានការហូរឈាមច្រើន C. សុកធ្លាក់ ឬ ជាប់នៅក្នុងស្បូន D. សុករបេះមុនកូនកើត	C
323	មុនពេលបញ្ជូនស្ត្រីធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ឆ្លុះបញ្ជូនធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម លើកលែងតែ៖ A. ម៉ាស្សាស្បូន B. ដាក់សុងទឹកនោម C. ប្រើ Oxytocin 10UI ចាក់តាមសាច់ដុំ D. អប់រំស្ត្រីពីការថែទាំក្រោយសម្រាល	D
324	ការថែទាំស្ត្រីធម្មតា នៅចន្លោះថ្ងៃទី១ក្រោយសម្រាល ឆ្លុះបញ្ជូនឃើញថាទឹករំអិល(Lochia)ស្ត្រី មាន៖ A. ពណ៌ក្រហម B. ពណ៌ក្រហមព្រៀងៗ C. ពណ៌ក្រហមក្រមៅ D. ពណ៌ត្នោត	A

325	តើឆ្មបត្រូវពិនិត្យដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រាកដថាការធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាលបណ្តាលមកពីការដាច់រំហែកទ្វារមាស ? A. វែកមើលតំបន់ទ្វារមាស B. សង្កត់ថ្មមៗលើ ជញ្ជាំងទ្វារមាស C. យកស្បែកផ្តិតលើទ្វារមាស D. ដាក់តាំប៉ុងចូលក្នុងទ្វារមាស	B
326	ក្រោយសំរាលកូនរួច ករណីដែលស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការបញ្ចេញទឹកនោម ឆ្មបអាចជួយគាត់បានដោយ: A. ឲ្យស្ត្រីអង្គុយត្រាំទឹកក្នុងបានក្លាំ B. ចាក់ទឹកត្រជាក់លើសរីរាង្គបន្តពូជរបស់គាត់ C. ចាក់ទឹកក្តៅខ្លះៗលើសរីរាង្គបន្តពូជរបស់គាត់ D. ដាក់ទឹកកកស្អំលើល្មោកនោម	C
327	ក្រោយពីទំលាក់សុក និងម៉ាស្សាស្បូនរួច ឆ្មបត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយថ្មមៗទៅលើសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្ត្រីដោយរកមើល: A. ថាតើល្មោកនោមស្ត្រីមានទឹកនោមឬអត់ B. ថាតើមានសល់កំទេចសុកឬ អត់ C. សភាពឈាមដែលហូរចេញតាមទ្វារមាស D. ការដាច់រំហែក មានដុំឈាមឬ កំណកឈាម	D
328	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនដំបូងអាយុ២១ឆ្នាំម្នាក់ មានគភ៌៤០សប្តាហ៍ បានចូលសម្រាកពេទ្យក្នុងដំណាក់កាលសកម្មនៃការឈឺពោះសម្រាល។ មាត់ស្បូននាងបើកបាន ៨សម ហើយក្បាលទារកបានចុះចូលក្នុងផ្ទាំងអាងត្រគាកទាំងស្រុង ត្រង់ទីតាំង ០/៥។ អំឡុងពេលនេះ ការថែទាំជាអទិភាពរបស់ឆ្មបគឺ: A. ពិនិត្យលើល្មោកនោម B. ពិនិត្យពីការដកដង្ហើមញាប់ C. ពន្យល់ពីរបៀបនៃការប្រឹងបញ្ចេញទារក D. គ្រប់គ្រងពីការឈឺពោះសម្រាល	D

329	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនដំបូងម្នាក់ ចូលសម្រាកពេទ្យដោយមាត់ស្បូននាងបើកបាន ២ សម មាត់ស្បូនរួញខ្លីបាន ៥០%។ ស្រោមទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក ហើយការកន្ត្រាក់តែងកើតមានជារៀងរាល់ ៥ទៅ ៦នាទីម្តង។ តើចំណុចខាងក្រោម ណាមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការណែនាំក្នុងពេលនេះ ? A. សម្រាកក្នុងដំណេកផ្អៀងស្តាំ B. សម្រាកក្នុងដំណេកផ្អៀងឆ្វេង C. ដើរទៅវិញទៅមកក្នុងបន្ទប់រងចាំ D. អង្គុយនៅលើកៅអីមានជាសុកភាព ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ	C
330	មុនពេលតាមដានចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអនុវត្តក្បួន Leopold's maneuvers ។ នៅពេលអនុវត្តការស្ទាបតាមក្បួន maneuvers ទី៣ ឆ្លុះបញ្ចាំងដល់ស្ត្រីថា ក្បួននេះត្រូវបានធ្វើដើម្បីកំណត់ពី៖ A. ទម្រង់បង្ហាញរបស់ទារកបានចុះចូលឆ្អឹងត្រជាក់ឬអត់ B. កំពូលស្បូនរបស់ស្ត្រី C. ទម្រង់បង្ហាញបញ្ជាស់ ឬ បង្ហាញក្បាល D. ទីតាំងខ្នងរបស់ទារក	C
331	ក្នុងពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអនុវត្តក្បួន Leopold's maneuvers ។ នៅពេលអនុវត្តការស្ទាបតាមក្បួន maneuvers ទី២ ឆ្លុះបញ្ចាំងដល់ស្ត្រីថា ក្បួននេះត្រូវបានធ្វើដើម្បីកំណត់ពី៖ A. ទម្រង់បង្ហាញរបស់ទារកបានចុះចូលឆ្អឹងត្រជាក់ឬអត់ B. កំពូលស្បូនរបស់ស្ត្រី C. ទម្រង់បង្ហាញបញ្ជាស់ ឬ បង្ហាញក្បាល D. ទីតាំងខ្នងរបស់ទារក	D
332	មុនពេលធ្វើការពន្លឿនការឈឺពោះសម្រាល ឲ្យដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនច្រើនម្នាក់ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចោះបំបែកទឹកភ្លោះ ។ បន្ទាប់ពីការចោះបំបែកទឹកភ្លោះហើយ ជាដំបូងឆ្លុះបញ្ចាំងពី៖ A. តាមដានលំនាំនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនរបស់ស្ត្រី B. តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារករយៈពេល១នាទីពេញ C. ប៉ាន់ប្រមាណកម្ដៅនិងជីពចររបស់ស្ត្រី D. កត់ត្រាពីពណ៌របស់ទឹកភ្លោះ	B

333	ឆ្លុបកំពុងធ្វើការថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនច្រើនម្នាក់ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឈឺពោះសម្រាលសកម្ម ស្ត្រីបានប្រាប់ឆ្លុបថា "ខ្ញុំគិតថាទឹកភ្លោះរបស់ខ្ញុំទើបតែនឹងបែកអំបាញ់មិញនេះ។" តើចំណុចខាងក្រោមទាំងនេះ មួយណាដែលឆ្លុបគួរធ្វើមុនគេ? A. ដាក់ស្រ្តីអោយគេងទៅចំហៀងខាងស្តាំ B. ប៉ាន់ប្រមាណពីពណ៌ បរិមាណ និងក្លិននៃសារធាតុរាវ C. ប៉ាន់ប្រមាណចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារក D. ពិនិត្យមើលពីការបើកមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រី	C
334	ស្ត្រីម្នាក់ចូលសម្រាកពេទ្យ ដោយសង្ស័យថាសុករបេះមុនកូនកើត។ តើឆ្លុបគួរធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណលើស្ត្រីពីសញ្ញានិងរោគសញ្ញាណាមួយខាងក្រោមនេះ ? A. ពោះឡើងវិងហើយឈឺប៉ះមិនបាន B. ធ្លាក់ឈាមដោយមិនមានការឈឺពោះ C. ស្បូនរីកធំ D. ធ្លាក់ឈាមដោយឯកឯង	A
335	ឆ្លុបកំពុងធ្វើការថែទាំដល់ស្ត្រីធ្លាប់មានផ្ទៃពោះច្រើនដងម្នាក់ដោយឲ្យស្ត្រីអង្គុយចោងហោងនៅលើគ្រែ ។ នៅពេលដែលឆ្លុបចូលទៅក្នុងបន្ទប់ស្ត្រី គាត់បានឃើញថាក្បាលទារកបានលូនចេញមកហើយឆ្លុបបានស្រែកហៅរកជំនួយ និងជួយអោយស្ត្រីដេកលើគ្រែ តើសកម្មភាពណាមួយដែលឆ្លុបគួរធ្វើបន្ទាប់មកទៀត? A. ប្រាប់អោយស្ត្រីខំប្រឹងបញ្ចេញកូន ចន្លោះពេលនៃការកន្ត្រាក់ស្បូន B. ផ្ដេកខ្លួនស្ត្រី ហើយ ទ្រក្បាលរបស់ទារកដោយថ្មមៗ C. ទាញស្មារបស់ទារកផ្អែកខាងមុខឡើងលើថ្មមៗ D. ទប់តំបន់ប៉េរីណេការពារការហែកទ្វារមាស	B

336	ស្រ្តី មានផ្ទៃពោះលើកដំបូងម្នាក់ មានគភ៌អាយុ ៣៧សប្តាហ៍ ចូលសម្រាកពេទ្យជាច្រើនថ្ងៃមកហើយ ដោយមានជំងឺបំប្លែងក្រឡាភ្លើងក្នុងសភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ នៅពេលធ្វើការថែទាំដល់ស្រ្តី ឆ្លុបសង្កេតឃើញថា នាងចាប់ផ្តើមប្រកាច់។ តើសកម្មភាពខាងក្រោមនេះ មួយណាដែលឆ្លុប ត្រូវធ្វើមុនគេ ? A. តំឡើងរណាំងគ្រែរបស់អ្នកជំងឺ B. ដាក់អ្នកជំងឺអោយគេងនៅផ្នែកខាងស្តាំដៃ C. ដាក់ប្រដាប់កល់អណ្តាតទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ D. ស្រែកហៅរកជំនួយភ្លាមៗអោយមកកាន់បន្ទប់អ្នកជំងឺ	D
337	ស្រ្តីឈឺពោះសម្រាលម្នាក់បានចូលសម្រាកពេទ្យ មាត់ស្បូនគាត់បើកបាន៧ ស.ម ហើយបានបែកទឹក ភ្លោះ ដោយមានលាយលាមកព្រៃ ឆ្លុបសន្មត់ថានេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទារកកង្វះ : A- អុកស៊ីសែន B- ប្លូតាស្យូម C- ជាតិស្ករ D- កាល់ស្យូម	A
338	ការថែទាំដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឆ្លុបចំពោះស្រ្តីនៅក្នុងពេលឈឺពោះសម្រាលបានជួយ: A- កាត់បន្ថយនូវភាពបារម្ភរបស់ក្រុមគ្រួសារស្រ្តី B- កាត់បន្ថយនូវភាពឈឺពោះសម្រាល C- ទាមទារឲ្យដៃគូរបស់ស្រ្តីនៅក្បែរគាត់ D- ទាមទារឲ្យឆ្លុបតែមួយមានវត្តមានជាមួយស្រ្តី	B
339	ស្រ្តីកូនដំបូងម្នាក់ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាល បានសួរទៅឆ្លុបថា"តើករណីណា ខ្លះដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការកាត់ទ្វារមាស ? " ឆ្លុបឆ្លើយថាការកាត់ទ្វារមាសអាចធ្វើបាន: A- គ្រប់ស្រ្តីទាំងអស់ B- គ្រប់ស្រ្តីដែលមានកូនដំបូងទាំងអស់ C- នៅពេលដែលស្រ្តីជាម្តាយ ឬទារក មានតម្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ D- នៅពេលសម្រាលលើសពីរយៈពេលដែលបានកំណត់	C

340	ចម្លើយទាំង៣ខាងក្រោមគឺជាការទម្លាក់សុកនិងស្រោមទឹកភ្លោះ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវធ្វើឡើងលើកលែងតែ ៖ A- ផ្តល់ថ្នាំពន្លឺនការទម្លាក់សុក B- ស្បូនកន្ត្រាក់បានល្អ C- តម្រង់ទិសពីការចេញនៃសុក D- ធ្វើការលូកបារដោយដៃ	D
341	ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅស្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងតំណក់កាលទី៣នៃការឈឺពោះសម្រាលថា មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការធ្លាក់សុកគឺបណ្តាលមកពី៖ A- ស្ត្រីមានកូនភ្លោះ B- ប្លោកនោមពេញដោយទឹកនោម C- ស្ត្រីមិនបានធ្វើលំហាត់ប្រាណក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ D- ស្ត្រីមានជំងឺក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ	B
342	ក្រោយពេលពន្យល់ពីមេរៀននៃការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលមក ឆ្លុះបញ្ចាំងវាយតម្លៃពី និស្សិតម្នាក់ថា គាត់មានការយល់ច្បាស់ដោយគាត់ឆ្លើយថា " ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលអាចបណ្តាលមកពី"៖ A- ស្បូនខ្វះអុកស៊ីសែន B- ស្បូនកន្ត្រាក់ មិនបានល្អ C- ឈឺពោះសម្រាលយូរ D- បែកទឹកភ្លោះមុនសម្រាលយូរ	B
343	ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅកាន់ស្ត្រីកំពុងឈឺពោះសម្រាលម្នាក់ថា "កត្តាប្រឈមមុខជាងគេដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលគឺកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែល" ៖ A- មានកូនច្រើន B- ស្ត្រីកូនដំបូងដែលមានអាយុច្រើន C- ឈឺពោះសម្រាលមុនកំនត់ D- ស្ត្រីមានប្រវត្តិរ៉ាំរ៉ៃកាត់ពីមុនមក	A

344	ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល តើឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វី ? A- ម៉ាស្សាជួយឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់ B- លូកបារសម្អាតស្បូន C- ពិនិត្យស្មុកឡើងវិញ D- ប៉ាន់ប្រមាណឈាមដែលបាត់បង់	A
345	ឆ្មបបានពន្យល់ទៅកាន់ស្រ្តីឈឺពោះសម្រាលថា "គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងពីការចោះបំបែកទឹកភ្លោះគឺ" A- ទងស្មុកធ្លាក់មកមុន B- ទងស្មុកមានគំនូច C- មានការបួសក្បាលទារក D- ទារកក្នុងផ្ទៃខ្សោយ	A
346	ក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈឺពោះសម្រាលយូរឆ្មបត្រូវ : A- ពិនិត្យទ្វារមាសស្រ្តីរាល់ម៉ោង B- ផ្តល់វិធីសាស្ត្របំបាត់ការឈឺចាប់ដោយមិនប្រើថ្នាំ C- ធានាថាម្តាយមិនខ្វះជាតិទឹក D- តាមដានលំនាំនៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន	C
347	តើចម្លើយខាងក្រោមមួយណាដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកជាងគេរបស់ឆ្មប ក្នុងទម្រង់បង្ហាញអុកស៊ីពីតខាងក្រោយ (occipitoposterior)? A.ឈឺពោះសម្រាលយូរជាមួយនឹងការសម្រាលធម្មតាតាមទ្វារមាស B.ឈឺពោះសម្រាលយូរ ហើយទារកស្ថិតក្នុងទម្រង់មិនធម្មតា C.ទារកកើតក្នុងទម្រង់បង្ហាញមុខទៅរកឆ្អឹងថ្ងាសម្តាយ D.ទម្រង់ទារកក្លាយជាទម្រង់បង្ហាញថ្ងាស	A
348	ពេលជួបអ្នកជំងឺស្មុកដោយសារធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាល តើឆ្មបមានវិធានការណ៍ជាដំបូងអ្វីខ្លះ? A- យកសញ្ញាជីវិត B- រកមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឈាម C- ផ្តល់ជាតិទឹកតាមសរសៃ D- ពិនិត្យទ្វារមាស	C

349	តើឆ្មបត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចម្តេចបន្ទាប់ពីសុកធ្លាក់អស់? A- ឈ្លីស្បូនដើម្បីអោយកំណកឈាមចេញអស់ B- ផ្តល់Ergometrine ដល់ស្រ្តី C- ដាក់ស្ថានភាពស្រ្តីឲ្យមានជាសុកភាព D- ពិនិត្យទ្វារមាសឡើងវិញ	A
350	ប្រសិនបើស្រ្តីកំពុងប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន តើសកម្មភាពណាមួយដែលឆ្មបត្រូវជៀសវាង? A- បញ្ចូលស្បូន B- ផ្តល់ថ្នាំតាមសរសៃ C- ផ្តល់ថ្នាំតាមសាច់ដុំ D- ផ្តល់ថ្នាំតាមមាត់	D
351	ក្រោយពេលសំរាលបើស្រ្តីក្តៅខ្លួន មិនធូរស្រាលហើយឈានចូលដល់ស្តុក តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ចាក់បញ្ចូលស្បូន ឲ្យអុកស៊ីសែន និងបញ្ជូនជាបន្ទាន់ B- ចាក់បញ្ចូលស្បូន និង ពន្យល់អ្នកជំងឺ C- ដាក់អុកស៊ីសែន និង អោយផ្តាំបំបាត់ការក្តៅ D- យកសញ្ញាជីវិត	A
352	ការលូកបារសុកដើម្បីប្រឡេះសុកចេញពីស្បូន តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A- ដៃចាប់ទាញទងសុក ដើម្បីឲ្យសុករើក ដោយដៃម្ខាងទៀតទប់ពីលើពោះ B- លូកដៃចូលក្នុងស្បូន ហើយចាប់ទាញទងសុក ដោយដៃម្ខាងទៀតទប់ពីលើពោះ C- លូកដៃចូលក្នុងស្បូន ប្រឡេះសុកតាមជញ្ជាំងស្បូនហើយ ដៃម្ខាងទៀតទប់ពីលើពោះ D- លូកដៃចូលក្នុងស្បូន ហើយបង្វិលសុកថ្មមៗ ដោយដៃម្ខាងទៀតទប់ពីលើពោះ	C
353	ក្រោយពីលូកបារសុករួច តើឆ្មបជំនាញត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយជាដំបូង? A- ផ្តល់អុកស៊ីតូស៊ីន B- ឈ្លីស្បូន C- ផ្តល់អែហ្គោមេទ្រីន D- ផ្តល់ស្បូនឈាមអុកស៊ីតូស៊ីន	B

354	ចំពោះការគ្រប់គ្រងការទំលាក់សុកដោយត្រួតពិនិត្យ លើការសម្រាលកូនភ្លោះហើយ ឆ្មបត្រូវចាក់អុកស៊ីតូស៊ីននៅពេល: A- បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនទី១ហើយ B- បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនទី២ ហើយ C- មុនពេលទំលាក់សុក D- ក្រោយពេលទំលាក់សុក	B
355	ស្ត្រីសំរាលកូនរួចមានគ្រុនក្តៅ ដោះឡើងក្រហម តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីការពារមិនឲ្យឈៀសដោះ? A- អោយកូនបៅដោះអោយបានញឹកញាប់ B- អោយកូនបៅទឹកដោះគោម្សៅ C- ច្របាច់ទឹកដោះចេញ D- ស្ត្រីទឹកក្តៅ	A
356	ពេលទារកទើបកើតមាតាមានបញ្ហាកើតឡើងត្រូវការសេវាបញ្ជូន តើចំណុចណាមួយដែលឆ្មបត្រូវជៀសវាង? A-ធ្វើអោយទារកមានលំនឹង B-ពន្យល់ស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារ C-រៀបចំយ៉ាងហ័សនូវមធ្យោបាយបញ្ជូន D-រង់ចាំពិនិត្យមើលសភាពអ្នកជំងឺក្នុងរយៈពេលយូរ	D
357	ចំណុចណាមួយដែលឆ្មបត្រូវជៀសវាងអនុវត្ត ប្រសិនបើស្នាមវះកាត់មានឈាមកក ទឹករងៃ និងខ្ទុះ? A- កាត់ស្បែកដែលខូចនិងកាត់ចេសដែលមានថ្មរខ្លាញ់ហើយចំហរមុខ B- កាត់ចេសដេរ Aponevrose C- បិទមុខរបួសដោយស្បែកស្តើវីល D- ដូរបិទស៊ីម៉ង់រាល់២៤ម៉ោងម្តង	B

358	តើបច្ចេកទេសណាមួយដែលមិនសមស្របក្នុងការសំរាលកូនទី១? A-ត្រូវពាក់ស្រោមដៃស្តេរីលហើយលូកដៃចូលក្នុងស្បូនចាប់យកជើង B-ទាញជើងទារកថ្មីៗចុះមកក្រោម C-ធ្វើការបង្កើតកូនច្រាសជើងដោយទាញ D-ធ្វើការបង្វិលទារកក្នុងផ្ទៃ	D
359	បច្ចេកទេសទាំង៣ខាងក្រោមគឺជាការសំរាលកូនភ្លោះទី១លើកលែងតែ: A-ចាប់ផ្តើមចាក់ស្បែកហើយបើកយឺតៗ B-តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក C-ពិនិត្យមើលការបង្ហាញរបស់ទារក D-ធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់	D
360	ស្ត្រីម្នាក់មានកូនទំរង់បង្ហាញទី១ តើឆ្មាត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលសំរាល? A- ពិនិត្យមាត់ស្បូន B- ធ្វើការបំបែកទឹកភ្លោះ C- តាមដានការកន្ត្រាក់នៃស្បូន D- បញ្ជូនស្ត្រីដើម្បីធ្វើការវះកាត់	D
361	តើសកម្មភាពណាមួយដែលហាមឃាត់ពេលមានធ្លាក់ទងសុកមុនសម្រាល? A- រុំទងសុកជាមួយក្រណាត់ស្អាត B- រៀបចំអោយស្ត្រីស្ថិតក្នុងឥរិយាបថដង្កង់ដើមទ្រូង C- កៀបទងសុកជាមួយនឹង pince D- បញ្ជូនស្ត្រីទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់	C
362	តើឱសថណាមួយដែលមិនត្រូវផ្តល់នៅពេលដែលស្ត្រីមានជំងឺគ្រុនចាញ់ក្រោយសំរាល? A-ផ្តល់ថ្នាំ Antibiotic(Amoxilline) B-ផ្តល់ថ្នាំParacetamol ដើម្បីបញ្ចុះកំដៅ C-ផ្តល់ថ្នាំគ្រុនចាញ់ (Quinine Chloroquine) D-ផ្តល់ថ្នាំ Tetracycline	D

363	តើការថែទាំណាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃលើសពី ១៦០ដងក្នុង១នាទី ហើយមានគ្រុនក្តៅ? A- ផ្តល់ការព្យាបាលបើមានគ្រុននិងមានការឆ្លងរោគនៅស្បូន B- ផ្តល់ថ្នាំ អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក C- បន្ថយកំដៅដោយប្រើថ្នាំ Paracetamol D- លូកពិនិត្យមាត់ស្បូនញឹកញាប់	D
364	ក្នុងរយៈពេល១ម៉ោងក្រោយសំរាល បើសុកនៅតែមិនឆ្លាក់ តើឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដូចម្តេច? A- បញ្ចេញទឹកនោមអោយអស់ B- លូកទំលាក់សុកម្តងទៀត C- ធ្វើការវះកាត់ស្បូនចេញ D- ផ្តល់ថ្នាំ អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	C
365	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពប្រទះស្រ្តីឈឺពោះសំរាលមានទំងន់បង្ហាញថាស? A-ធ្វើការសំរាលដោយវះកាត់ B-តាមដានពីការបើកនៃមាត់ស្បូន C-បំបែកទឹកភ្លោះនិងបង្កើនការសំរាល D-ធ្វើការសំរាលដោយបូម	A
366	តើសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងករណីដែលមានការសំរាលទំងន់ហុចគួច? A-ពិនិត្យមាត់ស្បូនពេលឈឺពោះសំរាល B-តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារក C-ចាប់ទាញជើងទារកចេញមកក្រៅពេលកំពុងឈឺពោះ D-អោយស្រ្តីប្រឹងបញ្ចេញកូនដល់ត្រឹមចង្កេះ ខ្នង ឆ្អឹងជំនីនិងស្លាបប្រដៀវចេញផុត	C
367	ស្រ្តីអាចមានកំដៅ៣៨អង្សាសេឬលើសដោយសារការរលាកដោះដែលមានការឆ្លងរោគក្រោយសំរាល តើសកម្មភាពបែបណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ? A-បន្តឲ្យកូនចៅដោះ B-គ្រប់គ្រងដោះដោយក្រណាត់ស្អាត C-ដាក់ក្រណាត់គ្រជាក់លើដោះម្តាយរាល់ពេលចន្លោះការបំបៅកូន D-ដាក់ក្រណាត់គ្រជាក់លើដោះម្តាយរហូតដល់២៤ម៉ោង	D

368	បើស្ត្រីមានលាសដោះហើយមិនឲ្យកូនបៅ តើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនត្រូវធ្វើ? A-ភ្លេចចុងដោះ B-ទ្រទ្រង់ដោះដោយអាវទ្រនាប់ C-យកក្រណាត់ត្រជាក់ដាក់លើដោះដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ D-អោយ Paracetamol 500mg បើចាំបាច់	A
369	តើសកម្មភាពក្នុងការថែទាំទារកមួយណាដែលមិនប្រសើរពេលទារកពិបាកដកដង្ហើមស្រាល? A-ផ្តល់ទឹកដោះច្របាច់តាមស្តង់ដារ B-តាមដាននិងកត់ត្រាចង្វាក់ដង្ហើមនិងកំរិតអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមរៀងរាល់ម៉ោង C-តាមដានការឆ្លើយតបទារកនិងការផ្តល់អុកស៊ីសែន D-តាមដានការឆ្លើយតបទារកនិងការនោមជុះ	D
370	ឆ្មបបានជួយពន្យល់ដល់ម្តាយដែលកូនមានកំដៅខ្លួនចុះទាប តើចំណុចណាមួយដែលឆ្មបបានណែនាំមិនសមស្របដល់គាត់? A-ផ្តល់កំដៅដល់កូនដោយស្បែកប៉ះស្បែក B-លើកទឹកចិត្តម្តាយអោយបំបៅកូនដោយដោះអោយបានញឹកញាប់ C-ស្លៀកពាក់អោយបានកក់ក្តៅនិងដណ្តប់ភ្លយ D-តាមដានកំដៅរៀងរាល់១២ម៉ោង	D
371	ការបែកទឹកភ្លោះអាចកើតមានឡើងនៅពេលមុនឈឺពោះសំរាលឬចាប់ផ្តើមឈឺពោះ តើការថែទាំរបស់ឆ្មបណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ? A-ពិនិត្យមើលទឹកភ្លោះនិងក្លិន B-ដាក់សំឡីទ្រាប់បន្ទាប់ពីពិនិត្យដោយភ្នែកនិងហិតក្លិន C-អោយស្ត្រីក្អកដើម្បីមើលឃើញទឹកភ្លោះហូរចេញ D-លូកពិនិត្យទ្វារមាសរាល់កន្លះម៉ោងម្តង	D
372	តើការថែទាំទារកដែលមានការពិបាកដកដង្ហើមមធ្យមណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ? A-ចាក់បញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃ ដើម្បីរក្សាជាតិទឹក B-តាមដាននិងកត់ត្រាចង្វាក់ដង្ហើម C-សង្កេតរកសញ្ញាផ្សេងៗពេលដកដង្ហើមចូលឬសម្លេងថ្ងូរ D-សង្កេតពីការយំរបស់ទារក	D

373	ក្នុងសកម្មភាពខាងក្រោមណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវចំពោះករណីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានគ្រុនចាញ់កំរិតធ្ងន់? A-ប្រាប់ស្ត្រីនិងប្តីថាទារកប្រហែលជាស្លាប់ B-បញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ទារកដោយអេកូសាស្ត្រ បើអាចធ្វើបាន C-ពិភាក្សាជាមួយស្ត្រីអំពីជំងឺសអន្តរាគមន៍ឬការគ្រប់គ្រង D-ផ្តល់ថ្នាំ tocolytic ដល់ស្ត្រី	D
374	ប្រសិនបើធ្វើការសំរាលហើយក្បាលកូនចេញមកក្រៅមែន តែជាប់តឹងនៅនឹងទ្វារមាស តើចំណុចណាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងស្រាប់? A-ស្រែកហៅជំនួយជាបន្ទាន់ B-ធ្វើEpisiotomieដើម្បីជួយពង្រីកសាច់ទ្វារមាសឲ្យទូលាយ C-ឲ្យអ្នកជំនួយ២នាក់ជួយទប់ជង្គង់ស្ត្រីមកផ្តុំបដល់ទ្រូង D-រុញកំពូលស្បូនច្នៃមៗ ដើម្បីឲ្យទារកឆាប់ចេញមកក្រៅ	D
375	តើរបៀបសម្រាលណាមួយដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកពេលធ្វើការសម្រាលកូនក្នុងទំរង់ បញ្ចុប្រាសជើង ប្រសិនបើជើងទារកមិនចេញមកដោយឯកឯង? A-ចាប់កង្កែបយ៉ាងឆាប់រហ័សសំរាល B-ធ្វើរបៀបដដែលសំរាប់ជើងម្ខាងទៀត C-ចាប់កាន់ត្រគាកទារក D-ចាប់កាន់ចង្កេះ	D
376	ប្រសិនបើទារកមានកំដៅទាប(៣៥-៣៦.៥C) តើសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវចៀសវាង: A-អោយទារកបោឡូបានញឹកញាប់ B-ផ្តល់កំដៅដោយស្បែកប៉ះស្បែក C-ស្លៀកពាក់ឲ្យបានកក់ក្តៅព្រមទាំងមួកនិងដណ្តប់ភួយ D-ជូតខ្លួនដោយកន្សែងសើម	D

377	ចំណុចទាំង៣ខាងក្រោម គឺជាសកម្មភាពថែទាំរបស់ឆ្មបដល់ទារកដែលមានការបង្ករោគនៅទងផ្ចិត ឬស្បែកឡើងក្រហមហូរខ្ទុះឬធំគ្លិន លើកលែងតែ: A- ពាក់ស្រោមដៃស្អាតមុននឹងពិនិត្យ B-លាងទងផ្ចិតដោយសូលុយស្យុងអង់ទីសេប៊ីកនឹងស្បែកស្អាត C-សំអាតជុំវិញទងផ្ចិតដោយប្រើ Gentiane Violet D-រុំទងផ្ចិតជាមួយស្បែកស្អាត	D
378	ឆ្មបបានពន្យល់ដល់ស្ត្រីពីការថែទាំទារក ក្នុងករណីម្តាយឈឺ ឬត្រូវបញ្ជូន។ តើសកម្មភាពណាមួយដែល ឆ្មបមិនត្រូវអនុវត្ត? A-ធានាភាពកក់ក្តៅដល់ទារក B-ជួយម្តាយឲ្យច្របាច់ទឹកដោះ C-ត្រូវប្រាកដថាអ្នកថែទាំបានទទួលការអប់រំពីការថែទាំទារក D-ដាក់ទារកឲ្យនៅឆ្ងាយពីម្តាយ	D
379	បើសិនទារករលាកភ្នែកដោយសារ Gonorrhea តើឆ្មបមិនត្រូវផ្តល់ថ្នាំអ្វីដល់ទារក A-ផ្តល់ Ceftriaxone 50mg/kg B-ផ្តល់ប្រូម៉ាត តេត្រាស៊ីគ្លីនសំរាប់ដាក់ភ្នែកទារក C-សំអាតភ្នែកនិងលប់មុខទារក D-អោយម្តាយជូតមុខទារករាល់ថ្ងៃដោយប្រើទឹកស្អាត	B
380	បើទារកឈឺភ្នែកឡើងក្រហម ហើមនិងហូរខ្ទុះ តើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនសមស្រប? A-សំអាតភ្នែកដោយស្រូវមែប្រៃ ឬទឹកស្អាត B-យកដុំសំឡីជូតពិតល់ភ្នែកខាងក្នុងចេញមកក្រៅ C-អោយម្តាយជូតភ្នែកទារកនឹងទឹកស្អាត ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ D-អោយម្តាយជូតភ្នែកទារក ៤ដងក្នុង១ថ្ងៃរហូតដល់ភ្នែកលែងមានបញ្ហា	C
381	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរលាកផ្លូវម៉ូត្រស្រួចស្រាវ តើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ? A-ព្យាបាលដោយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក B-ពិនិត្យទឹកនោមដោយធ្វើ Urine culture C-បញ្ជូលស្រូវមតាមសរសៃ D-ពិនិត្យទឹកនោមនិងវាស់សំពាធឈាម	C

382	តើសកម្មភាពមួយណាដែលមិនត្រូវឲ្យឆ្មបអនុវត្តក្នុងពេលមានការសំរាលកូនទី១? A-លូកដៃចូលក្នុងស្បូនដោយពាក់ស្រោមដៃស្តេរីល B-ចាប់ទាញយកជើងទារក C-ទាញជើងទារកមកក្រោម D-ទាញជើងទារកនិងទាញកជើង	D
383	ស្ត្រីជាមាតាត្រូវប្តូរឥរិយាបថរៀងរាល់ម៉ោង ដើម្បីបង្ការការឈឺពោះសំរាលយូរនិងពិបាក ដូច្នេះឆ្មបបានធ្វើការណែនាំដល់ស្ត្រីលើកលែងតែ: A-អោយស្ត្រីធ្វើចលនាឬដើរក្នុងពេលឈឺពោះសំរាល B-អោយស្ត្រី-ដើរប្រទាបលើអ្វីមួយ អង្គុយ ឈរ C-អោយស្ត្រីដេកផ្ទៀងដោយមានកល់ជើង D-អោយស្ត្រីដេកផ្ទាដោយលើកជើងម្តងៗ	D
384	បើមានការសំរាលជាប់ស្មាមិនអាចទាយទុកបាន តើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនត្រូវធ្វើ? A-គ្រៀមរៀបចំការជាប់ស្មា B-ទាញក្បាលទារកនិងចាប់ចង្កាដែលជាប់ក្រោយ Symphysis pubis C-ទាញក្បាលទារកនិងចាប់ចង្កាទារកឱ្យហាយសង្កត់លើពុយ D-ទាញក្បាលទារកនិងចាប់ទាញស្មាទារកផ្ទុមៗ	D
385	ក្នុងរយៈពេលឈឺពោះសំរាលអូសបន្លាយ បើក្បាលទារកស្ថិតនៅកំពស់៣/៥ តើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-ធ្វើការសំរាលដោយបូម B-ធ្វើការសំរាលដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន C-ធ្វើការសំរាលដោយរកាត់ D-ធ្វើការសំរាលធម្មតា	C
386	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ពេលដែលស្ត្រីឈឺពោះសំរាលយឺតអូសបន្លាយ ហើយមានការបង្កពេក? A-ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនិងអុកស៊ីតូស៊ីន B-ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនិងឲ្យស្ត្រីផឹកទឹកច្រើន C-ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនិងសំរាលដោយបូមឬជប់ D-ផ្តល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនិងឲ្យស្ត្រីធ្វើចលនា	A

387	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនដំបូង ឈឺក្បាល ស្រវាំងភ្នែកនិងហើមមុខទៀតផង បន្ទាប់មកស្ត្រីមានការប្រកាច់។ ជាដំបូងតើឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-ស្រែកហៅជំនួយជាបន្ទាន់ B-នៅក្បែរស្ត្រីនិងការពារគាត់កុំឲ្យរលូស C- ដាក់ស្រីឲ្យដេកផ្អៀងឆ្វេង D-សំអាតផ្លូវដង្ហើម និងផ្តល់អុកស៊ីសែន	A
388	ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រកាច់ដោយសារជំងឺក្រឡាភ្លើងធ្ងន់ៗបន្ទាប់ពីប្រកាច់រួច តើដំបូងឆ្មបត្រូវធ្វើដូចម្តេច? A-ផ្តល់ថ្នាំជាបន្ទាន់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកាច់និងសំពាធឈាមខ្ពស់ B-រៀបចំបញ្ចូលសេរ៉ូមតាមសរសៃ C-តាមដានសំពាធឈាម ការដកដង្ហើម កំរិតស្មារតី D-ដាក់សុង ដើម្បីតាមដានបរិមាណទឹកនោម?	A
389	ក្នុងការតាមដានម្តាយនិងទារកក្រោយពេលកើត តើសកម្មភាពណាមួយដែលមិនសមស្រប? A- រកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ B- ស្ទាបស្ទួនដើម្បីឲ្យដឹងថាវិងឬមូល C- ប្តូរម្តាយពីគ្រែសំរាលទៅបន្ទប់សំរាក D- ប្រគល់ទារកឲ្យក្រុមគ្រួសារជួយថែទាំ	D
390	បើស្ត្រីមានស្លេកស្លាំងក្រោយសំរាលកូន តើករណីណាដែលមិនសំខាន់ក្នុងការថែទាំ? A- វាស់កំរិតអេម៉ូក្លូប៊ីន B- រកមើលភាពស្លេកស្លាំងនៃត្រូបកភ្នែក បាតដៃ ចុងម្រាមដៃ C- រាប់ចំនួនចង្វាក់ដង្ហើមក្នុង១នាទី D- ចាក់បញ្ចូលឈាម	D
391	ស្ត្រីឈឺពោះសំរាលកូន មានផលវិបាកដោយសារការសំរាលអូសបន្លាយនិងមានឧបសគ្គ ឆ្មបបានឈប់ទៅស្ត្រីអំពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលកើតមានលើកលែងតែ: A- ភាពសមាមាត្ររវាងទំហំក្បាលទារក និងអាងត្រគាក B- បែកស្រោមទឹកភ្លោះមុនពេលកំណត់ C- ភាពមិនធម្មតានៃការបើកមាត់ស្បូន D- គ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លាយស្បូន	A

392	គោលបំណង នៃការបង្ការការឆ្លងរោគក្រោយសំរាល ការថែទាំសំខាន់ដំបូងរបស់ ឆ្មបត្រូវ៖ A- លាងសំអាតដៃយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមុននិងក្រោយប៉ះពាល់ស្រ្តី B- ប្រើប្រាស់សំភារៈស្អាតនិងស្តេរីល C- យកសំភារៈប្រើប្រាស់រួច ដាក់ក្នុងធុងដោយឡែកនិងដុតក្នុងឡ D- ដាក់ស្រ្តីសំរាកព្យាបាលនិងថែទាំនៅបន្ទប់ដោយឡែក	A
393	ដើម្បីជួយស្រ្តីឲ្យមានជាសុភាពនិង ជាសះស្បើយនាបំរើសពីការបង្ករោគ តើ ឆ្មបត្រូវថែទាំដូចម្តេច? A- តាមដានសញ្ញាជីវិត B- ផ្តល់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ C- ផ្តល់ថ្នាំ និងស្ត្រីដោយក្រណាត់សើមបើមានគ្រុនក្តៅ D- លើកទឹកចិត្តស្រ្តី ឲ្យប្រែប្រួលឥរិយាបថ	C
394	តើចង្វាក់បេះដូងប៉ុន្មាន និងមានបញ្ហាអ្វីដែលចាត់ទុកថាទារកខ្សោយក្នុងពេលឈឺពោះសម្រាល? A- តិចជាង ១០០ ឬ លើសពី ១៦០ ដងក្នុង១នាទី និង ទឹកភ្លោះខាប់ពណ៌លាមកព្រៃ B- ចង្វាក់បេះដូងតិចជាង ១០០ ដងក្នុង១នាទី ម្តាយមានជម្ងឺ C- ចង្វាក់បេះដូងលើសពី ១៦០ ដងក្នុង១នាទី ម្តាយមានគ្រុនក្តៅ D- ចង្វាក់បេះដូងលើសពី ២០០ ដងក្នុង១នាទី ម្តាយមានគ្រុនក្តៅ	A
395	តើទឹកភ្លោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ? A- ទឹកភ្លោះពណ៌ស្បែក B- ទឹកភ្លោះពណ៌សថ្លា C- ទឹកភ្លោះសខាប់ D- ទឹកភ្លោះពណ៌លឿងភ្លាវ	A
396	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញា ដែលបញ្ជាក់ថាស្រ្តីមានគភ៌មានជម្ងឺគ្រុនចាញ់ ? A- គ្រុនក្តៅ ងារញាក់ មិនឃ្លានបាយ B- គ្រុនក្តៅ ងារញាក់ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់ C- គ្រុនក្តៅ ងារញាក់ ឈឺក្នុងពោះ D- គ្រុនក្តៅ ងារញាក់ ស្បូនចំកោង ឈឺឆ្អឹង ពិបាកនោម	B

397	តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច និងត្រូវគ្រប់គ្រងអ្វីក្នុងការសម្រាលទារកដែលមានទឹកភ្លោះលាយលាមកព្រៃ? A- ធ្វើការសម្រាលធម្មតា និង ធ្វើការគ្រប់គ្រងចលនា B- ធ្វើការសម្រាលឱ្យបានឆាប់ និង ធ្វើការគ្រប់គ្រងបេះដូង C- ធ្វើការសម្រាលឱ្យបានឆាប់ និង ធ្វើការគ្រប់គ្រងផ្លូវដង្ហើម D- ធ្វើការសម្រាលធម្មតា និង ធ្វើការគ្រប់គ្រងវេជ្ជិកឱ្យបានម្តងចត់	C
398	តើគោលសំគាល់របស់ ទម្រង់ហុចកំពូលក្បាល គឺអ្វី ? A- ច្រមុះ B- ចង្កា C- អុកស៊ីពីត D- កុកស៊ីច	C
399	តើក្បាលទារកមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងទម្រង់ហុចថ្ងាស ? A- ក្បាលទារកងើបអង្អើរ B- ក្បាលទារកជ្រមុជល្អ C- ក្បាលទារកងើយខ្លាំងបំផុត D- ក្បាលទារកជ្រមុជខ្លាំងបំផុត	A
400	ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើនៅត្រីមាសទីប៉ុន្មានដែលហាមប្រើថ្នាំ Mefloquine ? A- គ្រប់ត្រីមាសទាំងអស់ B- ត្រីមាសទី ៣ C- ត្រីមាសទី ២ D- ត្រីមាសទី ១	D
401	តើកម្រិតប៉ុន្មាននៃ Chloroquine ដែលអ្នកត្រូវប្រើដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើ P.Falciparum ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ? A- ៥mg/kg/d រយៈពេល២ថ្ងៃ រួចបន្ត ៣mg/kg/d រយៈពេល៣ថ្ងៃ B- ៨mg/kg/d រយៈពេល២ថ្ងៃ រួចបន្ត ៤mg/kg/d រយៈពេល៣ថ្ងៃ C- ៩mg/kg/d រយៈពេល២ថ្ងៃ រួចបន្ត ៥mg/kg/d រយៈពេល៣ថ្ងៃ D- ១០mg/kg/d រយៈពេល២ថ្ងៃ រួចបន្ត ៥mg/kg/d រយៈពេល៣ថ្ងៃ	D

402	តើជាអាការៈរោគនៃជំងឺអ្វី ដែលបណ្តាលឱ្យមានការពិបាកនោម នោមញឹកហើយបន្ទាន់ ពេលមានគតិ និងឈឺពោះសម្រាល ? A- រលូតមានក្លាយរោគ B- រលាកប្លោកនោម C- រលាកស្រោមទឹកភ្លោះ D- រលាកអាងត្រតាក	B
403	តើអ្វីខ្លះជាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឱ្យមាន ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានភាពស្មុំនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ (រស់នៅតំបន់គ្រុនចាញ់) ? A- អាចបង្កឱ្យមានជំងឺក្រឡាភ្លើង B- ស្លេកស្លាំង ឈឺសន្លាក់ C- ស្លេកស្លាំងខ្លាំង និង សម្រាលកូនមានទម្ងន់តិច D- ស្លេកស្លាំង និង សម្រាលកូនមានទម្ងន់ធម្មតា	C
404	តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាកូនខ្សោយ ហើយមាត់ស្បូនបើកមិនទាន់អស់ និងកំពូលក្បាលនៅពីលើស្ថានភាព 0 ? A- សម្រាលតាមធម្មតា B- ត្រូវធ្វើការវះកាត់ភ្លាម C- សម្រាលដោយបូម D- ទុកតាមដានបន្ត	B
405	តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាកូនខ្សោយ ហើយមាត់ស្បូនបើកអស់ និងកំពូលក្បាលកូនចុះមកត្រឹមស្ថានភាព 0 ? A- សម្រាលធម្មតា B- ត្រូវធ្វើការវះកាត់ភ្លាម C- សម្រាលដោយបូម D- បញ្ជូនជាបន្ទាន់	C

406	តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាបណ្តាលមកពីឧបសគ្គនៃការឈឺពោះសម្រាលយូរចំពោះកូនដែលថ្លោះ ? A- ទារកខ្សោយពិបាកសម្រាល B- ជាប់ស្មា និងការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល C- សម្រាលជាប់ក្បាល និង ការធ្លាក់ឈាម D- សម្រាលជាប់ចង្កា	B
407	តើនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើការស្តាប់បេះដូងទារកនៅពេលឈឺពោះសម្រាល ? A- ស្បូនឈប់កន្ទាក់ B- ស្បូនកន្ទាក់ C- ប្រឹងបញ្ចេញកូន D- ពេលបែកទឹកភ្លោះ	A
408	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើកូនភ្លោះទី១ មានទម្រង់បង្ហាញទទឹង ? A- ត្រូវធ្វើការវះកាត់ B- សម្រាលដោយចាប់ទាញ C- សម្រាលដោយបូម D- ចោះទឹកភ្លោះ និងបង្វិល	A
409	តើឱសថ គូកូលីទីច មិនត្រូវផ្តល់ឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលើសពីប៉ុន្មានម៉ោង ? A- ១២ ម៉ោង B- ២៤ ម៉ោង C- ៤០ ម៉ោង D- ៤៨ ម៉ោង	D
410	តើទម្រង់អ្វីដែលជាទម្រង់បង្ហាញមិនធម្មតារបស់ទារកដែលសំបូរជួបជាងគេ ? A- ទម្រង់ហុចថ្ងាស B- ទម្រង់ហុចកំពូលក្បាល C- ទម្រង់ទទឹង D- ទម្រង់ហុចគូថ	B

411	តើក្បាលទារកមានបង្ហើយធំៗអ្វីខ្លះ ? A- បង្ហើយមុខ និងបង្ហើយក្រោយ B- បង្ហើយលើ និងបង្ហើយក្រោម C- បង្ហើយក្រោម និងបង្ហើយក្រោយ D- បង្ហើយមុខ និងបង្ហើយក្រោម	A
412	តើការពិនិត្យណាមួយដែលត្រូវហាមឃាត់ចំពោះករណីស្ត្រីធ្លាក់ឈាមក្រោយ២២ សប្តាហ៍ ពេលបែក ទឹកភ្លោះមុនសម្រាល ? (នៅក្នុងរបៀបគ្រប់គ្រងទូទៅ) A- ពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ B- ពិនិត្យផ្ទៃពោះ C- ពិនិត្យដោយលូកទ្វារ D- ពិនិត្យដោយជំពុះទា	C
413	តើឱសថណាមួយដែលជំនួយឱ្យមាត់ស្បូនទន់ ? A- Oxytocine B- Dexamethasone C- Ergometrine D- Prostaglandins	D
414	តើចំឡើយណាមួយដែលជា ទម្រង់បង្ហាញរបស់កូនដោយមានស្ថានភាពជ្រមុជល្អនៃកំពូល ក្បាល ? A- អុកស៊ីពុតក្បាលកូននៅខ្ពស់ជាងសាំងស៊ីពុត B- អុកស៊ីពុតក្បាលកូននៅទាបជាងសាំងស៊ីពុត C- អុកស៊ីពុតក្បាលកូននៅស្មើសាំងស៊ីពុត D- អុកស៊ីពុតក្បាលកូននៅស្មើនឹងពុយពីស	A
415	តើដោយសារអ្វីដែលការបញ្ចេញស្មាត្រូវបរាជ័យ ក្នុងករណីការសម្រាលជាប់ស្មា ? A- ស្មាត្រូវជាប់នៅពីក្រោម Symphyse pubis B- ស្មាត្រូវជាប់នៅពីមុខ Symphyse pubis C- មិនបានធ្វើ ការកាត់ទ្វារ Episiotomy D- ស្មាត្រូវជាប់នៅពីក្រោយ Symphyse pubis	D

416	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃការក្លាយរោគដោយសារការបែកទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាល ? A- ទឹកភ្លោះពណ៌ស្បែក B- ក្តៅខ្លួន ទឹកហូរតាមទ្វារភ្លិនស្អុយ C- ទឹកហូរតាមទ្វារថ្លា ពណ៌បៃតងថ្លា D- ទឹកហូរតាមទ្វារថ្លា រួមទាំងការឈឺចុកចាប់	B
417	តើសម្ពាធឈាមស៊ីសតូលីកប៉ុន្មាននៅពេលដែលមានសញ្ញាស្លុក? A- សម្ពាធស៊ីសតូលីកតិចជាង ៩០ mmHg B- សម្ពាធស៊ីសតូលីក ១០០ mmHg C- សម្ពាធស៊ីសតូលីក ១១០ mmHg D- សម្ពាធស៊ីសតូលីក ១២០ mmHg	A
418	តើដីពពមានល្បឿនប៉ុន្មាននៅពេលដែលមានសញ្ញាស្លុក? A- ល្បឿន ៨០ ដង/នាទី B- ល្បឿន ៩០ ដង/នាទី C- ល្បឿន ១០០ ដង/នាទី D- ល្បឿន ១១០ ដង/នាទី	D
419	ហេតុអ្វីបានជាត្រូវដាក់ស្រ្តីឱ្យដេកផ្ទៀងពេលមានស្លុកកើតឡើង? A- សម្រួលដំណើរឈាមរត់ B- បន្ថយការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម C- ងាយស្រួលក្នុងការសង្រ្គោះ D- បន្ថយការស្រូបកម្មអ្នកចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់	D
420	តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវធ្វើមុនគេក្នុងការគ្រប់គ្រងស្លុកភ្លាមៗ ? A- ស្រែករកជំនួយ B- យកសញ្ញាជីវិត C- ដាក់ស្រ្តីឱ្យដេកផ្ទៀង D- លើកជើងឱ្យខ្ពស់ និងដណ្តប់ឱ្យកកក្តៅ	A

144	តើឆ្មបត្រូវធ្វើការលាងសំអាតទ្វារមាសស្រ្តីដោយដុំសំឡីទី២ មុនពេលសំរាលដូចម្តេច? A.យកសំឡីស្តើវីលដុំទី២ជ្រលក់បេតាឌីន ៥% លាងសំអាតចំកណ្តាលទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម B.យកសំឡីស្តើវីលដុំទី២ជ្រលក់បេតាឌីន ១០% លាងសំអាតចំកណ្តាលទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម C.យកសំឡីស្តើវីលដុំទី២ជ្រលក់បេតាឌីន ១៥% លាងសំអាតចំកណ្តាលទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម D.យកសំឡីស្តើវីលដុំទី២ជ្រលក់បេតាឌីន ២.៥% លាងសំអាតចំកណ្តាលទ្វារមាសពីលើចុះក្រោម	D
145	មុនពេលសំរាលដើម្បីការពារការឆ្លងរោគ តើឆ្មបត្រូវធ្វើការលាងដៃដូចម្តេច ? A. ដោះគ្រឿងអលង្ការចេញ យកប្រាស់ត្រដុសសាប៊ូរួចដុសពីក្រចកដល់កំភួនដៃ B. ដោះគ្រឿងអលង្ការចេញ ត្រដុសសាប៊ូពីក្រចកដល់កំភួនដៃរួចដុសនឹងប្រាស់ បន្ទាប់មកទើបលាងជំរះ C. យកប្រាស់ត្រដុសសាប៊ូរួចដុសពីក្រចកដល់កំភួនដៃ(៣០វិនាទី) រួចដុសនឹងប្រាស់ឲ្យសព្វកន្លែង ទើបលាងជំរះសាប៊ូ D.ត្រដុសសាប៊ូពីបាតដល់កំភួនដៃ(៣០វិនាទី) រួចដុសនឹងប្រាស់ឲ្យសព្វកន្លែងទើបលាងជំរះសាប៊ូ	D
146	មុនពេលសំរាលដើម្បីការពារការឆ្លងរោគ តើឆ្មបត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេពេលលាងដៃ ? A. ដោះគ្រឿងអលង្ការចេញ ចាក់ទឹកផ្សើមដៃពីចុងដៃមកកំភួនដៃ B. ដោះគ្រឿងអលង្ការចេញ ត្រដុសសាប៊ូពីក្រចកដល់កំភួនដៃរួចដុសនឹងប្រាស់ បន្ទាប់មកទើបលាងជំរះ C. យកប្រាស់ត្រដុសសាប៊ូរួចដុសពីក្រចកដល់កំភួនដៃ(៣០វិនាទី) រួចដុសនឹងប្រាស់ឲ្យសព្វកន្លែង ទើបលាងជំរះសាប៊ូ D. ត្រដុសសាប៊ូពីបាតដល់កំភួនដៃ(៣០វិនាទី) រួចដុសនឹងប្រាស់ឲ្យសព្វកន្លែង ទើបលាងជំរះសាប៊ូ	A