

421	តើអ្នកត្រូវបញ្ចូលសេរីមប៉ុន្មានដង នៃការបាត់បង់ឈាមដើម្បីគ្រប់គ្រងស្តុក ? A- ១-២ ដង នៃការបាត់បង់ឈាម B- ២-៣ ដង នៃការបាត់បង់ឈាម C- ៣-៤ ដង នៃការបាត់បង់ឈាម D- ៤-៥ ដង នៃការបាត់បង់ឈាម	B
422	តើអ្នកត្រូវផ្តល់អុកស៊ីសែនប៉ុន្មានលីត្រ ក្នុងមួយនាទីដើម្បីគ្រប់គ្រងស្តុក ? A- ១-២លីត្រ/នាទី B- ២-៣លីត្រ/នាទី C- ៣-៤លីត្រ/នាទី D- ៦-៨លីត្រ/នាទី	D
423	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុដែលភាគច្រើនបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ឈាមនៅពេលគភីមានអាយុមុន២២សប្តាហ៍នឹងមានស្តុក? A- ស្តុកពាំងមាត់ស្បូន B- កូនក្រៅស្បូន C- របេះស្តុកពឹកនៃឆោងធម្មតាមុនពេលកូនប្រសូត្រ D- រលាកស្រោមទឹកភ្លោះ	B
424	ដូចម្តេចដែលហៅថាស្តុក ? A- គឺជាការចុះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធចលនាឈាមរត់ B- គឺជាការ ចុះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធឡូហ្វីប៊ាទឹក C- គឺជាការចុះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធទឹកនោម D- គឺជាការចុះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ	A
425	តើត្រូវបន្តដាក់សេរីមក្នុងល្បឿនប៉ុន្មាន ពេលដែលស្តុកមានសភាពធ្ងន់ស្រាល ? A- បន្តសេរីមល្បឿន ១ លីត្រក្នុង ៦ ម៉ោង B- បន្តសេរីមល្បឿន ១ លីត្រក្នុង ៣ ម៉ោង C- បន្តសេរីមល្បឿន ២ លីត្រក្នុង ៣ ម៉ោង D- បន្តសេរីមល្បឿន ២ លីត្រក្នុង ៤ ម៉ោង	A

426	តើឱសថអ្វីដែលអ្នកត្រូវប្រើនៅពេលស្តុកបណ្តាលមកពីការក្លាយរោគពេលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ? A- ផ្តល់ឱសថបំបាត់ការឈឺចាប់ B- ផ្តល់វីតាមីន C- ផ្តល់ឱសថអង់ទីប៊ីយូទិក D- ផ្តល់ឱសថបញ្ចុះកំដៅ	C
427	តើគេត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើអង់ទីប៊ីយូទិកនៅពេលណាក្នុងស្ថានភាពដែលស្ត្រីស្តុកហើយត្រលប់មកធម្មតាវិញ ? A- នៅពេលបាត់ក្តៅ ១២ម៉ោង B- នៅពេលបាត់ក្តៅ ២៤ម៉ោង C- នៅពេលបាត់ក្តៅ ៤៨ម៉ោង D- នៅពេលបាត់ក្តៅ ៧២ម៉ោង	C
428	តើនៅក្នុងសរីរាង្គមួយណាដែលការរលាករំពងជ្រៅបង្កឱ្យមានកំណកឈាម ? A- ថ្លើម B- សួត C- ក្រពះ D- លំពែង	B
429	តើផលវិបាកនៃការក្លាយរោគក្រោយសម្រាលរយៈពេលយូរអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហា ឬជំងឺអ្វី? A- ជំងឺរលាកដោះ B- ជំងឺរលាកស្រោមពោះ C- គ្មានលទ្ធភាពបង្ករកំណើត D- រលាកប្លោកនោម	C
430	ជាទូទៅ តើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ដែលការឈឺពោះសម្រាលធម្មតាគ្មានផលវិបាកត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ ? A- ១២ម៉ោង ទៅ ១៤ ម៉ោង B- ១៤ម៉ោង ទៅ ១៦ ម៉ោង C- ១៦ម៉ោង ទៅ ១៨ ម៉ោង D- ១៨ម៉ោង ទៅ ២៤ ម៉ោង	D

431	តើសកម្មភាពសម្រាលមួយណាជាដំណាក់កាលទី១ នៃការសម្រាល? A- មាត់ស្បូនចាប់បើករហូតដល់មាត់ស្បូនបើកអស់ B- មាត់ស្បូនបើកអស់រហូតកូនសម្រាលផុត C- កូនសម្រាលផុត រហូតដល់ទំលាក់សុក្ខចរាស់ D- ចាប់ពីទំលាក់សុក្ខចរហូតដល់ ២-៤ ម៉ោងក្រោយសម្រាល	A
432	តើសកម្មភាពសម្រាលមួយណាជាដំណាក់កាលទី២ នៃការសម្រាល ? A- មាត់ស្បូនចាប់បើករហូតដល់មាត់ស្បូនបើកអស់ B- មាត់ស្បូនបើកអស់រហូតកូនសម្រាលផុត C- កូនសម្រាលផុត រហូតដល់ទំលាក់សុក្ខចរាស់ D- ទំលាក់សុក្ខចរហូតដល់ ២-៤ ម៉ោងក្រោយសម្រាល	B
433	តើសកម្មភាពសម្រាលមួយណាជាដំណាក់កាលទី៣ នៃការសម្រាល ? A- មាត់ស្បូនចាប់បើករហូតដល់មាត់ស្បូនបើកអស់ B- មាត់ស្បូនបើកអស់រហូតកូនសម្រាលផុត C- កូនសម្រាលផុត រហូតដល់ទំលាក់សុក្ខចរាស់ D- ទំលាក់សុក្ខចរហូតដល់ ២-៤ ម៉ោងក្រោយសម្រាល	C
434	តើសកម្មភាពសម្រាលមួយណាជាដំណាក់កាលទី ៤នៃការសម្រាល ? A- មាត់ស្បូនចាប់បើករហូតដល់មាត់ស្បូនបើកអស់ B- មាត់ស្បូនបើកអស់រហូតកូនសម្រាលផុត C- កូនសម្រាលផុត រហូតដល់ទំលាក់សុក្ខចរាស់ D- ទំលាក់សុក្ខចរហូតដល់ ២-៤ ម៉ោងក្រោយសម្រាល	D
435	តើដំណាក់កាលទី១នៃការឈឺពោះសម្រាលចំពោះស្ត្រីកូនដំបូងជាធម្មតាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន ? A- ពី ៨-៩ ម៉ោង B- ពី ១០-១១ ម៉ោង C- ពី ១២-១៤ ម៉ោង D- ពី ១៥-១៦ម៉ោង	C

436	តើដំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាលចំពោះស្ត្រីកូនច្រើនដងជាធម្មតាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន ? A- ៣០ នាទី B- ៦០ នាទី C- ៦-១០ម៉ោង D- ១២-១៤ ម៉ោង	A
437	តើដំណាក់កាលទី២នៃការឈឺពោះសម្រាលចំពោះស្ត្រីកូនដំបូងជាធម្មតាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន? A- ៣០ នាទី B- ៦០ នាទី C- ៩០នាទី D- ១២០ នាទី	B
438	ក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មនៅដំណាក់កាលទី៣នៃការសម្រាលមានរយៈពេលប៉ុន្មាន ? A- ៥-១៥ នាទី B- ២០-២៥ នាទី C- ៣០-៣៥ នាទី D- ៤០-៤៥ នាទី	A
439	តើជាការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាពអ្វីមួយដែលបង្ហាញឡើងដោយការធ្លាក់ឆ្អុលកំរិតអតិសព្វន្ននៅដំណាក់កាលទី១ ? A- ការបញ្ចេញទារក B- ការកន្ត្រាក់ស្បូន C- ការឈឺពោះសម្រាល D- ការបើកមាត់ស្បូន	C
440	តើការពិនិត្យពោះដើម្បីរកស្ថានភាពទារកត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលណា ក្នុងអំឡុងពេលឈឺពោះសម្រាល ? A- ចន្លោះស្បូនកន្ត្រាក់ B- ស្ត្រីប្រាប់ថាឈឺពោះសម្រាល C- ស្បូនចាប់ផ្តើមកន្ត្រាក់ D- មានធ្លាក់ទឹកអំសិល	A

441	តើអ្នកត្រូវឱ្យស្ត្រីនាមរាល់ប៉ុន្មានម៉ោងម្តង ដើម្បីជំនួយក្នុងការសម្រាលឱ្យដំណើរការជាធម្មតា? A- ១ ម៉ោងម្តង B- ២ ម៉ោងម្តង C- ៣ ម៉ោងម្តង D- ៤ ម៉ោងម្តង	B
442	តើនៅរៀងរាល់ប៉ុន្មានម៉ោង ម្តងដែលអ្នកត្រូវកត់ត្រាអំពីចង្វាក់បេះដូងទារក នៅដំណាក់កាល ទី១? A- កន្លះ ម៉ោងម្តង B- ១ ម៉ោងកន្លះម្តង C- ២ម៉ោងម្តង D- ២ ម៉ោងកន្លះម្តង	A
443	តើអក្សរ B បញ្ជាក់ពីទឹកភ្លោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងការបំពេញប៉ាតូក្រាហ្វ ? A- ទឹកភ្លោះមានសភាពថ្លា B- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាម C- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាមក្រៃ D- ទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក	B
444	តើអក្សរ C បញ្ជាក់ពីទឹកភ្លោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងការបំពេញប៉ាតូក្រាហ្វ ? A- ទឹកភ្លោះមានសភាពថ្លា B- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាម C- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាមក្រៃ D- ទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក	A
445	តើអក្សរ M បញ្ជាក់ពីទឹកភ្លោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងការបំពេញប៉ាតូក្រាហ្វ? A- ទឹកភ្លោះមានសភាពថ្លា B- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាម C- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាមក្រៃ D- ទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក	C

446	តើអក្សរ I បញ្ជាក់ពីទឹកភ្លោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងការបំពេញប៉ាតូក្រាហ្វ ? A- ទឹកភ្លោះមានសភាពថ្លា B- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាម C- ទឹកភ្លោះមានលាយឈាមកព្រៃ D- ទឹកភ្លោះមិនទាន់បែក	D
447	តើស្ថានភាពណាមួយដែលជួយពន្លឿនការឈឺពោះសម្រាល ចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២? A- ដេកផ្អៀងស្តាំ ក្បាលខ្ពស់ B- លុតជង្គង់ ចំតិតតូច C- ដេកថ្ងារ សណ្តូកជើង D- អង្គុយចោងហោង	D
448	តើការវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចដែលបញ្ជាក់ថាការសម្រាលមានឧបសគ្គ ផ្អែកលើប៉ាតូក្រាហ្វ? A- ខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន B- ខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ន C- ខាងស្តាំនៃបន្ទាត់អន្តរាគមន៍ D- ខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់អន្តរាគមន៍	A
449	តើរៀងរាល់ប៉ុន្មានម៉ោងម្តង ដែលជាធម្មតាអ្នកត្រូវតាមដានសីតុណ្ហភាព ផ្អែកលើប៉ាតូក្រាហ្វ ? A- កន្លះម៉ោងម្តង B- ១ ម៉ោងម្តង C- ២ម៉ោងម្តង D- ៣ម៉ោងម្តង	C
450	តើដំណាក់កាលស្ងៀមស្ងាត់មានរយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវធ្វើការបញ្ជូន ? A- លើសពី ១២ម៉ោង B- លើសពី ៨ម៉ោង C- លើសពី ៦ម៉ោង D- លើសពី ៤ម៉ោង	B

451	តើការរលើងនៃសុកជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមុនគេ? A- ពីតែមខាងមុខ និងក្រោយ B- ពីតែមចំហៀងឆ្វេងស្តាំ C- ពីតែមខាងលើនៃស្បូន D- ពីចំណុចកណ្តាលនៃស្បូន	D
452	ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវទប់ស្បូនពីលើពោះនៅពេលទំលាក់សុក? A- ឱ្យមានលំនឹង និង ការពារការពន្លាត់ស្បូន B- ការពារការរំហែកស្បូន C- ការពារការប៉ះទង្គិច D- ការពារការធ្លាក់ឈាម	A
453	តើមាត់ស្បូនមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែលអាចឱ្យមាត់ស្បូនបើកបានល្អ ? A- ទន់-យឺត B- ទន់-ក្រាស់ C- ក្រាស់-យឺត D- ក្រាស់-រឹង	A
454	តើសកម្មភាពមួយណាដែល មិនមែនជាការជួយស្រ្តីក្នុងពេលកំពុងសម្រាល ? A- រៀបចំស្ថានភាពរបស់ម្តាយក្នុងការប្រឹង B- ជួយស្រ្តីជាមាតាក្នុងការប្រឹងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ C- រៀបចំផ្លាស់ប្តូរកំរាលឱ្យគាត់ D- ជួយស្រ្តីក្នុងការបញ្ចេញក្បាលទារក	C
455	តើសរសៃឈាមអ្វីខ្លះ ចំនួនប៉ុន្មាន ដែលមាននៅក្នុងទងសុក? អាអ័ក ២ និង វ៉ែន១ B- សរសៃឈាមអាកទែរ ១ និង វ៉ែន២ C- សរសៃឈាមអាកទែរ ២ និង វ៉ែន១ D- សរសៃឈាមអាអ័ក ១ និង វ៉ែន២	A- សរសៃឈាម C

456	តើរបៀបមួយណាជាការទំលាក់សុកតាមបែបសកម្ម ? A- ទំលាក់សុកដោយលូកបារនឹងដៃ B- ទំលាក់សុកដោយប្រើអ៊ីកហ្គោមេទ្រីន C- ទំលាក់សុកដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន D- ទំលាក់សុកដោយប្រើសំភារៈ	C
457	តើអ្វីមួយជានិយមន័យនៃពាក្យ Dystocia Dynamique ? A- សភាពមិនធម្មតានៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន និង ការបើកនៃមាត់ស្បូន B- សភាពមិនធម្មតានៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន និង ការចុះចូលនៃក្បាលកូន C- សភាពមិនធម្មតារបស់ផ្ទឹងអាងត្រជាក់ម្តាយ D- សភាពមិនធម្មតារបស់ផ្ទឹងអាងត្រជាក់ម្តាយ និង ការបើកនៃមាត់ស្បូន	A
458	តើអ្វីមួយជានិយមន័យនៃពាក្យ Dystocia Mecanique ? A- សភាពមិនធម្មតានៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន និង ការបើកនៃមាត់ស្បូន B- សភាពមិនធម្មតានៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន និង ការចុះចូលនៃក្បាលកូន C- សភាពមិនធម្មតារបស់ផ្ទឹងអាងត្រជាក់ម្តាយ D- សភាពមិនធម្មតារបស់ផ្ទឹងអាងត្រជាក់ម្តាយ និង ការបើកនៃមាត់ស្បូន	C
459	តើអ្វីខ្លះជាសកម្មភាពនៃការតាមដានក្នុងដំណាក់កាលយឺតអូសបន្លាយចំពោះម្តាយ ? A- ពិនិត្យមើលសភាពស្លេកស្លាំងរបស់ស្រ្តី B- ពិនិត្យការកន្ត្រាក់របស់ស្បូន និង សភាពមាត់ស្បូន C- ឱ្យគាត់សំរាកស្ងៀម និង ផ្តល់ជាតិទឹក D- យកសញ្ញាជីវិត និង ធ្វើការបូមទឹកនោម	B
460	តើអ្វីមួយជាសកម្មភាព នៃការតាមដានក្នុងដំណាក់កាលយឺតអូសបន្លាយចំពោះទារក ? A- ពិនិត្យសភាពនៃទារកក្នុងផ្ទៃ ឬចង្វាក់បេះដូងទារក B- ពិនិត្យមើលការចុះចូលនៃក្បាលកូន C- ពិនិត្យមើលទម្រង់បង្ហាញរបស់កូន D- ពិនិត្យមើលសភាពស្រោមទឹកភ្លោះ	A

461	ដូចម្តេចដែលហៅថាទងសុកធ្លាក់មកក្រៅ ? A- ការធ្លាក់ទងសុកមុនពេលដែលផ្នែកណាមួយនៃទារកបានបង្ហាញ B- ការធ្លាក់ទងសុកពេលដែលផ្នែកណាមួយនៃទារកបានបង្ហាញ C- ការធ្លាក់សុកមុនពេលដែលផ្នែកណាមួយនៃទារកបានបង្ហាញ D- ការធ្លាក់ទងសុក និង សុក មុនពេលដែលផ្នែកណាមួយនៃទារកបានបង្ហាញ	A
462	តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាដែលជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេក្នុងដំណាក់កាលទី៣ និង ទី៤នៃការសម្រាល? A- ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល ពន្លាត់ស្បូន B- ការរំហែកស្បូន- ពន្លាត់ស្បូន C- ការអស់កម្លាំងរបស់ម្តាយ - ពន្លាត់ស្បូន D- ការរំហែកទ្វារមាស - ពន្លាត់ស្បូន	A
463	តើការធ្លាក់ឈាមដែលអាចបណ្តាលឱ្យម្តាយស្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលណា ? A- ២៤ ម៉ោង ក្រោយសម្រាលជាពិសេស ១-២ ម៉ោង B- ២៤ ម៉ោង ក្រោយសម្រាលជាពិសេស ៧-៨ ម៉ោង C- ២៨ ម៉ោង ក្រោយសម្រាលជាពិសេស ១-២ ម៉ោង D- ២៨ ម៉ោង ក្រោយសម្រាលជាពិសេស ៥-៦ ម៉ោង	A
464	តើនៅក្នុងករណីមួយណាដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់ការសម្រាលដោយបូម ? A- មានភាពយឺតយ៉ាវនៅដំណាក់កាលទី១ នៃការសម្រាល B- ដើម្បីកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃដំណាក់កាលទី១នៃការសម្រាល C- មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងដំណាក់កាលទី២នៃការសម្រាល D- ទារកបង្ហាញទម្រង់មិនធម្មតា	C
465	តើទម្រង់បង្ហាញណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើការសម្រាលដោយបូមបាន ? A- ទម្រង់បង្ហាញគូថ B- ទម្រង់បង្ហាញមុខ C- ទម្រង់បង្ហាញកំពូលក្បាល D- ទម្រង់បង្ហាញស្មា	C

466	តើចម្ងាយប៉ុន្មានសង្ខីម៉ែត្រខាងមុខបង្ហើយក្រោយដែលអ្នកត្រូវដាក់ក្បាលបូមឱ្យចំចំណុចកណ្តាល របស់ វាស្ថិតនៅលើចំនុចកោង ? A- ១ស.ម B- ២ស.ម C- ៣ស.ម D- ៤ស.ម	A
467	តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វី ឬយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះទងសុកធ្លាក់មកក្រៅហើយមិនលោត ? A- ធ្វើការសម្រាលដោយប្រើឧបករណ៍ជំនួយ B- ធ្វើការសម្រាលធម្មតា C- ធ្វើការសម្រាលដោយទាញជើងចេញមកក្រៅ D- ជួយទ្រសុកកុំឱ្យចេញមកក្រៅ	B
468	តើស្ថានភាពមួយណាដែលជាឥរិយាបថងាយស្រួលក្នុងការប្រឹងបញ្ជាញទារក ? A- អង្គុយ ឬ ផ្អែកពាក់កណ្តាល B- ដេកសណ្ឋានជើងត្រង់ C- ឈរត្រង់ ឬ ជ្រៀងបន្តិច D- ដេកថ្ងារ អង្គុញជើង	A
469	ដូចម្តេចដែលហៅថាការឈឺពោះសម្រាលអូសបន្លាយ ក្នុងរយៈពេលយឺត ? A- ការបើកមាត់ស្បូនបាន ៤ ស.ម មានរយៈពេលលើស ពី៨ម៉ោង B- ការបើកមាត់ស្បូនបាន ៤ ស.ម មានរយៈពេលលើសពី៦ម៉ោង C- ការបើកមាត់ស្បូនបាន ៤ ស.ម មានរយៈពេលលើសពី៤ម៉ោង D- ការបើកមាត់ស្បូនបាន ៤ ស.ម មានរយៈពេលលើសពី២ម៉ោង	A
470	តើគេអាចរកឃើញសញ្ញាអ្វីខ្លះតាមរយៈការស្ទាបពិនិត្យពោះពេលឈឺពោះសម្រាលមានបសគ្គ ? A- ក្បាលនៅពីក្រោមតែម្ខាងថ្ងាស B- ក្បាលនៅពីលើតែម្ខាងថ្ងាស C- ក្បាលនៅស្មើតែម្ខាងថ្ងាស D- ក្បាលនៅពាក់កណ្តាលរវាងផ្ចិត និងតែម្ខាងថ្ងាស	B

471	តើពេទ្យវិនិច្ឆ័យមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាជាការឈឺពោះចោល ? A- មាត់ស្បូនអត់បើក/ស្បូនកន្ត្រាក់មិនញឹកញាប់ B- ការបើកមាត់ស្បូនឯកខាងស្តាំបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ននៃប៉ាតូក្រាហូ C- មាត់ស្បូនឈប់បើកបន្តនិងទម្រង់កូនចុះល្អ ស្បូនកន្ត្រាក់ល្អ D- ស្បូនកន្ត្រាក់តិចជាង២ដង/១០នាទី កន្ត្រាក់ម្តងៗតិចជាង៤០វិនាទី	A
472	តើមូលហេតុអ្វីធ្វើឱ្យមានការបង្កពេទ្យក្រោយសម្រាលដែលអ្នកសប្បាយនិង មានឧបសគ្គ? A- មិនមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ B- ដោយសារការលូតលាស់មាសញឹកញាប់ C- ការឈឺពោះសម្រាលយូរ D- ការបំបែកស្រោមទឹកភ្លោះ ពេលប្រឹងបញ្ចេញទារក	B
473	តើពេទ្យវិនិច្ឆ័យមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាមានភាពមិនសមមាត្ររវាងអាងផ្ចឹងត្រគាត ម្តាយ និងក្បាលទារក? A- ការបើកមាត់ស្បូនបើកលើសពី៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូន B- ការបើកមាត់ស្បូនឯកខាងស្តាំបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ននៃប៉ាតូក្រាហូ C- មាត់ស្បូនបើកបន្ត ទម្រង់កូនចុះមិនល្អ និងស្បូនកន្ត្រាក់បានល្អ D- ស្បូនកន្ត្រាក់តិចជាង២ដង/១០នាទី ហើយកន្ត្រាក់ម្តងៗតិចជាង៤០វិនាទី	C
474	តើពេទ្យវិនិច្ឆ័យមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពស្បូនមិនគ្រប់គ្រាន់ នៅពេលឈឺពោះសម្រាល? A- ការបើកមាត់ស្បូនបើកលើសពី៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូន B- ការបើកមាត់ស្បូនឯកខាងស្តាំបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ននៃប៉ាតូក្រាហូ C- មាត់ស្បូនឈប់បើកបន្តនិងទម្រង់កូនចុះល្អ ស្បូនកន្ត្រាក់ល្អ D- ស្បូនកន្ត្រាក់តិចជាង២ដង/១០នាទី ហើយកន្ត្រាក់ម្តងៗតិចជាង៤០វិនាទី	D
475	តើពេទ្យវិនិច្ឆ័យមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាការឈឺពោះសម្រាលចូលដំណាក់កាលយឺតអ្នកសប្បាយ? A- ការបើកមាត់ស្បូនបើកលើសពី៤ស.មក្រោយ៨ម៉ោងនៃការកន្ត្រាក់ស្បូន B- ការបើកមាត់ស្បូនឯកខាងស្តាំបន្ទាត់ប្រកាសអាសន្ននៃប៉ាតូក្រាហូ C- មាត់ស្បូននៅបើកបន្តនិងទម្រង់កូនចុះល្អ ស្បូនកន្ត្រាក់ល្អ D- ស្បូនកន្ត្រាក់តិចជាង២ដង/១០នាទី កន្ត្រាក់ម្តងៗតិចជាង៤០វិនាទី	B

476	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច ក្នុងករណីទម្រង់បង្ហាញមិនល្អ និងរយៈពេលប្រឹងបញ្ចេញទារកអូសបន្លាយ ? A- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាលដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន B- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាលដោយឱ្យស្រ្តីធ្វើចលនា C- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាលដោយឱ្យស្រ្តី ញ៉ាំទឹកឱ្យបានច្រើន D- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាលដោយបូម ឬដប់	A
477	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច ពេលឈឺពោះសម្រាលមានការបង្កពេក ក្នុងរយៈពេលយឺតអូសបន្លាយ ? A- ឱ្យស្រ្តីញ៉ាំទឹកឱ្យបានច្រើន និងផ្តល់ល្បាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក B- ឱ្យស្រ្តីធ្វើចលនា និងផ្តល់ល្បាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក C- ប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន និងផ្តល់ល្បាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក D- សម្រាលឱ្យរហ័សដោយបូមឬដប់ និងផ្តល់ល្បាយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	C
478	តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើក្បាលទារកស្ថិតនៅកំពស់ ០ ពេលឈឺពោះសម្រាលក្នុងរយៈពេលប្រឹងអូសបន្លាយ ? A- ធ្វើការសម្រាលដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន B- ធ្វើការសម្រាលដោយបូម C- ធ្វើការសម្រាលធម្មតា D- ធ្វើការសម្រាលដោយរះកាត់	B
479	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើក្បាលទារកចិតនៅកំពស់ក្បាល៣/៥ ពេលឈឺពោះសម្រាល ក្នុងរយៈពេលប្រឹងអូសបន្លាយ ? A- ធ្វើការសម្រាលដោយប្រើអុកស៊ីតូស៊ីន B- ធ្វើការសម្រាលដោយបូម C- ធ្វើការសម្រាលធម្មតា D- ធ្វើការសម្រាលដោយរះកាត់	D
480	តើចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃមានល្បឿនចំនួនប៉ុន្មាន ក្នុងករណីទារកចុះខ្សោយ ? A- តិចជាង១០០ ឬលើសពី១៦០ដងក្នុង១នាទី B- ១២០ទៅ១៦០ដងក្នុង១នាទី C- ១២០ ទៅ ១៤០ដងក្នុង១នាទី D- តិចជាង ៨០ដង បលើសពី១២០ដងក្នុង ១នាទី	A

481	តើរយៈពេលយឺតអូសបន្លាយ (Prolong latent phase) នៃដំណាក់កាលទី ១ (first stage) នៃការឈឺពោះសម្រាលមានរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ? (ផ្អែកលើប៉ាតូក្រាហ្វ) A- លើសពី ២ ម៉ោង B- លើសពី ៤ ម៉ោង C- លើសពី ៦ ម៉ោង D- លើសពី ៨ ម៉ោង	D
482	តើអ្វីមួយជាគោលបំណងនៃការធ្វើការបំបែកស្រោមទឹកភ្លោះ ? A- បង្កើនការឈឺពោះសម្រាល B- កាត់បន្ថយការធ្លាក់ឈាម C- ជួយសម្រួលដល់ការឈឺចាប់ D- សម្រួលដល់ការបង្វិលរបស់ទារក	A
483	តើអ្វីខ្លះជាពេទ្យសញ្ញានៃការបង្កពេទ្យក្នុងដំណាក់កាលអូសបន្លាយនៃការឈឺពោះសម្រាល ? A- គ្រុនក្តៅ ធ្លាក់ទឹកអំពិល មានធំក្លិន B- ធ្លាក់ទឹកអំពិល លាយឈាម C- ធ្លាក់ទឹកភ្លោះ លាយឈាមតិចៗ D- ធំក្លិននៅទ្វារមាស	A
484	តើអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវកត់ត្រាចូលក្នុងប៉ាតូក្រាហ្វ ពេលស្រ្តីមកដល់ដំបូងនៃការសម្រាលអូសបន្លាយ និងមានឧបសគ្គ ? A- ប្រវត្តិរបស់ស្រ្តី សញ្ញាជីវិត B- ចង្វាក់បេះដូង សភាពទឹកភ្លោះ ការប្រើប្រាស់ឱសថ C- ការរំកិលចុះរបស់ក្បាល និងការបើកមាត់ស្បូន D- ចម្លើយខាងលើទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	D
485	តើលក្ខណៈដូចម្តេច ដែលជាលក្ខណៈនៃការកន្ត្រាក់ស្បូនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈសកម្មអូសបន្លាយ នៃការឈឺពោះសម្រាល ? (ផ្អែកតាមប៉ាតូក្រាហ្វ) A- កន្ត្រាក់ ២ដង/១០នាទី កន្ត្រាក់ម្តងៗលើសពី ៣០វិនាទី B- កន្ត្រាក់តិចជាង ៣ដង/១០នាទី កន្ត្រាក់ម្តងៗខ្លីជាង ៤០វិនាទី C- កន្ត្រាក់តិចជាង ២ដង/១០នាទី កន្ត្រាក់ម្តងៗខ្លីជាង ៤០វិនាទី D- កន្ត្រាក់ ៣ដង/១០នាទី កន្ត្រាក់ម្តងៗលើសពី ៤០វិនាទី	D

486	តើសញ្ញា Bandl'ring មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការឈឺពោះសម្រាលមានឧបសគ្គ ? A- ឃើញស្នាមផតមួយកាត់ពីលើតំបន់ពោះត្រង់កម្ពស់ផ្ចិត B- ឃើញស្នាមផតមួយកាត់ពីលើតំបន់ពោះក្រោមកម្ពស់ផ្ចិត C- ឃើញស្នាមផតមួយកាត់ពីលើតំបន់ពោះលើកម្ពស់ផ្ចិត D- ឃើញស្នាមផតមួយកាត់ពីលើពោះចន្លោះផ្ចិតនិងថ្ងាស	A
487	តើអ្វីខ្លះជាសញ្ញានៃការជិតរហែកស្បូន? A- ស្បូនកន្ត្រាក់ ឈឺចាប់ពេលស្លាប B- Bandl'sring និងភាពឈឺខ្លាំងនៅពេលប៉ះ (Tenderness) C- ពេលស្លាបពោះឃើញរាងកាយទារកយ៉ាងងាយ D- ដឹងចម្លាយញាប់ ស្តុក	B
488	តើទម្រង់បង្ហាញណាមួយដែលអាចធ្វើការសម្រាលកូនតាមទ្វារមាសបាន ? A- ហុចជើង ឬ បង្ហាញតូច B- ហុចស្មា C- ហុចដៃ D- ហុចថ្ងាស	A
489	តើក្នុងដំណាក់កាលឬករណីមួយណាដែលអ្នកអាចដាក់ស្បូននោះមេរយៈពេលយូរចំពោះស្ត្រី? A- ដំណាក់កាលទី១នៃការសម្រាល B- ដំណាក់កាលទី៣នៃការសម្រាល C- ស្បូនកន្ត្រាក់ខ្សោយ D- មុនពេលអនុវត្តន៍ប្រើឧបករណ៍ជំនួយការសម្រាល	C
490	តើវិធានបទរបស់ស្ត្រីរបៀបមួយណាដែលប្រកបដោយសុខភាពសំរាប់អ្នកក្នុងការជួយសម្រួល ដល់ការបញ្ចេញក្បាលទារក? A- ការអង្គុយ ឬផ្អែកពាក់កណ្តាល B- ការច្រត់ដៃ និង ច្រត់ជង្គង់ C- ការអង្គុយចោងហោង ឬឈរ D- ការដេកចំហៀងខាងឆ្វេង	A

491	តើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យ ដើម្បីបន្ថយការបង្ករោគដោយស្រ្តីបត្រក្រុមបេ ចំពោះទារកប្រសិនបើទឹកភ្លោះបែកលើសពី១៨ម៉ោង? A- Penicilline ឬ Ampicilline B- Streptomycine ឬ Kanamycine C- Lincomycine ឬ Erytromycine D- Ofloxacin ឬ Cyprofloxacin	A
492	តើស្ថានភាពមួយណាដែលអ្នកគួរលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឱ្យផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីបន្ថយការធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈឺពោះសម្រាលបង្ហាញមុខ នៅដំណាក់កាលទី២ ? A- ឈរ B- អង្គុយ C- ដេកជ្រាប D- ដេកផ្អៀង	A
493	តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងម្តង ដែលអ្នកត្រូវលូកពិនិត្យទារកមានសោយប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈឺពោះសម្រាល ទម្រង់បង្ហាញមុខ ? A- ១៥ នាទី - ៣០ នាទីម្តង B- ៣០ នាទី - ១ម៉ោងម្តង C- ១ម៉ោង- ២ម៉ោងម្តង D- ២ម៉ោង-៤ម៉ោងម្តង	D
494	តើក្រោយពេលសម្រាល ជាធម្មតាស្បូនមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច ? A- ស្បូនទន់ B- ស្បូនកាន់តែរីកធំ C- ស្បូនរឹងតឹង D- ស្បូនទន់រួមតូច	C
495	តើការធ្លាក់ឈាមធម្មតានៅ ២៤ម៉ោងក្រោយសម្រាលមានលក្ខណៈដូចម្តេច ? A- ឈាមច្រើនជាងឈាមរដូវប្រចាំខែ B- ឈាមហូរជាប់ C- ឈាមក្រហមស្រស់ D- ឈាមដូចឈាមរដូវប្រចាំខែ	D

496	តើរៀងរាល់ប៉ុន្មាននាទីម្តង ដែលអ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យស្បូនក្រោយពេលទំលាក់សុក ? A- ១៥នាទីម្តង B- ២០នាទីម្តង C- ២៥នាទីម្តង D- ៣០នាទីម្តង	A
497	តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច បើស្បូននៅតែទន់ និងមានដក់កំណកឈាម ? A- ចាក្កអុកស៊ីតូស៊ីន B- ឈ្លីស្បូន C- ចាក់សេរ៉ូម D- ទប់ស្បូន	B
498	តើអ្វីមួយដែលស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូន មិនគួរបរិភោគ ? A- បន្លែស្រស់ B- សាច់ផ្សេងៗ C- តែ កាហ្វេ D- ស៊ីត	C
499	តើអាហារអ្វីដែលស្ត្រីទល់ឈាមកគួរបរិភោគក្រោយសម្រាលកូន ? A- បន្លែផ្លែឈើ B- ហូបសាច់ច្រើន C- ហូបអាហារសាប D- ហូបម្ហូបគោក	A
500	តើនៅពេលណាទារកអាចងូតទឹកបានបន្ទាប់ពីសម្រាល ? A- កើតភ្លាម B- ១ម៉ោងក្រោយកើត C- ៦- ២៤ម៉ោង D- ៣ថ្ងៃ	C

501	តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីក្រោយពេលសម្រាល ដែលពិបាកនោម ? A- ផឹកទឹកឱ្យបានច្រើន B- ឱ្យលេបថ្នាំ C- ចាក់ទឹកក្តៅខណ្ឌៗលើសរីរាង្គបន្តពូជ D- ចាក់សេរ៉ូម	C
502	តើនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវចាក់វីតាមីនកា ឱ្យទារក ? A- ពេលកើតភ្លាម B- ១ថ្ងៃក្រោយកើត C- អាយុបាន១ខែ D- រួមជាមួយការចាក់ថ្នាំបង្ការ	A
503	តើនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើការកាត់ទ្វារមាសនៅពេលសម្រាលកូន ? A- ពេលឃើញក្បាលកូន B- បើរំលោភបំពានស្តើងខ្លាំង C- ពេលមាត់ស្បូនបើកអស់ D- ពេលស្បូនកន្ត្រាក់	B
504	តើត្រង់មុំប៉ុន្មានអង្សានៃ fourchette ទៅបើរំលោភ ដែលជាកន្លែងត្រូវចាក់ថ្នាំស្លឹក ? A- ១៥ អង្សា B- ២៥ អង្សា C- ៣៥ អង្សា D- ៤៥អង្សា	D
505	តើអ្វីមួយជាបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះស្ត្រីប្រសិនបើចាក់ថ្នាំស្លឹកនៅតំបន់បើរំលោភចូលក្នុងសរសៃឈាម ? A- ឈឺចាប់ពេលចាក់ B- បេះដូងដើរមិនប្រក្រតី នឹងអាចស្លាប់ C- មានរបាំងនៅកន្លែងចាក់ D- មានជាំកន្លែងចាក់	B

506	តើអ្នកត្រូវកាត់ទ្វារមាសយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីការពារក្បាលទារកមិនឱ្យមានរបួស ? A- ដៃទប់នៅបើរីណេកខាងក្រៅ រួចសឹកកន្ត្រែកកាត់ B- កាត់ទ្វារមាសពេលក្បាលកូនចេញផុត C- ដាក់ម្រាមដៃ២ នៅចន្លោះក្បាលទារក និងបើរីណេ D- កន្ត្រែកដាក់ឱ្យជាប់បើរីណេ ហើយរុញក្បាលទារកឱ្យខ្លាំង	C
507	តើបរិមាណឈាមហូរតាមទ្វារមាសប៉ុន្មានមីលីលីត្រ ទើបហៅថាធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល ? A- ១០០ មល B- ១៥០ មល C- ២០០មល D- ៥០០មល	D
508	តើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ទើបហៅថាការធ្លាក់ឈាមភ្លាមៗក្រោយសម្រាល ? A- ១ថ្ងៃ B- ២ថ្ងៃ C- ៣ថ្ងៃ D- មួយអាទិត្យ	A
509	តើអ្វីមួយជាមូលហេតុធ្វើឱ្យស្បូនមិនកន្ត្រាក់ល្អក្រោយសម្រាល ? A- រំហែកទ្វារមាស B- រំហែកនៅបើរីណេ C- សល់បំណែកសុក ភ្នាស និងកំណកឈាម D- រំហែកមាត់ស្បូន	C
510	តើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលស្ត្រីអាចស្លាប់ដោយសារការហូរឈាមយ៉ាងលឿនបំផុតក្រោយពេលសម្រាល ? A- ១០នាទី B- ២០ នាទី C- ៣០នាទី D- ៤០នាទី	A

511	តើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើស្ត្រីមិនបេះចេញពីជញ្ជាំងស្បូន ? A- ចាប់ទាញ B- បញ្ជូន C- បញ្ចូលស្បូន D- លូកបារដោយផ្ទាល់	A
512	តើអ្វីមួយជាគោលបំណងនៃការទប់ស្បូន និងបន្តការសន្លឹកទងស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលទម្លាក់ស្ត្រី ? A- ការការពារហែកស្បូន B- ការការពារការពន្លាតស្បូន C- ទប់ការរីកធំនៃស្បូន D- ទប់ការកន្ត្រាក់ស្បូន	B
513	តើអ្វីមួយដែល មិនមែនជាផលវិបាកនៃការបារទំលាក់បំណែកស្ត្រីដោយដៃ ? A- ធ្លាក់ឈាម និងស្បូន B- បង្កពេក និងស្បូន C- រលូស ឬហែកស្បូន D- ការពន្លាតស្បូន	D
514	តើស្បូនមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះស្ត្រីកូនច្រើនដង ទារកធំ និងមានទឹកភ្លោះច្រើន? A- ស្បូនយឺត សន្លឹក B- ស្បូនស្រុត C- ស្បូនទំហំធំម្យ៉ាង D- ស្បូនស្លើង	A
515	តើរៀងរាល់ប៉ុន្មាននាទីម្តង ក្នុងរយៈពេល៦ម៉ោងដំបូង ដែលអ្នកត្រូវយកសញ្ញាជីវិត បន្ទាប់ពីបានបារទំលាក់ស្ត្រីដោយដៃ ? A- ៦០នាទី B- ៥០នាទី C- ៤០នាទី D- ៣០នាទី	D

516	តើអ្វីខ្លះជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល? A- ល្បឿន ជំនាញ ពិភាក្សា B- ល្បឿន ជំនាញ អាទិភាព C- ល្បឿន អប់រំ អាទិភាព D- ល្បឿន អប់រំ ពិភាក្សា	B
517	តើថ្នាំគ្រាប់អ្វីដែលអ្នកត្រូវផ្តល់បន្ថែមដល់ស្ត្រីធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល មុនពេលគាត់ចេញទៅផ្ទះ ? A- អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក B- ថ្នាំព្រូន C- ថ្នាំជាតិដែក D- ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់	C
518	តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីជា ដំបូង និងបន្ទាន់ប្រសិនបើស្បូនទន់នៅដំណាក់កាលសម្រាល ? A- ចាក់ថ្នាំកម្រិតស្បូន B- ចាក់សេរ៉ូម C- ឈ្លីស្បូន D- លេបថ្នាំ	C
519	ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវសង្កត់លើស្បូនស្ត្រី ក្នុងពេលពិនិត្យមាត់ស្បូន ? A- កុំឱ្យស្បូនរីកធំ B- មាត់ស្បូនខិតចុះក្រោម C- ស្បូនមានលំនឹង D- ជំរុញឱ្យស្បូនរឹង	B
520	តើអ្វីជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យមានដុំកំណកឈាម (hematome)នៅទ្វារមាស ? A- រហែកសរសៃវ៉ែនក្នុងទ្វារមាស B- កំណកឈាមនៅក្នុងទ្វារមាស C- ស្តុកជាប់នៅក្នុងទ្វារមាស D- ការលូតទ្វារមាស	A

521	តើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលហៅថាការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដោយសារសុកមិនធ្លាក់ ?	B
	A- ១៥នាទី	
	B- ៣០នាទី	
	C- ៥០នាទី	
	D- ៦០នាទី	