




ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

បទប្បញ្ញត្តិ
កម្មវិធីសិក្សា

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ភាគ១

១១



គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកចាយ



បញ្ជីខ្ចីសៀវភៅ

សាលារៀន :

កម្រងសាលារៀន :

ក្រុង / ស្រុក / ខណ្ឌ :

រាជធានី / ខេត្ត :

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលសាលារៀនទទួលបានសៀវភៅ :

ឈ្មោះសិស្ស ខ្ចីសៀវភៅ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ខ្ចីសៀវភៅ	សភាពលក្ខណៈ សៀវភៅ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សងសៀវភៅ	សភាពលក្ខណៈ សៀវភៅ

ចំពោះគ្រូបង្រៀន

សូមសរសេរឈ្មោះសិស្សឱ្យបានច្បាស់នៅក្នុងកូឡោន “ឈ្មោះសិស្សខ្ចីសៀវភៅ” ។

សូមប្រើអក្សរខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបញ្ជាក់សភាពលក្ខណៈរបស់សៀវភៅ :

ក. (សៀវភៅថ្មី)

ខ. (សៀវភៅប្រើហើយ ដែលនៅមានសភាពល្អ)

គ. (សៀវភៅប្រើហើយ ដែលនៅមានសភាពមធ្យម)

ឃ. (សៀវភៅប្រើហើយ ដែលនៅមានសភាពអន់ឬចាស់)

សូមលើកទឹកចិត្តសិស្សនិងជួយសិស្សក្នុងការថែរក្សាសៀវភៅដែលបានខ្ចី ។



ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី

១១

ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ភាគ១



បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកចាយ

ឆ្នាំ១៩៩៨ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ

គណៈកម្មការពិនិត្យ	លោក អ៊ី ស៊ាងលី	លោកស្រី ទី ប៉ូលីវើត	លោក ឱក លីនដា
	លោកស្រី អ៊ុក សុមនី	លោក ចាន់ រ៉ាដា	លោក ប៊ុន រុ
	លោក នូ វ៉េត		
អ្នកវាយអត្ថបទ	លោកស្រី ឈាង ណារីន		
វិចិត្រករ	លោក គន់ ជាតិ		
អ្នករៀបរៀង	លោក ឡុង សុផេង	លោក ព្រំ ដួន	
អ្នករចនាទំព័រ	លោក ខែម ម៉ារី		
អ្នកឯកទេស	លោក អ៊ុន គឹមស្រីន		
គណៈកម្មការពិនិត្យ	លោក ថៃ ហេង	លោក សុខ ជី	លោក ប៊ូ សន
			លោក ហេង ចន្ទា

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយ **ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** តាមប្រកាសលេខ២២៩៣ អយក. ប្រក. ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀន ។

ក្រុមការងារកែលម្អសៀវភៅសិក្សាគោល មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ក្រុមគ្រូនិងគ្រូពិនិត្យ	ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន	ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរៀន
	លោកជំទាវ ទន់ សាអ៊ឹម	ឯកឧត្តម ពុត សាមិត្ត
	ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សៀង សុវណ្ណា	ឯកឧត្តម សុខ ប្ញទ្ធី
	ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុក សារ៉ុម	លោក ស៊ុន ប៊ុណ្ណា
	លោក ព្រីង មរកត	លោក វ៉ា រុទ្ធី
រៀបរៀងនិងពិនិត្យ	លោក ប៊ូ សន	លោកស៊ឹម វិសុទ្ធ
	លោក ម៉ែន រ៉ាំង	លោកស្រី សេក ភិរុន
	លោក គង់ ប៊ុនអៀង	លោក ចាន់ រ៉ាដា
	លោក ហុក ចន្ទា	
សម្របសម្រួល	លោក ស៊ឹម ចាន់ធី	លោក ហ៊ុន សាម៉ុល
	លោក ជុំ សត្យា	លោកស្រីម៉ៅ សម្បស្ស
រចនាទំព័រ	លោក ប៉ាន់ ជាតិ	
វិចិត្រកម្ម	លោកស្រី ស៊ុន ស៊ីណាត	
ឯកទេសមុខវិជ្ជា	ឯកឧត្តម ឡៅ ឈីវអ៊ាវ	
គណៈកម្មការពិនិត្យ		

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយ **ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** តាមប្រកាសលេខ..... អយក. ប្រក. ចុះថ្ងៃ..... ខែ..... ឆ្នាំ..... បញ្ជាក់ ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀន ។

ហាមថតចម្លងសៀវភៅនេះ

រក្សាសិទ្ធិ ©
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកចាយ
 បោះពុម្ពលើកទី... ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន ... ច្បាប់
 ISBN 9-789-995-000-714

អារម្ភកថា

សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី 11 ភាគ 1 រួមមាន 4 ជំពូក សិក្សាអំពី ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា អនុគមន៍អិចស្ទ៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រម៉ាទ្រីស ។

ការរៀបចំមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានទម្រង់ដូចខាងក្រោម ៖

- មេរៀននីមួយៗបានបញ្ជាក់អំពីវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់
- ខ្លឹមសារមេរៀននីមួយៗ ផ្ដើមចេញពីឧទាហរណ៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
- មានលំហាត់ប្រតិបត្តិសម្រាប់ពង្រឹងចំណេះដឹងសិស្ស
- នៅចុងមេរៀននៃជំពូកនីមួយៗមានសង្ខេបគន្លឹះមេរៀនសម្រាប់ឱ្យសិស្សចងចាំនូវអ្វីដែលបានរៀនរួច
- មេរៀននីមួយៗមានលំហាត់និងលំហាត់សម្រាប់ជំពូកសម្រាប់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង
- នៅចុងទំព័រនៃសៀវភៅនេះមានចម្លើយលំហាត់សម្រាប់ឱ្យសិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ ។

សៀវភៅសិក្សានេះមានការចូលរួមពី ៖

- លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលបានសាកល្បងជួយផ្តល់យោបល់
- លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលបានសាកល្បងបង្រៀននូវសៀវភៅសិក្សានេះ
- គណៈកម្មការវាយតម្លៃដែលបានជួយត្រួតពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់ ។

ដើម្បីឱ្យសៀវភៅសិក្សាកាន់តែល្អប្រសើរ យើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលរាល់ការវិនិច្ឆ័យ និងកែលម្អបន្ថែមអំពីសំណាក់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយក្តីរីករាយ ។

គណៈកម្មការនិពន្ធ

បញ្ជីអត្ថបទ

ជំពូកទី 1	ស្វិតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា.....	01
	មេរៀនទី 1 : ស្វិតចំនួនពិត.....	02
	មេរៀនទី 2 : ស្វិតនព្វន្ត.....	08
	មេរៀនទី 3 : ស្វិតធរណីមាត្រ.....	14
	មេរៀនទី 4 : ផលបូកក្នុងនៃស្វិតផ្សេងៗ.....	24
	មេរៀនទី 5 : ទំនាក់ទំនងក្នុងនៃស្វិត.....	36
	មេរៀនទី 6 : វិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា.....	44
ជំពូកទី 2	អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត.....	57
	មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល.....	58
	មេរៀនទី 2 : អនុគមន៍លោការីត.....	72
ជំពូកទី 3	អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ.....	89
	មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ.....	90
	មេរៀនទី 2 : រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ.....	110
	មេរៀនទី 3 : អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ.....	120
	មេរៀនទី 4 : សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ.....	128
	មេរៀនទី 5 : សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រផ្សេងទៀត.....	142
ជំពូកទី 4	ម៉ាទ្រីស ដេទែរមីណង់ និងបម្លែងលីនេអ៊ែរ.....	161
	មេរៀនទី 1 : ម៉ាទ្រីស.....	162
	មេរៀនទី 2 : ដេទែរមីណង់.....	180
	មេរៀនទី 3 : ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ.....	188
បទានក្រម		218



1

ស្វ៊ីតចំនួនពិត

4

ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ

2

ស្វ៊ីតធួន

5

ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត

3

ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

6

វិធានអនុមាសរួមគណិតវិទ្យា

ការសិក្សាស្វ៊ីត គឺបណ្តាលឱ្យគណិតវិទ្យាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តាមរយៈផលបូកតួនៃស្វ៊ីតអាចឱ្យគេសង់បាននូវតារាងនៃអនុគន្ធគ្រីកោណមាត្រ និងអនុគមន៍ លោការីតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចឱ្យគេគណនាបាននូវតម្លៃលេខ e និង π ទៀតផង ។

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \dots$$

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \dots \text{ ។}$$

វត្ថុបំណង

1. បង្ហាញសញ្ញាណស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតរាប់អស់ និងស្វ៊ីតអនន្តតួ
2. សរសេរតួនៃស្វ៊ីតនិងកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត
3. បង្ហាញថាស្វ៊ីតមួយជាស្វ៊ីតកើនឬស្វ៊ីតចុះ
4. បង្ហាញស្វ៊ីតម៉ូឌូលូតូន ។

1. សញ្ញាណស្វ៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 : គេមានចំនួនគត់ធម្មជាតិ $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ។
គេមានចំនួនគត់គូ $2, 4, 6, 8, 10, \dots$ ។
គេមានចំនួនគត់សេសតូចជាង 16 គឺ $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$ ។
គេមានចំនួនសនិទាន $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ។

ចំនួនដែលរៀបតាមលំដាប់នេះហៅថា ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត ។ ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ហៅថា ស្វ៊ីតអនន្តតួ ។ ស្វ៊ីតអនន្តតួ គឺជាស្វ៊ីតដែលមានចំនួនតួច្រើនរាប់មិនអស់ ។
ម្យ៉ាងទៀត ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$ និងស្វ៊ីតនៃចំនួនសនិទាន $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ហៅថា ស្វ៊ីតរាប់អស់ ។ ស្វ៊ីតរាប់អស់គឺជាស្វ៊ីតដែលគេរាប់ចំនួនតួបាន ។ ក្នុងស្វ៊ីតរាប់អស់គេអាចស្គាល់ចំនួនតួនិងតួចុងក្រោយនៃស្វ៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេមានអនុគមន៍ $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto f(n) = 2n + 1$ គេសង្កេតឃើញថា
បើ $n = 1$ នោះ $f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$
បើ $n = 2$ នោះ $f(2) = 2 \times 2 + 1 = 5$
បើ $n = 3$ នោះ $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$
បើ $n = 4$ នោះ $f(4) = 2 \times 4 + 1 = 9$
.....

គេបានចំនួនរៀបតាមលំដាប់ 3, 5, 7, 9... បង្កើតបានជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត ។ ចំនួននីមួយៗនៃស្វ៊ីតហៅថា តួ ។ ចំនួន 3 ហៅថាតួទី 1, 5 តួទី 2, 7 តួទី 3 ... រៀងគ្នា ។

និយមន័យ ស្វ៊ីតចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី N ទៅ $\mathbb{R}$ ។

ជាទូទៅគេប្រើអក្សរ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ សម្រាប់តាងឱ្យតួនៃស្វ៊ីតដែល a_1 ជាតួទី 1 , a_2 ជា
តួទី 2 , ..., a_n ជាតួទី n ។

គេតាងស្វ៊ីតនោះដោយនិមិត្តសញ្ញា (a_n) ដែល $n \in \mathbb{N}, \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 បំពេញតួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោមនេះឱ្យបានបីតួទៀត

н. 1, 5, 9, ...

2. 1, 8, 27, ... 9

ដំណោះស្រាយ ក. 1, 5, 9, 13, 17, 21

2. 1, 8, 27, 64, 125, 216 ට

លំហាត់គំរូ 2 សរសេរគ្រប់តួនៃស្វ៊ីតរាបអស់ $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1 \leq n \leq 5$ ។

ដំណោះស្រាយ ជំនួសចំនួនគត់ធម្មជាតិពី 1 ដល់ 5 ក្នុង a_n ។ គេបាន

$$a_1 = \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{(-1)^3}{3} = -\frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4}, \quad a_4 = \frac{(-1)^5}{5} = -\frac{1}{5}$$

$$a_5 = \frac{(-1)^6}{6} = \frac{1}{6} \quad \text{ដូច្នេះប្រាំតួនៃស្វ៊ីតគឺ} \quad \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{6} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

ក. គេឱ្យស្វ៊ីត $3, 8, 15, \dots$ ។ បន្តសរសេរស្វ៊ីតនេះឱ្យបានបីតួទៀត ។

ខ. សរសេរតួនៃស្រីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = \frac{1}{n+2}$ ដែល $1 \leq n \leq 4$ ។

គ. សរសេរតួនៃស្វ៊ីតតាមលំដាប់តួគ្នា $a_n = 2 + \frac{1}{2^n}$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

ចម្លើយ

н. 24, 35, 48

2. $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$

8. $\frac{5}{2}, \frac{9}{4}, \frac{17}{8}, \dots, 2 + \frac{1}{2^n}$ 9

2. តួទី n នៃស៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យស្វ៊ីតចំនួនគត់ $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ដែលត្រូវប្រកាសរបស់វាតាងដោយ

n ។ ក្នុងករណីគេថា $a_1 = 1$ ជាតួទី 1, $a_2 = 2$ ជាតួទី 2, $a_3 = 3$ ជាតួទី 3, $\dots, a_n = n$ ជាតួទី n ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ចំពោះស្វ៊ីតនៃចំនួន $2, 4, 6, 8, 10, \dots$ ។ គេឃើញថា

$$a_1 = 2 = 2 \times 1, \quad a_2 = 4 = 2 \times 2, \quad a_3 = 6 = 2 \times 3$$

$a_4 = 8 = 2 \times 4, \dots, a_n = 2 \times n$ ដូច្នេះ គេបានតួទី n នៃស្វ៊ីតគឺ $a_n = 2 \times n$ ។

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ បើគេស្គាល់តួដំបូង និងតួបន្តបន្ទាប់នៃស្វ៊ីត ដើម្បីសរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតគេពិនិត្យមើលតួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត រួចរកមើលលំនាំគំរូរបស់វា ។ តួនីមួយៗជាអនុគមន៍នៃចំនួនតួ ។ តួទី 1 ត្រូវនឹង $n = 1$ តួទី 2 ត្រូវនឹង $n = 2, \dots$, តួទី n ត្រូវនឹង $n = n$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $3, 5, 7, 11, \dots$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេសង្កេតឃើញថា

$$a_1 = 3 = 2 \times 1 + 1$$

$$a_2 = 5 = 2 \times 2 + 1$$

$$a_3 = 7 = 2 \times 3 + 1$$


$$a_4 = 9 = 2 \times 4 + 1$$

$$a_5 = 11 = 2 \times 5 + 1$$

$$\dots = \dots = \dots \times \dots + \dots$$

$$a_n = 2n + 1 \quad \text{ដូច្នេះគេបានតួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីត } a_n = 2n + 1 \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 បាល់មួយត្រូវបានទម្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ។ ដោយដឹងថា បាល់នោះធ្លាក់ដល់ដីតែងតែលោតឡើងលើវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់ដែលបាល់នោះធ្លាក់ចុះ ។ ចូរកំណត់កម្ពស់នៃបាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសរសេរជាស្វ៊ីតមួយ រួចកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។



ដំណោះស្រាយ លើកដំបូងបាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ដូចបង្ហាញក្នុងរូប រួចលោតឡើងលើវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃ 6 m ឬ $6\left(\frac{2}{3}\right) \text{ m}$ មានកម្ពស់ 4 m ។ លើកទី 2 បាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ $6\left(\frac{2}{3}\right) \text{ m}$ ហើយលោតឡើងវិញបាន $6\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)$ ឬ $6\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ។

ដូច្នេះ កម្ពស់បាល់ជាបន្តបន្ទាប់គឺ

$$6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^1, 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2, 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3, 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^4, \dots \text{ ហើយតួទី } n \text{ គឺ } a_n = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{(n-1)} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n ចំពោះ គ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } -1, 2, 7, 14, 23, \dots \quad \text{ខ. } \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots \text{ ។}$$

$$\text{ចម្លើយ} \quad \text{ក. } a_n = n^2 - 2 \quad \text{ខ. } a_n = \frac{n+1}{n+2} \text{ ។}$$

3. អថេរភាពនៃស្វ៊ីត

3.1. ស្វ៊ីតកើន ស្វ៊ីតចុះ

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = n$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $1, 2, 3, 4, \dots, n$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$ ឬ $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < a_{n+1} < \dots$ នោះគេបានស្វ៊ីត (a_n) ហៅថាស្វ៊ីតកើនដាច់ខាត ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែលមានតួ $1, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ឬ $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \dots$ នោះគេបានស្វ៊ីត (a_n) ហៅថាស្វ៊ីតកើន ។

ឧទាហរណ៍ 3 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n}$ ។
គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5}, \dots$ ឬ $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > a_{n+1} > \dots$ ឬ $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \dots$ នោះគេបានស្វ៊ីត (a_n) ហៅថាស្វ៊ីតចុះ ។

និយមន័យ	• ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន លុះត្រាតែចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \geq a_n$ ។ • ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ លុះត្រាតែចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leq a_n$ ។
---------	--

លំហាត់គំរូ ក. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = 3n + 1$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

ខ. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = 12 - 2n$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

ដំណោះស្រាយ ក. គេមាន $a_n = 3n + 1$, $a_{n+1} = 3(n+1) + 1 = 3n + 4$

នោះគេបាន $a_{n+1} - a_n = 3n + 4 - (3n + 1) = 3 > 0$ នាំឱ្យ $a_{n+1} > a_n$ ។

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = 3n + 1$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

ខ. គេមាន $b_n = 12 - 2n$, $b_{n+1} = 12 - 2(n+1) = 10 - 2n$

នោះគេបាន $b_{n+1} - b_n = 10 - 2n - (12 - 2n) = -2 < 0$ នាំឱ្យ $b_{n+1} < b_n$ ។

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = 12 - 2n$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

ប្រតិបត្តិ

តើស្វ៊ីតខាងក្រោមមួយណាជាស្វ៊ីតកើន មួយណាជាស្វ៊ីតចុះ ។

ក. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 5}$ ដែល $a_n = \frac{3n}{2}$ ខ. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 3}$ ដែល $a_n = \frac{2}{n}$ ។

ចម្លើយ

ក. ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន ខ. ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។

3.2. ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{n}{n+1}$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា

$$1 < \frac{1}{2} < \frac{1}{3} < \frac{1}{4} < \frac{1}{5}, \dots \text{ ឬ } a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots < a_n < a_{n+1} < \dots$$

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន នោះគេថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ នេះជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 1 + \frac{1}{n}$ ។

គេបានតួនៃស្វ៊ីតគឺ $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត គេសង្កេតឃើញថា

$$2 > \frac{3}{2} > \frac{4}{3} > \frac{5}{4} > \dots \text{ ឬ } a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots > a_n > a_{n+1} > \dots$$

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ នោះគេថាស្វ៊ីតនេះជា ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

និយមន័យ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន កាលណាស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើនឬជាស្វ៊ីតចុះ ។

លំហាត់គំរូ

បង្ហាញថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន $a_n = \frac{n}{n+1}$ ។

ដំណោះស្រាយ

របៀបទី 1 : គេមាន $a_n = \frac{n}{n+1}$ គេបាន $a_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)+1} = \frac{n+1}{n+2}$ ។

ចំពោះ $\forall n \geq 1$ គេបាន

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0 \text{ នោះ } a_{n+1} > a_n \text{ ដូច្នេះ ស្វ៊ីត } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។} \end{aligned}$$

របៀបទី 2 : ដោយ $a_n = \frac{n}{n+1} > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$ គេបាន

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+1}{(n+1)+1} = \frac{n+1}{n+2} > 0, \forall n \in \mathbb{N} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{n+1}{n+2}}{\frac{n}{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \times \frac{n+1}{n} = \frac{n^2+2n+1}{n^2+2n} > 1 \end{aligned}$$

ព្រោះ $\forall n \geq 1$ ឬ $n^2+2n+1 > n^2+2n$ នោះ $a_{n+1} > a_n$

ដូច្នេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

ប្រតិបត្តិ

តើស្វ៊ីតខាងក្រោម ស្វ៊ីតណាជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

ក. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

ខ. $a_n = \frac{2^n}{n}, n \geq 1$

គ. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$

ចម្លើយ

ក. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន

ខ. (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន

គ. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \times \frac{1}{n}$ មិនមែនជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ។

? លំហាត់

1. សរសេរឋិតបន្ទាប់នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម ៖

ក. $5, 10, 15, 20, \dots$

ខ. $1, 5, 14, 30, 55, \dots$ ។

2. សរសេរតួនៃស្វ៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម ៖

ក. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 8$

ខ. $b_n = (2)^{-n+2}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 5$ ។

3. សរសេរបួនតួដំបូងនៃស្វ៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម ៖

ក. $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$

ខ. $b_n = \frac{1}{n^2 + n}$

គ. $c_n = (-1)^n(n-2)^2$

ឃ. $d_n = (-1)^n 2^{n-1}$ ។

4. កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម ៖

ក. $5, 7, 9, 11, 13, \dots$

ខ. $-3, -1, 1, 3, 5, \dots$

គ. $16, 13, 10, 7, 4, \dots$

ឃ. $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}, \dots$ ។

5. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{1}{n+3}$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

6. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = \frac{2n+1}{n+3}$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

7. សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n}$

ខ. ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = n^3 + 4n - 5$

គ. ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_{n+1} = a_n^2$ និង $a_1 = 2$ ។

8. គេមានស្វ៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ហើយ $a_1 = 1$ និង $a_{n+1} = a_n^2 + a_n + 1$ ។

ក. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ជាស្វ៊ីតកើន ។

ខ. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ $n, a_n \geq n$ ។

វត្ថុបំណង

1. កំណត់និយមន័យនិងផលសង្ខេបនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត
2. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត
3. ផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
4. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។

1. និយមន័យស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីត $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ។

គេបាន $a_1 = 1$, $a_2 = 2 = 1 + 1 = a_1 + 1$, $a_3 = 3 = 2 + 1 = a_2 + 1$

$a_4 = 4 = 3 + 1 = a_3 + 1$, $a_5 = 5 = 4 + 1 = a_4 + 1$, $\dots = \dots = \dots = \dots$, $a_{n+1} = a_n + 1$ ។

គេសង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ (ស្មើនឹង 1) ។ ចំនួន 1 ហៅថាផលសង្ខេបនៃស្វ៊ីត ។ ស្វ៊ីត $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ហៅថា ស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសង្ខេបស្មើ 1 ។

និយមន័យ ស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ហៅថាផលសង្ខេប ។

ជាទូទៅ ផលសង្ខេបនៃស្វ៊ីតនព្វន្តតាងដោយ d កំណត់ដោយ

$$d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = a_{n+1} - a_n \text{ ។}$$

2. តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីត $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ គឺជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 : $a_1 = 1$ និង

ផលសង្ខេប $d = 1$ ។

គេបាន $a_1 = 1$, $a_2 = 2 = 1 + 1 = a_1 + d$, $a_3 = 3 = 2 + 1 = a_2 + d$

$a_4 = 4 = 3 + 1 = a_3 + d$, $a_5 = 5 = 4 + 1 = a_4 + d$, $\dots$ ។

គេសង្កេតឃើញ តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួទី 1 បូក $d, 2d, 3d, \dots$, រៀងគ្នា ។

ជាទូទៅ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 a_1 និងផលសង្កម d ។
 តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្តកំណត់ដោយ $a_n = a_1 + (n-1) \times d$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត 2, 8, 14, 20, ... ។

ក. គណនាតួទី 20

ខ. តើចំនួន 236 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?

ដំណោះស្រាយ តាងតួទីមួយ $a_1 = 2$ តួទីពីរ $a_2 = 8$

គេបានផលសង្កម $d = a_2 - a_1 = 8 - 2 = 6$

ក. ដោយ $a_n = a_1 + (n-1)d$ គេបានតួទី 20 នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

$$a_{20} = 2 + (20-1) \times 6 = 116 \text{ ដូច្នេះតួទី 20 នៃស្វ៊ីតគឺ } 116 \text{ ។}$$

ខ. តាង $a_n = 236$ គេបាន $a_n = 2 + (n-1) \times 6$

$$236 = 2 + (n-1) \times 6 \text{ ឬ } 236 = 6n - 4$$

$$6n = 240 \Rightarrow n = 40 \text{ ដូច្នេះចំនួន 236 ជាតួទី 40 នៃស្វ៊ីត ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 តំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយទទួលប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ 30 លានរៀល និងក្នុងឆ្នាំទី 7 គឺ 60 លានរៀល ។ ឧបមាថា តួលេខនៃប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បង្កើតបានជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ កំណត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំទី 10 ។

ដំណោះស្រាយ គេមានប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ $a_1 = 30$ លានរៀលនិងប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 7

$$a_7 = 60 \text{ លានរៀល នោះគឺ } a_7 = a_1 + (7-1)d$$

$$60 = 30 + (7-1)d \text{ គេបាន } d = 5 \text{ លានរៀល}$$

ដូច្នេះប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 10 គឺ

$$a_{10} = a_7 + (10-7)d, \quad a_{10} = 60 + 3 \times 5$$

$$a_{10} = 75 \text{ លានរៀល ។}$$

ប្រតិបត្តិ

ក. គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្តមួយដែល $a_1 = 2$ និង $a_2 = 9$ ។ កំណត់តួទី 5 និងគណនា a_6 ។

ខ. សៀវភៅមួយក្បាលមាន 100 ទំព័រចុះលេខទំព័រពី 1 ដល់ 100 ។ រកចំនួនទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5 ។

ចម្លើយ

ក. $a_5 = 30$, $a_6 = 37$

ខ. មាន 10 ទំព័រ ។

3. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ ។ a_1 និង a_6 ហៅថា តួចុង ។ a_2 និង a_5 ហើយ a_3 និង a_4 ហៅថា តួនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង ។

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ៖ $a_n = a_1 + (n-1)d$


$$\text{គេបាន } a_1 + a_6 = a_1 + a_1 + 5d = 2a_1 + 5d \quad (1)$$

$$a_2 + a_5 = a_1 + d + a_1 + 4d = 2a_1 + 5d \quad (2)$$

$$a_3 + a_4 = a_1 + 2d + a_1 + 3d = 2a_1 + 5d \quad (3)$$

គេបាន $a_1 + a_6 = a_2 + a_5 = a_3 + a_4$ ។

ដូច្នេះ បើគេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត



គេបានផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកតួនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$$

គេប្រើលក្ខណៈនេះដើម្បីគណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n \\ + S_n &= a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 \\ \hline 2S_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_{n-1} + a_2) + (a_1 + a_n) \\ &= \underbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_1 + a_n)}_{n \text{ តួ}} \\ 2S_n &= (a_1 + a_n)n \quad \text{នោះ } S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \text{។} \end{aligned}$$

ដូច្នេះ ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ដែលមាន a_1 ជាតួទី 1 និង a_n ជាតួទី n កំណត់ដោយ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ឬ $S_n = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $51, 47, 43, \dots$ ។ កំណត់តម្លៃ n ដែលគេឱ្យផលបូក n តួដំបូង S_n មានតម្លៃអតិបរមា និងកំណត់តម្លៃនៃ S_n ។


ដំណោះស្រាយ តាង a_n ជាក្តីទូទៅនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ ដោយផលសង្ខេប $d = -4$ និង $a_1 = 51$ ។
 គេបាន $a_n = a_1 + (n-1)d = 51 + (n-1)(-4) = 55 - 4n$ នាំឱ្យ $a_n > 0$
 ចំពោះ $n = 1, 2, \dots, 13$ និង $a_n < 0$ ចំពោះ $n = 14, 15, \dots$ ។
 ដូច្នេះ S_n អតិបរមានៅពេលដែល $n = 13$ និង

$$S_{13} = \frac{51 + (55 - 4 \times 13)}{2} \times 13 = 351$$
 ។

លំហាត់គំរូ 2 គេរៀបឥឡូវទីធ្លាមុខផ្ទះមួយដែលមានរាងជាចតុកោណញាយ(មើលរូប) ។
 ទីធ្លានោះមានឥដ្ឋ 18 ជួរ ។ ជួរទី 1 មានឥដ្ឋ 14 ដុំ ហើយជួរបន្តបន្ទាប់មានចំនួន
 ឥដ្ឋលើសជួរមុន 1 ដុំ រហូតដល់ជួរទី 18 មាន 31 ដុំ ។ តើគេត្រូវចំណាយឥដ្ឋ
 ប៉ុន្មានដុំដើម្បីរៀបឱ្យពេញទីធ្លានោះ?

ដំណោះស្រាយ ចំនួនឥដ្ឋតាមជួរដែលរៀបទីធ្លាមុខផ្ទះនេះបង្កើត
 បានជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានក្តីទី 1 គឺ
 $a_1 = 14$, $a_{18} = 31$ និងមាន 18 ជួរ
 តាមរូបមន្តផលបូកក្តីនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត គេបាន

$$S_{18} = \frac{(a_1 + a_{18}) \times 18}{2} = \frac{(14 + 31) \times 18}{2} = 405$$



ការរៀបឥឡូវទីធ្លាមុខផ្ទះ គេត្រូវចំណាយឥដ្ឋអស់ 405 ដុំ ។

លំហាត់គំរូ 3 គេមានការងាររដូវក្តៅ 2 សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែ ឬ 12 សប្តាហ៍ ។
 ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 400 000 រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង
 100 000 រៀលរៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 100 000 រៀលក្នុង
 មួយសប្តាហ៍ហើយដំឡើង 5 000 រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ ។ តើគេគួរជ្រើសរើស
 យកការងារណាមួយប្រសើរជាង?

ដំណោះស្រាយ ចំពោះការងារ A ប្រាក់បៀវត្សសរុបសម្រាប់រយៈពេល 3 ខែគឺ
 $S_3 = 400,000 + 500,000 + 600,000 = 1,500,000$ រៀល
 ការងារ B ប្រាក់បៀវត្សគឺ 100 000, 105 000, 110 000, ..., a_{12} ។
 នេះជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានក្តីទី 1 គឺ $a_1 = 100 000$ និងផលសង្ខេប $d = 5 000$
 តាមរូបមន្ត ប្រាក់បៀវត្សនៅសប្តាហ៍ទី 12 គឺ
 $a_{12} = a_1 + (12-1)d = 100 000 + 11 \times 5 000 = 155 000$ ។

ចំពោះការងារ B ប្រាក់បៀវត្សសរុបរយៈពេល 3 ខែ ឬ 12 សប្តាហ៍គឺ

$$S_B = 100\,000 + 105\,000 + 101\,000 + \dots + 155\,000$$

$$= \frac{(100\,000 + 155\,000) \times 12}{2} = 255\,000 \times 6 = 1\,530\,000 \text{ រៀល ។}$$

ប្រាក់បានពីការងារ B ច្រើនជាងបានពីការងារ A ដូច្នេះគេរើសយកការងារ B ។

ប្រតិបត្តិ

- ក. គណនាផលបូក $(-6) + (-1) + 4 + 9 + \dots + 64$ ។
ខ. គណនាផលបូក 25 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 7, 12, 17, \dots$
- គេមានការងាររដូវក្តៅ 2 សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែឬ 12 សប្តាហ៍ ។ ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស $325\,000$ រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង $100\,000$ រៀលរៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស $80\,000$ រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយដំឡើង $3\,000$ រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ ។ តើគេគួរជ្រើសរើសយកការងារណាមួយប្រសើរជាង?


ចម្លើយ

- ក. $S_{15} = 435$ ខ. $S_{25} = 1550$ ។
2. គេរើសយកការងារ A ។

? លំហាត់

- សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖
ក. $4, 15, 26, 37, \dots$ ខ. $5, 1, -3, -7, -11, \dots$
គ. $-2, -9, -16, -23, \dots$ ឃ. $7, 12, 17, 22, 27, \dots$ ។
- សរសេរប្រាំតួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្តដែលកំណត់ដោយតួ
ក. $a_1 = 3, a_2 = 10$ ខ. $a_n = -7 + 3n$
- គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $-8, -3, 2, 7, \dots$ ។
ក. គណនា a_{17} និង a_{43} ខ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីតស្មើនឹង 322 ។
- កំណត់ចំនួនតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖
ក. $18, 13, 8, \dots, -102$ ខ. $-9, -4, 1, \dots, 171$ ។
- ក្នុងចំណោមស្វ៊ីតខាងក្រោម តើស្វ៊ីតណាជាស្វ៊ីតនព្វន្ត?
ក. $a_n = 13 + 6(n-1)$ ខ. $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{4}$ ។

6. គេឱ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត បើគេដឹងថា
- $a_{35} = 9$, $a_{45} = 17$ ។ គណនា a_{40} ។
 - $a_7 = \frac{7}{2}$, $a_{13} = \frac{13}{2}$ ។ គណនា a_1 ។
 - $a_2 = -12$, $S_{12} = 18$ ។ គណនា a_1 , d និង U_6 ។
7. គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 7, 12, \dots$ និងស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 5, 8, \dots$ ។
តើក្នុងចំណោម 121 ក្នុងស្វ៊ីតទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានក្នុងដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា?
8. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n = \frac{2n+3}{4}$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តកើន ។
9. គេឱ្យប្រាំចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ គណនាចំនួនទាំងនោះបើគេដឹងថាផលបូកវ៉ាស្មើនឹង 125 ហើយផលបូកពីរក្នុងដំបូងស្មើនឹង 38 ។
10. បើផលបូក 9 ក្នុងដំបូងនៃស្វ៊ីតស្មើនឹង 162 ហើយផលបូក 12 ក្នុងដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្តស្មើនឹង 288 ។
គណនាផលបូក 30 ក្នុងដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។
11. បីចំនួនគត្តាជាស្វ៊ីតនព្វន្តដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួននេះស្មើនឹង 36 និងផលគុណវ៉ាស្មើនឹង 1428 ។
12. គណនាផលបូកស្វ៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖
- $2 + 4 + 6 + \dots + 146$
 - $100 + 95 + 90 + 85 + \dots - 20$
 - $-193 - 189 - 185 - \dots - 21 - 17$
 - $5\frac{1}{4} + 4\frac{1}{2} + 3\frac{3}{4} + \dots - 3$ ។
13. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ A បានចម្ងាយ 15 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ថ្ងៃ ។ ប្រាំបីថ្ងៃក្រោយមកទើបអ្នកជិះកង់ទីពីរចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ A ដូចគ្នាដោយថ្ងៃទីមួយ គាត់ជិះកង់បានចម្ងាយ 14 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ថ្ងៃ ហើយថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវជិះកើនបានចម្ងាយ 2 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឱ្យទាន់អ្នកជិះកង់ទីមួយ A ។ តើអ្នកជិះកង់ទីពីរត្រូវចំណាយរយៈពេលអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃ ដើម្បីជិះទៅកាន់អ្នកជិះកង់ទីមួយ?
14. សាលាប្រជុំមួយមានរាងចតុកោណព្នាយ ហើយតាមជ្រុងទ្រូតនៃសាលាប្រជុំនោះ គេរៀបកៅអីជា 15 ជួរដែលជួរមុខគេបង្អស់រៀបបាន 25 កៅអី ហើយជួរទី 2 រៀបបាន 27 កៅអី ជួរទី 3 រៀបបាន 29 កៅអី ។ គេរៀបកៅអីតាមលំនាំខាងលើរហូតដល់ជួរខាងក្រោយ ។ គណនាកៅអីសម្រាប់អង្គុយទាំងអស់ដែលមានក្នុងសាលាប្រជុំ ។



វត្ថុបំណង

1. កំណត់និយមន័យនិងផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
2. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
3. បង្ហាញផលគុណក្នុងស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
4. គណនាផលបូកក្នុងស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
5. គណនាផលបូកក្នុងស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត ។

1. និយមន័យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីត $2, 6, 18, 54, 162, \dots$ ។

គេបាន $a_1 = 2$

$$a_2 = 6 = 2 \times 3 = a_1 \times 3$$

$$a_3 = 18 = 6 \times 3 = a_2 \times 3$$

$$a_4 = 54 = 18 \times 3 = a_3 \times 3$$

$$a_5 = 162 = 54 \times 3 = a_4 \times 3 \quad \text{។}$$

គេសង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត(ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរមួយ(ស្មើនឹង 3) ។ ដូច្នេះ ស្វ៊ីត $2, 6, 18, 54, 162, \dots$ ហៅថា ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ចំនួនថេរ 3 ហៅថា ផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

និយមន័យ

ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះ ហៅថាផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ជាទូទៅ

ផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ តាងដោយ q ដែល $q \neq 0$ ។

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \text{។}$$

2. តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $2, 6, 18, 54, 162, \dots$ ។

គេបាន $a_1 = 2$

$$a_2 = 2 \times 3 = a_1 \times 3$$

$$a_3 = 18 = 6 \times 3 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2 = 2 \times 3^{3-1}$$

$$a_4 = 54 = 18 \times 3 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^3 = 2 \times 3^{4-1}$$

$$a_5 = 162 = 54 \times 3 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^4 = 2 \times 3^{5-1}$$

$$\dots = \dots = \dots = \dots$$

$$a_n = 2 \times \underbrace{3 \times 3 \times \dots \times 3}_{(n-1) \text{ តួ}} = 2 \times 3^{n-1} \text{ ។}$$

ជាទូទៅ តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រកំណត់ដោយ : $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $6, 12, 24, 48, \dots$ ។

ក. គណនាតួទី 14

ខ. តើចំនួន 384 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?

ដំណោះស្រាយ តាងតួទីមួយ $a_1 = 6$ តួទីពីរ $a_2 = 12$

គេបានផលធៀបរួម $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{12}{6} = 2$ ។

ក. តួទី 14 នៃស្វ៊ីតត្រូវនឹង a_{14}

តាមរូបមន្ត គេបាន $a_n = 6 \times 2^{n-1}$

$$\text{នោះ } a_{14} = 6 \times 2^{13} = 6 \times 8192 = 49152$$

ដូច្នេះតួទី 14 គឺ $a_{14} = 49152$ ។

ខ. តាមរូបមន្ត $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

ដោយ $a_n = 384$ គេបាន

$$384 = 6 \times 2^{n-1} \text{ ឬ } 64 = 2^{n-1}$$

$$2^6 = 2^{n-1}$$

$$6 = n - 1 \Rightarrow n = 7$$

ដូច្នេះចំនួន 384 ជាតួទី 7 នៃស្វ៊ីត ។

លំហាត់គំរូ 2

ប្រជាជននៅទីក្រុងមួយមានចំនួន 2 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ 2000 ហើយមានកំណើន 4% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំបង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ និងព្យាករទុកនូវចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2009 ។

ដំណោះស្រាយ

តាងចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2000 ដោយ $a_1 = 2$ លាននាក់ នោះចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2001 នឹងមាន

$$2 + 2(0.04) = 2(1.04) \text{ លាននាក់}$$

ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2002 នឹងមាន

$$a_3 = 2(1.04)^2 \text{ លាននាក់}$$

ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2003 នឹងមាន

$$a_4 = 2 \times (1.04)^3 \text{ លាននាក់}$$

ចំនួនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំបង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ ដូច្នេះ ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2009 នឹងមាន $a_{10} = 2 \times (1.04)^9 = 2846624$ នាក់ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 3, 12, 48, 192, ... ។
 - ក. គណនាតួទី 9 ។
 - ខ. តើចំនួន 12288 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?
2. គ្រួសារមួយសម្រេចចិត្តបើកគណនីសន្សំប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនកាត់ ។ នៅពេលថ្ងៃចាប់កំណើតកូនរបស់គាត់ គាត់បានយកប្រាក់ចំនួន 100 000 រៀលទៅធ្វើនៅធនាគារដោយបានទទួលអត្រាការប្រាក់សមាស 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់អត្រាការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។
 - ក. កំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅរាល់ចុងឆ្នាំនីមួយៗនៃបួនឆ្នាំដំបូង និងកំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី n ។
 - ខ. កំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី 21 ។

ចម្លើយ

1. ក. $a_9 = 196608$ ខ. $a_7 = 12288$ ។
2. ក. $a_1 = 106000$, $a_2 = 112360$, $a_3 = 119101.6$, $a_4 = 126247.696$,

$$a_m = 100000 \left(1 + \frac{6}{100}\right)^n$$
 ខ. $a_{21} = 339956.36$ ។

៣. ផលគុណគូស្តើចម្ងាយពីតួចុង

ឧទាហរណ៍ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ ។ a_1 និង a_6 ហៅថាតួចុង a_2 និង a_5 ហើយ a_3 និង a_4 ហៅថាតួនៅស្តើចម្ងាយពីតួចុង ។

បង្ហាញថា $a_1 \times a_6 = a_2 \times a_5 = a_3 \times a_4$

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

$$\text{គេបាន } a_1 \times a_6 = a_1 \times a_1 \times q^{6-1} = a_1^2 \times q^5 \quad (1)$$

$$a_2 \times a_5 = a_1 \times q \times a_1 \times q^{5-1} = a_1^2 \times q^5 \quad (2)$$

$$a_3 \times a_4 = a_1 \times q^{3-1} \times a_1 \times q^{4-1} = a_1^2 \times q^5 \quad (3)$$

តាម (1) , (2) និង (3) គេបាន $a_1 \times a_6 = a_2 \times a_5 = a_3 \times a_4$ ។

បើ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_p, \dots, a_{n-p+1}, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

គេបាន



$$\text{នោះ } a_1 \times a_n = a_2 \times a_{n-1} = a_3 \times a_{n-2} = \dots = a_p \times a_{n-p+1} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ ផលគុណគូស្តើចម្ងាយពីតួចុងស្មើនឹងផលគុណគូស្តើចម្ងាយទាំងពីរ ។
គេកំណត់សរសេរ $a_p \times a_{n-p+1} = a_1 \times a_n$ ។

ករណីពិសេស បីចំនួនគត្តា a, b និង c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រសមមូល $\frac{b}{a} = \frac{c}{b} = q$ ឬ $a \times c = b^2$ ឬ ($b = \sqrt{a \times c}$ ហៅថា មធ្យមធរណីមាត្រ a និង c) ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យបីចំនួនគត្តា a, b និង c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថាបីចំនួនគត្តា a^2, b^2 និង c^2 ក៏ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែរ ។

ដំណោះស្រាយ បីចំនួនគត្តា a, b និង c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រនោះ $b^2 = a \times c$ លើកអង្កទាំងពីរជាការេ គេបាន $(b^2)^2 = (a \times c)^2 = a^2 \times c^2$ ។

ដូច្នេះ បីចំនួនគត្តា a^2, b^2 និង c^2 ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ប្រតិបត្តិ ក. តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន 3, 24, 94 ដើម្បីឱ្យបីចំនួនគត្តាជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ?

ខ. រកមធ្យមធរណីមាត្រនៃពីចំនួន 4 និង 9 ។

គ. គេឱ្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយដែល $a_3 = 4$ និង $a_5 = 36$ ។

គណនា a_1 និងផលធៀបរួម q ។

ចម្លើយ

ក. ចំនួនត្រូវថែម $x = 6$

$$ខ. \sqrt{4 \times 9} = 6$$

គ. $q = -3$, $a_1 = \frac{4}{9}$ និង $q = 3$, $a_1 = \frac{4}{9}$ ។

4. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ : គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ។

តាង S ជាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 2

$$គេបាន S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 \quad (1)$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹងផលធៀបរួមស្មើ 2

$$គេបាន 2S = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 \quad (2)$$

យក (2) - (1) គេបាន

$$2S - S = (2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128) - (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64)$$

$$S = 128 - 1 = 127 \quad \text{។}$$

គេអាចយកឧទាហរណ៍ខាងលើ ដើម្បីកំណត់រូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

បើគេយក S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ a_1 និងផលធៀប

រួម q នោះ គេបាន

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} \quad (1)$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹងផលធៀបរួម q គេបាន

$$qS_n = a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \dots + a_1q^n \quad (2)$$

យក (2) - (1) គេបាន

$$qS_n - S_n = (a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \dots + a_1q^n) - (a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1})$$

$$\Leftrightarrow (q - 1)S_n = a_1q^n - a_1 \Rightarrow (q - 1)S_n = a_1(q^n - 1)$$

$$\text{បើ } q \neq 1 \text{ គេបាន } S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ a_1 និងផលធៀបរួម q ដែល $q \neq 1$ ស្មើនឹង $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ក. គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $5 + 10 + 20 + 40 + \dots$ ។

ខ. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $2 + 6 + 18 + \dots + 1458$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. តាង $S = 5 + 10 + 20 + 40 + \dots$ ជាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួ

ទី 1 គឺ $a_1 = 5$ ផលធៀបរួម $q = 2$ ។ តាមរូបមន្ត $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$

បើ $n = 7$ គេបាន $S_7 = \frac{5(2^7 - 1)}{2 - 1} = 5(128 - 1) = 635$

ដូច្នេះ ផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រគឺ 635 ។

ខ. តាង $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 1458$ ដែល $a_1 = 2$, $a_n = 1458$ និងផលធៀបរួម $q = 3$ ។

តាមរូបមន្តតួទី n គេបាន

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad 1458 = 2 \times 3^{n-1}, \quad 729 = 3^{n-1}, \quad 3^6 = 3^{n-1},$$

$6 = n - 1 \Rightarrow 7 = n$ នោះ S ជាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

$$\text{តាមរូបមន្ត } S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

$$\text{គេបាន } S_7 = \frac{2(3^7 - 1)}{3 - 1} = \frac{2(2187 - 1)}{2} = 2186$$

ដូច្នេះ $2 + 6 + 18 + \dots + 1458 = 2186$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ស្តេចឥណ្ឌាល្មោះស៊ីវាម បានបញ្ជាឱ្យជាងម្នាក់ធ្វើការចត្រង់ ហើយសន្យាថានឹងជូនរង្វាន់តាមតម្រូវការនៃជាងនោះចង់បាន ។ ពេលធ្វើរួច ជាងនោះស្នើសុំគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងក្រឡាចត្រង់ទាំង ហើយរបៀបដាក់មានដូចតទៅ ៖ មួយគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 1 ពីរគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 2 បួនគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 3 ប្រាំបីគ្រាប់ក្នុងក្រឡាទី 4 ,..., ចំនួនគ្រាប់ស្រូវក្នុងក្រឡា បន្ទាប់មកស្នើនឹងចំនួនគ្រាប់ស្រូវក្រឡាមុនគុណនឹង 2 ។ គណនាផលបូកនៃគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដែលត្រូវដាក់លើក្រឡាចត្រង់ទាំង 64 ក្រឡា ។

ដំណោះស្រាយ តាមបម្រាប់ចំនួនគ្រាប់ស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាបង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $1, 2, 4, 8, \dots$ ឬ $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$, ដែលមាន $a_1 = 1$ និងផលធៀបរួម $q = 2$ ។

$$\text{តាមរូបមន្ត } S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

$$\text{គេបាន } S_{64} = \frac{1(2^{64} - 1)}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615 \text{ ។}$$

ដូច្នេះចំនួនគ្រាប់ស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាគឺ

18 446 744 073 709 551 615 គ្រាប់ ។


គ្រាប់ស្រូវចំនួន 37000 គ្រាប់ប្រហែល 1 kg

នោះស្រូវទម្ងន់ $1t \approx 37000000$ គ្រាប់ ។

ដូច្នេះស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង

64 ក្រឡាប្រហែល $4986 \times 10^8 t$ ។

គេដឹងថាទិន្នផលស្រូវប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាប្រហែល $5 \times 10^6 t$ ។



ប្រតិបត្តិ

1. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $6 ; 3 ; 1.5 ; 0.75 ; \dots$ ។ គណនា
ក. តួទី 7
ខ. ផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។
2. គណនា $S_n = 7 + 77 + 777 + 7777 + \dots + 77\dots + (777\dots)$ (n ដងលេខ 7) ។
3. លោក B បានដាក់ប្រាក់ 100\$ ទៅធ្វើក្នុងគណនីសន្សំនៃធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សមាស 10\$ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់អត្រាការប្រាក់មួយខែម្តង ។ ប្រាក់សរុបដែលលោក B ទទួលបាននៅចុងឆ្នាំទី 5 គឺ
$$A = 100 \times \left(1 + \frac{0.10}{12}\right) + 100 \times \left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^2 + 100 \times \left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^3 + \dots + 100 \times \left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^{60}$$
 ។ គណនា A ។
4. ប៉ោលមួយយោលដំបូងបានប្រវែងធ្នូ 18 cm និងយោលជាបន្តបន្ទាប់មកទៀត ដោយម្តងៗសល់ប្រវែងធ្នូ 95 % នៃប្រវែងធ្នូមុន ។
ក. កំណត់ប្រវែងធ្នូបន្ទាប់ពីយោលលើកទី 10 ។



២. ក្រោយពីយោលបាន 15 ដង ។ កំណត់ប្រព័ន្ធសរុបនៃការយោលនោះ ។

ចម្លើយ

$$1. \text{ ក. } a_7 = \frac{3}{32}$$

$$2. S_7 = \frac{381}{32} \text{ ។}$$

$$2. S_n = \frac{7}{81}(10^{n+1} - 9n - 10) \text{ ។}$$

$$3. A = 7808.23 \text{ ។}$$

$$4. \text{ ក. } a_{10} = 11.34$$

$$2. S_{15} = 193.21 \text{ ។}$$

5. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

ឧទាហរណ៍ : ពិនិត្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត $18 + 1.8 + 0.18 + 0.018 + 0.0018 + \dots$ ដែលមានតួទីមួយ $a_1 = 18$ និងផលធៀបរួម $q = \frac{1}{10}$ ។

$$\text{គេបាន } S_2 = 19.8$$

$$S_3 = 19.98$$

$$S_4 = 19.998$$

$$S_5 = 19.9998$$

$$S_6 = 19.99998, \dots, S_n = 19.999\dots998$$

ដូច្នេះ S_n ខិតជិត 20 កាលណា n ខិតជិតអនន្ត ។

ពិនិត្យផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត $a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} + \dots$ ដែលមានតួទីមួយ a_1 និងផលធៀបរួម q ។

$$\text{គេបាន } S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_1q$$

$$S_3 = a_1 + a_1q + a_1q^2$$

$$S_4 = a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3$$

$$S_5 = a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + a_1q^4$$

.....

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \dots + a_1q^{n-1}$$

$$\text{តាមរូបមន្តគេបាន } S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{a_1q^n}{q - 1} - \frac{a_1}{q - 1}, \quad (q \neq 1) \text{ ។}$$

បើ $|q| < 1$ នោះ q^n កាន់តែតូចទៅៗ កាលណាចំនួនតួ n កាន់តែធំទៅៗមានន័យថា $q^n \rightarrow 0$

ពេល $n \rightarrow +\infty$ គេបាន $S_n = 0 - \frac{a_1}{q - 1} = \frac{a_1}{1 - q}$ ពេល $n \rightarrow +\infty$ ។ ដូច្នេះ $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$ ។

ជាទូទៅ

ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} + \dots$
ដែល $|q| < 1$ កំណត់ដោយ $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$ ។

សម្គាល់

បើ $|q| \geq 1$ នោះ S_∞ មិនអាចកំណត់បាន ។

លំហាត់គំរូ 1

គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $6 + 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \dots$ ។

ដំណោះស្រាយ

$6 + 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \dots$ ជាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $a_1 = 6$,
 $q = \frac{1}{3}$ ។ តាមរូបមន្ត $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$ គេបាន $S_\infty = \frac{6}{1-\frac{1}{3}} = 9$ ។

លំហាត់គំរូ 2

សរសេរចំនួនទសភាគខួប $4.\overline{57}$ ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

ដំណោះស្រាយ


$4.\overline{57} = 4 + 0.57 + 0.0057 + 0.000057 + \dots$ ចាប់ពីតួទី 2 ទៅជាផលបូកនៃស្វ៊ីត
ធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $a_1 = 0.57$, $q = \frac{1}{100} = 0.01$

តាមរូបមន្ត $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$ គេបាន $4.\overline{57} = 4 + \frac{0.57}{1-0.01} = 4 + \frac{0.57}{0.99} = 4 + \frac{57}{99} = \frac{453}{99}$

ដូច្នេះ $4.\overline{57} = \frac{453}{99}$ ។

លំហាត់គំរូ 3

គេយោលប៉ោលមួយ(ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ លើកដំបូង
បានឆ្លុយប្រវែង 24 dm បន្ទាប់មកប្រវែងឆ្លុយ
ចុះ 20 % ជាបន្តបន្ទាប់ ។ កំណត់ប្រវែងគន្លងសរុបនៃ
លំយោលប៉ោលចាប់ពីពេលដំបូងដល់ពេលវាយប់ ។



ដំណោះស្រាយ

គេត្រូវកំណត់ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមានតួទី 1 គឺ

$a_1 = 24$ ហើយផលធៀបរួម $q = 80\%$, $|q| < 1$ ។

តាមរូបមន្តស្វ៊ីតអនន្តតួ $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$ ឬ $S_\infty = \frac{24}{1-0.8} = 120$

ដូច្នេះប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោលប៉ោល ពីពេលយោលដំបូងដល់ពេលវាយប់
ស្មើនឹង 120 dm ។

ប្រតិបត្តិ

ក. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $16 + 12 + 9 + \dots$ ។

ខ. សរសេរចំនួនទសភាគខួប $0.\overline{235}$ ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

ចម្លើយ

ក. $S_\infty = 64$

ខ. $0.\overline{235} = \frac{235}{999}$ ។



- [illegible]

វត្ថុបំណង

1. គណនាផលបូកក្នុងស្វ៊ីត
2. ចេះប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកក្នុងស្វ៊ីត
3. កំណត់តួទី n តាមផលសងស្វ៊ីតលំដាប់ 1 និងលំដាប់ 2 ។

1. របៀបគណនាផលបូក

ចំពោះស្វ៊ីតផ្សេងៗ គេពុំអាចប្រើរូបមន្តផលបូកក្នុងស្វ៊ីតធម្មតា ឬស្វ៊ីតធរណីមាត្រមកគណនាផលបូកវាបានឡើយ ក្នុងករណីនេះត្រូវប្រើវិធីផ្សេងៗទៅតាមទម្រង់នៃស្វ៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ចំពោះផលបូក $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ ។

គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1 \quad \text{ដោយឱ្យ } k \text{ យកតម្លៃពី } 1 \text{ ដល់ } n$$

$$2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$$

$$3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$$

$$4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$$

.....

$$n^3 - (n-1)^3 = 3 \times (n-1)^2 + 3 \times (n-1) + 1 \quad (1)$$

$$(n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1 \quad (2)$$

បូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការ (1) និង (2) គេបាន

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)$$

$$+ 3 \times (1 + 2 + 3 + \dots + n) + (1 + 1 + 1 + \dots + 1) = 3 \times S + 3 \times \frac{n(n+1)}{2} + n \quad \text{។}$$

$$\text{គណនា } S \text{ គេបាន } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : ចំពោះផលបូក $S = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$

គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព $\frac{1}{k \cdot (k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ដោយឱ្យ k

យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

.....

$$\frac{1}{(n-1) \cdot n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \quad \text{បូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការ}$$

$$\text{គេបាន } S = 1 - \frac{1}{n+1} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ គណនាផលបូក $S = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$ ។

ដំណោះស្រាយ គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$$(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1 \quad \text{ដោយឱ្យ } k \text{ យកតម្លៃពី } 1 \text{ ដល់ } n$$

$$2^4 - 1^4 = 4 \times 1^3 + 6 \times 1^2 + 4 \times 1 + 1$$

$$3^4 - 2^4 = 4 \times 2^3 + 6 \times 2^2 + 4 \times 2 + 1$$

$$4^4 - 3^4 = 4 \times 3^3 + 6 \times 3^2 + 4 \times 3 + 1$$

.....

$$n^4 - (n-1)^4 = 4 \times (n-1)^3 + 6 \times (n-1)^2 + 4 \times (n-1) + 1$$

$$(n+1)^4 - n^4 = 4 \times n^3 + 6 \times n^2 + 4 \times n + 1$$

បូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការ គេបាន

$$(n+1)^4 - 1^4 = 4 \times (1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3) + 6 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)$$

$$+ 4 \times (1 + 2 + 3 + \dots + n) + (1 + 1 + 1 + \dots + 1)$$

$$= 4S + 6 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)$$

$$+ 4 \times (1 + 2 + 3 + \dots + n) + (1 + 1 + 1 + \dots + 1)$$

$$\text{គណនា } S \text{ គេបាន } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

1. គណនា $S = 12^3 + 13^3 + 14^3 + \dots + 50^3$ ។

2. គណនា $S = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}$ ។

ចម្លើយ

1. $S = 1621269$

2. $S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$ ។

2. គណនាផលបូកតាមលំនាំគំរូ

ចំពោះស្វ៊ីតដែលមានតួជាចំនួនគត់ គេអាចគណនាផលបូកតាមការសង្កេតលំនាំគំរូ ។


ឧទាហរណ៍

$$1 = 1 = 1^2$$

$$1 + 3 = 4 = 2^2$$

$$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$$



ដូច្នេះ $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ ។

លំហាត់គំរូ

គណនាផលបូក n តួនៃចំនួនគត់ $S = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n$ ។


ដំណោះស្រាយ

$$2 = 2 = 1 \times 2$$

$$2 + 4 = 6 = 2 \times 3$$

$$2 + 4 + 6 = 12 = 3 \times 4$$

$$2 + 4 + 6 + 8 = 20 = 4 \times 5$$



ដូច្នេះ $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n \cdot (n+1)$ ។

ប្រតិបត្តិ

គេឱ្យលំនាំគំរូនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម ៖

$$1 = 1$$

$$1 + 7 = 8$$

$$1 + 7 + 19 = 27$$

$$1 + 7 + 19 + 37 = 64$$

$$1 + 7 + 19 + 37 + 61 = 125$$

គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតនេះដែលមាន 10 តួ ។

ចម្លើយ

$S = 1000$ ។

3. និមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកនៃស្វ៊ីត

3.1. សញ្ញា Σ

ក្នុងការសរសេរផលបូកតួនៃស្វ៊ីត $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ គេប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ អាស្រ័យលើស៊ីម៉ូល

សម្រាប់តាំងផលបូក n តួនៃស្វ៊ីត ។ គេកំណត់សរសេរ $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ ។

ក្នុងនោះ k យកតម្លៃពី 1, 2, 3, ... រហូតដល់ n ។

ឧទាហរណ៍ : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ។

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

លំហាត់គំរូ 1

សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$

ខ. $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 100$

គ. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{50}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ ។

ខ. $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 100 = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + 2 \times 50$

ផលបូកស្វ៊ីតនេះមានតួទូទៅ $2n$ ហើយ n យកតម្លៃពី 1 ដល់ 50 ។

គេបាន $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 100 = \sum_{n=1}^{50} 2n$ ។

គ. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{50}$ ផលបូកស្វ៊ីតនេះមានតួទូទៅនៃស្វ៊ីត $\frac{(-1)^n}{n}$

ចំពោះ n យកតម្លៃពី 2 ដល់ 50 ។

គេបាន $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{50} = \sum_{n=2}^{50} \frac{(-1)^n}{n}$ ។

លំហាត់គំរូ 2

សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ

ក. $\sum_{k=1}^6 2$

ខ. $\sum_{n=1}^5 (2n+1)$

គ. $\sum_{j=1}^5 j(j+1)$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $\sum_{k=1}^6 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$ ។

ខ. $\sum_{n=1}^5 (2n+1) = 5 + 7 + 9 + 11$ ។

គ. $\sum_{j=1}^5 j(j+1) = 2 + 6 + 12 + 20 + 30$ ។

ប្រតិបត្តិ

សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1)$

ខ. $3 + 6 + 12 + \dots + 3(2)^{n-1}$

គ. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{100}$ ។

ចម្លើយ

ក. $\sum_{k=1}^n (3k-1)$

ខ. $\sum_{k=1}^n 3 \times 2^{k-1}$

គ. $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k}$ ។

3.2. លក្ខណៈនៃស៊ីមម៉ា

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^n c = nc \qquad \text{ខ. } \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k \qquad \text{គ. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \qquad \text{ង. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \quad \text{។}$$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^n c = c + c + c + \dots + c = nc \quad \text{។}$$

$$\text{ខ. } \sum_{k=1}^n ca_k = ca_1 + ca_2 + ca_3 + \dots + ca_n = c(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) = c \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{។}$$

$$\begin{aligned} \text{គ. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{។} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ឃ. } \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) &= (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3) + \dots + (a_n - b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) - (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{។} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ង. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 &= \sum_{k=1}^n (a_k^2 + 2a_k b_k + b_k^2) = \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n 2a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \quad \text{។} \end{aligned}$$

លំហាត់គំរូ

$$\text{គណនា } \text{ក. } \sum_{k=1}^{15} (4k+3) \qquad \text{ខ. } \sum_{k=1}^{20} (k+3)k \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} \text{ក. } \sum_{k=1}^{15} (4k+3) &= \sum_{k=1}^{15} 4k + \sum_{k=1}^{15} 3 = 4 \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 3 \\ &= 4(1+2+3+\dots+15) + 15 \times 3 \\ &= 4 \times \frac{(1+15) \times 15}{2} + 45 = 2 \times 16 \times 15 + 45 = 525 \quad \text{។} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ខ. } \sum_{k=1}^{20} (k+3)k &= \sum_{k=1}^{20} (k^2 + 3k) = \sum_{k=1}^{20} k^2 + 3 \sum_{k=1}^{20} k \\ &= \frac{(20) \times (20+1) \times (2 \times 20 + 1)}{6} + 3 \frac{(1+20) \times 20}{2} \\ &= 10 \times 7 \times 41 + 3 \times 21 \times 10 = 2870 + 630 = 3500 \quad \text{។} \end{aligned}$$

ប្រតិបត្តិ

$$\text{គណនា } \text{ក. } \sum_{k=1}^{20} (3k+1) \qquad \text{ខ. } \sum_{k=1}^7 2^k \qquad \text{គ. } \sum_{k=4}^{14} (4k-3)$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n (3+k)^2 \qquad \text{ង. } \sum_{k=1}^{30} k(k+1) \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

$$\text{ក. } \sum_{k=1}^{20} (3k+1) = 650$$

$$\text{ខ. } \sum_{k=1}^7 2^k = 254$$

$$\text{គ. } \sum_{k=4}^{14} (4k-3) = 363$$

$$\text{ឃ. } \sum_{k=1}^n (3+k)^2 = \frac{n}{6}(2n^2+21n+73)$$

$$\text{ង. } \sum_{k=1}^{30} k(k+1) = 9920 \quad \forall$$

4. របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងនៃស្វ៊ីត

គេអាចកំណត់តួទី n របស់ស្វ៊ីត (a_n) ដែលពុំមែនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ឬជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រតាមរបៀបដូចខាងក្រោម ៖

4.1. ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត 1, 3, 7, 13, 21, 31, ... ។

គេសង្កេតឃើញថាស្វ៊ីតនេះមិនមែនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ហើយក៏មិនមែនជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

នោះគេត្រូវធ្វើផលសងនៃតួបន្តបន្ទាប់គ្នានៃស្វ៊ីត 1, 3, 7, 13, 21, 31, ... ។

គេបានលំនាំគំរូដូចជា

n	: 1	2	3	4	5	6...
ស្វ៊ីត (a_n)	: 1	3	7	13	21	31...
ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត	:	2	4	6	8	10...

ផលសងតួនៃស្វ៊ីតអាចជួយឱ្យគេរកលំនាំគំរូ ដែលអាចកំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីតបានដូចជា

$$a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2 \times 1$$

$$a_3 - a_2 = 7 - 3 = 4 = 2 \times 2$$

$$a_4 - a_3 = 13 - 7 = 6 = 2 \times 3$$

.....

$$a_{n-1} - a_{n-2} = 2 \times (n-2)$$

$$a_n - a_{n-1} = 2 \times (n-1) \quad \forall \text{ បូកអង្គនិងអង្គទាំងអស់ គេបាន}$$

$$a_n - a_1 = a_n - 1 = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + 2 \times (n-2) + 2 \times (n-1)$$

$$a_n = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + 2 \times (n-2) + 2 \times (n-1) + 1$$

$$= 2 \times [1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1)] + 1 = 2 \times \frac{[1 + (n-1)](n-1)}{2} + 1$$

$$= n(n-1) + 1 = n^2 - n + 1$$

ដូច្នេះតួទី n នៃស្វ៊ីត 1, 3, 7, 13, 21, 31, ... កំណត់ដោយ $a_n = n^2 - n + 1$ ។

ជាទូទៅ

គេមានស្វ៊ីត $(a_n) : a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$

ហើយ $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, b_3 = a_4 - a_3, \dots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។

ស្វ៊ីត $(b_n) : b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងក្នុងលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ឧទាហរណ៍ 2 : បង្ហាញថា $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

$$\underbrace{a_1}_{b_1} \underbrace{a_2}_{b_2} \underbrace{a_3}_{b_3} \underbrace{a_4}_{b_4} \cdots \underbrace{a_{n-1}}_{b_{n-1}} \underbrace{a_n}_{b_{n-1}}$$

$$+ \begin{cases} a_2 - a_1 = b_1 \\ a_3 - a_2 = b_2 \\ a_4 - a_3 = b_3 \\ \vdots \\ a_{n-1} - a_{n-2} = b_{n-2} \\ a_n - a_{n-1} = b_{n-1} \end{cases}$$

$$a_n - a_1 = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1}$$

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1}) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $b_{n-1} = b_0$ មិនមាន ។ ដូច្នេះ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

ជាទូទៅ

គេមានស្វ៊ីត (a_n) និងស្វ៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ

$b_n = a_{n+1} - a_n, n = 1, 2, 3, \dots$ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n)

កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $2, 4, 8, 14, 22, 32, \dots$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីតដែលគេឱ្យ ។ ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងក្នុងលំដាប់ទី 1

នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួ b_n កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$

ស្វ៊ីត $(b_n) : 2, 4, 6, 8, \dots$

ស្វ៊ីត (b_n) ជាស្វ៊ីតពន្លឺដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 2 និងផលសងរួមស្មើនឹង 2

នោះ $b_n = 2 + 2(n-1) = 2n$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 2 + 2 \cdot \frac{1}{2}n(n-1) = 2 + n^2 - n = n^2 - n + 2$$

$$\text{នោះ } a_n = n^2 - n + 2 \quad \forall$$

$$\text{ចំពោះ } n = 1, \quad a_1 = 1^2 - 1 + 2 = 2 \quad \text{ពិត} \quad \forall$$

$$\text{ដូច្នេះស្វ៊ីត } (a_n) \text{ មានតួទី } n \text{ កំណត់ដោយ } a_n = n^2 - n + 2 \quad \forall$$

លំហាត់គំរូ 2

$$\text{ក. កំណត់តួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីត } 1, 2, 5, 10, 17, \dots \quad \forall$$

$$\text{ខ. គណនាផលបូក } n \text{ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ} \quad \forall$$

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ក. កំណត់តួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីត } (a_n) : 1, 2, 5, 10, 17, \dots$$

$$\text{តាង } a_n \text{ ជាតួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីតដែលគេឱ្យ } (a_n) \quad \forall$$

$$\text{ស្វ៊ីត } (b_n) \text{ ជាផលសងតួលំដាប់ទី } 1 \text{ នៃស្វ៊ីត } (a_n) \text{ ដែលមានតួ } b_n$$

$$\text{កំណត់ដោយ } b_n = a_{n+1} - a_n \quad \forall$$

$$\text{ស្វ៊ីត } (b_n) : 1, 3, 5, 7, \dots \quad \forall \text{ ស្វ៊ីត } (b_n) \text{ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី } 1 \text{ ស្មើនឹង } 1$$

$$\text{និងផលសងរួមស្មើនឹង } 2 \text{ នោះ } b_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1 \quad \forall$$

$$\text{ចំពោះ } n \geq 2 \text{ គេបាន } a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1)$$

$$= 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} k - (n-1) = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}n(n-1) - (n-1)$$

$$= 1 + n^2 - n - n + 1 = 2 - 2n + n^2 \text{ នោះ } a_n = 2 - 2n + n^2 \quad \forall$$

$$\text{ចំពោះ } n = 1 \text{ គេបាន } a_1 = 2 - 2 + 1 = 1 \text{ ពិត} \quad \forall \text{ ដូច្នេះ } a_n = 2 - 2n + n^2 \quad \forall$$

$$\text{ខ. គណនាផលបូក } n \text{ តួដំបូងនៃស្វ៊ីត } (a_n)$$

$$\text{តាង } S_n \text{ ជាផលបូកនៃស្វ៊ីត } (a_n) \text{ គឺ}$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n (2 - 2k + k^2)$$

$$= 2n - 2 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k^2 = 2n - 2 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$= \frac{12n}{6} - \frac{6}{6}n(n+1) + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) = \frac{1}{6}n(12 - 6n - 6 + 2n^2 + n + 2n + 1)$$

$$= \frac{1}{6}n(7 - 3n + 2n^2) \text{ ដូច្នេះ } S_n = \frac{1}{6}n(2n^2 - 3n + 7) \quad \forall$$

ប្រតិបត្តិ

$$1. \text{ ក. កំណត់តួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីត } 4, 5, 7, 10, 14, \dots \quad \forall$$

$$\text{ខ. គណនាផលបូក } n \text{ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ} \quad \forall$$

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្រីតនេះ ។

$$1. \quad \tilde{n}. \quad a_n = 4 - \frac{n}{2} + \frac{n^2}{2}$$

$$2. S_n = \frac{n(23 + n^2)}{6} \quad \text{ч}$$

2. ñ. $a_n = 3 + \frac{(n-1)(n+2)}{2}$

$$2. S_n = \frac{n}{6}(n^2 + 3n + 14) \quad \text{ч}$$

បើសិនជាស្វ៊ីត (b_n) នៅតែមិនអាចកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) បានទៀត នោះគេត្រូវធ្វើ ផលសងលំដាប់តួនៃស្វ៊ីត (b_n) បន្តទៀត ដែលគេហៅថា ផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

រូបថតទី ១ n : 1 2 3 4 5 6...

ស្វ៊ីត (a_n) : 1 2 6 15 31 56... ។

ផលសង្កត់លំដាប់ទី 1 : 1 4 9 16 25...

តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។ ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសង្កត់លំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n)

ស្វ័តិ (b_n) : 1 4 9 16 25... នោះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n \quad \text{and} \quad a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$$

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n+1$ ។

រូបទី 2 n : 1 2 3 4 5 6...

ស៊ីតិ (a_n) : 1 2 6 15 31 56... ។

ផលសង្កត់លំដាប់ទី 1 : 1 4 9 16 25...

ផលសង្កត់លំដាប់ទី 2 : 3 5 7 9...

តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។ ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងក្នុងលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n)

ដែលមានតួទី n នៃស្វ៊ីតគឺ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។

តាង c_n ជាផលសងក្នុងនៃស្វ៊ីត (b_n) ហៅថា ផលសងក្នុងលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) ។ គេបាន

ស្វ៊ីត (c_n) : $3, 5, 7, 9, \dots$ ។

ស្លឹក (c_n) ជាស្លឹកឈើដែលមានក្នុងទី 1 ស្មើនឹង 3 និងផលសង្កមស្មើនឹង 2 និង

$$c_n = 3 + 2(n - 1) = 2n + 1 \quad \forall$$

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)$

$= 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} k + (n-1) = n + 2 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n = n^2$ នោះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $b_1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n$ នោះ

$a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត ។ ដូច្នេះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ជាទូទៅ

គេមានស្វ៊ីត (a_n) ។

ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$

ហៅថាផលសងក្នុលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ

$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងក្នុលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺជាផលសងក្នុលំដាប់ទី 1

នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$ ដែលមានតួទី n

នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ

ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត 4, 18, 48, 100, 180, 294, ... ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត 4, 18, 48, 100, 180, 294, ...

តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីតដែលគេឱ្យ (a_n) ។

ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងក្នុលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួ b_n នៃស្វ៊ីត
កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។ ស្វ៊ីត (b_n) : 14, 30, 52, 80, 114, ... ។

ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងក្នុលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (b_n) ដែលមានតួ c_n ជាតួទី n
នៃស្វ៊ីត កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$

គេបានស្វ៊ីត (c_n) : 16, 22, 28, 34, ... ។

ស្វ៊ីត (c_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 16 និងផលសងរួមស្មើនឹង 6

$c_n = 16 + 6(n-1) = 16 + 6n - 6 = 6n + 10$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = 14 + \sum_{k=1}^{n-1} (6k + 10) = 14 + 6 \sum_{k=1}^{n-1} k + 10(n-1) \\ &= 14 + 6 \cdot \frac{1}{2} n(n-1) + 10(n-1) = 3n^2 + 7n + 4 \quad \forall \end{aligned}$$

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $b_1 = 4 + 7 + 3 = 14$ ពិត

ដូច្នេះ $b_n = 3n^2 + 7n + 4 \quad \forall$

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k^2 + 7k + 4) \\ &= 4 + 3 \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + 7 \sum_{k=1}^{n-1} k + 4(n-1) \\ &= 4 + 3 \cdot \frac{1}{6} n(n-1)(2n-1) + 7 \cdot \frac{1}{2} (n-1)n + 4n - 4 \\ &= \frac{1}{2} (n-1)(7n + 2n^2 - n) + 4n \\ &= (n-1)(3n + n^2) + 4n = n^3 + 2n^2 + n \quad \forall \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $a_n = n^3 + 2n^2 + n \quad \forall$

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n)

តាង S_n ជាផលបូកនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \\ S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (k^3 + 2k^2 + k) \\ &= \sum_{k=1}^n k^3 + 2 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{1}{4} n^2 (1+n)^2 + 2 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2} n(n+1) \\ &= \frac{1}{12} n(n+1)(3n + 3n^2 + 4 + 8n + 6) \\ &= \frac{1}{12} n(n+1)(3n^2 + 11n + 10) \quad \forall \end{aligned}$$

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត

ដូច្នេះ $S_n = \frac{1}{12} n(n+1)(3n^2 + 11n + 10) \quad \forall$

កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121, ... $\forall$

$a_n = 2^n - n \quad \forall$

ប្រតិបត្តិ
ចម្លើយ

❓ លំហាត់

1. សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $1 + 2 + 3 + \dots + 100$

ខ. $1 + 4 + 9 + 16 + \dots + 484$

គ. $1 + 8 + 27 + 64 + \dots + 3375$

ឃ. $1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 5 + \dots + 20 \times 22$ ។

2. សរសេរគ្រប់ក្នុងទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ ៖

ក. $\sum_{k=1}^6 k$

ខ. $\sum_{k=1}^5 k^2$

គ. $\sum_{k=4}^9 (3k-1)$

ឃ. $\sum_{k=2}^7 (-1)^k k$ ។

3. គណនា

ក. $\sum_{k=1}^{11} k^2$

ខ. $\sum_{k=1}^{24} k^2$

គ. $\sum_{k=12}^{24} k^2$ ។

4. គណនា

ក. $\sum_{k=1}^{24} k^3$

ខ. $\sum_{k=1}^{15} k^3$

គ. $\sum_{k=16}^{24} k^3$ ។

5. ក. សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^n k(k+1)$

ខ. ដោយប្រើចម្លើយ គណនាផលបូក $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + 28 \times 29$ ។

6. ក. សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)$

ខ. ដោយប្រើចម្លើយ គណនាផលបូក $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \dots + 20 \times 21 \times 22$ ។

7. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 2, 5, 10, 17, \dots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

8. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $1, 5, 14, 30, 55, 91, \dots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

9. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $(a_n) : p, q, p, q, p, q, \dots$ ។

វត្ថុបំណង

1. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ
2. កំណត់តួទី n តាមទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n
3. កំណត់តួទីទៅនៃទំនាក់ទំនងក្នុងទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ ។

1. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

គេបានសិក្សារួចមកហើយនូវទំនាក់ទំនងក្នុងស្វ៊ីតនព្វន្ត និងស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ចំពោះស្វ៊ីតនព្វន្ត $a_{n+1} = a_n + d$, d ជាផលសង្កម ។

ចំពោះស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_{n+1} = a_n \times q$, q ជាផលធៀបរួម ។

តទៅទៀតគេនឹងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងក្នុងស្វ៊ីតផ្សេងៗទៀតដោយកំណត់រកតួទី n នៃស្វ៊ីតនោះ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទីទៅនៃស្វ៊ីត (a_n) ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$,
 $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ ។

ដំណោះស្រាយ

របៀបទី 1: គេមាន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ គេអាចកំណត់

$$a_2 = 1 + 4a_1 = 1 + 4$$

$$a_3 = 1 + 4a_2 = 1 + 4 \times (1 + 4) = 1 + 4 + 4^2$$

$$a_4 = 1 + 4a_3 = 1 + 4 \times (1 + 4 + 4^2) = 1 + 4 + 4^2 + 4^3$$

.....

$$\text{នោះ } a_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{n-1}$$

$$\text{គេបាន } a_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{n-1} = \frac{1 \times (4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{4^n - 1}{3} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ តួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីត } (a_n) \text{ គឺ } a_n = \frac{4^n - 1}{3} \quad \text{។}$$

របៀបទី 2: ចំពោះ $n \geq 2$

$$\text{គេបាន } a_{n+1} = 1 + 4a_n, \quad a_n = 1 + 4a_{n-1}$$

$$\text{នោះ } a_{n+1} - a_n = 1 + 4a_n - (1 + 4a_{n-1}) = 4(a_n - a_{n-1}) \quad (1)$$

$$\text{បើគេតាង } b_n = a_{n+1} - a_n \text{ នោះពី (1) គេបាន } b_n = 4b_{n-1} \Rightarrow \frac{b_n}{b_{n-1}} = 4 \text{ នោះស្វ៊ីត}$$

(b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 4 និងមានតួទី 1 និងតួទី n

$$\text{គឺ } b_1 = a_2 - a_1 = 1 + 4 \times 1 - 1 = 4, \quad b_n = 4 \times 4^{n-1} = 4^n \text{ ។}$$

ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងស្វ៊ីត (a_n) តាមរូបមន្ត ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4^k = 1 + 4^1 + 4^2 + \dots + 4^{n-1} = \frac{1 \times (4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{4^n - 1}{3} \text{ ។}$$

$$\text{ដូច្នេះ តួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីត } (a_n) \text{ គឺ } a_n = \frac{4^n - 1}{3} \text{ ។}$$

របៀបទី 3: គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) រួចធ្វើផលដក $a_{n+1} - r_n$ ។

$$\text{គេឱ្យ } r_n = -\frac{1}{3} \text{ គេបាន } a_{n+1} + \frac{1}{3} = 1 + 4a_n + \frac{1}{3} = 4a_n + \frac{4}{3} = 4 \cdot \left(a_n + \frac{1}{3}\right)$$

$$\text{តាង } V_{n+1} = a_{n+1} + \frac{1}{3} \text{ ហើយ } V_n = a_n + \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\text{គេបាន } V_{n+1} = 4V_n \text{ ហើយ } V_n = 4^{n-1} \cdot V_1 \text{ ។}$$

$$\text{គេអាចគណនា } V_1 \text{ តាមទំនាក់ទំនង (1) គឺ } V_1 = a_1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\text{គេបាន } V_n = 4^{n-1} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3} \cdot 4^n \text{ គេអាចគណនា } a_n \text{ តាមទំនាក់ទំនង (1)}$$

$$\text{គឺ } a_n = V_n - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \cdot 4^n - \frac{1}{3} = \frac{4^n - 1}{3} \text{ ។}$$

សម្គាល់

ដើម្បីកំណត់រកតម្លៃនៃស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) គេតាង $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ (α, β ថេរ) ជាស្វ៊ីត

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ ។ ជំនួសស្វ៊ីតជំនួយទៅក្នុងស្វ៊ីត (a_n) គេបាន

សមីការដែលអាចឱ្យ គេកំណត់រក α និង β ។

$$a_{n+1} = 1 + 4a_n \Leftrightarrow \alpha \cdot (n+1) + \beta = 1 + 4 \cdot (\alpha \cdot n + \beta) \text{ ឬ}$$

$$3 \cdot \alpha \cdot n + 3 \cdot \beta - \alpha + 1 = 0$$

$$\text{គេបាន } \begin{cases} 3 \cdot \alpha = 0 \\ 3 \cdot \beta - \alpha + 1 = 0 \end{cases} \text{ ហើយ } \alpha = 0, \beta = -\frac{1}{3} \text{ ។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } r_n = -\frac{1}{3} \text{ ដូច្នេះស្វ៊ីត } (r_n) \text{ ហៅថា ស្វ៊ីតជំនួយ ។}$$

ជាទូទៅ

គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ (α, β ថេរ) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់
ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស (r_n) ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត
រួចគណនា តម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស្វ៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផល
សង $a_{n+1} - r_n$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - n + 1$ ។ កំណត់តួទី n ។

ដំណោះស្រាយ តាង (r_n) ដែល $r_n = \alpha n + \beta$ ជាស្វ៊ីតជំនួយ ។

$$\text{គេបាន } a_{n+1} = 2a_n - n + 1 \Leftrightarrow \alpha \cdot (n+1) + \beta = 2(\alpha \cdot n + \beta) - n + 1$$

$$\Leftrightarrow n \cdot (\alpha - 1) + \beta - \alpha + 1 = 0$$

$$\text{គេបានប្រព័ន្ធ } \begin{cases} \alpha - 1 = 0 \\ \beta - \alpha + 1 = 0 \end{cases} \text{ ហើយ } \alpha = 1, \beta = 0$$

នោះ (r_n) = n ធ្វើផលសងរវាងស្វ៊ីត $a_{n+1} - r_n$ គេបាន :

$$a_{n+1} - n = 2a_n - n + 1 - n = 2a_n - 2n + 1, \quad a_{n+1} - (n+1) = 2(a_n - n)$$

$$\text{តាង } V_n = a_n - n \quad (1) \quad \text{នោះ } V_{n+1} = a_{n+1} - (n+1) \quad \text{គេបាន } V_{n+1} = 2 \cdot V_n$$

$$\text{ហើយ } V_n = 2^{n-1} \cdot V_1 \quad \text{។}$$

$$\text{គេគណនា } V_1 \text{ តាម } V_n = a_n - n, \quad V_1 = a_1 - 1 = 3 - 1 = 2,$$

$$V_n = 2^{n-1} \cdot 2 = 2^n$$

$$\text{គេអាចគណនា } V_n \text{ តាម (1) គឺ } V_n = a_n - n \quad \text{នោះ } a_n = V_n + n = 2^n + n \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } a_n = 2^n + n \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 5$, $a_n = 2a_{n-1} - n$ ។

ចម្លើយ

$$a_n = 2^n + (n+2) \quad \text{។}$$

2. ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

ឧទាហរណ៍ : គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $S_n = n^2 + n$ ។ កំណត់តួទី n នៃ
ស្វ៊ីត (a_n) ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$$S_n = n^2 + n \Leftrightarrow S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n = n^2 + n$$

$$\Rightarrow S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} = (n-1)^2 + (n-1) \quad \text{។}$$

$$\text{ចំពោះ } n \geq 2 \quad \text{គេបាន } S_n - S_{n-1} = a_n = n^2 + n - [(n-1)^2 + (n-1)]$$

$$a_n = n^2 + n - (n-1)^2 - n + 1 = n^2 + n - n^2 + 2n - 1 - n + 1 = 2n \quad \text{នោះ } a_n = 2n \quad \forall$$

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $S_1 = 1^2 + 1 = 2$ ពិត ព្រោះ $(S_1 = a_1 = 2)$

ដូច្នេះ $a_n = 2n \quad \forall$

ឧបមាថា S_n គឺជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) នោះ

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n \quad \text{និង } S_{n-1} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \quad \forall$$

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n \quad \forall$ ម្យ៉ាងទៀត $S_1 = a_1 \quad \forall$

ជាទូទៅ ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1 \quad \forall$

សម្គាល់ S_n និង S_{n+1} មានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក a_{n+1} គឺ $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \quad \forall$

លំហាត់គំរូ គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $S_n = n^3 + 2n \quad \forall$

កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ដំណោះស្រាយ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n)

គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ

$$S_n = n^3 + 2n \Rightarrow S_{n-1} = (n-1)^3 + 2(n-1)$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^3 + 2n - (n-1)^3 - 2(n-1)$$

$$= n^3 + 2n - 2n + 2 - n^3 + 3n^2 - 3n + 1 = 3n^2 - 3n + 3 \quad \forall$$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 3n^2 - 3n + 3 \quad \forall$

ប្រតិបត្តិ គេមាន $S_n = 4 - a_n - \frac{1}{2^{n-2}} (n = 1, 2, 3, \dots)$ ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ក. កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ចម្លើយ ក. $2a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^{n-1}}$ ខ. $a_n = \frac{2n}{2^n} \quad \forall$

3. ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងប្រព័ន្ធ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

ឧទាហរណ៍ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ដោយ $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ ដែល

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n (n = 1, 2, \dots) \quad \forall$$

គេស្គាល់ a_1 , a_2 គេអាចគណនាតួ a_3 និងតួបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលលំនាំគំរូ

$$a_3 = 3 \cdot a_2 - 2 \cdot a_1 = 9 - 2 = 7$$

$$a_4 = 3 \cdot a_3 - 2 \cdot a_2 = 21 - 6 = 15$$

$$a_5 = 3 \cdot a_4 - 2 \cdot a_3 = 45 - 14 = 31$$

$$a_6 = 3 \cdot a_5 - 2 \cdot a_4 = 93 - 30 = 63$$

គណនាផលសងក្នុងនៃស្វ៊ីតនេះ

$$a_2 - a_1 = 2$$

$$a_3 - a_2 = 2^2$$

$$a_4 - a_3 = 2^3$$

.....

$$a_n - a_{n-1} = 2^{n-1}$$

$$a_n - a_1 = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1} \quad \text{នោះ } a_n = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1}$$

ជាផលបូកក្នុងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមាន 1 ជាតួទី 1 និងផលធៀបរួមស្មើនឹង 2

$$\text{គេបាន } a_n = 2^n - 1 \quad \forall$$

ជាទូទៅគេអាចគណនា a_n តាមវិធីខាងក្រោម ៖

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - 2a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n = a_n - 2a_{n-1}$$

$$= a_{n-1} - 2a_{n-2} = \dots = a_2 - 2a_1 = 3 - 2 \times 1 = 1$$

$$\text{នោះ } a_{n+2} - 2a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n = 1 \quad (1) \quad \forall$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$$

តាំង $b_n = a_{n+1} - a_n$ នោះ (b_n) ឬ $(a_{n+1} - a_n)$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមាន

ផលធៀបរួមស្មើនឹង 2 និងតួទី 1 ស្មើនឹង $b_1 = a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$ ហើយ

$$b_n = 2 \cdot (2)^{n-1} = 2^n \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$\begin{cases} a_{n+1} - 2a_n = 1 & (1) \\ a_{n+1} - a_n = 2^n & (2) \end{cases}$$

$$-a_n = 1 - 2^n$$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 2^n - 1 \quad \forall$

គេបានរបៀបរកក្នុងទូទៅតាមទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម ៖

ជាទូទៅ

$$r \text{ បៀបដោះស្រាយ } a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

បើទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត (a_n) មានទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

គេពិចារណាពីរចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p$, $\alpha\beta = q$

$$\text{នោះគេបាន } a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0 \quad \forall$$

ទំនាក់ទំនងនេះអាចបម្លែងតាមរបៀបពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោម ៖

$$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$$

$$a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$$

ទំនាក់ទំនងទាំង 2 ខាងលើនេះ គឺជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រអាថ្មីគេរក a_n បាន ។

គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយសមីការ $x^2 + px + q = 0$ ព្រោះគេ

ស្គាល់ផលបូកនិងផលគុណវា ។

សមីការ $x^2 + px + q = 0$ ហៅថា “សមីការសម្គាល់នៃ

$$a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0” \quad \forall$$

លំហាត់គំរូ

ស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 1$, $a_2 = 13$, $a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$

$(n = 1, 2, \dots)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត ។

ដំណោះស្រាយ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n)

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - a_{n+1} - 6a_n = 0$$

សមីការសម្គាល់ : $x^2 - x - 6 = 0$ សមីការមានឫស $x = 3$ ឬ $x = -2$ ។

$$\text{គេបាន } \begin{cases} a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n) & (i) \\ a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n) & (ii) \end{cases}$$

$$(i) \quad a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n)$$

តាង $b_n = a_{n+1} + 2a_n$ នោះស្វ៊ីត (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀប

រួមស្មើនឹង 3 ហើយតួទី 1 គឺ $b_1 = a_2 + 2a_1 = 13 + 2 \times 1 = 15$ និង

$$b_n = 15 \cdot (3)^{n-1}$$

$$\text{គេបាន } a_{n+1} + 2a_n = 15 \cdot (3)^{n-1} \quad (1) \quad \forall$$

$$(ii) \quad a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n)$$

តាង $c_n = a_{n+1} - 3a_n$ នោះស្វ៊ីត (c_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀប

រួមស្មើនឹង -2 ហើយតួទី 1 គឺ $c_1 = a_2 - 3a_1 = 13 - 3 \times 1 = 10$ និង

$$c_n = 10 \cdot (-2)^{n-1}$$

$$\text{គេបាន } a_{n+1} - 3a_n = 10 \cdot (-2)^{n-1} \quad (2) \quad \text{។}$$

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$\begin{cases} a_{n+1} + 2a_n = 15 \cdot (3)^{n-1} & (1) \\ a_{n+1} - 3a_n = 10 \cdot (-2)^{n-1} & (2) \end{cases}$$

$$5a_n = 15(3)^{n-1} - 10(-2)^{n-1}$$

$$a_n = 3 \times 3^{n-1} - 2 \times (-2)^{n-1} = 3^n + (-2)^n$$

ដូច្នេះ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 3^n + (-2)^n$ ។

ប្រតិបត្តិ

ស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនង $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n$

$(n = 1, 2, \dots)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

ចម្លើយ

$$a_n = \frac{1}{2}(3^n - 3) \quad \text{។}$$

? លំហាត់

1. ស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម ៖

ក. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 4$

ខ. $a_1 = 5$, $a_{n+1} = 3a_n - 2n$ ។

កំណត់តួទី 4 នៃស្វ៊ីតនេះ ។

2. ស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ។

កំណត់តួទី 7 នៃស្វ៊ីតនេះ ។

3. ស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = pa_n + q$ ។

គណនាតម្លៃ p និង q បើគេដឹងតួទី 3 ស្មើនឹង 6 និងតួទី 5 ស្មើនឹង 86 ។

4. កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម ៖

ក. $a_1 = 1$, $3a_{n+1} = 2a_n + 3$ $(n = 1, 2, \dots)$

ខ. $a_1 = 1$, $3a_{n+1} = 3a_n + 4$ $(n = 1, 2, \dots)$

គ. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + n$ $(n = 1, 2, \dots)$ ។

5. គេមានស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) ។
- ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a_n \neq 3$ ចំពោះគ្រប់ n ។
- ខ. យក $b_n = \frac{1}{a_n - 3}$ និងកំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (b_n) ។ កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (a_n) ។
6. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ។
- បើ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n = 4 - a - \frac{1}{2^{n-2}}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) នោះចូរ ៖
- ក. កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។
- ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។
7. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌ $(a_n) : a_1 = 1$, $S_n = a_{n+1} + n^2$ ($n \geq 1$) ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។
8. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត (a_n) ហើយ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n = \frac{n}{n-1} \cdot a_n$ $n \geq 2$ ។
- ក. បញ្ជាក់រក a_n ($n \geq 3$) អនុគមន៍នឹង n និង a_{n-1} ។
- ខ. បញ្ជាក់រក S_n ($n \geq 2$) អនុគមន៍នឹង n និង S_{n-1} ។
- គ. ឧបមាថា $a_1 = 1$ រកតួទី n នៃស្វ៊ីត S_n ដែល $n \geq 1$ ។
9. គេមានស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន
- $(a_n) : a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 3}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) ។
- ក. តាង $b_n = \frac{1}{a_n}$ ។ កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង b_n និង b_{n+1} ។
- ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត a_n ។

វត្ថុបំណង

1. កំណត់វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
2. ការប្រើអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
3. ទ្រឹស្តីបទទេរដា ។

1. គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

គេគ្រាន់តែសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃផលបូកចំនួនគត់សេស

ផលបូក 1 ត្រូវបានដោយ $P(1) = 1 = 1^2$

ផលបូក 2 ត្រូវបានដោយ $P(2) = 1 + 3 = 2^2$

ផលបូក 3 ត្រូវបានដោយ $P(3) = 1 + 3 + 5 = 3^2$

គេអាចទាញបានផលបូក n ត្រូវបានដោយ $P(n) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ ។

បន្ទាប់ពីបានរូបមន្តនេះមក គេត្រូវបញ្ជាក់ថារូបមន្ត $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ។

ក្នុងករណីនេះគេផ្តើមផ្ទៀងផ្ទាត់ $P(n)$ ដោយឱ្យ $n = 1$ ។

បើ $n = 1$ $1 = 1^2$ ដូច្នេះ $P(1)$ ពិត ។

ឧបមាថា $P(n)$ ពិត ចំពោះតម្លៃ n ណាមួយ

គេត្រូវស្រាយថា $P(n)$ ពិតនាំឱ្យបាន $P(n+1)$ ក៏ពិតដែរ

បើ $P(n)$ ពិត គេបាន $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n+1)$ ពិតលុះត្រាតែគេបាន $P(n+1) = (n+1)^2$ ។

របៀបស្រាយបញ្ជាក់

គេដឹងថា $P(n+1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) + [2(n+1)-1] = n^2 + (2n+2-1)$

$$= n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

$P(n+1)$ ពិត ។ ដូច្នេះ $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

គោលការណ៍នៃវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

វិធានអនុមានរួម $P(n)$ ជាសំណើដែលទាក់ទងនឹងចំនួនគត់ n ។ ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n)$

ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ គេត្រូវ

1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1$
2. ឧបមាថា $P(n)$ ពិតចំពោះតម្លៃ n
3. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $P(n)$ ពិតនាំឱ្យបាន $P(n+1)$ ពិត ។

លំហាត់គំរូ 1 ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n \times (n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

ពិតចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ដោយប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $n = 1$

អង្គខាងឆ្វេង $1 \times 2 = 2$ អង្គខាងស្តាំ $\frac{1}{3} \times 1 \times (1+1)(1+2) = 2$ ។

នោះអង្គខាងឆ្វេង = អង្គខាងស្តាំ ។ ដូច្នេះ ចំពោះ $n = 1$ សមភាពពិត ។

ឧបមាថា សមភាពពិតចំពោះ $n = k$ គេបាន

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k \times (k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{។}$$

បង្ហាញថាសមភាពពិតចំពោះ $n = k$ នាំឱ្យបានសមភាពពិតចំពោះ $n = k+1$

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$$

$$\text{គេមាន } 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k \times (k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$$

ថែម $(k+1)(k+2)$ លើអង្គទាំងពីរនៃសមីការ គេបាន

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k \times (k+1) + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + (k+1)(k+2)$$

$$= (k+1)(k+2)\left(\frac{1}{3}k+1\right)$$

$$= (k+1)(k+2)\left(\frac{k+3}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3) \quad \text{ពិត ។ ដូច្នេះ សមភាពពិតចំពោះគ្រប់ } n \in \mathbb{N} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n \times (n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

$$(n = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 2 ចំពោះ $h > 0$ និងចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n \geq 2$ បង្ហាញថា $(1+h)^n > 1+nh$ ដោយប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $n = 2$

គេបាន $(1+h)^2 = 1+2h+h^2 > 1+2h$ ព្រោះ $h^2 > 0$

ដូច្នេះ វិសមភាពនេះពិត ចំពោះ $n = 2$ ។

ឧបមាថាវិសមភាពនេះពិត ចំពោះ $n = k$ ($k \geq 2$) នោះ $(1+h)^k > 1+kh$ ពិត គេនឹងបង្ហាញថាវាពិតដល់ $n = k+1$ ($k \geq 2$) គឺ

$$(1+h)^{k+1} > 1+(k+1) \times h \quad (1) \quad \text{។}$$

គេមាន $(1+h)^k > 1+kh$ ដោយ $h > 0$ នោះ $1+h > 0$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) និង $1+h > 0$

គេបាន $(1+h)^k(1+h) > (1+kh)(1+h)$

$$(1+h)^{k+1} > 1+kh+h+kh^2 = 1+(k+1)h+kh^2 > 1+(k+1)h$$

ព្រោះ $kh^2 > 0$ ។

ដូច្នេះ វិសមភាព $(1+h)^2 > 1+nh$ ពិតចំពោះគ្រប់ ($n \geq 2$) ។

លំហាត់គំរូ 3 ស្រាយបញ្ជាក់ថា n^3+2n ជាពហុគុណនៃ 3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ដោយប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $n = 0$ គេបាន 0 ជាពហុគុណនៃ 3 ពិត ។

ឧបមាថាសមភាពពិតចំពោះចំនួនគត់ $n = k$

គេបាន k^3+2k ជាពហុគុណនៃ 3 ពិត

យើងបាន $k^3+2k = 3q$, q ជាចំនួនគត់ ។

គេបង្ហាញថាវាពិតចំពោះ $n = k+1$ គឺ $(k+1)^3+2(k+1)$ ជាពហុគុណនៃ 3 ។

$$\text{គេបាន } (k+1)^3+2(k+1) = k^3+3k^2+3k+1+2k+2$$

$$= k^3+3k^2+5k+3 = (k^3+2k) + 3 \times (k^2+k+1)$$

$$= 3q + 3(k^2+k+1) = 3(q+k^2+k+1)$$

មានន័យថា $(k+1)^3+2(k+1)$ ជាពហុគុណនៃ 3 ។

ដូច្នេះ n^3+2n ជាពហុគុណនៃ 3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n ។

ប្រតិបត្តិ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់វិសមភាព $\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right)(1 + 2 + 3 + \dots + n) \geq n^2$ ដោយ

ប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2^{n+1} + 3^{2n-1}$ ជាពហុគុណនៃ 7 ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

ដោយប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

គ. ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

ដោយប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។

2. ព្រឹត្តិបទទ្វេធា

ពេលគេពន្លាតស្វ័យគុណនៃទ្វេធា គេបានពហុធា ឬស៊េរីមួយ ។ វាមិនមែនជាស្វ័យគុណណាមួយ ឬស្វ័យគុណពន្លាតឡើយ តែវាមានលំនាំគំរូមួយច្បាស់លាស់ ។ ក្នុងមេរៀននេះគេនឹងសិក្សារូបមន្តពន្លាតនៃស្វ័យគុណ នៃទ្វេធាឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។ ជាដំបូងពិនិត្យមើលពន្លាតនៃកន្សោម $(x+y)^n$ ចំពោះតម្លៃខ្លះនៃ n ។

ឧទាហរណ៍ 1 :

$$(x+y)^0 = 1$$

$$(x+y)^1 = 1x + 1y$$

$$(x+y)^2 = 1x^2 + 2xy + 1y^2$$

$$(x+y)^3 = 1x^3 + 3x^2y^1 + 3x^1y^2 + 1y^3$$

$$(x+y)^4 = 1x^4 + 4x^3y^1 + 6x^2y^2 + 4x^1y^3 + 1y^4$$

$$(x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5x^1y^4 + 1y^5$$

.....

ក្នុងជួរដេកនីមួយៗកើតមានលំនាំគំរូដូចៗគ្នា ។

ពីឧទាហរណ៍ខាងលើ គេសង្កេតក្នុងជួរដេកនីមួយៗនៃពន្លាតកន្សោម $(x+y)^n$ ឃើញថា ៖

- ពន្លាតទ្វេធានីមួយៗជាពហុធាដែលមាន $(n+1)$ តួ ។
- ក្នុងពន្លាតទ្វេធានីមួយៗស្វ័យគុណនៃ x ចុះ 1 ដីក្រេជាបន្តបន្ទាប់ និងស្វ័យគុណនៃ y កើន 1 ដីក្រេជាបន្តបន្ទាប់បើគេអានពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។
- ផលបូកនៃស្វ័យគុណក្នុងតួនីមួយៗនៃពហុធាស្មើ n ។

- លេខមេគុណចាប់ផ្ដើមនិងចុងក្រោយគឺ 1 ដូចគ្នា ហើយផលបូកនៃលេខមេគុណពីរតួ ជាប់គ្នានៃពន្លាត $(x+y)^3$ ជាលេខមេគុណនៃពន្លាត $(x+y)^4 \dots$ ។

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & & \underbrace{} & & \underbrace{} & & \underbrace{} & & \underbrace{} \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{លេខមេគុណនៃ } (x+y)^3 \\ \text{លេខមេគុណនៃ } (x+y)^4 \end{array}$$

ឬលេខមេគុណនៃតួផ្សេងទៀតកំណត់បានអាស្រ័យនឹងលេខមេគុណនៃតួបន្ទាប់ខាងមុខគឺ


$$\text{លេខមេគុណនៃតួទី } k+1 = \frac{(\text{លេខមេគុណនៃតួទី } k) \times (\text{ស្វ័យគុណនៃ } x \text{ ក្នុងតួទី } k)}{k} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : $(x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5$

$$\begin{array}{ccccc} \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \frac{1 \times 5}{1} & \frac{5 \times 4}{2} & \frac{10 \times 3}{3} & \frac{10 \times 2}{4} & \frac{5 \times 1}{5} \end{array}$$

ពីឧទាហរណ៍ 1 បើគេផ្ដាច់យកតែលេខមេគុណនិងតម្រៀបលេខទាំងនេះជាតារាងត្រីកោណ គេឃើញមានលំនាំគំរូជាច្រើន ។ គេបាន

តម្រៀបលេខមេគុណទាំងនេះជាតារាងត្រីកោណ ហៅថា **ត្រីកោណប៉ាស្កាល់** និងមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់រកលេខមេគុណក្នុងពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^n$ ដែល មានស្វ័យគុណតូចតែវាពិបាកអនុវត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះ ការពន្លាតទ្វេធា $(x+y)^n$ ដែលមានស្វ័យគុណធំ ។



ចំណែកឯស្វ័ត 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... ហៅថា **ស្វ័ត Fibonacci** ។

លំហាត់គំរូ ប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ពន្លាតកន្សោម $(x+y)^5$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយប្រើជួរដេកទី 5 នៃត្រីកោណប៉ាស្កាល់ គេបានលេខមេគុណ

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

$$\text{គេបាន } (x+y)^5 = 1x^5 + 5x^4y^1 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + 1y^5 \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ ប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ពន្លាតកន្សោម $(x+y)^6$ ។

ចម្លើយ $(x+y)^6 = x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$ ។

គេចាំបាច់កំណត់គំរូតួទូទៅនៃពន្លាត $(x+y)^n$ គឺ

$$(x+y)^n = 1x^n + ?x^{n-1}y^1 + ?x^{n-2}y^2 + \dots + ?x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$

តួ 1 2 3 ... (r+1) ... (n+1)

លេខមេគុណ 1 $\frac{1 \times n}{1}$ $\frac{n(n-1)}{1 \times 2}$... $\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times r}$... 1

$$= 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1 \times 2}x^{n-2}y^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times r}x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$

ដូច្នេះ $(x+y)^n = 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1 \times 2}x^{n-2}y^2 + \dots$
 $+ \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times r}x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$ ។

ពីត្រីកោណប៉ាស្កាល់ គេឃើញថាលេខមេគុណនៃទ្វេធាជាចំនួនដែលរៀបឆ្លុះគ្នា ហើយគេ

ដឹងថា

$$1 = \frac{n!}{n!0!} = {}_nC_0 = {}_nC_n$$

$$\frac{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = {}_nC_1 = {}_nC_{n-1}$$

$$\frac{n(n-1)}{1 \times 2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = {}_nC_2 = {}_nC_{n-2}$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{1 \times 2 \times 3} = \frac{n!}{(n-3)!3!} = {}_nC_3 = {}_nC_{n-3}$$


.....

$$\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times r} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

ចំនួនថេរ ${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \dots, {}_nC_n$ ហៅថាលេខមេគុណនៃទ្វេធា $(x+y)^n$ ។

គេបាន

$$(x+y)^n = 1x^n + \frac{n}{1}x^{n-1}y^1 + \frac{n(n-1)}{1 \times 2}x^{n-2}y^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-1+1)}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times r}x^{n-r}y^r + \dots + 1y^n$$


$${}_nC_0x^n + {}_nC_1x^{n-1}y^1 + {}_nC_2x^{n-2}y^2 + \dots + {}_nC_rx^{n-r}y^r + \dots + {}_nC_ny^n$$

ហៅថា ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ។


ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា $(x+y)^n = \sum_{r=1}^n {}_nC_r x^{n-r}y^r$

$$= {}_nC_0 x^n + {}_nC_1 x^{n-1}y^1 + {}_nC_2 x^{n-2}y^2 + \dots + {}_nC_n y^n$$
 ។

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើជួរដេកទី 6 នៃត្រីកោណប៉ាស្កាល់គណនាលេខមេគុណនៃទ្វេធា

$${}_6C_0, {}_6C_1, {}_6C_2, {}_6C_3, {}_6C_4, {}_6C_5, {}_6C_6$$
 ។

ដំណោះស្រាយ



ប្រតិបត្តិ

- ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទទ្វេធាតុរូបពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ៖
 ក. $(1+3x)^4$ ខ. $(2x-y)^5$ គ. $\left(a+\frac{1}{2}\right)^6$ ឃ. $(1+x)^n$ ។
- កំណត់តួទី 4 នៃពន្លាតទ្វេធា $(x+x)^{13}$ ។

ចម្លើយ

- ក. $(1+3x)^4 = 1 + 12x + 54x^2 + 108x^3 + 81x^4$
 ខ. $(2x-y)^5 = 32x^5 - 80x^4y + 80x^3y^2 - 40x^2y^3 + 10xy^4 - y^5$
 គ. $\left(a+\frac{1}{2}\right)^6 = a^6 + 6a^5 + 15a^4 + 20a^3 + 15a^2 + 6a + \frac{1}{64}$
 ឃ. $(1+x)^n = 1 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + {}_nC_3 x^3 + \dots + {}_nC_n x^n$ ។
- ${}_{13}C_3 x^{10}y^3 = 286x^{10}y^3$ ។

? លំហាត់

- ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ដោយប្រើវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ។
- បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n
 ក. ចំនួន $4^n + 2$ ចែកដាច់នឹង 3 ។ ខ. ចំនួន $3^{n+3} - 4^{4n+2}$ ចែកដាច់នឹង 11 ។
- គេមានស្វីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់កំណត់ដោយ $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ និង $a_0 = 0$ ។
 បង្ហាញតាមវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា
 ក. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n , $a_n \leq 2$ ។ ខ. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n , $a_n \leq a_{n+1}$ ។
- បង្ហាញតាមវិធានអនុមានរួមគណិតវិទ្យាថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n
 $(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \geq 0$ ។
- ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទទ្វេធា ចូរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ៖
 ក. $(3x-1)^4$ ខ. $(2x+y)^6$ គ. $(a+b)^6$ ។
- សរសេរពន្លាតកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើ Σ ៖
 ក. $(x-y)^5$ ខ. $(2x+y)^6$ គ. $(a+b)^{12}$ ។

មេរៀនសង្ខេប

1. ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។
2. ស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុន បន្ទាប់ បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = a_{n+1} - a_n$) ។
3. រូបមន្តតួទូទៅនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត $a_n = a_1 + (n-1) \times d$ ។
4. ផលបូក n តួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2}$ ។
5. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស្វ៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណ នឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។
6. រូបមន្តតួទូទៅនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_{n+1} = a_n \times q$, $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ។
7. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ ដែល $q \neq 1$ ។
8. ផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$ បើ $|q| < 1$ ។
9. រូបមន្តផលបូកស្វ៊ីតមានលំដាប់ខ្ពស់

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1), \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2$$
 ។
10. ស្វ៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$, $n \geq 2$ ។
11. ទំនាក់ទំនងកំណើនទម្រង់ $a_{n+1} = a_n + pn$ នោះផលសងស្វ៊ីត (b_n) ដែល

$$b_n = a_{n+1} - a_n = pn \quad \text{និង} \quad a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} pk$$
 ។
12. ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។
13. ទំនាក់ទំនងកំណើននៃស្វ៊ីត (a_n) ទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ មានសមីការសម្គាល់

$$x^2 + px + q = 0$$
 ដែលបូស α និង β បំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p$, $\alpha\beta = q$ នោះ
គេបាន $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ អាចបំប្លែងជា $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$

$$a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$$
 ទំនាក់ទំនងទាំង 2 នេះគឺជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។
14. សំណើ $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n ហើយសំណើរខាងក្រោម (i)
និង (ii) ពិតគឺ
(i) $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1$

(ii) ឧបមាថា $P(n)$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n = k$ រួចបង្ហាញថា $P(n+1)$

ពិតចំពោះគ្រប់ $n = k+1$ ។

$$15. \text{ ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា } (x+y)^n = \sum_{r=1}^n {}_nC_r x^{n-r} y^r$$

$$= {}_nC_0 x^n + {}_nC_1 x^{n-1} y^1 + {}_nC_2 x^{n-2} y^2 + \dots + {}_nC_n y^n \text{ ។}$$

? លំហាត់ជំពូក 1

1. តួទី 5 នៃស៊ីតនព្វន្តស្មើ 14 និងតួទី 12 ស្មើ 35 ។ គណនាផលសង្កេត តួទី 1 និងតួទី n ។
2. ផលបូកនៃ n តួដំបូងនៃស៊ីតមួយកំណត់ដោយ $S_n = n^2 + n$ ។ គណនាតួទី 5 នៃស៊ីត និងបង្ហាញថាតួនៃស៊ីតនេះជាស៊ីតនព្វន្ត ។
3. តួទី 3 នៃស៊ីតធរណីមាត្រស្មើ 3 និងតួទី 6 ស្មើនឹង $\frac{3}{8}$ ។ គណនាផលធៀបរួមតួទី 1 និងផលបូក 8 តួដំបូង ។
4. គណនា a ដើម្បីឱ្យបីចំនួន $(a-3)$, $(a+1)$ និង $(4a-2)$ ជាបីតួគត្តានៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។
5. គេឱ្យបួនចំនួនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។ គណនាតួទី 2 និងទី 3 នៃស៊ីត បើគេដឹងថាតួទី 1 ស្មើនឹង 6 ហើយតួទី 4 ស្មើនឹង 162 ។
6. គេទិញផ្ទះមួយតម្លៃ 30000 ដុល្លារ ។ អ្នកទិញត្រូវបង់ប្រាក់ជា 6 ដំណាក់កាល ដែលបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រមានផលធៀបរួម $\frac{9}{10}$ ។ កំណត់ប្រាក់ដែលត្រូវបង់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ។
7. គេមានស៊ីតនព្វន្ត (U_n) និង (V_n) កំណត់ដោយ $U_1 = 3$ និងផលសង្កេតស្មើ 3 និង $V_1 = 4$ និងផលសង្កេតស្មើ 2 ។
 ក. កំណត់ U_n និង V_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។
 ខ. គេមានស៊ីត (W_n) កំណត់ដោយ $W_n = \frac{U_n}{V_n}$ ។ បង្ហាញថាស៊ីត (W_n) ជាស៊ីតកើន និងកំណត់ n ដើម្បីឱ្យ $W_n - W_{n-1} = \frac{1}{28}$ ។
8. កំណត់ផលសង្កេតនិងតួទី 1 U_1 នៃស៊ីតនព្វន្ត $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ កើននិងដឹងថា

$$\begin{cases} U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 = 98 \\ U_1 - U_2 + U_3 = 4 \end{cases}$$
 ។ គណនា U_{10} និងផលបូក 10 តួដំបូងនៃស៊ីត ។

9. តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រស្មើ 3 ហើយមានផលធៀបរួម r ដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃ r តូចជាង 1 ។
ផលបូក 3 តួដំបូងស្មើ $\frac{8}{9}$ នៃផលបូក 6 តួដំបូង ។ គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត ។
10. 1. ដោះស្រាយក្នុង $\mathbb{R}$ សមីការ : $3x^2 - 8x + 4 = 0$ (E) ។
2. គេមាន $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រកើនដែលមាន U_3 និង U_4 នៃស្វ៊ីតនេះជាចម្លើយនៃ
សមីការ (E) ។
ក. ទាញរកផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតនេះ ។ ខ. គណនាតួទី 1 U_1 នៃស្វ៊ីត ។
11. សរសេរវិធីដំបូងនៃស្វ៊ីតពូជដោយដឹងថា $S_{10} = 210$ និង $S_{20} = 820$ ។
12. គេដឹងថាផលបូកតួទី 1 និងតួទី 4 នៃស្វ៊ីតពូជស្មើនឹង 2 និងផលបូកការេរបស់វា
ស្មើនឹង 20 ។ គណនាផលបូកប្រាំបីតួដំបូងនៃស្វ៊ីត ។
13. គេមាន S_m និង S_n ជាផលបូក m តួដំបូង និង n តួដំបូងរៀងគ្នានៃស្វ៊ីតពូជមួយដែល
 $\frac{S_m}{S_n} = \frac{m^2}{n^2}; (n \neq m)$ ។ តាងតួទី m គឺ a_m និងតួទី n គឺ a_n ។ បង្ហាញថា $\frac{a_m}{a_n} = \frac{2m-1}{2n-1}$ ។
14. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $12, 4, \frac{4}{3}, \dots$ ។
ក. គណនាតួទី 10
ខ. តើចំនួន $\frac{4}{729}$ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត?
គ. គណនាផលបូក 20 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។
15. គេឱ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ បើគេដឹងថា $a_n = 2(3)^{n-1}$ ។ គណនា S_n ។
16. គណនាផលបូក $1 + 2x + 3x^2 + \dots + (n-1)x^{n-2} + nx^{n-1}$ ។
17. គណនាតួទី 1 នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តដែលមាន $q = \frac{3}{5}$ និង $S_\infty = 40$ ។
18. គេឱ្យបីចំនួនជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ គណនាចំនួនទាំងនេះបើគេដឹងថាផលគុណនៃចំនួនទាំង
នោះស្មើនឹង 3375 ហើយផលបូកវាស្មើនឹង 93 ។
19. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនីមួយៗខាងក្រោម
ក. ស្វ៊ីត $(a_n) : 1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \dots, \frac{1}{1+2+3+4+\dots+n}$
ខ. ស្វ៊ីត $(b_n) : \frac{1}{(1 \times 3)^2}, \frac{2}{(3 \times 5)^2}, \frac{3}{(5 \times 7)^2}, \dots, \frac{n}{[(2n-1)(2n+1)]^2}$ ។
20. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត 1, 2, 6, 15, 31, 56, ...
ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

21. ក. គណនា $\sum_{k=1}^n (2k^2 - 1)$

ខ. ដោយប្រើសំណួរ ក. គណនាផលបូក $1 + 7 + 17 + 31 + \dots + 799$ ។

22. សរសេរផលបូក $1 + 4 + 7 + 10 + 13 + \dots + 298$ ដោយប្រើ Σ ។

23. ដោយប្រើវិធានអនុមាត្រមគណិតវិទ្យាស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = 2^n - 1$ ។

24. គេមានស្វ៊ីត (U_n) ដែល n ជាចំនួនគត់កំណត់ដោយ $U_{n+1} = 2U_n + 1$ និង $U_0 = 1$ ហើយ

ស្វ៊ីត (V_n) កំណត់ដោយ $V_n = U_n + 1$ ។

ក. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (V_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ខ. ទាញរក U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

គ. សិក្សាភាពម៉ូឌូតូននៃស្វ៊ីត (U_n) ។

ឃ. ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n គណនាផលបូក $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$ ។

25. គេមាន (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + n$ ។

ក. តាង $b_n = 2^n a_n$ ។ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (b_n) ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

26. ក. សរសេរ $(x^2 - 2y)^7$ ដោយប្រើ Σ

ខ. កំណត់តួទី 6 នៃពន្លាត $(x^2 - 2y)^7$ ។

27. បង្ហាញថាផលបូកនៃលេខមេគុណក្នុងពន្លាត $(1+x)^n$ គឺ 2^n ។

28. បង្ហាញថា

$${}_nC_0 + {}nC_2 + {}nC_4 + \dots + {}nC_{n-1} = {}nC_1 + {}nC_3 + {}nC_5 + \dots + {}nC_n = 2^{n-1} \text{ ដែល } {}nC_0, {}nC_1,$$

${}_nC_2, \dots, {}nC_n$ ជាលេខមេគុណក្នុងពន្លាត $(1+x)^n$ ដែល n ជាចំនួនគត់សេស ។

29. គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) មួយកំណត់ដោយ $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + 168(a_n)^2}}$, $n \in \mathbb{N}$ ។

ក. តាង $b_n = \frac{1}{(a_n)^2}$ ។ បង្ហាញថា (b_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តមួយ

ខ. គណនា b_n , $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

30. គេឱ្យពហុធា $f(x) = px^2 + qx$ ។
 ក. កំណត់តម្លៃពិតនៃ p និង q ដើម្បីឱ្យ $f(x) = f(x-1) + x$ គ្រប់ x
 ខ. ទាញរកផលបូក $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots$ ។
31. គេឱ្យស្វ៊ីតពន្លឺមួយ $a_1 = \frac{5\pi}{3}$ និងមានផលសង្ខេប $d = \frac{\pi}{6}$ ។
 ក. គណនាតួទី 168 នៃស្វ៊ីតនេះ
 ខ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីតនេះស្មើនឹង $\frac{8\pi}{3}$ ។
32. គេឱ្យសមីការ $x^2 + ax + \beta$ ។ កំណត់តម្លៃ α និង β ដើម្បីឱ្យផលបូកការេនៃបូសសមីការនេះស្មើនឹង 14 ហើយ $1, \alpha, \beta$ ជាបីតួបន្តគ្នានៃស្វ៊ីតពន្លឺចុះដាច់ខាតមួយ ។
33. គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) មួយកំណត់ដោយ $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3}$ ។
 ក. តាង $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$ ។ បង្ហាញថា (b_n) ជាស្វ៊ីតពន្លឺមួយ
 ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។
34. គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) មួយកំណត់ដោយ $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \sqrt[3]{2 + 3(a_n)^2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$
 ក. ស្រាយថា $b_n = 1 + a_n^3$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
 ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n
 គ. $S_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$ ។
35. គណនាផលបូក $S_n = \frac{13}{10} + \frac{303}{100} + \frac{5003}{1000} + \dots + \frac{(2n-1)00\dots003}{1000\dots000}$ ។
36. គេឱ្យ (a_n) កំណត់ដោយ $\begin{cases} a_1 = a, & a_2 = b \\ a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2} \end{cases}$ ។
 ក. ស្រាយថា $b_n = a_n - a_{n-1}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
 ខ. សរសេរ a_n ជាអនុគមន៍នៃ a , b និង n ។
37. គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ $\begin{cases} a_1 = 5 + 3\sqrt{5} \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{5}{a_n}\right) \end{cases}$ ។
 ក. តាង $b_n = \frac{a_n - \sqrt{5}}{a_n + \sqrt{5}}$ ។ សរសេរទំនាក់ទំនងរវាង b_{n+1} និង b_n
 ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n
 គ. បើ $c_n = 1 + b_n$ គណនា $P_n = c_1 \times c_2 \times c_3 \times \dots \times c_n$ ។

38. គេមានស្វ៊ីតចំនួនពិត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ
$$\begin{cases} a_1 = \sqrt{5} \\ a_{n+1} = a_n^2 - 2 \end{cases} \quad ។$$

ក. បង្ហាញថា $a_n > 2$, $\forall n \in \mathbb{N}$

2. តាង $b_n = a_n + \sqrt{a_n^2 - 4}$ សរសេរទំនាក់ទំនងរវាង b_n និង b_{n+1}

គ. សរសេរ a_n និង b_n ជាអនុគមន៍ n ។

39. គេមានស្វីត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ
$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - \frac{1}{3} \end{cases} .$$

ក. បង្ហាញថាគេអាចកំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ $b_n = 3a_n + k$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយគ្រប់ $\mathbb{N}$

ខ. សរសេរ b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ចំពោះតម្លៃ k ខាងលើ ។

40. គេឱ្យកន្សោម $S_n = \frac{1}{7} + \frac{2}{7^2} + \frac{3}{7^3} + \dots + \frac{n-1}{7^{n-1}} + \frac{n}{7^n}$ ។ គណនា S_n ។

41. គេមានស្វ៊ីតចំនួនពិត (a_n) មួយកំណត់លើ $\mathbb{N}$ ដោយ
$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{3} \\ a_{n+1} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right) a_n \end{cases}$$

ក. សរសេរ b_n ជាអនុគមន៍នៃ n

២. តាង $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ ។ គណនា $S_n - \frac{1}{3}S_n$ ចំពោះ S_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

42. កំណត់តួទី n , a_n នៃស្វ៊ីត (a_n) ខាងក្រោម

$$\begin{array}{ll} \text{1.} & \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n + 2 \end{cases} \\ \text{2.} & \begin{cases} a_1 = \frac{13}{2} \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 3 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{iii. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = (\sqrt{3} + \sqrt{2})a_n + \sqrt{3} - \sqrt{2} + 1 \end{cases}$$

43. កំណត់តួទី n , a_n នៃស្វ៊ីត (a_n) ខាងក្រោម

$$\text{ñ. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n \end{cases} \qquad \text{2. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \end{cases}$$

$$\text{iii. } \begin{cases} a_1 = 0, & a_2 = 1 \\ a_{n+2} = (\sqrt{3}a_{n+1} - 4a_n) \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ជំពូក 2

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត



1

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

2

អនុគមន៍លោការីត

នៅក្នុងជំពូកនេះ គេចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបញ្ញត្តិនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់សិក្សាពីបញ្ញត្តិ ក្រាប សមីការ និងវិសមីការលោការីត ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ញត្តិអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងលោការីត សិស្សអាចយកចំណេះដឹងនិងបំណិនទៅដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការប្រាក់ កំណើនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត កំណើនប្រជាជននិងសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ។

1

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

រៀបចំណង

1. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
2. ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

1. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

1.1. និយមន័យនៃអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យកន្សោមស្វ័យគុណដូចខាងក្រោម ៖

ក. $(-3)^x$, 1^x , 0^x

ខ. 3^x ហៅថា អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

គ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1}$ ហៅថា អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

និយមន័យ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជាកន្សោមស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាអថេរ និងមានគោលជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 ។

1.2. និយមន័យនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = (-3)^x$

ខ. $f(x) = 1^x$

គ. $f(x) = 0^x$

ឃ. $f(x) = 3^x$ ទំនាក់ទំនងនេះហៅថា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

ង. $f(x) = 3^{-x+1}$ ទំនាក់ទំនងនេះហៅថា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

និយមន័យ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជាអនុគមន៍ស្វ័យគុណដែលមានអថេរឯករាជ្យជានិទស្សន្ត និងមានគោលជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 ។


1.3. ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$, $g(x) = (1.5)^x$, $h(x) = 1^x$,

$k(x) = (0.5)^x$ ក្នុងតម្រូវតែមួយ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 1.5^x$
-2	0.44
-1	0.66
0	1
1	1.5
2	2.25



តាមក្រាបយើងសង្កេតឃើញថា គ្រប់ក្រាបរបស់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដែលមានរាង $y = a^x$ កាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(0,1)$ ជានិច្ច ។

- បើ $x > 0$ នោះ $(1.5)^x < 2^x$ ។ ដូច្នេះ ក្នុងកាប្រុងទី 1 ក្រាបនៃអនុគមន៍ $g(x) = (1.5)^x$ ស្ថិតនៅក្រោមក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$ ។
- អនុគមន៍ $h(x) = 1^x$ មានក្រាបជាបន្ទាត់ស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងនៅពីលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសចំនួន 1 ឯកតា ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ។
- បើ $x > 0$ នោះ $(0.5)^x < 1$ ។ ដូច្នេះ បើ x យកតម្លៃកើនធំឡើងៗ នោះ $k(x) = (0.5)^x$ មានតម្លៃចុះតូចទៅៗ ហើយខិតទៅរក 0 ។
- បើ $x < 0$ នោះ $(0.5)^x$ មានតម្លៃធំឡើងៗគ្មានកំណត់ ។

ជាទូទៅ

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = a^x$ មានក្រាប

- បើ $a > 1$ ក្រាបនៃ $y = a^x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = a^x$ ជាអនុគមន៍កើន
- បើ $0 < a < 1$ ក្រាបនៃ $y = a^x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = a^x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
- អនុគមន៍ $y = a^x$ វិជ្ជមានជានិច្ច $\forall x \in \mathbb{R}$ បើ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាននិងខុសពី 1
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^x$ កាត់អ័ក្សអរដោនេត្រង់ $(0, 1)$ ជានិច្ច ។

លំហាត់គំរូ


សង់ក្រាប

ក. $y = 4^x$

ខ. $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ ។


ដំណោះស្រាយ ក. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 4^x$
-2	0.06
-1	0.25
0	1
1	4
2	16



ខ. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = (1/4)^x$
-2	16
-1	4
0	1
1	0.25
2	0.06



ប្រតិបត្តិ

សង់ក្រាបអនុគមន៍ ក. $y = 10^x$


ខ. $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

1.4. លក្ខណៈក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^x + 1$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^x + 1$
-2	0.25	1.25
-1	0.50	1.50
0	1	2
1	2	3
2	4	5




តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^x + 1$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួច
រំកិល ចំនួនមួយឯកតាឡើងលើស្របអ័ក្ស (oy) គេបានក្រាប $y = 2^x + 1$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^{x+1}$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^{x+1}$
-2	0.25	0.50
-1	0.50	1
0	1	2
1	2	4
2	4	8




តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^{x+1}$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួច
រំកិល ចំនួនមួយឯកតាទៅខាងឆ្វេងស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = 2^{x+1}$ ។

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^{x-2}$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^{x-2}$
-2	0.25	0.06
-1	0.50	0.12
0	1	0.25
1	2	0.5
2	4	1




តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^{x-2}$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួច
រំកិល ចំនួនពីរឯកតាទៅខាងស្តាំស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = 2^{x-2}$ ។

ឃ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2^x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = -2^x$
-2	0.25	-0.25
-1	0.50	-0.50
0	1	-1
1	2	-2
2	4	-4



តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះចៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -2^x$ ។

ជាទូទៅ

- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^x + q$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (oy) ចំនួន q ឯកតាឡើងលើបើ $q > 0$ ហើយចំនួន q ឯកតាចុះក្រោមបើ $q < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^{(x-p)}$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (ox) ចំនួន p ឯកតាទៅខាងស្តាំបើ $p > 0$ ហើយចំនួន p ឯកតាទៅខាងឆ្វេងបើ $p < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -a^x$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះចៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -a^x$ ។

ប្រតិបត្តិ

សង់ក្រាបអនុគមន៍

ក. $y = 3^x - 3$

ខ. $y = 3^x + 1$

គ. $y = (1.5)^{x-2}$

ឃ. $y = (1.5)^{x+3}$

ង. $y = -5^x$ ។

2. សមីការនិមិត្តសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

2.1. សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យសមភាពដូចខាងក្រោម៖

ក. $(-3)^x = -2187$

ខ. $1^x = 1$

គ. $0^x = 0$

ឃ. $3^x = 2187$ សមភាពដែលមាននិមិត្តសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងមានគោលជាចំនួននិមិត្តសមីការខុស

ពី 1 ហៅថា សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

និយមន័យ សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជាសមីការស្វ័យគុណដែលមាននិមិត្តសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងមានគោលជាចំនួននិមិត្តសមីការខុសពី 1 ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2^{3x+5} = 128$

ខ. $5^{x-3} = \frac{1}{25}$

គ. $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 81^{x+4}$

ឃ. $49^x = 7^{x^2-15}$

ង. $36^{2x} = 216^{x-1}$

ច. $10^{x-1} = 100^{2x-3}$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $2^{3x+5} = 128$, $2^{3x+5} = 2^7$, $3x+5 = 7$ នាំឱ្យ $x = \frac{2}{3}$

ខ. $5^{x-3} = \frac{1}{25}$, $5^{x-3} = 5^{-2}$, $x-3 = -2$ នាំឱ្យ $x = 1$

គ. $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 81^{x+4}$, $9^{-x} = 9^{2(x+4)}$, $-x = 2x+8$ នាំឱ្យ $x = \frac{-8}{3}$

ឃ. $49^x = 7^{x^2-15}$, $7^{2x} = 7^{x^2-15}$, $2x = x^2-15$ នាំឱ្យ $x = 5$, $x = -3$

ង. $36^{2x} = 216^{x-1}$, $6^{2(2x)} = 6^{3(x-1)}$, $(4x) = (3x-3)$ នាំឱ្យ $x = \frac{5}{3}$

ច. $10^{x-1} = 100^{2x-3}$, $10^{x-1} = 10^{2(2x-3)}$, $x-1 = 4x-6$ នាំឱ្យ $x = -3$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. $5^x \cdot 2^{\frac{2x-1}{x+1}} = 50$

ខ. $3^{4x+8} - 4 \cdot 3^{2x+5} + 27 = 0$

គ. $27^x + 12^x = 2 \cdot 8^x$

ឃ. $3^{2x^2-6x+3} + 6^{x^2-3x+1} = 2^{2x^2-6x+3}$ ។

ចម្លើយ

ក. $x = 2$, $x = -1 - \log_5 2$

ខ. $x = -1$, $-\frac{3}{2}$

គ. $x = 0$

ឃ. $x = 1$, 2 ។

2.2. វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $2^x < 2^3$ គេបាន $x < 3$ ជាចម្លើយរបស់វិសមីការព្រោះតម្លៃ $x < 3$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យវិសមីការ ។

ខ. $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^3$ គេបាន $x > 3$ ជាចម្លើយរបស់វិសមីការ ព្រោះតម្លៃ $x > 3$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យ

វិសមីការ ។

ជាទូទៅ

វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលមានទម្រង់ $a^x > a^y$

- បើ $a > 1$ វិសមីការ $a^x > a^y$ សមមូល $x > y$ ហើយវិសមីការ $a^x < a^y$

សមមូល $x < y$ ។

- បើ $0 < a < 1$ វិសមីការ $a^x > a^y$ សមមូល $x < y$ ហើយវិសមីការ $a^x < a^y$

សមមូល $x > y$ ។

លំហាត់គំរូ

ដោះស្រាយសមីការ

ក. $25^{2x} \leq 5\sqrt{5}$

ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \frac{16}{81}$

គ. $5^x > -7$

ឃ. $(0.1)^x > 10$

ង. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$

ច. $2^{9x-x^3} < 1$

ឆ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $25^{2x} \leq 5\sqrt{5}$, $25^{2x} \leq 5\left(5^{\frac{1}{2}}\right)$, $5^{4x} \leq 5^{\frac{3}{2}}$, $x \leq \frac{3}{8}$ ។

ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \frac{16}{81}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \left(\frac{2}{3}\right)^4$, $-3x < 4$, $x > -\frac{4}{3}$ ។

គ. $5^x > -7$, 5^x វិជ្ជមានជានិច្ច, -7 អវិជ្ជមានជានិច្ចដូច្នេះ វិសមីការមានចម្លើយ
ចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}$ ។

ឃ. $(0.1)^x > 10$, $10^{-x} > 10$, $-x > 1$, $x < -1$ ។

ង. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$, $3^{3x} \cdot 3^{1-x} < 3^{-1}$, $3^{2x+1} < 3^{-1}$, $2x+1 < -1$ ឬ $x < -1$ ។

ច. $2^{9x-x^3} < 1$, $2^{9x-x^3} < 2^0$, $9x-x^3 < 0$, $(9-x^2)x < 0$, $-3 < x < 0$ ឬ $x > 3$ ។

ឆ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$, $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}}\right]^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} - 12 > 0$, $(x \neq 0)$

តាង $t = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$, $t > 0$ យើងបាន $t^2 + t - 12 > 0$, $t < -4$, $t > 3$

ដោយ $t > 0$ នោះចម្លើយរបស់វិសមីការគឺ $t > 3$ ឬ $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} > 3 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

ដោយ $\frac{1}{3} < 1$ នោះ $\frac{1}{x} < -1$ ឬ $-1 < x < 0$ ដូច្នេះវិសមីការមានចម្លើយ $-1 < x < 0$ ។

សម្គាល់

- រូបមន្ត $A = P(1+i)^t$ ប្រើបានតែក្នុងករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។
- ករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង គេប្រើ $A = P\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{2t}$ ព្រោះមួយឆ្នាំទូទាត់ការប្រាក់ពីរដង នាំឱ្យ t ឆ្នាំទូទាត់ $2t$ ហើយមួយឆ្នាំទទួលការប្រាក់ i នាំឱ្យមួយឆ្នាំមានទទួលអត្រាការប្រាក់ $\frac{i}{2}$ ។
- ករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយត្រីមាសម្តង គេប្រើ $A = P\left(1 + \frac{i}{4}\right)^{4t}$ ព្រោះមួយឆ្នាំទូទាត់ការប្រាក់បួនដង នាំឱ្យ t ឆ្នាំទូទាត់ $4t$ ហើយមួយឆ្នាំទទួលការប្រាក់ i នាំឱ្យមួយត្រីមាស ទទួលការប្រាក់ $\frac{i}{4}$ ។

ជាទូទៅ	បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ គេបានរូបមន្ត $A = P\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$ ។
--------	--

លំហាត់គំរូ 1 នៅឆ្នាំ 1987 អ្នកវិនិយោគទុនម្នាក់បានទិញដីមួយកន្លែងថ្លៃ 84 000 ដុល្លារ ហើយនៅឆ្នាំ 2007 គាត់បានលក់ដីនោះទិញដោយទទួលបានតម្លៃ 49 លានដុល្លារ ។ តើក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកវិនិយោគទុននោះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចំណេញចំនួនប៉ុន្មានបើប្រាក់របស់គាត់កើនពី 84 000 ដុល្លារដល់ 49 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំ ។

ដំណោះស្រាយ តាង i ជាអត្រាការប្រាក់ចំណេញ

$$84\,000(1+i)^{20} = 49\,000\,000 \quad \text{ឬ} \quad (1+i)^{20} = \frac{49\,000\,000}{84\,000}$$

$$(1+i)^{20} = \frac{49\,000}{84} \quad (\text{លើកបូសទី } 20)$$

$$\text{គេបាន} \quad 1+i = 1.375 \quad \text{ឬ} \quad i = 0.375$$

ដូច្នេះ ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកវិនិយោគទុនទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចំណេញ 37.5 % ។

លំហាត់គំរូ 2 នៅឆ្នាំ 1996 មានសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន 3 405 នាក់ ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើង 30 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ក. សរសេរសមីការដែលបង្ហាញចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996 ។

ខ. តើនៅឆ្នាំ 2006 មានសិស្សប៉ុន្មាននាក់បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ។

ដំណោះស្រាយ ក. សមីការសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ 1996

ប្រើរូបមន្ត $y = C(1+r)^t$ ដែល $C = 3\,405$ ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់

$r = 30\% = 0.30$ អត្រាសិស្សប្រឡងជាប់

t ឆ្នាំដែលសិស្សប្រឡងជាប់

y ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996

ខ. ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 2006

តាមសមីការខាងលើ $y = 3\,405(1.30)^t$ ដែល $t = 2006 - 1996 = 10$

គេបាន $y = 3\,405(1.30)^{10}$ ឬ 46 941 ។

ដូច្នេះ ចំនួនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 2006 គឺ 46 941 នាក់ ។

លំហាត់គំរូ 3

កសិករម្នាក់ទិញត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងសម្រាប់ភ្ជួរស្រែក្នុងតម្លៃ 50 000 ដុល្លារ ។

ត្រាក់ទ័រនោះចុះថ្លៃ 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃត្រាក់ទ័រក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ ។

ដំណោះស្រាយ

ប្រើរូបមន្ត $y = C(1+r)^t$ ដែល $C = 50\,000$ ជាតម្លៃទិញ

$r = 10\% = 0.10$ ជាអត្រាចុះថ្លៃ

$t = 7$ ជាចំនួនឆ្នាំ

y ជាតម្លៃលក់នៅឆ្នាំក្រោយពីចុះថ្លៃ

គេបាន $y = 50\,000(1-0.10)^7 = 23\,914.85$ ។

ដូច្នេះ ក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ តម្លៃត្រាក់ទ័រនៅសល់ត្រឹមតែ 23 914.85 \$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. ពូស៊ុយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅធ្វើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយទទួលបានប្រាក់សរុបចំនួន 1 000 ដុល្លារ ។ តើពូស៊ុយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន?

ខ. មនុស្សម្នាក់មានអាយុ 20 ឆ្នាំ បានយកប្រាក់ 1 000 ដុល្លារ ទៅធ្វើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 60 ឆ្នាំ?

គ. មនុស្សម្នាក់បានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងម៉ាកតូយ៉ូតាកាម៉ារី ក្នុងតម្លៃ 3 900 ដុល្លារ ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 14% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំក្រោយ ។



លំហាត់

1. គណនាតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt{16}$

ខ. $\sqrt{225}$

គ. $\sqrt{144}$

ឃ. $\sqrt[3]{0.008(y-2)^3}$

ង. $\sqrt{(-6x)^2}$

ច. $\sqrt[3]{27}$

ឆ. $-\sqrt[3]{64}$

ជ. $\sqrt[3]{-64x^3}$ ។

2. សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $x = \sqrt[4]{10}$

ខ. $\sqrt[8]{56} = k$

គ. $a = \sqrt[28]{500h}$

ឃ. $b = \sqrt[x]{y}$ ។

3. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt[4]{625}$

ខ. $\sqrt[5]{-1}$

គ. $-\sqrt[5]{-32}$

ឃ. $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$

ង. $\sqrt[6]{x^6}$

ច. $\sqrt[4]{(7b)^4}$

ឆ. $\sqrt[7]{y^7}$

ជ. $\sqrt[5]{(x-2)^5}$ ។

4. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \sqrt{x}$

ខ. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

គ. $f(x) = \sqrt{2x+8}$

ឃ. $f(x) = \sqrt{4-3x}$

ង. $f(x) = \sqrt{-3x^2}$

ច. $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

ឆ. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2x^2-3x-5}$

ជ. $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-x-2}$

ឈ. $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x+|x|}$ ។

5. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \sqrt{x}$

ខ. $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{5}$

គ. $\sqrt[4]{8} \times \sqrt[4]{9} \times \sqrt[4]{72}$

ឃ. $\sqrt{3a} \times \sqrt{10b}$

ង. $\sqrt{x-a} \times \sqrt{x+a}$

ច. $\sqrt{\frac{6}{x}} \times \sqrt{\frac{y}{5}}$ ។

6. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\frac{2}{3}\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{16} + \frac{1}{4}\sqrt{72}$

ខ. $x^3\sqrt{2y} - \sqrt[3]{16x^3y} + \frac{x}{3}\sqrt[3]{54y}$ ។

7. ប្រៀបធៀបកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $5\sqrt[3]{2}$ និង $2\sqrt[3]{31}$

ខ. $\sqrt[3]{2}$ និង $\sqrt[12]{45}$

គ. $\sqrt[6]{5}$ និង $\sqrt[8]{8}$ ។

8. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\frac{\sqrt[3]{c^3 + 3c^2d + 3cd^2 + d^3}}{\sqrt{c^2 - d^2} \times \sqrt{c^2 - d^2}}$

ខ. $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - \sqrt{x+1}}$

គ. $\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{3q^2 + 4pq + p^2}} \times \frac{\sqrt{p+3q}}{\sqrt{p^2 + 6pq + 8q^2}} \div \frac{1}{\sqrt{p^2 + 3pq + 2q^2}}$ ។

9. សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់វ៉ាឌីកាល់

ក. $8^{\frac{1}{3}}$

ខ. $x^{\frac{1}{4}}$

គ. $y^{\frac{1}{5}}$

ឃ. $(a^5t^3)^{\frac{1}{2}}$

ង. $(x^3y^3)^{\frac{1}{4}}$

ច. $(x^3y^5)^{\frac{1}{4}}$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2^x = 32$

ខ. $(x+1)^{x^2-4x+3} = 1$

គ. $(2 - \sqrt{3})^x + (2 + \sqrt{3})^x = 2$

ឃ. $3^{(2^x)} = 6561$

ង. $81^{(4^x)} = 9$

ច. $3(4^x) + 2(9^x) - 5(6^x) = 0$

ឆ. $3^{(3^x)} = 1$

ជ. $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x + (\sqrt{2-\sqrt{3}})^x = 4$ ។

11. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2^x > 1$

ខ. $3^x \leq 1$

គ. $2^{2x} \leq \frac{1}{16}$

ឃ. $16^x < 8^{x+1}$

ង. $32^{5x+2} \geq 16^{5x}$

ច. $4^{3x-1} > \frac{1}{256}$ ។

12. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $16^x > 0.125$

ខ. $2^x > -8$

គ. $27^x \times 3^{1-x} < \frac{1}{3}$

ឃ. $(0.2)^x \leq 25$

ង. $3^x \leq \sqrt[3]{9}$

ច. $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ ។

13. មីងសយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅធ្វើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយទទួលបានប្រាក់សរុប ចំនួន 300 ដុល្លារ ។ តើមីងសយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន ?

14. មនុស្សម្នាក់មានអាយុ 30 ឆ្នាំបានយកប្រាក់ 50 000 រៀល ទៅធ្វើនៅធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 4 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 65 ឆ្នាំ?

15. មនុស្សម្នាក់បានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 45 000 ដុល្លារ ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 15 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ ។

16. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោមក្នុងតម្រុយតែមួយ :

ក. $f(x) = 2^x$, $g(x) = 5^x$, $h(x) = 10^x$

ខ. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$, $h(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

17. រកតម្លៃ a បើខ្សែកោងនៃ $f(x) = a^x$ កាត់តាមចំណុចនីមួយៗដូចក្រោម ៖

ក. $A(3, 216)$

ខ. $B(5, 32)$

គ. $C(3, 512)$

ឃ. $D(4, 256)$

ង. $E(-2, 64)$

ច. $F\left(-3, \frac{1}{216}\right)$

ឆ. $G(3, 343)$

ជ. $H\left(\frac{1}{3}, 3\right)$ ។

18. បង្ហាញថា បើ $f(x) = a^x$ នោះ $f(x)f(y) = f(x+y)$ ។

19. ក. បើ (x_1, y_1) និង (x_2, y_2) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ នោះចំណុចទាំងពីរ $x_1 + x_2, y_1 y_2$ និង $\left(x_1 - x_2, \frac{y_1}{y_2}\right)$ ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង ។

ខ. បើ (x_1, y_1) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ នោះចំណុចទាំងពីរ $(2x_1, y_1^2)$ និង $\left(-x_1, \frac{1}{y_1}\right)$ ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ ។

20. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍នីមួយៗក្នុងតម្រុយតែមួយជាមួយក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$

i). $y = f(x) - 1$,

ii). $y = f(x - 1)$,

iii). $y = f(x + 1)$,

iv). $y = f(0.5x)$

v). $y = f(2x)$,

vi). $y = f(-x)$ ។

21. បើ $a > 0$ ។ ចូររកតម្លៃ a និង x ដែលធ្វើឱ្យសមភាព និងវិសមភាពខាងក្រោមផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $a^x = 1$

ខ. $a^x > 1$

គ. $0 < a^x < 1$ ។

22. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $f(x) = 2^{|x|}$

ខ. $f(x) = x(2^x)$

គ. $f(x) = x^x$ ។

23. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y = 2^{x-1}$

ខ. $y = 2^{|x-1|}$

គ. $y = 2^x + 2^{-x}$

ឃ. $y = 2^{-x^2}$

ង. $y = 3^{-|x+1|^2}$

ច. $y = 2^{|x^2-8|}$ ។

24. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3^{x^2+4x} = \frac{1}{27}$

ខ. $3^{5x} \cdot 9^{x^2} = 27$

គ. $4^{3x^2+2x+1} = 16$ ។

វត្ថុបំណង

1. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត
2. ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការលោការីត ។


1. ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

ឧទាហរណ៍ :

ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 4^x$, $y = \log_4 x$ និងបន្ទាត់ $y = x$ តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = 4^x$		$y = \log_4 x$	
x	y	x	y
-2	0.06	0.25	-1
-1	0.25	0.50	-0.50
0	1	1	0
1	4	2	0.50
2	16	4	1

x	0	1
$y = x$	0	1




តាមក្រាប យើងសង្កេតឃើញថា

- តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_4 x$ កើន
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_4 x$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច $(1, 0)$ ជានិច្ច
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_4 x$ និង $y = 4^x$ ឆ្លងគ្នាជៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$, $y = \log_{\frac{1}{4}}x$ និងបន្ទាត់ $y = x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$		$y = \log_{\frac{1}{4}}x$	
x	y	x	y
-2	16	0.25	1
-1	4	0.50	0.50
0	1	1	0
1	0.25	2	-0.50
2	0.06	4	-1



តាមក្រាប យើងសង្កេតឃើញថា

- តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_{\frac{1}{4}}x$ ចុះ
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{4}}x$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច $(1, 0)$
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{4}}x$ និង $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ ឆ្លងគ្នាជ្រៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ជាទូទៅ បើ $a > 1$ នោះអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន ។

បើ $0 < a < 1$ នោះអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ ។

ជាសន្និដ្ឋាន អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាប ៖

- បើ $a > 1$ ក្រាបកើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន
- បើ $0 < a < 1$ ក្រាបចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាបកាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(1, 0)$ ជានិច្ច
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានដែនកំណត់ $x > 0$ ជានិច្ច
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ ជាអនុគមន៍ប្រាសគ្នា ហើយមានក្រាបឆ្លងគ្នាជ្រៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

លំហាត់គំរូ


សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_{10} x$

ខ. $y = \log_{\frac{1}{10}} x$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y


$y = \log_{10} x$	
x	y
$\frac{1}{100}$	-2
$\frac{1}{10}$	-1
1	0
10	1
100	2



យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_{10} x$ មានក្រាបកើន ។

ខ. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \log_{\frac{1}{10}} x$	
x	y
$\frac{1}{100}$	2
$\frac{1}{10}$	1
1	0
10	-1
100	-2



យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{10}} x$ មានក្រាបចុះ ។

ប្រតិបត្តិ

សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7 x$

ខ. $y = \log_{\frac{1}{7}} x$ ។

2. លក្ខណៈក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

ឧទាហរណ៍ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = -2 + \log_3 x$


ខ. $y = \log_3(x-2)$

គ. $y = -\log_3 x$ ។

ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$\log_3 x$	$y = -2 + \log_3 x$
$\frac{1}{3}$	-1	-3
1	0	-2
3	1	-1
9	2	0




ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចរំកិលចំនួន 2 ឯកតាចុះក្រោមស្របអ័ក្ស (oy) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = \log_3(x-2)$
$\frac{7}{3}$	-1
3	0
5	1
11	2




ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចរំកិលចំនួន 2 ឯកតា ទៅខាងស្តាំស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$ ។

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = -\log_3 x$	
x	y
$\frac{1}{9}$	2
$\frac{1}{3}$	1
1	0
3	-1
9	-2



ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះរូបសំរាប់វាធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$ ។

- ជាទូទៅ
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x + q$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (oy) ចំនួន q ឯកតាឡើងលើបើ $q > 0$ ហើយចំនួន q ឯកតា ចុះក្រោមបើ $q < 0$ ។
 - ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a(x - p)$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចធ្វើបម្លែងកិលក្រាបស្របអ័ក្ស (ox) ចំនួន p ឯកតាទៅខាងស្តាំបើ $p > 0$ ហើយ p ឯកតាទៅខាងឆ្វេងបើ $p < 0$ ។
 - ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_a x$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -\log_a x$ ។

ប្រតិបត្តិ

សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7(x + 3)$

ខ. $y = \log_7 x + 3$

គ. $y = -\log_7 x$

ឃ. $y = \log_2(x - 1)^2$

ង. $y = 2 - \log_2 x^2$ ។

3. រូបមន្តប្តូរគោល

ទ្រឹស្តីបទខាងក្រោម អាចឱ្យអ្នកសិក្សាអនុគមន៍លោការីត ប្រើសម្រាប់ប្តូរគោលនៃលោការីតទៅជាគោលដែលគេអាចគណនាបាន ។

បើ a , b និង x ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ហើយ $a \neq 1$, $b \neq 1$ គេបាន $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

$$\text{តាង } M = \log_a x$$

$$\text{គេបាន } a^M = x$$

$$\log_b a^M = \log_b x$$

$$M \log_b a = \log_b x$$

$$\text{នាំឱ្យ } M = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\text{យើងទាញបាន } \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ

គណនា

$$\text{ក. } \log_9 27$$

$$\text{ខ. } \log_{27} \frac{1}{3}$$

$$\text{គ. } \log_7 27$$

$$\text{ឃ. } \log_5 125 \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ក. } \log_9 27 = \frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{\log_3 3^3}{\log_3 3^2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{ខ. } \log_{27} \frac{1}{3} = \log_{3^3} 3^{-1} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{គ. } \log_7 27 = \frac{\log_{10} 27}{\log_{10} 7} \approx 1.6937$$

$$\text{ឃ. } \log_5 125 = \log_5 5^3 = 3 \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

$$\text{គណនា ក. } \log_5 625$$

$$\text{ខ. } \log_5 346$$

$$\text{គ. } \log_6 4870 \text{ ។}$$

ចម្លើយ

$$\text{ក. } 4$$

$$\text{ខ. } 3.63$$

$$\text{គ. } 4.73 \text{ ។}$$

4. សមីការនិមិត្តសមីការលោការីត

4.1. សមីការលោការីត

ឧទាហរណ៍ 1: បើ $\log_4 x = \log_4 7$ លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$

នោះ $x = 7$ ។

ឧទាហរណ៍ 2: ដោះស្រាយសមីការ $\log_4 x = \frac{5}{2}$ លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$

$$\log_4 x = \frac{5}{2}, \log_4 x = \log_4 4^{\frac{5}{2}} \text{ ប្រើរូបមន្ត } \log_a a = 1$$

$$x = 4^{\frac{5}{2}} = (2^2)^{\frac{5}{2}} \text{ ព្រោះ } 4 = 2^2 \text{ នាំឱ្យ } x = 2^5 \text{ ឬ } x = 32 \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 3: ដោះស្រាយសមីការ $6(\log_x 8 + \log_8 x) = 13$

លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$ និង $x \neq 1$ ។

$$6\left(\frac{1}{\log_8 x} + \log_8 x\right) = 13 \quad \text{ប្រើរូបមន្តប្តូរគោល} \quad \log_x 8 = \frac{1}{\log_8 x}$$

$$6 + 6(\log_8 x)^2 = 13\log_8 x \quad \text{គេបាន}$$

$$6(\log_8 x)^2 - 13\log_8 x + 6 = 0$$

$$(3\log_8 x - 2)(2\log_8 x - 3) = 0$$

$$\log_8 x = \frac{2}{3}, \quad \log_8 x = \frac{3}{2}$$

$$x = 8^{\frac{2}{3}}, \quad x = 8^{\frac{3}{2}} \Rightarrow x = 4, \quad x = 16\sqrt{2} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 4: ដោះស្រាយសមីការ $\log_9 x + \log_x 9 = \frac{5}{2}$

លក្ខខណ្ឌ : សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$ និង $x \neq 1$ ។

$$\log_9 x + \frac{1}{\log_9 x} = \frac{5}{2}$$

$$(\log_9 x)^2 + 1 = \frac{5}{2}\log_9 x$$

$$2(\log_9 x)^2 - 5\log_9 x + 2 = 0$$

$$(2\log_9 x - 1)(\log_9 x - 2) = 0 \quad \text{សមមូល}$$

$$\log_9 x = \frac{1}{2}, \quad \log_9 x = 2 \quad \text{បើ}$$

$$\log_9 x = \frac{1}{2} \quad \text{ឬ} \quad x = 9^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = 3$$

$$\log_9 x = 2 \quad \text{ឬ} \quad x = 9^2 \Rightarrow x = 81 \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\log_9 x = \frac{3}{2}$

ខ. $\log_{\frac{1}{10}} x = -3$

គ. $\log_x 9 = 2$ ។

ចម្លើយ

ក. $x = 27$

ខ. $x = 1000$

គ. $x = 3$ ។

4.2. វិសមីការលោការីត

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $\log_3 x > \log_3 7$ នោះ $x > 7$ ព្រោះគោល 3 ធំជាង 1

ខ. $\log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{2}} 7$ នោះ $0 < x < 7$ ព្រោះគោល $\frac{1}{2}$ តូចជាង 1 ។

ជាទូទៅ

- បើ $a > 1$ នោះវិសមីការ $\log_a x > \log_a y$ សមមូល $x > y$ និង $y > 0$
- បើ $0 < a < 1$ នោះវិសមីការ $\log_a x > \log_a y$ សមមូល $x < y$ និង $x > 0$ ។

លំហាត់គំរូ

ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\log_3(3x - 5) > \log_3(x + 7)$

ខ. $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 1) \leq 2$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $\log_3(3x - 5) > \log_3(x + 7)$

$3x - 5 > x + 7$ លក្ខណៈនៃវិសមីការរបស់អនុគមន៍លោការីត

$2x > 12$ លក្ខណៈបូកបន្ថែម ឬដកលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការ

$x > 6$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\log_3(3x - 5)$ មានន័យបើ $3x - 5 > 0$ ឬ $x > \frac{5}{3}$

$\log_3(x + 7)$ មានន័យបើ $x + 7 > 0$ ឬ $x > -7$

ដូច្នេះវិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x > 6$ ឬ $x \in (6, +\infty)$ ។

ខ. $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 1) \leq 2$

$\log_{\frac{1}{2}}(2x - 1) \leq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2$ ឬ $2 = \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2$ តាមលក្ខណៈលោការីតនៃគោល

$2x - 1 \geq \frac{1}{4}$ ប្តូរទិសដៅព្រោះគោលស្មើនឹង $\frac{1}{2} < 1$

$x \geq \frac{5}{8}$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 1)$ មានន័យបើ $2x - 1 > 0$ ឬ $x > \frac{1}{2}$

ដូច្នេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \geq \frac{5}{8}$ ឬ $x \in \left(\frac{5}{8}, +\infty\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $\log_5(x^2 - 6) > \log_5 x$

ខ. $\log_{\frac{1}{3}} x < 0$

គ. $\log_x 27 \geq 3$ ។

ចម្លើយ

ក. $x \in (3, +\infty)$

ខ. $x > 1$

គ. $x \in (0, 1) \cup (1, 3]$ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃ x ជាអនុគមន៍នៃលោការីតនេព័

ក. $e^{x-2} = 12$

ខ. $4e^{2x} + 2 = 18$ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $e^{x-2} = 12$ គេបាន $x-2 = \ln 12$

ដូច្នេះ $x = \ln 12 + 2$ ។

ខ. $4e^{2x} + 2 = 18$ គេបាន $4e^{2x} = 16$ ឬ $e^{2x} = 4$

ដូច្នេះ $2x = \ln 4$ ឬ $x = \frac{\ln 4}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការ

ក. $e^{5x+2} = 23$

ខ. $e^x(2e^x - 1) = 10$ ។

ចម្លើយ


ក. $x = 0.227$

ខ. $x = 0.916$ ។

5.3. ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីតគោល 10 និងលោការីតនេព័



$y = \log_{10} x \Leftrightarrow 10^y = x$

$\log_{10} x = \log x$



$y = \log_e x \Leftrightarrow 10^e = x$

$\log_e x = \ln x$



ជាទូទៅ តាមក្រាប អនុគមន៍លោការីតដែលមានគោលកាន់តែធំ (ចំពោះគោល $a > 1$) នោះអនុគមន៍មានកំណើនកាន់តែយឺត ។

6. ការអនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត

6.1. តម្លៃកើនតាមឆ្នាំ

ឧទាហរណ៍ : មនុស្សម្នាក់បានយកប្រាក់ចំនួន 2 925 000 រៀល ទៅធ្វើនៅធនាគារដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់ការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបធ្វើឱ្យប្រាក់របស់គាត់កើនដល់ 3 705 000 រៀល?

$$\text{តាមរូបមន្ត } A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

$$P = 2\,925\,000 \text{ រៀល}, r = \frac{10}{100} = 0.10, A = 3\,705\,000 \text{ រៀល} \text{ ហើយ } n = 2 \text{ គេបាន}$$

$$3\,705\,000 = 2\,925\,000\left(1 + \frac{0.10}{2}\right)^{2t} \text{ ឬ } \frac{3\,705\,000}{2\,925\,000} = 1.05^{2t}$$

$$1266.67 = 1.05^{2t} \text{ ឬ } \log 1266.67 = \log 1.05^{2t}$$

$$\log 1266.67 = 2t \log 1.05 \text{ នាំឱ្យ } t = \frac{\log 1266.67}{2 \log 1.05} \approx 2.42$$

ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យប្រាក់របស់គាត់កើនដល់ 3 705 000 រៀល គាត់ត្រូវប្រើពេលអស់ប្រហែល 2.42 ឆ្នាំ ។

6.2. តម្លៃថយតាមឆ្នាំ

ឧទាហរណ៍ : បើយើងសង្កេតលើរបស់មួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃ យើងឃើញថាមានរបស់ខ្លះឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចជា ដី ផ្ទះ ជាដើម ។ ល ។ ទន្ទឹមនឹងរបស់ដែលកើនតម្លៃរហូត ដូច្នេះ ក៏មានរបស់ខ្លះចុះថ្លៃរហូតដែរ ដូចជា រថយន្ត ម៉ូតូ ។ ល ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងតម្លៃ 20 000 ដុល្លារ ហើយតម្លៃរថយន្តនេះនឹងចុះថ្លៃ 15 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នោះតារាងតម្លៃរថយន្តចំនួន 4 ឆ្នាំក្រោយ បង្ហាញដូចតារាងខាងក្រោម ៖

ចំនួនឆ្នាំទិញរថយន្ត	តម្លៃរថយន្តជាដុល្លារ
0	20 000
1	$20\,000 - 20\,000 \times 15\% = 17\,000$
2	$17\,000 - 17\,000 \times 15\% = 14\,450$
3	$14\,450 - 14\,450 \times 15\% = 12\,282.5$
4	$12\,282.5 - 12\,282.5 \times 15\% = 10\,440.13$

យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃរថយន្តមានការថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទៅតាមអត្រាភាគរយ
កំណត់របស់វា ។

លំហាត់គំរូ មនុស្សម្នាក់បានដឹកតែទឹកកកក្រូចឆ្មារមួយកែវ ដែលមានសារជាតិស្ករចំណុះ
130 មីលីក្រាម ។ បើស្កររលាយចូលក្នុងសារពាងកាយក្នុងអត្រា 11 % ក្នុងមួយ
ម៉ោង ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ទើបសារជាតិស្កររលាយចូលក្នុងរាងកាយអស់
ពាក់កណ្តាលនៃបរិមាណស្ករដែលមាន?

ដំណោះស្រាយ ប្រើរូបមន្ត $y = a(1-r)^t$
ដោយ $y = \frac{130}{2} = 65$, $r = \frac{11}{100} = 0.11$, $a = 130$ គេបាន

$$65 = 130(1 - 0.11)^t$$

$$0.89^t = 0.5 \text{ ឬ } \log 0.89^t = \log 0.5 \Leftrightarrow t \log 0.89 = \log 0.5$$

$$t = \frac{\log 0.5}{\log 0.89} \text{ ឬ } t \approx 5.9480 \text{ ។}$$

ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យស្ករជ្រាបចូលក្នុងរាងកាយអស់ពាក់កណ្តាល គេត្រូវប្រើពេល
ប្រហែល 6 ម៉ោង ។

ប្រតិបត្តិ

- ក. ពូសៅបានយកប្រាក់ចំនួន 2 000 000 រទៅធ្វើនៅធនាគារដោយទទួលបាន
អត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបប្រាក់របស់គាត់
កើនឡើងពីរដង?
- ខ. គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយបានទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងថ្លៃ 3 000 ដុល្លារ ។
បើគេគិតប្រាក់រំលស់ 20 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចូររកតម្លៃកុំព្យូទ័រក្នុងរយៈពេល
3 ឆ្នាំក្រោយ ។
- គ. តាមការស្រង់ស្ថិតិនាឆ្នាំ 2000 ប្រទេសចិនមានប្រជាជន 1.26 ពាន់លាននាក់
ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ ប្រទេសដែលមាន
ចំនួនប្រជាជនច្រើនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន គឺប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានចំនួន
1.01 ពាន់លាននាក់ ។ ចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិន អាច
គណនាតាមសមីការ $I(t) = 1.01e^{0.015t}$ និង $C(t) = 1.26e^{0.009t}$ (គេកំណត់
 $c = 2.7183$) តាមសមីការគំរូទាំងពីរ តើនៅឆ្នាំណាដែលប្រទេសឥណ្ឌាកើន
ចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិន?

1. រកសមីការនៃអនុគមន៍ប្រាសរបស់អនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = 4x - 3$ ខ. $y = 3x^2 + 1$ គ. $x^2 - 3y^2 = 3$ ឃ. $xy = -6$
 ង. $xy^2 = 1$ ច. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ឆ. $y = \frac{5}{x}$ ជ. $y = \sqrt{x-2}$ ។

2. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x - 2$ ។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ប្រាស $f^{-1}(x)$ រួចសង់ក្រាបរបស់វា ។

3. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = \log_5 x$ ខ. $y = \log_7 x$ គ. $y = \log_{10} x$
 ឃ. $y = \log_{1.5} x$ ង. $y = \log_{0.5} x$ ច. $y = \log_{0.3} x$ ។

4. បំប្លែងជាទម្រង់លោការីត

ក. $10^4 = 10000$ ខ. $8^{\frac{1}{3}} = 2$ គ. $16^{\frac{1}{4}} = 2$ ឃ. $5^{-2} = \frac{1}{25}$
 ង. $4^{-3} = \frac{1}{64}$ ច. $10^{0.3010} = 2$ ឆ. $x^{-a} = y$ ជ. $A = k^c$ ។

5. សម្រួល

ក. $3^{\log_3 2}$ ខ. $5^{\log_5 10}$ គ. $\log_a a^{10}$ ឃ. $\log_q q^a$
 ង. $\log_4 64$ ច. $\log_{10} 0.1$ ឆ. $\log_{\sqrt{2}} 16$ ជ. $\log_{10} 1$ ។

6. ដោះស្រាយសមីការលោការីត

ក. $\log_3 x = 3$ ខ. $\log_x 16 = 2$ គ. $\log x + \log(x+9) = 1$ ឃ. $\log_2 x = -1$
 ង. $\log_9 x = \frac{1}{2}$ ច. $\log_8 x = \frac{1}{3}$ ឆ. $\log^3 \sqrt{x} = \sqrt{\log x}$ ជ. $\log_5 \sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{1}$
 ឃ. $\log_4(x+3) + \log_4(x-3) = 2$ ញ. $\log^3 \sqrt{x^2} + \log^3 \sqrt{x^4} = \log 2^{-3}$ ។

7. ដោះស្រាយវិសមីការលោការីត

ក. $\log_2 2x \leq \log_4(x+3)$ ខ. $\log_3(3x-5) \geq \log_3(x+7)$ គ. $\log \frac{x^2-x}{x^2-1} < 0$
 ឃ. $\log_{0.5} x^2 < \log_{0.5} 3x$ ង. $\log_5 12 < \log_5(5x-3)$ ច. $\log(x^2 - 2x + 3) \geq 0$
 ឆ. $\log_8(3x-1) < \log_8(x+5)$ ។

8. ពូសេងយកប្រាក់ 4 000 000 រទៅធ្វើវិនិយោគទុន ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ ទើបប្រាក់របស់គាត់កើនឡើងពីរដង?

9. មីងសុខាបានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងថ្លៃ 38 500 ដុល្លារ ។ បើរថយន្តចុះថ្លៃក្នុងអត្រា 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ រថយន្តគាត់នៅសល់ថ្លៃប៉ុន្មាន?

10. សរសេរអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = 10^x$

ខ. $g(x) = 3^x$

គ. $h(x) = 7^x$

ឃ. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

ង. $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$

ច. $h(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

11. សរសេរអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \log x$

ខ. $g(x) = \log_3 x$

គ. $h(x) = \log_5 x$

ឃ. $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

ង. $g(x) = \log_{\frac{5}{4}} x$

ច. $h(x) = \log_{21} x$ ។

12. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណេន្យល $f(x) = 5^x$

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រាសរបស់អនុគមន៍ $f(x) = 5^x$ ក្នុងតម្រុយតែមួយ

គ. សរសេរសមីការអនុគមន៍ប្រាសរបស់អនុគមន៍ខាងលើ ។

13. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x) = \log_6 x$

ខ. $g(x) = \log_{\frac{1}{6}} x$

គ. $h(x) = \log_{0.8} x$ ។

14. បង្ហាញថា បើ $f(x) = \log_a x$ នោះ $f(xy) = f(x) + f(y)$ ។

15. ក. បង្ហាញថា បើ (x_1, y_1) និង (x_2, y_2) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$
នោះចំណុច $\left(\frac{x_1}{x_2}, y_1 - y_2\right)$ ក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ ។

ខ. បង្ហាញថា បើ (x_1, y_1) ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ នោះចំណុច $(x_1^2, 2y_1)$
និងចំណុច $\left(\frac{1}{x_1}, -y_1\right)$ ក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ ។

16. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = a^x$ និងអនុគមន៍ $f^{-1}(x) = \log_a x$ ដែល $a > 0$ ។ រកតម្លៃ a
ដើម្បីឱ្យខ្សែកោងនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និង $f^{-1}(x)$ កាត់គ្នា ។

17. គេឱ្យ $f(x) = x - \log_2 x$ ហើយ $g(x) = 2^x$ ។

គណនា ក. $f(g(x))$

ខ. $g(f(x))$ ។

18. ដោះស្រាយសមីការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\log_2(2x + 4) - \log_2(x - 1) = 3$

ខ. $\log_2 x + \log_4 x = 5$

គ. $\log_5 x + \log_{10} x = 5$

ឃ. $\log(x + 10) + \frac{1}{2} \log x^2 = 2 - \log 4$ ។

19. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $\forall x$ ។

20. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $\log_{\frac{1}{a+1}}(x^2 + 2) \geq 1$ មានសំណុំរួមសំបូរចំពោះ $\forall x$ ។

- 86

មេរៀនសង្ខេប

1. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

- ស្វ័យគុណ បើ $\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n \text{ កត្តា} = a^n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន គេបាន

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, (ab)^a = a^n b^n, \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (b \neq 0), a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \frac{1}{a^n} = a^{-n} \text{ ដែល } (a \neq 0), n \in \mathbb{N} \text{ ។}$$

- ឫសទី n

បើ a ជាចំនួនពិត $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ បើ n ជាចំនួនគត់គូ $\sqrt[n]{a^n} = a$ បើ n ជាចំនួនគត់សេស ។

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{ab}, \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad b \neq 0, \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}, \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}, \sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ ។}$$

បើ $a > 0, a \neq 1$ $a^x = a^y$ សមមូល $x = y$ ។

- អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល កំណត់ដោយ $f(x) = a^x, x \in \mathbb{R}, a > 0$ និង $a \neq 1$ ។

- បើ P ប្រាក់ដើម i អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ n ជាចំនួនឆ្នាំចំនួនប្រាក់សរុបគឺ

$$A = P(1+i)^n \text{ ។}$$

2. អនុគមន៍លោការីត

- បើ (a, b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(x)$ ហើយ (b, a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

- បើអនុគមន៍ពីរប្រាសគ្នា នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរឆ្លងគ្នាជ្រុំបន្ទាត់ $y = x$ ។

- បើ $a^x = y$ នោះ $x = \log_a y, y > 0, a > 0, a \neq 1$ ហើយ $f(x) = a^x$ មាន

$$\text{អនុគមន៍ប្រាស } f^{-1}(x) = \log_a x \text{ ។}$$

- លក្ខណៈលោការីត

ចំពោះគ្រប់ $x > 0, y > 0, a > 0, a \neq 1$ និង $b > 0, b \neq 1$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \quad (x, y > 0), \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^n = n \log_a x, \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \log_a a = 1, \log_a 1 = 0, \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_a a^x = x, a^{\log_a x} = x \text{ ។}$$

លំហាត់ជំពូក 2

1. ដោះស្រាយសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $3^{x^2} = 81^{x-1}$

ខ. $9^{(2x-1)^2} = 3^{x+3}$

គ. $2(3)^{2x+3} = 3 - 7(3^x)$

ឃ. $2^{2x+3} - 2^x = 1 - 2^{x+3}$ ។

2. បើ $a^x = b^y = (ab)^z$ ។ បង្ហាញថា $xy = z(x+y)$ ។

3. បើ $2^x = 3^y = 12^z$ ។ បង្ហាញថា $xy = z(x+2y)$ ។

4. បើ $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ និង $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ។ បង្ហាញថា $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} = 1$ ។

5. បើ $a^2 + b^2 = 11ab$ ។ បង្ហាញថា $\log a + \log b = 2\log\left(\frac{a-b}{3}\right)$ ។

6. បើ $\log_x M = a$ និង $\log_y M = b$ ។ បង្ហាញថា $\log_{xy} M = \frac{ab}{a+b}$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការលោការីត

ក. $2 + \log_{10}(2x-3) = \log_{10}x^2 + \log_{10}25$

ខ. $6(\log_x 8 + \log_8 x) = 13$

គ. $\log_x 9 + \log_9 x = \frac{5}{2}$

ឃ. $\log_9 x + \log_{x^2} 9 = 1$ ។

8. ដោះស្រាយវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $25^x \geq 125^{3x-2}$

ខ. $3^x > 27$

គ. $4^x - 6(2^x) + 8 > 0$

ឃ. $15^x \geq \frac{1}{\sqrt[4]{15^3}}$

ង. $\left(\frac{1}{5}\right)^x < \sqrt[3]{0.04}$

ច. $(0.3)^x \leq \frac{100}{9}$ ។

9. ដោះស្រាយវិសមីការលោការីត

ក. $\log_{3x-2} x \leq 1$

ខ. $\log_x^2 x - \log_2 x - 15 < 0$

គ. $\log_4 (3^x - 1) \cdot \log_{\frac{1}{4}} \frac{3^x - 1}{16} = \frac{3}{4}$

ឃ. $x \cdot \log_{0.1}(x^2 + x + 1) \geq 0$

ង. $\log_{\frac{x}{5}}(x^2 - 8x + 16) \leq 0$

ច. $\log_{x-\frac{9}{2}} \frac{x+4}{2x-6} \leq \log_{x-\frac{9}{2}}(x-5)$ ។

10. មនុស្សម្នាក់បានយកប្រាក់ទៅធ្វើនៅធនាគារអេស៊ីលីជាចំនួន 1 000 \$ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើគាត់វិនិយោគប្រាក់នេះតាំងពីឆ្នាំ 1996 មក តើបច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំ 2007 គាត់មានប្រាក់សរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាននៅធនាគារ?

11. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = a^x$ និងអនុគមន៍ប្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ដែល a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាននិង $a \neq 1$ ។

ក. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និង $f^{-1}(x)$ កាត់គ្នា ។

ខ. រកគ្រប់ចំណុចដែលក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរកាត់គ្នា(ក្នុងសំណួរ ក) ។

ជំពូក 3

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ



1

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

2

រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

3

អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

4

សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

5

សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រផ្សេងទៀត

នៅថ្នាក់ទី 10 យើងបានសិក្សាចមកហើយពីអនុគមន៍ពហុធា ដូចជា $y = au$, $y = au^2$, $y = au^3 \dots$ ដែលអនុវត្តក្នុងចលនាស្មើឬទន្លាក់សេរី ។

នៅថ្នាក់ទី 11 នេះ យើងនឹងសិក្សាពីចលនាមួយទៀត ដូចចលនារំយោលនៃប៉ោលនាឡិកា មួយជាចលនាខួប ។ ចលនានេះគេសិក្សានៅក្នុងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជាអនុគមន៍ខួប ដូចជា អនុគមន៍ស៊ីនុស អនុគមន៍កូស៊ីនុស និងអនុគមន៍តង់សង់ ។

រូបបំណង

1. បំប្លែងមុំពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់និងពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ
2. ប្រើលក្ខណៈមុំផ្គុំក្នុងការគណនាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
3. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ។


1. រង្វាស់មុំ

1.1. ការកំណត់មុំមានទិសដៅ

ឧទាហរណ៍ 1 : ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេប្រើវ៉ិចទ័រ $\vec{OP}_0$ និង $\vec{OP}$ មកកំណត់មុំ ។

$\vec{OP}_0$ ជាវ៉ិចទ័រនឹងបិតនៅផ្នែកវិជ្ជមាននៃអ័ក្ស $\vec{Ox}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រ





គល់ ។ $\vec{OP}$ ជាវ៉ិចទ័រចល័តជុំវិញគល់ O ហៅថា វ៉ិចទ័រចុង ។




វ៉ិចទ័រ $\vec{OP}_0$ និង $\vec{OP}$ បង្កើតបានមុំតាមករណីដូចខាងក្រោម ៖

- ក្នុងករណីវ៉ិចទ័រ $\vec{OP}$ វិលច្រាសនឹងទិសដៅនៃទ្រនិចនាឡិកា មុំដែលបង្កើតបានជាមុំវិជ្ជមាន ។ មុំ $(\vec{OP}_0, \vec{OP}) = 30^\circ$ (រូប ក) ។
- ក្នុងករណីវ៉ិចទ័រ $\vec{OP}$ វិលស្របនឹងទិសដៅនៃទ្រនិចនាឡិកា មុំដែលបង្កើតបានជាមុំអវិជ្ជមាន ។ មុំ $(\vec{OP}_0, \vec{OP}) = -30^\circ$ (រូប ខ) ។

ឧទាហរណ៍ 2 : តាមទិសដៅវិជ្ជមានបើ $\vec{OP}$ វិលបានមួយជុំពេញនៃរង្វង់នោះ គេនឹងបានមុំ 360° ហើយរង្វាស់មុំនឹងកើនជា 2 ដង ជា 3 ដង ទៅតាមចំនួនជុំនៃការវិលនេះ ។



បើ α ជាមុំកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ នោះ $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ក៏
កំណត់មុំដែលមានរង្វាស់ផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម៖



$$\begin{aligned} \alpha + 360^\circ & \quad \alpha - 360^\circ \\ \alpha + 2 \times 360^\circ & \quad \alpha - 2 \times 360^\circ \\ \alpha + 3 \times 360^\circ & \quad \alpha - 3 \times 360^\circ \end{aligned}$$

ជាទូទៅ $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ជាវ៉ិចទ័រកំណត់បានមុំ $\alpha + k360^\circ$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

សម្គាល់ មុំ α និង $\alpha + 360^\circ$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា ប៉ុន្តែមានវ៉ិចទ័រគល់និងវ៉ិចទ័រចុងដូចគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលចេញពីទីតាំងដើម $\overrightarrow{OP_0}$ បានមុំ 120° ហើយបន្ទាប់មកវិលបាន
មុំ -155° ទៀត ។ ចូរកំណត់មុំ $(\overrightarrow{OP_0}, \overrightarrow{OP})$ ។

ដំណោះស្រាយ មុំ $(\overrightarrow{OP_0}, \overrightarrow{OP}) = 120^\circ + (-155^\circ) = -35^\circ$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាមុំ $\alpha = 45^\circ + k \times 360^\circ$ ក្នុងករណី $k = 1, k = -1$ ។

ដំណោះស្រាយ ចំពោះ $k = 1$, $\alpha = 45^\circ + 360^\circ = 405^\circ$ ។

ចំពោះ $k = -1$, $\alpha = 45^\circ - 360^\circ = -315^\circ$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 បើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ ផ្ដើមវិលពីទីតាំងដើម $\overrightarrow{OP_0}$ បានមុំ 70° តាមទិសដៅអវិជ្ជមាន
ហើយបន្ទាប់មកវិលបានមុំ 150° តាមទិសដៅវិជ្ជមាន ។ ចូរកំណត់មុំ
 $(\overrightarrow{OP_0}, \overrightarrow{OP})$ ។

ចម្លើយ 80° ។


ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\alpha = -270^\circ + k \times 360^\circ$ ក្នុងករណី $k = 2, k = -3$ ។

ចម្លើយ $\alpha = 450^\circ, -1350^\circ$ ។

1.2. រង្វាស់មុំគិតជាដឺក្រេ

ឧទាហរណ៍ : រង្វង់មួយមានកាំ $r = 5 \text{ cm}$ និង $\angle AOB = 30^\circ$ ។

គណនាប្រវែងធ្នូ AB ។ មុំផ្ចិតគិតជាដឺក្រេពុំមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងប្រវែងធ្នូ
 AB ទេ ។




ដូច្នេះគេបង្កើតខ្នាតរង្វាស់មុំមួយទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងទៅ

ប្រវែងធ្នូ ។

និយមន័យ

1 រ៉ាដ្យង់ គឺជារង្វាស់មុំផ្ចិតដែលស្តាត់ផ្ទុយមានប្រវែង ស្មើនឹងកាំនៃរង្វង់ ហើយគេកំណត់សរសេរ $1rd$ ។



យើងដឹងថាប្រវែងធ្នូ $2\pi r$ ស្មើនឹងបរិមាត្ររង្វង់ស្តាត់ដោយមុំ 360° ឬមុំ $2\pi(rd)$ មានន័យថា $360^\circ = 2\pi(rd)$ ។ យើងបានទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់មុំគិតជាដឺក្រេ និងរ៉ាដ្យង់គឺ

$$1rd = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.017 \text{ ។}$$

គេអាចគណនាប្រវែងធ្នូ AB ដោយគ្រាន់តែប្តូរឯកតាមុំដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ $\alpha = 30^\circ$ ឬ $\alpha = 30 \times \frac{\pi}{180} = 0.52rd$ ប្រវែងធ្នូ $AB = \alpha \cdot r = 0.52 \times 5 = 2.6 \text{ cm}$ ។

ជាទូទៅ

$$1rd = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180}rd \text{ ។}$$

សម្គាល់

រង្វាស់មុំគិតជា រ៉ាដ្យង់អាចសរសេរដោយមិនប្រើ rd បាន ។ ឧ. $\alpha = \frac{\pi}{4}rd$ អាចសរសេរដោយខ្លី $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ

ប្តូរមុំ $30^\circ, 45^\circ, 150^\circ$ ជា រ៉ាដ្យង់ និងប្តូរមុំ $\frac{\pi}{5}, \frac{2}{3}\pi, 3\pi$ ជា ដឺក្រេ ។

ដំណោះស្រាយ

$$\frac{\pi}{180} \times 30 = \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{180} \times 45 = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{180} \times 150 = \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{180^\circ}{\pi} \times \frac{\pi}{5} = 36^\circ, \quad \frac{180^\circ}{\pi} \times \frac{2\pi}{3} = 120^\circ, \quad \frac{180^\circ}{\pi} \times 3\pi = 540^\circ \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

ប្តូរមុំពី រ៉ាដ្យង់ទៅជា ដឺក្រេ $\frac{4\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}, -\frac{7\pi}{2}$ ។

ចម្លើយ


$240^\circ, -240^\circ, 315^\circ, -630^\circ$ ។

2. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

2.1. ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់

យើងបានសិក្សាប្រមូលហើយពីផលធៀបត្រីកោណមាត្រ មុំចន្លោះ 0° និង 180° ក្នុងថ្នាក់ទី 10 ។ ពេលនេះ យើងកំណត់ $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ និង $\cot\theta$ ដែល θ ជាមុំទូទៅ ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និងកាំ r ។ P ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដែលមានកូអរដោនេ $P(x, y)$ ហើយមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP}) = \theta$ ។ P' ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $x'x$ និង Q ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $y'y$ ។



$$\text{គេបាន } \sin\theta = \frac{OQ}{OP} = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{OP'}{OP} = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x}, \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{x}{y} \text{ ។}$$

សម្គាល់ 1. អ័ក្ស $\vec{y'y}$ ហៅថាអ័ក្សស៊ីនុស ហើយអ័ក្ស $\vec{x'x}$ អ័ក្សកូស៊ីនុស ហើយអ័ក្ស $\vec{u'u}$ ជាអ័ក្សតង់សង់ និងអ័ក្ស $\vec{v'v}$ ជាអ័ក្សកូតង់សង់ ។


2. រង្វង់ដែលមានផ្ចិតត្រង់គល់ O មានកាំស្មើ 1 ហៅថារង្វង់ឯកតា ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$ ។

តាមរូបខាងស្តាំ B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងរង្វង់និងអ័ក្ស $\vec{y'y}$ តាមទិសដៅវិជ្ជមាន ។ ដូច្នេះ B ជាចំណុចដែលត្រូវនឹងតម្លៃ $\frac{\pi}{2}$ ។

តាមរូបភាពនេះ គេបាន $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ។

$$\cot \frac{\pi}{2} = \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2}} = \frac{0}{1} = 0, \quad \tan \frac{\pi}{2} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\cos \frac{\pi}{2}} \text{ មិនអាចកំណត់បាន}$$



ព្រោះ $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែង OPQ គេបាន $\widehat{AOP} = \frac{\pi}{6}$ ហើយ $PQ = \frac{1}{2}$

$$\text{ដូច្នេះ } \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\cot \frac{\pi}{6} = \frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} \text{ ។}$$

ជាទូទៅ គេបានតារាងតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រមុំពិសេស ដូចខាងក្រោម ៖

មុំ អនុ.	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
cot		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	

លំហាត់គំរូ

គណនា ក. $2 \sin \frac{\pi}{3} + 4 \cos \frac{\pi}{6} - 3 \tan \frac{\pi}{3} + 4 \cot \frac{\pi}{4}$

ខ. $\frac{5 - 4 \tan^2 45^\circ + \cot^2 60^\circ}{2 \cos^2 60^\circ - 2 \sin^3 90^\circ + 4 \tan 45^\circ}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 3 \times \sqrt{3} + 4 \times 1 = \sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4 = 4$

ខ. $\frac{5 - 4 \times 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}{2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times 1^3 + 4 \times 1} = \frac{1 + \frac{1}{3}}{2 \times \frac{1}{4} - 2 + 4} = \frac{8}{15}$ ។

ប្រតិបត្តិ


គណនា ក. $2 \sin \frac{2\pi}{4} - 3 \tan \frac{2\pi}{6} + 2 \cos \frac{4\pi}{2} + 3 \cot \frac{2\pi}{4}$

ខ. $\sin(-135^\circ) + \sin \frac{4\pi}{3} + \tan\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$ ។

ចម្លើយ

ក. 5 ខ. $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2} - 2}{2}$ ។

2.2. សញ្ញាទៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ



គេបានតារាងសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

អនុ. កាជ្រុង	I	II	III	IV
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-

លំហាត់គំរូ

តើមុំ x នៅក្នុងកាជ្រុងណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ $\begin{cases} \sin x < 0 \\ \cos x < 0 \end{cases}$ ។

ដំណោះស្រាយ

គេបាន $\sin x < 0$ និង $\cos x < 0 \Rightarrow x$ នៅកាជ្រុងទី III ។ ដូច្នេះ x នៅកាជ្រុងទី III ។

ប្រតិបត្តិ 1 តើក្នុងការប្រុងណាដែលគេអាចរកមុំផ្សេងផ្ទាត់វិសមីការ $\begin{cases} \cos x > 0 \\ \tan x > 0 \end{cases}$ ។

ចម្លើយ (I) ។

ប្រតិបត្តិ 2 ក. តើក្នុងការប្រុងណាដែល $\tan x$ និង $\cot x$ មានសញ្ញាដូចគ្នា?

ខ. រកតម្លៃនៃ $\cos \theta$ និង $\tan \theta$ បើ $\sin \theta = \frac{-3}{5}$ ដែល θ នៅក្នុងជំហាន III ។

ចម្លើយ $\cos \theta = \frac{-4}{5}$, $\tan \theta = \frac{3}{4}$ ។

3. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

3.1. ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ

នៅក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ θ ជារង្វាស់មុំ $(\vec{OA}, \vec{OP})$ គេបាន

$\cos \theta = OQ$, $\sin \theta = OR$ ។ ក្នុងត្រីកោណកែង OPQ តាមទ្រឹស្តី

បទពិភាក្សា គេបាន $OP^2 = OQ^2 + PQ^2$

$$1 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \text{ ឬ } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (1)$$

ដែល $-1 \leq \sin \theta \leq 1$, $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ ។

គេដឹងថា $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ចំពោះ $\cos \theta \neq 0$ គេចែកអង្គទាំងពីរនៃទំនាក់ទំនង (1) និង $\cos^2 \theta$

$$\text{គេបាន } \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{ ឬ } \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \text{។}$$

ដូចគ្នាដែរ បើគេចែកទំនាក់ទំនង (1) និង $\sin^2 \theta \neq 0$ គេបាន $1 + \cos^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta}$ ។

$$\text{គេបានរូបមន្ត } \boxed{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ , } 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \text{ , } 1 + \cot^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta}} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គណនា $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$ ដោយស្គាល់ $\sin \theta = \frac{8}{17}$ និងមុំ θ នៅក្នុង

ជំហាន I ។


គេមាន $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ។ ដោយ θ នៅក្នុងជំហាន I នោះ $\cos \theta$ វិជ្ជមាន ។

គេបាន

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2} = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{8}{15}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{15}{8} \quad \text{។}$$



លំហាត់គំរូ គណនា $\frac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{6\cos\alpha - 3\sin\alpha}$ ដោយដឹងថា $\tan\alpha = \frac{4}{15}$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន

$$\frac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{6\cos\alpha - 3\sin\alpha} = \frac{\cos\alpha(5\tan\alpha + 7)}{\cos\alpha(6 - 3\tan\alpha)} = \frac{5 \times \frac{4}{15} + 7}{6 - 3 \times \frac{4}{15}} = \frac{\frac{4}{3} + 7}{6 - \frac{4}{5}} = \frac{125}{78} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ ដោយគេស្គាល់ $\sin\alpha = -\frac{2}{3}$ និង $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ ។

ចម្លើយ $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan\alpha = \frac{-2\sqrt{5}}{5}$, $\cot\alpha = \frac{-\sqrt{5}}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\frac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ និង $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ។


ចម្លើយ $\frac{25}{7}$ ។

3.2. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

ដោយមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ជាមុំកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រ

$\vec{OA}$ និង $\vec{OP}$ ដូចគ្នានោះ គេបានរូបមន្ត

$$\begin{aligned} \sin(\theta + 2k\pi) &= \sin\theta, & \cos(\theta + 2k\pi) &= \cos\theta \\ \tan(\theta + 2k\pi) &= \tan\theta, & \cot(\theta + 2k\pi) &= \cot\theta \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$



សម្គាល់ : $\tan(\theta + k\pi) = \tan\theta$, $\cot(\theta + k\pi) = \cot\theta$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ : $\sin\frac{9}{2}\pi = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 4\pi\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1$,

$$\cos\left(-\frac{17}{3}\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - 6\pi\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ គេដឹងថា $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។ គណនា $\cos\frac{65\pi}{4}$ និង $\sin\left(-\frac{39}{4}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ គេសរសេរ

$$\frac{65\pi}{4} = \frac{64\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 16\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\cos\frac{65\pi}{4} = \cos\left[\frac{\pi}{4} + (8 \times 2\pi)\right] = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{។}$$

$$\text{គេដឹងថា } -\frac{39\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{40\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 10\pi \quad \text{គេបាន}$$

$$\sin\left(-\frac{39\pi}{4}\right) = \sin\left[\frac{\pi}{4} - (5 \times 2\pi)\right] = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ គណនាតម្លៃរបស់ $\sin 6\pi$, $\sin\frac{11\pi}{3}$, $\cos\left(-\frac{23\pi}{6}\right)$, $\tan\left(-\frac{27\pi}{4}\right)$ ។

ចម្លើយ 0 , $\frac{-\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $+1$ ។

3.3. មុំឌុំ

3.3.1. មុំផ្ទុយគ្នា θ និង $-\theta$

មុំពីរផ្ទុយគ្នាកាលណាផលបូករង្វាស់វ៉ាស្ទេនីងស្មើនឹងសូន្យតាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមាន $(\vec{OA}, \vec{OP}) = \theta$ និង

$(\vec{OA}, \vec{OP}') = \theta'$ ហើយ $\theta + \theta' = 0$ តាម 2π ដាំឱ្យ $\theta' = -\theta$ តាម 2π ។

គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P និង P' គឺ $P(\cos\theta, \sin\theta)$ និង $P'(\cos(-\theta), \sin(-\theta))$ ។

ដោយ P និង P' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស គេបាន $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, $\cos(-\theta) = \cos\theta$ ។

ដូច្នេះ

$$\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin\theta}{\cos\theta} = -\tan\theta$$

$$\cot(-\theta) = \frac{\cos(-\theta)}{\sin(-\theta)} = \frac{\cos\theta}{-\sin\theta} = -\cot\theta$$
 ។

គេបានរូបមន្ត

$\begin{aligned} \sin(-\theta) &= -\sin\theta, & \cos(-\theta) &= \cos\theta \\ \tan(-\theta) &= -\tan\theta, & \cot(-\theta) &= -\cot\theta \end{aligned}$

សម្គាល់ : មុំពីរផ្ទុយគ្នាមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា ហើយមានស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ផ្ទុយគ្នា ។ ឧទាហរណ៍ :

$$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = \frac{-\sqrt{3}}{2}, \quad \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \cot\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\cot\frac{\pi}{3} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$$
 ។

3.3.2. មុំបំពេញ $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ និង θ

មុំពីរបំពេញគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់វ៉ាស្ទេនីង $\frac{\pi}{2}$ តាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណ គេមាន $(\vec{OA}, \vec{OP}) = \theta$ និង $(\vec{OA}, \vec{OP}') = \frac{\pi}{2} - \theta$ ។ គេបានកូអរដោនេ



នៃចំណុច P គឺ $(\cos\theta, \sin\theta)$ ។ បើគេយកចំណុច P' ឆ្លុះគ្នានឹងចំណុច P ធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$

នោះគេបាន កូអរដោនេនៃចំណុច P' គឺ $(\cos\theta, \sin\theta)$ (1) ។

តាមរូបខាងស្តាំ OP' ជាជ្រុងមួយនៃមុំ $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ ។ ដូច្នេះ

កូអរដោនេនៃ P' គឺ $\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right]$ (2) ។

តាម (1) និង (2)



គេបាន

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta \text{ និង } \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta \quad \text{។}$$

សម្គាល់

- មុំពីរបំពេញគ្នា មានចុងឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងបន្ទាត់ពុះទី 1 ។ គេបានរូបមន្ត

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos\theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cot\theta, \quad \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan\theta \end{aligned} \quad \text{។}$$

- មុំពីរបំពេញគ្នា មានស៊ីនុសនៃមុំមួយស្មើនឹងកូស៊ីនុសនៃមុំមួយទៀត ហើយតង់សង់នៃមុំមួយស្មើនឹងកូតង់សង់នៃមុំមួយទៀត ។ ឧទាហរណ៍ :

$$\sin 60^\circ = \cos(90^\circ - 60^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan \frac{\pi}{3} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \quad \text{។}$$

3.3.3. មុំបន្ថែម $(\pi - \theta)$ និង θ

មុំពីរបន្ថែមគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់វ៉ាស្ទេនីង π តាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP}) = \theta$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP}') = \pi - \theta$ ។ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P គឺ $(\cos\theta, \sin\theta)$ និងកូអរដោនេនៃចំណុច $P'(-\cos\theta, \sin\theta)$ (1) ។

តាមរូបខាងស្តាំ OP' ជាជ្រុងមួយនៃមុំ $(\pi - \theta)$ ។ ដូច្នេះកូអរដោនេនៃ P' គឺ


$$\cos(\pi - \theta), \sin(\pi - \theta) \quad (2) \quad \text{។}$$

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta, \quad \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$$

$$\tan(\pi - \theta) = \frac{\sin(\pi - \theta)}{\cos(\pi - \theta)} = \frac{\sin\theta}{-\cos\theta} = -\tan\theta$$

$$\cot(\pi - \theta) = \frac{\cos(\pi - \theta)}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{-\cos\theta}{\sin\theta} = -\cot\theta$$



មុំពីរដែលមានចុងឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងអ័ក្សស៊ីនុសគេបានរូបមន្ត

$$\left. \begin{aligned} \sin(\pi - \theta) &= \sin \theta, & \cos(\pi - \theta) &= -\cos \theta \\ \tan(\pi - \theta) &= -\tan \theta, & \cot(\pi - \theta) &= -\cot \theta \end{aligned} \right\} \text{ ។}$$

សម្គាល់ : មុំពីរដែលមានចុងឆ្លុះគ្នា មានស៊ីនុសដូចគ្នាហើយមានកូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ផ្ទុយ

គ្នា ។

ឧទាហរណ៍ : $\sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} \cos\left(-\frac{20\pi}{3}\right) &= \cos\left(\frac{20\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3} + 6\pi\right) = \cos\frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \text{ ។} \end{aligned}$$

លំហាត់គំរូ គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម៖

$$A = \cos(-\theta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \cos(\pi - \theta) + \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$$

$$B = \sin\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{3\pi}{4} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ $A = \cos \theta + \cos \theta - \cos \theta - \cos \theta = 0$

$$\begin{aligned} B &= \sin\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{3\pi}{4} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\frac{\pi}{6} \\ &= \sin\frac{\pi}{6} - \cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ។} \end{aligned}$$

ប្រតិបត្តិ 1 ដោយស្គាល់ $\sin 47^\circ = 0.6820$ គណនា $\cos 43^\circ$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃលេខនៃកន្សោម $A = \sin(-x) + \sin(\pi - x) + \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

$$B = \sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) + \cos(3\pi - x)$$

$$C = \tan\frac{5\pi}{6} + \cot\frac{7\pi}{4} + \frac{1}{\tan\frac{\pi}{3}} \text{ ។}$$

3.3.4. មុំដែលមានផលសងស្មើ π

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP}) = \theta$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP}') = \pi + \theta$ គេបាន កូអរដោនេនៃចំណុច $P(\cos \theta, \sin \theta)$ និងកូអរដោនេនៃចំណុច $P'(\cos(\pi + \theta), \sin(\pi + \theta))$ ។

ចំណុច P និង P' ឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងគល់ O ។ គេបាន OP និង OP' មានចំណោលកែងផ្ទុយគ្នា លើអ័ក្សស៊ីនុស និងអ័ក្សកូស៊ីនុស ។

គេបាន

$$\sin(\pi + \theta) = \sin[\pi - (-\theta)] = \sin(-\theta) = -\sin\theta$$

$$\cos(\pi + \theta) = \cos[\pi - (-\theta)] = -\cos(-\theta) = -\cos\theta$$

$$\tan(\pi + \theta) = \frac{\sin(\pi + \theta)}{\cos(\pi + \theta)} = \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} = \tan\theta$$

$$\cot(\pi + \theta) = \frac{\cos(\pi + \theta)}{\sin(\pi + \theta)} = \frac{-\cos\theta}{-\sin\theta} = \cot\theta \quad \forall$$

គេបានរូបមន្ត

$$\begin{cases} \sin(\pi + \theta) = -\sin\theta, & \cos(\pi + \theta) = -\cos\theta \\ \tan(\pi + \theta) = \tan\theta, & \cot(\pi + \theta) = \cot\theta \end{cases} \quad \forall$$

ឧទាហរណ៍ : $\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \quad \forall$

$$\tan \frac{7\pi}{2} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \forall$$

$$A = 2\cos(\pi - 2x) + \sin(\pi + y) - 2\cos(\pi - 2x) - \sin(\pi + y)$$

$$= -2\cos 2x - \sin y + 2\cos 2x + \sin y = 0 \quad \forall$$

3.3.5. មុំដែលមានជលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP}) = \theta$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OP'}) = \frac{\pi}{2} + \theta = \frac{\pi}{2} - (-\theta) \quad \forall$ ផ្ទុំ AP' ជាផ្ទុំបំពេញនៃផ្ទុំដែលមានរង្វាស់ $(-\theta)$ តាម $2\pi \quad \forall$ ដូច្នេះ



$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(-\theta) = -\sin\theta$$

$$\tan\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cot(-\theta) = -\cot\theta, \quad \cot\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \tan(-\theta) = -\tan\theta$$

ឧទាហរណ៍ : $\sin 120^\circ = \sin(30^\circ + 90^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\tan \frac{5\pi}{6} = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -\cot \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \forall$$

$$\frac{\cot \frac{3}{4}\pi}{\sin \frac{3}{2}\pi} = \frac{\cot\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right)} = \frac{-\tan \frac{\pi}{4}}{\cos \pi} = \frac{-1}{-1} = 1 \quad \forall$$



លំហាត់គំរូ គណនា $\frac{\cos(-288^\circ)\cot 72^\circ}{\tan(-162^\circ)\sin 108^\circ} - \tan 18^\circ$ ។

ដំណោះស្រាយ គណនា

$$\begin{aligned} & \frac{\cos(-288^\circ)\cot 72^\circ}{\tan(-162^\circ)\sin 108^\circ} - \tan 18^\circ \\ &= \frac{\cos(-360^\circ + 72^\circ)\cot 72^\circ}{\tan(-180^\circ + 18^\circ)\sin(90^\circ + 18^\circ)} - \tan 18^\circ \\ &= \frac{\cos 72^\circ \tan 18^\circ}{\tan 18^\circ \cos 18^\circ} - \tan 18^\circ \\ &= \frac{\cos(90^\circ - 18^\circ)\tan 18^\circ}{\tan 18^\circ \cos 18^\circ} - \tan 18^\circ \\ &= \frac{\sin 18^\circ}{\cos 18^\circ} - \tan 18^\circ = \tan 18^\circ - \tan 18^\circ = 0 \quad \text{។} \end{aligned}$$

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin 870^\circ$, $\cos(-135^\circ)$, $\tan 765^\circ$, $\cot \frac{25}{4}\pi$ ។

ចម្លើយ $\frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1 , 1 ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\frac{(\cot 44^\circ + \tan 226^\circ)\cos 406^\circ}{\cos 316^\circ} - \cot 72^\circ \cot 18^\circ$ ។

ចម្លើយ $\tan 44^\circ$ ។

4. ការសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ដើម្បីសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គេត្រូវរកដែនកំណត់ ខួប ភាពគូសេស ទិសដៅអថេរ ភាពនឹងក្រាបនៃអនុគមន៍ ។

4.1. ដែនកំណត់

អនុគមន៍ស៊ីនុសនិងអនុគមន៍កូស៊ីនុសមានដែនកំណត់លើ $\mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍តង់សង់អាចកំណត់បាន លុះត្រាតែ $\cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូច្នេះដែនកំណត់នៃអនុគមន៍តង់សង់គឺ

$$D = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{។}$$

អនុគមន៍កូតង់សង់អាចកំណត់បាន លុះត្រាតែ $\sin x \neq 0 \Rightarrow x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូច្នេះដែនកំណត់នៃអនុគមន៍កូតង់សង់គឺ $D = \mathbb{R} - \{k\pi\}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ : អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$

អនុគមន៍ $y = \frac{4}{\cos x}$ កំណត់បាន កាលណា $\cos x \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

អនុគមន៍ $y = \tan(x-1)$ កំណត់បានកាលណា $x-1 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x \neq 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

4.2. ខួបនៃអនុគមន៍

និយមន័យ	f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍មានខួប p លុះត្រាតែ p ជាចំនួនវិជ្ជមានតូចបំផុត ដែល $\forall x \in D : f(x+p) = f(x)$ ។ ពីនិយមន័យនេះគេអាចទាញបាន $f(x) = f(x+p) = f[(x+p)+p] = f(x+2p) = \dots$
ជាទូទៅ	$f(x) = f(x-p) = f[(x-p)-p] = f(x-2p) = \dots$ ។ អនុគមន៍ស៊ីនុសនិងកូស៊ីនុសមានខួប 2π ព្រោះ 2π ជាចំនួនវិជ្ជមានតូចបំផុតដែល $\sin[(x+2\pi)] = \sin x$ និង $\cos(x+2\pi) = \cos x$ ដែល $\forall k \in \mathbb{Z}, \forall x \in D,$ $f(x+kp) = f(x) \text{ ។}$

សម្គាល់	អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ និង $y = \cos 2x$ មានខួប π ព្រោះ $\sin[2(x+\pi)] = \sin(2x+2\pi) = \sin 2x \text{ និង}$ $\cos[2(x+\pi)] = \cos(2x+2\pi) = \cos 2x \text{ ។}$
---------	--

ជាទូទៅ	អនុគមន៍ $y = \sin ax$ និង $y = \cos ax$ មានខួប $p = \frac{2\pi}{ a }$ ។ អនុគមន៍តង់សង់និងអនុគមន៍កូតង់សង់មានខួប π ព្រោះ $\forall x \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{Z},$ $\tan(x+\pi) = \tan x \text{ នាំឱ្យ } \tan(x+k\pi) = \tan x \text{ និង } \cot(x+\pi) = \cot x \text{ នាំឱ្យ}$ $\cot(x+k\pi) = \cot x \text{ ។}$
--------	--

ជាទូទៅ	អនុគមន៍ $y = \tan ax$ និង $y = \cot ax$ មានខួប $p = \frac{\pi}{ a }$ ។ ឧទាហរណ៍ : អនុគមន៍ $y = \sin \frac{1}{2}x$ មានខួប $p = 4\pi$, $y = \cos(-3x)$ មានខួប $p = \frac{2\pi}{ -3 } = \frac{2\pi}{3}$ អនុគមន៍ $y = 3 \tan \frac{1}{2}x$ មានខួប $p = 2\pi$, $y = \cot 5x$ មានខួប $p = \frac{\pi}{5}$ ។
--------	--

4.3. ភាពគូនិចភាពសេស

និយមន័យ	f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍គូ លុះត្រាតែគ្រប់ $x \in D,$ $-x \in D, f(-x) = f(x)$ ។ f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍សេស លុះត្រាតែគ្រប់ $x \in D, -x \in D, f(-x) = -f(x)$ ។
---------	---

ឧទាហរណ៍ : $y = x - \sin x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។

គ្រប់តម្លៃ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = -x - \sin(-x) = -(x - \sin x) = -f(x)$

ដូច្នេះ $y = x - \sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

$y = \tan x \cot^3 x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} \right\}$, $k \in \mathbb{Z}$

គ្រប់តម្លៃ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = \tan(-x) \cot^3(-x) = \tan x \cot^3 x = f(x)$

ដូច្នេះ $y = \tan x \cot^3 x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

លក្ខណៈ: ក្រាបនៃអនុគមន៍សេសមានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ និងក្រាបនៃអនុគមន៍គូមានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

4.4. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$

ដែនកំណត់ ៖ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។


ខួប ៖ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍ខួបដែលមានខួប $p = 2\pi$ ព្រោះ $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ។

យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \sin x$ លើ $[-\pi, \pi]$ ហើយក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ លើចន្លោះ $[(2k-1)\pi, (2k+1)\pi]$ បានដោយរំកិលមែកលើ $[-\pi, \pi]$ ចំនួន 2π តាមអ័ក្ស $(x'x)$ ។

ភាពសេស ៖ គេដឹងថា $\sin(-x) = -\sin x$ ។ ដូច្នេះអនុគមន៍ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ដូច្នេះសិក្សាអនុគមន៍ $y = \sin x$ តែលើ $[0, \pi]$ រួចធ្វើបម្លែងឆ្លុះធៀបនឹង 0 បានមែកលើ $[-\pi, 0]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព ៖ គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\sin x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π នោះតម្លៃ $\sin x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប $y = \sin x$ លើ $[-\pi, \pi]$



ឧទាហរណ៍ : សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2\sin x$ លើចន្លោះ $[0, 2\pi]$ ។

ដែនកំណត់: អនុគមន៍ $y = 2\sin x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ $y = 2\sin x$ មានខួប


$$p = 2\pi \text{ ។}$$

ភាពសេស : គ្រប់ $x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = 2\sin(-x) = -2\sin x = -f(x)$ ។ ដូច្នេះ

$y = 2\sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$2\sin x$	0	2	0	-2	0




លំហាត់គំរូ ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ ។ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

សង់បានដោយរំកិលក្រាបនៃ

អនុគមន៍ $y = \sin x$ ពីស្តាំទៅឆ្វេង

ចំនួន $\frac{\pi}{2}$ ឯកតាតាមអ័ក្ស x ។



ប្រតិបត្តិ 1 សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃ

អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ប្រើក្រាប $y = \sin x$ សង់ក្រាប $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ ។

4.5. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$

ដែនកំណត់ : កូស៊ីនុសជាអនុគមន៍ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

ខួប : $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = 2\pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cos x$ លើ

ចន្លោះ $[2k-1)\pi, (2k+1)\pi]$, $k \in \mathbb{Z}$ បានដោយរំកិលមែកលើ $[-\pi, \pi]$ ចំនួន 2π តាម (x) ។

ភាពគូ : គេដឹងថា $\cos(-x) = \cos x$ ដូច្នេះ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍គូ ។ ក្រាបនៃ $y = \cos x$


មានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។ ដូច្នេះ យើងសិក្សាតែលើ $[0, \pi]$ ហើយមែកលើ $[-\pi, 0]$ បាន

ដោយធ្វើបម្លែងឆ្លុះរៀបនិងអ័ក្សអរដោនេនៃមែកលើ $[0, \pi]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព៖ គេសង្កេតឃើញថាកាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π នោះតម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 0 ទៅ -1 ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប $y = \cos x$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	$1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$		




ឧទាហរណ៍ : សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2\cos x$ ។

ដែនកំណត់ : អនុគមន៍ $y = 2\cos x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ $y = 2\cos x$ មានខួប $T = 2\pi$ ។

$x \in D$, $-x \in D$, $f(-x) = 2\cos(-x) = 2\cos x = f(x)$ ។ ដូច្នេះ $y = 2\cos x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$2\cos x$	$-2 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow -2$				




លំហាត់គំរូ ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

ដោយរំកិលក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ $\frac{\pi}{2}$ ឯកតាស្របនឹងអ័ក្ស $(x'x)$ ។



ប្រតិបត្តិ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos 2x$ និង $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ។

4.6. អថេរភាពនៃក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan x$

ដែនកំណត់ : គេដឹងថា $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ។ អនុគមន៍តង់សង់កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ខុសពី

$$\frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}) \text{ ឬ } x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

ខួប : $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = \pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍លើ $y = \tan x$ លើចន្លោះ $\left((2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2} \right), (k \in \mathbb{Z})$ បានដោយរំកិលមែកលើ $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$ ចំនួន π ឯកតាតាម $(x'x)$ ។


ភាពសេស : គេដឹងថាគ្រប់ $x \neq \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right), (k \in \mathbb{Z})$ នាំឱ្យ $\tan(-x) = -\tan x$ ។ ដូច្នេះ

$y = \tan x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃ $y = \tan x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ដូច្នេះយើងសិក្សាតែលើ $\left[0, \frac{\pi}{2} \right)$ ហើយមែកលើ $\left(-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$ បានដោយធ្វើប្លែងឆ្លុះជៀបនឹង 0 នៃមែកលើ $\left[0, \frac{\pi}{2} \right)$ ។

ទិសដៅអថេរភាព : គេសង្កេតឃើញថាអនុគមន៍ $y = \tan x$ កើនលើចន្លោះ $\left[0, \frac{\pi}{2} \right)$ ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$	0	∞



ឧទាហរណ៍ : សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2} \tan x$ ។


ដែនកំណត់ : អនុគមន៍ $y = \frac{1}{2} \tan x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} (k \in \mathbb{Z})$ ។

ខួប : អនុគមន៍ $y = \frac{1}{2} \tan x$ មានខួប $p = \pi$ ។ គេដឹងថាគ្រប់ $x \neq \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right), (k \in \mathbb{Z})$ នាំឱ្យ

$$\frac{1}{2} \tan(-x) = -\frac{1}{2} \tan x = -f(x) \text{ ជាអនុគមន៍សេស ។}$$

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{2} \tan x$	$ $	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$ $




លំហាត់គំរូ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $X = x - \frac{\pi}{6}$, $x = X + \frac{\pi}{6}$, $y = -\tan X$

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$x = X + \frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
y	$ \infty \searrow$	$1 \searrow$	$0 \searrow$	$-1 \searrow$	$-\infty $



ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\tan 2x$ និង $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ។

4.7. អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cot x$

ដែនកំណត់ : គេដឹងថា $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ។ ដូច្នេះ អនុគមន៍កូតង់សង់កំណត់និងជាប់ចំពោះ

គ្រប់ $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{R}$)


ខួប : $y = \cot x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = \pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cot x$ លើចន្លោះ $(k\pi, (k+1)\pi)$, ($k \in \mathbb{R}$) បានដោយរំកិលមែកលើ $(0, \pi)$ ចំនួន π ឯកតាតាម $(x'x)$ ។

ភាពសេស : ដោយ $\cot(-x) = -\cot x$ នាំឱ្យ $y = \cot x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃ $y = \cot x$ មានគល់ ០ ជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cot x$ លើចន្លោះ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព : អនុគមន៍ $y = \cot x$ ចុះលើចន្លោះ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

តារាងអថេរភាពនិងក្រាប :

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	$ + \infty \searrow$	0



ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\cot x$ ។



លំហាត់

1. បំប្លែងជាដឺក្រេនៃមុំ $200^\circ, -100^\circ, 225^\circ, -240^\circ, -135^\circ, 330^\circ, 570^\circ, 630^\circ$ ។

2. បំប្លែងជាដឺក្រេនៃមុំ $\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{7}, \frac{7\pi}{4}, \frac{-11\pi}{6}, \frac{-5\pi}{2}, \frac{-7\pi}{2}, \frac{\pi}{9}$ ។

3. គេមាន $\sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{2}$ ហើយ $\pi < \theta < 2\pi$ ។ គណនា

ក. $\sin\theta\cos\theta$

ខ. $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$

គ. $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ ។

4. រកតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

$A = \frac{8\cos^3\alpha - 2\sin^3\alpha + \cos\alpha}{2\cos\alpha - \sin^3\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = 2$ ។

$B = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = -2$ ។

$C = \frac{\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}{\sin^2\alpha - 2\cos^2\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\cot\alpha = 3$ ។

5. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sqrt{\tan^2\alpha + \cot^2\alpha + 2}$

ខ. $\frac{\sin^2\alpha - \tan^2\alpha}{\cos^2\alpha - \cot^2\alpha}$

គ. $\sqrt{\sin^2\alpha(1 + \cot\alpha) + \cos^2\alpha(1 + \tan\alpha)}$

ឃ. $\frac{\cos^2\alpha + \cos^2\alpha\cot^2\alpha}{\sin^2\alpha + \sin^2\alpha\tan^2\alpha}$ ។

6. ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម ៖

ក. $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

ខ. $\frac{\cos x \cot x - \sin x \tan x}{\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x}} = 1 + \sin x \cos x$

គ. $(\tan\theta - \sin\theta)^2 + (1 - \cos\theta)^2 = \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)^2$

ឃ. $\frac{2\sin\theta\cos\theta - \cos\theta}{1 - \sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta} = \frac{1}{\tan\theta}$ ។

7. រកខួបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = \sin\frac{2}{3}x$

ខ. $y = -\sin\frac{1}{4}x$

គ. $y = 2\cos\frac{1}{4}x$

ឃ. $y = \tan\frac{1}{4}x$

ង. $y = \cot\frac{1}{3}x$

ច. $y = \sin 2x + \cos x$ ។

8. រកភាពគូនិងសេសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $y = x - \sin 2x$

ខ. $y = x^2 \cos^2 x$

គ. $y = \tan x \cos^2 x$

ឃ. $y = \sin 5x + \sin 3x + 5 \sin x \cos 2x \quad (x \in \mathbb{R})$

ង. $y = \sin x + \tan x + \cot 3x \quad \left(x \neq \frac{k\pi}{2}\right)$

ច. $y = \cos x + \sin\frac{x}{2}\sin x + 5x^2$ ។

9. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = -\sin\frac{x}{3}$

ខ. $y = -\sin\theta + 1$

គ. $y = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$

ឃ. $y = 3\tan\theta$ ។

10. ដោយប្រើក្រាប $y = \sin x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

ខ. $y = 2 + \sin x$

គ. $y = 1 - \sin x$ ។

11. ដោយប្រើក្រាប $y = \cos x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ ៖

ក. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

ខ. $y = 2 - \cos x$

គ. $y = \cos x + 2$ ។

12. គេមានត្រីកោណដូចរូបខាងស្តាំដែលមាន $\sin\beta = p$

ហើយ β ជាមុំស្រួច ។ ចូរគណនាកន្លោមខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ p ៖

ក. $\tan\beta$

ខ. $\sin(90^\circ - \beta)$

គ. $\sin(180^\circ + \beta)$ ។

13. តាមរូបខាងស្តាំនេះ QRS ជាបន្ទាត់ត្រង់ ហើយ



$PQ = 12 \text{ cm}$, $QR = 5 \text{ cm}$ និង $RP = 13 \text{ cm}$ ។

ក. ពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជា $\angle PQR$ ជាមុំកែង ។

ខ. ទាញរកតម្លៃ $\angle QPR$ និង $\cos\angle PRS$ ។

14. បង្ហាញថា $\cos\theta\left(\frac{1}{1-\sin\theta} - \frac{1}{1+\sin\theta}\right)$ អាចសរសេរក្នុង

ទម្រង់ $k\tan\theta$ និងរកតម្លៃនៃ k ។



វត្ថុបំណង

1. ស្រាយបញ្ជាក់ រូបមន្តផលបូកមុំខុបនិងរូបមន្តបន្លែង
2. ដោះស្រាយចំណោទត្រីកោណមាត្រ ។

1. រូបមន្តផលបូកនិងផលជក

1.1. គណនា $\cos(\alpha - \beta)$ និង $\cos(\alpha + \beta)$

ឧទាហរណ៍ 1 : ប្រៀបធៀបកន្សោម $\cos(60^\circ - 30^\circ)$ និង $\cos 60^\circ - \cos 30^\circ$ ។

គេបាន

$$\cos(60^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 \text{ និង}$$

$$\cos 60^\circ - \cos 30^\circ = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}) = -0.366$$

ដូច្នេះ $\cos(60^\circ - 30^\circ) \neq \cos 60^\circ - \cos 30^\circ$ ។

ក្នុងការគណនា $\cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos 15^\circ$ គេមិនអាចរក $\cos 15^\circ$ បានដោយងាយនោះទេ ព្រោះ 15° មិនមែនជាមុំពិសេស ។ ដូច្នេះគេបង្កើតរូបមន្តដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំទាំងនោះដូចខាងក្រោម ៖

គេពិនិត្យរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM}) = \alpha$

មុំ $(\vec{OA}, \vec{ON}) = \beta$ និងមុំ $(\vec{OM}, \vec{ON}) = \beta - \alpha$ ។

គេបាន $\vec{OM} \begin{vmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{vmatrix}$, $\vec{ON} \begin{vmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{vmatrix}$ ។ តាមនិយមន័យផលគុណ


ស្កាលែ គេអាចសរសេរ

$$\vec{OM} \cdot \vec{ON} = OM \cdot ON \cdot \cos(\beta - \alpha) = \cos(\beta - \alpha) \text{ ព្រោះ}$$

$OM = ON = 1$ (កាំរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ) និង $\cos(-x) = \cos x$ ។ ម្យ៉ាងទៀតតាមកន្សោមវិភាគ

ផលគុណស្កាលែ គេបាន $\vec{OM} \cdot \vec{ON} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ ។

$$\text{ដូច្នេះ } \boxed{\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta} \quad (1) \quad \text{។}$$



ឧទាហរណ៍ 2 : $\cos 15^\circ = \cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ ។

បើគេជំនួស $-\beta$ ដោយ β ក្នុងរូបមន្ត $\cos(\alpha - \beta)$

គេបាន $\cos[\alpha - (-\beta)] = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta)$ ដូច្នេះ

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (2) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 3 : $\cos \frac{5\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2}$
 $= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ ។

1.2. គណនា $\sin(\alpha - \beta)$ និង $\sin(\alpha + \beta)$

តាមលក្ខណៈមុំបំពេញ គេបាន $\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$

តាមរូបមន្ត (1) $\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta$

តែ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$ និង $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

$$\text{ដូច្នេះ } \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha \quad (3) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 1 : $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ ។

បើយើងជំនួស β ដោយ $(-\beta)$ ក្នុងរូបមន្ត (3) គេបាន $\sin(\alpha - \beta) = \sin[\alpha + (-\beta)]$

$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos(-\beta) + \sin(-\beta) \cos \alpha$ ដោយ $\cos(-\beta) = \cos \beta$ និង $\sin(-\beta) = -\sin \beta$ ។

$$\text{ដូច្នេះ } \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha \quad (4)$$

ឧទាហរណ៍ 2 : $\sin \frac{\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនា $\frac{\sin 9^\circ \cos 39^\circ - \cos 9^\circ \sin 39^\circ}{\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{28} + \sin \frac{3\pi}{7} \sin \frac{5\pi}{28}}$

ដំណោះស្រាយ $\frac{\sin 9^\circ \cos 39^\circ - \cos 9^\circ \sin 39^\circ}{\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{28} + \sin \frac{3\pi}{7} \sin \frac{5\pi}{28}} = \frac{\sin(9^\circ - 39^\circ)}{\cos\left(\frac{12\pi}{28} - \frac{5\pi}{28}\right)} = \frac{\sin(-30^\circ)}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថា $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha \right) = \sqrt{2} \left(\sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right)$

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin 105^\circ$, $\cos 105^\circ$, $\cos \frac{\pi}{12}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 បង្ហាញថា $\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\sin(\beta - \theta)}{\cos \beta \cos \theta} + \frac{\sin(\theta - \alpha)}{\cos \theta \cos \alpha} = 0$ ។

1.3. គណនា $\tan(\alpha + \beta)$ និង $\tan(\alpha - \beta)$

គេមាន $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}$ ដោយប្រើរូបមន្ត (2) និង (3)

គេបាន $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$ ។

ឧបមាថា $\cos \alpha \neq 0$, $\cos \beta \neq 0$, $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$

គេចែកភាគទាំងពីរនៃផលធៀបនឹង $\cos \alpha \cos \beta$

គេបាន $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}$ ឬ $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ (5) ។

ឧទាហរណ៍ 1 : $\tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = \frac{\tan 60^\circ + \tan 45^\circ}{1 - \tan 60^\circ \tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3} \times 1} = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3}}$

បើគេជំនួស β ដោយ $(-\beta)$ ក្នុងរូបមន្ត $\tan(\alpha + \beta)$ ។ គេបាន

$\tan[\alpha + (-\beta)] = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan(-\beta)}$

$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ (6)

រូបមន្តនេះកំណត់បានលុះត្រាតែ $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $\beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $(\alpha - \beta) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : $\tan \frac{\pi}{12} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \frac{\pi}{6}}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{6}} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$ និង $\tan \alpha = 2$, $\tan \beta = -3$ ។ គណនា $\tan(\alpha - \beta)$ ។

ដំណោះស្រាយ $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{2 - (-3)}{1 + 2(-3)} = \frac{5}{-5} = -1$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សម្រួលកន្សោម $\frac{\tan 3\theta - \tan \theta}{1 + \tan \theta \tan 3\theta} + \cot \left(\frac{\pi}{2} + 2\theta \right)$

ដំណោះស្រាយ គេមាន $\frac{\tan 3\theta - \tan \theta}{1 + \tan \theta \tan 3\theta} = \tan(3\theta - \theta) = \tan 2\theta$ និង $\cot \left(\frac{\pi}{2} + 2\theta \right) = -\tan 2\theta$ ។

ដូច្នេះ $\frac{\tan 3\theta - \tan \theta}{1 + \tan \theta \tan 3\theta} + \cot \left(\frac{\pi}{2} + 2\theta \right) = \tan 2\theta - \tan 2\theta = 0$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\tan(a + b + c)$ ដោយប្រើរូបមន្ត $\tan(\alpha + \beta)$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right)$ ។

2. អនុគមន៍រូបមន្តដលមូក

2.1. រូបមន្តមុំទុប

- គេឱ្យ $\alpha = \beta$ ជំនួស β ដោយ α ក្នុងរូបមន្ត $\sin(\alpha + \beta)$ គេបាន

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\text{ដូច្នេះ } \boxed{\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha} \quad (7) \quad \text{។}$$

- បើគេជំនួស β ដោយ α ទៅក្នុងរូបមន្ត $\cos(\alpha + \beta)$ គេបាន

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\text{គេសង្កេតឃើញថា } \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \text{ និង } \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$\text{គេបាន } \cos 2\alpha = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \text{ និង}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\text{ដូច្នេះ } \boxed{\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1} \quad (8) \quad \text{។}$$

- បើគេជំនួស β ដោយ α ទៅក្នុងរូបមន្ត $\tan(\alpha + \beta)$ គេបាន

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \boxed{\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}} \quad (9) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 1 : រក $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ និង $\tan 2\alpha$ បើ $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ និង $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ។

ដោយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ នាំឱ្យ $\sin \alpha > 0$ គេបាន $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$, $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$,

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{7}{25}$$

$$\text{គេបាន } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4} \text{ នាំឱ្យ } \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2 \times \left(-\frac{3}{4}\right)}{1 - \left(-\frac{3}{4}\right)^2} = -\frac{24}{7}$$

$$\text{គេអាចរក } \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\frac{24}{7} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : គណនា $\sin 3\alpha$ និង $\cos 3\alpha$ ។

$$\sin 3\alpha = \sin(2\alpha + \alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos 2\alpha$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \sin \alpha \cos \alpha \cos \alpha + \sin \alpha (1 - 2 \sin^2 \alpha) = 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha \\
&= 2 \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + \sin \alpha - 2 \sin^2 \alpha = 2 \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha \\
&= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ $\boxed{\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha} \quad (10) \quad \text{។}$

$$\cos 3\alpha = \cos(2\alpha + \alpha) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha \quad \text{ប្រើ } \cos 2\alpha \text{ និង } \sin 2\alpha$$

ដូច្នេះ $\boxed{\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha} \quad (11) \quad \text{។}$

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើ $\sin 3x$ និង $\cos 3x$ គណនា $\sin 4x$ ។

ដំណោះស្រាយ $\sin 4x = \sin(3x + x) = \sin 3x \cos x - \sin x \cos 3x$

$$= 4(\cos^3 x \sin x - \sin^3 x \cos x) \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ បង្ហាញថា $\frac{1 - 2 \sin^2 \alpha}{2 \cot\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)} = 1 \quad \text{។}$

2.2. រូបមន្តកន្លះមុំ

- បើគេជំនួស 2α ដោយ α និង α ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ ទៅក្នុងរូបមន្ត $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$,

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad \text{និង} \quad \tan^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{1 - \cos 2\alpha}$$

គេបាន $\boxed{\begin{aligned} \sin \alpha &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \\ \sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} \end{aligned}} \quad (12) \quad \text{។}$

រូបមន្តម្យ៉ាងទៀតរបស់ $\tan \frac{\alpha}{2}$ គឺ

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{2 \sin x \cos x}{2 \cos x \cos x} = \frac{\sin 2x}{2 \cos^2 x} = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}$$

- បើគេជំនួស x ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ និង $\alpha = 2x$ គេបាន $\boxed{\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}} \quad (13) \quad \text{។}$

បើគេជំនួស 2α ដោយ α និង α ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ ទៅក្នុងរូបមន្ត (7), (8) និង (9) គេបាន ៖

$$\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}, \quad \sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}, \quad \tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad \text{។}$$

$$\text{ដោយ } \cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\text{គេអាចសរសេរ } \cos \alpha = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2}}$$

គេចែកភាគយកនិងភាគបែងកន្សោមទាំងពីរនឹង $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ ដែល $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$ គេបាន

$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad \text{។ បើគេឱ្យ } \tan \frac{\alpha}{2} = t$$

$$\text{គេបានរូបមន្ត} \quad \boxed{\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}} \quad (14) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 1 : គណនា $\sin 22^\circ 30'$, $\sin \frac{\pi}{12}$ និង $\tan \frac{3\pi}{8}$ ។

គេដឹងថាមុំ $22^\circ 30'$ នៅក្នុងកាប្រុងទី I ដូច្នេះ $\sin$ និង $\cos$ មានតម្លៃវិជ្ជមាន ។

$$\text{គេបាន } \sin 22^\circ 30' = \sin \frac{45^\circ}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \quad \text{។}$$

$$\sin^2 \frac{\pi}{2} = \sin^2 \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad \text{ដោយ } \sin \frac{\pi}{12} > 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

$$\tan \frac{3\pi}{8} = \tan \left(\frac{1}{2} \times \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\sin \frac{3\pi}{4}}{1 + \cos \frac{3\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \sqrt{2} + 1 \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\frac{1 - \cos x}{\sin x} = \tan \frac{x}{2}$ ។

$$\text{តាង } \tan \frac{x}{2} = t \quad \text{គេបាន } \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{1 - \frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{\frac{1+t^2-1+t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{2t^2}{2t} = t = \tan \frac{x}{2} \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ គេមាន $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ ហើយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ។ គណនា $\sin \frac{\alpha}{2}$ និង $\cos \frac{\alpha}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ នោះនាំឱ្យ $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha < 0$ ។

$$\text{គេបាន } \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{16}{25} \quad \text{។ ដូច្នេះ } \sin \alpha = \frac{4}{5} \quad \text{។}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{3}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{3}{5}}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

ប្រតិបត្តិ គណនា $\tan \frac{\alpha}{2}$ ដោយស្គាល់ $\tan \alpha = \frac{24}{7}$ និង $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ ។

ចម្លើយ $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$ ។

3. រូបមន្តបម្លែង

3.1. បម្លែងពីផលគុណទៅជាផលបូក

តាមរូបមន្តផលបូកនិងផលដកខាងក្រោម ៖

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta \quad (1)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta \quad (2)$$

- បូករូបមន្ត (1) និង (2) គេបាន $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2\cos\alpha \cos\beta$

- ដករូបមន្ត (1) និង (2) គេបាន $\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2\sin\alpha \sin\beta$ ។

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \sin\beta \cos\alpha \quad (3)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \sin\beta \cos\alpha \quad (4)$$

- បូករូបមន្ត (3) និង (4) គេបាន $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2\sin\alpha \cos\beta$

- ដករូបមន្ត (3) និង (4) គេបាន $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2\sin\beta \cos\alpha$ ។

ដូច្នេះ គេបានរូបមន្ត

$$\begin{aligned} \cos\alpha \cos\beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] , \quad \sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin\alpha \cos\beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] , \quad \sin\beta \cos\alpha = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍ 1 : គណនា $\cos 75^\circ \cos 45^\circ$ ។

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \cos 75^\circ \cos 45^\circ &= \frac{1}{2}[\cos(75^\circ + 45^\circ) + \cos(75^\circ - 45^\circ)] \\ &= \frac{1}{2}(\cos 120^\circ + \cos 30^\circ) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \quad \text{។} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ឧទាហរណ៍ 2 : } \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{2\pi}{3}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \frac{\sqrt{3}+1}{4} \quad \text{។} \end{aligned}$$

3.2. បម្លែងពីផលបូកទៅជាផលគុណ

តាង $\alpha + \beta = p$, $\alpha - \beta = q$ គេទាញបាន $\alpha = \frac{p+q}{2}$ និង $\beta = \frac{p-q}{2}$ ។

ជំនួស α និង β ទៅក្នុងរូបមន្តខាងលើ គេបាន

$$\begin{aligned} \cos p + \cos q &= 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} , \quad \cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} \\ \sin p + \sin q &= 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} , \quad \sin p - \sin q = 2\sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរគេបាន } \tan p + \tan q = \frac{\sin p}{\cos p} + \frac{\sin q}{\cos q} = \frac{\sin p \cos q + \sin q \cos p}{\cos p \cos q} = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q} \quad \text{។}$$

ជំនួស q ដោយ $-q$ គេបាន $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$ ។

ធ្វើតាមវិធីដូចខាងលើ គេបាន $\cot q + \cot p = \frac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q}$ និង $\cot p - \cot q = \frac{\sin(p-q)}{\sin p \sin q}$ ។

ដូច្នេះ

$$\left. \begin{aligned} \tan p + \tan q &= \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}, \quad \cot p + \cot q = \frac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q} \\ \tan p - \tan q &= \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}, \quad \cot p - \cot q = \frac{\sin(p-q)}{\sin p \sin q} \end{aligned} \right\} \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 1 : $\sin 105^\circ + \sin 15^\circ = 2 \sin \frac{105^\circ + 15^\circ}{2} \cos \frac{105^\circ - 15^\circ}{2} = 2 \sin 60^\circ \cos 45^\circ$
 $= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : សរសេរជាផលគុណនៃ $1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha$ ។

គេបាន $1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha = 1 + \cos 2\alpha + \cos \alpha = 2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha = 2 \cos \alpha \cos \left(\alpha + \frac{1}{2} \right)$
 $= 2 \cos \alpha \cos \left(\alpha + \cos \frac{\pi}{3} \right) = 4 \cos \alpha \cos \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{6} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $2 \left(\frac{1}{\sin 2\alpha} + \cot 2\alpha \right) = \cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ $2 \left(\frac{1}{\sin 2\alpha} + \cot 2\alpha \right) = 2 \left(\frac{1}{\sin 2\alpha} + \frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \right) = 2 \left(\frac{2 \cos^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha} \right) = \frac{2 \cos \alpha}{\sin \alpha}$
 $= \frac{2 \left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right)}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} - \frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមាន A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ គេមាន $\sin A + \sin B + \sin C = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$

ដោយ $A + B + C = \pi \Rightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}$

ដូច្នេះ $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}, \quad \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$ ។

គេបាន $\sin A + \sin B + \sin C = 2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{C}{2}$
 $= 2 \cos \frac{C}{2} \left(\cos \frac{A-B}{2} + \cos \frac{A+B}{2} \right)$
 $= 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ

A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \text{ ។}$$

លំហាត់

- គេមាន $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$), $\sin \beta = \frac{1}{3}$ ($\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$) ។ គណនា

$\sin(\alpha + \beta)$, $\cos(\alpha - \beta)$, $\tan(\alpha - \beta)$ និង $\cot(\alpha - \beta)$ ។
- គេមាន $\cos \theta = -\frac{2}{3}$, ($\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$) ។ គណនា $\cos 2\theta$, $\sin \frac{\theta}{2}$, $\sin 3\theta$ ។
- គេមាន $t = \tan \frac{\theta}{2}$ ($t \neq \pm 1$), $\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\tan \theta = \frac{2t}{1-t^2}$

តាមសមភាព $2\cos 2\theta - \cos(\theta + 2) = 0$ ។ គណនា $\tan \frac{\theta}{2}$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ។
- គេមាន $\theta = 36^\circ$ និង $2\theta = 180^\circ - 3\theta$ ។ តាមលក្ខណៈនេះ គណនា $\cos 36^\circ$ ។
- គេមាន $\sin \alpha + \cos \beta = \frac{5}{4}$ និង $\cos \alpha + \sin \beta = \frac{5}{4}$ ហើយ ($0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$), ($0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$) ។

គណនា $\sin(\alpha + \beta)$ និង $\tan(\alpha + \beta)$ ។
- បង្ហាញសមភាពខាងក្រោម ៖

ក. $\cot(a \pm b) = \frac{\cot a \cot(b \mp 1)}{\cot b \pm \cot a}$

ខ. $\tan(a + b) - \tan a - \tan b = \tan a \tan b \tan(a + b)$

គ. $\frac{\sin^4 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha - \cos^4 \alpha}{\tan 2\alpha - 1} = \cos 2\alpha$

ឃ. $\frac{\cos^3 \alpha - \cos 3\alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin^3 \alpha + \sin 3\alpha}{\sin \alpha} = 3$ ។
- សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $\sin 4x - 4 \sin 3x + 6 \sin 2x - 4 \sin x$

ខ. $\cos^2(\alpha + \beta) + \cos^2(\alpha - \beta) - \cos 2\alpha \cos 2\beta$

គ. $\frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha}$

ឃ. $\frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha + \sin 7\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \cos 7\alpha}$ ។
- បង្ហាញសមភាពខាងក្រោម ៖

ក. $\sin 3a = 4 \sin a \sin\left(\frac{\pi}{3} + a\right) \sin\left(\frac{\pi}{3} - a\right)$

ខ. $\cos 3a = 4 \cos a \cos\left(\frac{\pi}{3} + a\right) \sin\left(\frac{\pi}{3} - a\right)$


គ. $4 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \sin^2 \alpha - 3$

ឃ. $\sin a - \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$ ។

9. បង្ហាញថាត្រីកោណដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

ក. $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$ ជាត្រីកោណកែង

ខ. $\frac{\sin C}{\cos B} = \sin A + \cos A \cot C$ ជាត្រីកោណកែង ។



10. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\sin A = 2 \sin B \sin C$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

11. គេឱ្យ $\tan A + \tan B = 2 \cot \frac{C}{2}$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

12. គេមាន $\triangle ABC$ និង A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណនេះ ។

ក. បើគេដឹងថា $\sin A + \sin B + \sin C = 1$ គណនា $\cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$ ។


ខ. បង្ហាញថា $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$ ។

13. គណនាផ្ទាំងមុំនៃត្រីកោណ ABC បើគេដឹងថា

ក. $\sin 3A + \sin 3B + \sin 3C = 0$

ខ. $\sin 5A + \sin 5B + \sin 5C = 0$

គ. $\sin 6A + \sin 6B + \sin 6C = 0$ ។



1. សេចក្តីផ្តើម

អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងសាមញ្ញថាជាអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្ររបស់អនុគមន៍ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ កូតង់សង់ ។ អនុគមន៍ប្រាសទាំងនេះត្រូវបានប្រើជាមួយមុំមួយចំនួននៃផលធៀបត្រីកោណមាត្រណាមួយ ។ អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យវិស្វកម្ម រូបវិទ្យា ធរណីមាត្រ និងការរុករក ។

2. អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ


យើងបានសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៅមេរៀនមុនរួចរាល់ហើយអំពី $\sin x$, $\cos x$ និង $\tan x$ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ប្រវែងជ្រុងមួយមិនស្គាល់នៃត្រីកោណកែង ប្រសិនបើប្រវែងជ្រុងមួយ និងរង្វាស់មុំមួយត្រូវបានគេស្គាល់ ។

គេតាងអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រតាមក្បួនដូចខាងក្រោម ៖

$$\text{បើ } a = f(b) \text{ នោះអនុគមន៍ប្រាសគឺ } b = f^{-1}(a) \text{ ។}$$

ដូច្នេះអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃ $\sin x$, $\cos x$ និង $\tan x$ ត្រូវបានកំណត់ដោយ $\sin^{-1}(x)$, $\cos^{-1}(x)$ និង $\tan^{-1}(x)$ ឬតាង ដោយ $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$ និង $\arctan(x)$ ។ អនុគមន៍ប្រាសនេះ ត្រូវបានប្រើដើម្បីរករង្វាស់មុំមិនស្គាល់នៃត្រីកោណកែងមួយ នៅពេលដែលប្រវែងជ្រុងពីរទៀតមិនស្គាល់ ។

ឧទាហរណ៍ : បាតនៃជណ្តើរមួយ ត្រូវបានដាក់នៅចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រ ពីជញ្ជាំងកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ និងផ្នែកខាងលើនៃជណ្តើរប៉ះនឹងកំពូលនៃជញ្ជាំង ។ តើរង្វាស់មុំដែលបង្កើតឡើងដោយជណ្តើរ និងដីមានរង្វាស់ស្មើនឹងប៉ុន្មានដឺក្រេ?



នៅទីនេះយើងមានត្រីកោណកែងមួយ ដែលយើងដឹងពីប្រវែងជ្រុងទាំងពីរ ពោលគឺ ជ្រុងទល់មុខ និងជ្រុងនៅជាប់នឹងមុំ ។ ដូច្នេះ យើងប្រើអនុគមន៍ត្រាសនៃអនុគមន៍តង់សង់ ។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលវាទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខដែលគិតជា “ ដឺក្រេ ” នោះយើងបាន $\tan^{-1}\left(\frac{10}{3}\right) \approx 73.3^\circ$


ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់ម៉ាស៊ីនគិតលេខទៅជាប្រភេទរ៉ាដ្យង់ អ្នកនឹងទទួលបាន

$$\tan^{-1}\left(\frac{10}{3}\right) \approx 1.28\text{rd} \quad \text{។}$$

ប្រសិនបើប្រើផលធៀបជ្រុងរបស់ត្រីកោណដែលមានមុំ $(45^\circ, 45^\circ, 90^\circ)$ និង $(30^\circ, 60^\circ, 90^\circ)$ នោះគេអាចរកឃើញតម្លៃមួយចំនួននៃអនុគមន៍ត្រាសត្រីកោណមាត្របានដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃនៃ $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ អ្នកអាចចាំថានៅក្នុងត្រីកោណដែលមានមុំ $(30^\circ, 60^\circ, 90^\circ)$ ប្រសិនបើអ៊ីប៉ូតេនុសមានប្រវែងស្មើនឹង 1 នោះជ្រុងវែងមានប្រវែង $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។ ដោយសារកូស៊ីនុសគឺជាសមាមាត្រនៃផ្នែកដែលនៅជាប់នឹងអ៊ីប៉ូតេនុស នោះតម្លៃត្រាសនៃកូស៊ីនុសគឺមុំ 30° ឬប្រហែល 0.52 រ៉ាដ្យង់ ។



ចូរប្រយ័ត្ន ៖ ចំពោះអនុគមន៍ត្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ $\sin^{-1}x \neq \frac{1}{\sin x}$, $\cos^{-1}x \neq \frac{1}{\cos x}$ និង $\tan^{-1}x \neq \frac{1}{\tan x}$ ។

ប្រតិបត្តិ រកតម្លៃមុំដូចខាងក្រោម ៖

- ក. ចំពោះត្រីកោណកែង ABC គេឱ្យជ្រុងមុំកែង $AB = 65$, $BC = 35$ ។
រកមុំ α នៃជ្រុង AB និង AC ។
- ខ. ចំពោះត្រីកោណកែង LMN គេឱ្យជ្រុងមុំកែង $LM = 6$, $MN = 4$ ។
រកមុំ α នៃជ្រុង LM និង LN ។
- គ. ចំពោះត្រីកោណកែង PQR គេឱ្យជ្រុងមុំកែង $QR = 8$ និងអ៊ីប៉ូតេនុស $PR = 10$ ។ រកមុំ α នៃជ្រុង PQ និង PR ។

ចម្លើយ ក. $\alpha = 28.30^\circ$ ខ. $\alpha = 33.69^\circ$ គ. $\alpha = 53.13^\circ$ ។

3. រូបមន្តអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ


ខាងក្រោមជារូបមន្តគ្រឹះនៃអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ	រូបមន្ត
$\arcsin(x)$	$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x) , x \in [-1, 1]$
$\arccos(x)$	$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x) , x \in [-1, 1]$
$\arctan(x)$	$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}(x) , x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{arccot}(x)$	$\cot^{-1}(-x) = -\cot^{-1}(x) , x \in \mathbb{R}$


4. ក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រាសរបស់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ អាចបានពីក្រាបនៃអនុគមន៍ដើម ដោយការផ្លាស់ប្តូរអ័ក្ស x និងអ័ក្ស y ។ ប្រសិនបើ (a, b) គឺជាចំណុចនៅលើក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ បន្ទាប់មក (b, a) ក្លាយជាចំណុចដែលត្រូវគ្នានៅលើក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រប្រាសរបស់វា ។ វាអាចត្រូវបានបង្ហាញថា ក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រាសអាចបានពីក្រាបដែលត្រូវគ្នានៃអនុគមន៍ដើមជារូបភាពឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

4.1. ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin^{-1}(x)$ ឬ $y = \arcsin(x)$



ដែនកំណត់	រង្វង់
$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$	$-1 \leq y \leq 1$



ដែនកំណត់	រង្វង់
$-1 \leq x \leq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$


ប្រសិនបើយើងដាក់លក្ខខណ្ឌដែនកំណត់របស់ $f(x) = \sin(x)$ នៅចន្លោះ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ នោះយើងបានវាជាអនុគមន៍មួយទល់មួយ ហើយរង្វង់របស់វាគឺចន្លោះ $[-1, 1]$ ។ យើងកំណត់អនុគមន៍ប្រាសនៃ $f(x) = \sin(x)$ ដោយ $y = \sin^{-1}(x)$ ។ គេអាចថា y បញ្ចូលស៊ីនុស x ហើយមានន័យថា y ជាមុំចំនួនពិតដែលតម្លៃស៊ីនុសគឺ x ។ សូមប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាដែលបានប្រើ ។ សញ្ញា (-1)

មិនមែនជាស្វ័យគុណទេ មានន័យថា $\sin^{-1}x \neq \frac{1}{\sin x}$ ។ ដើម្បីជៀសវាងការសម្គាល់នេះ សៀវភៅខ្លះប្រើសញ្ញាណ $y = \arcsin(x)$ ជំនួសវិញ ។

គេឃើញថាក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ នៃអនុគមន៍ស៊ីនុស ។

សូមកត់សម្គាល់ថា ដែនកំណត់ឥឡូវវាជារឿង ហើយរង់ឥឡូវវាជាដែនកំណត់ ។ ដោយសារដែនកំណត់ត្រូវបានដាក់លក្ខខណ្ឌ នោះមុំមានតម្លៃវិជ្ជមានគឺស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ហើយមុំតម្លៃអវិជ្ជមានស្ថិតនៅក្នុងកាដ្រង់ទី 4 ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ យើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌដែនកំណត់នៃអនុគមន៍កូស៊ីនុស និងតង់សង់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាជាអនុគមន៍មួយទល់មួយ ។

4.2. ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos^{-1}(x)$ ឬ $y = \arccos(x)$




ដែនកំណត់	រង្វង់
$0 \leq x \leq \pi$	$-1 \leq y \leq 1$

ដែនកំណត់	រង្វង់
$-1 \leq x \leq 1$	$0 \leq y \leq \pi$

ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍កូស៊ីនុសគឺ $[-1, 1]$ ហើយរង្វង់គឺ $[0, \pi]$ ។ នោះមានន័យថាមុំមានតម្លៃវិជ្ជមានស្ថិតនៅក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ហើយមុំមានតម្លៃអវិជ្ជមានស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី 2 ។

4.3. ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan^{-1}(x)$ ឬ $y = \arctan(x)$



ដែនកំណត់	រង្វង់
$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, +\infty)$

ដែនកំណត់	រង្វង់
$(-\infty, +\infty)$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

ដែនកំណត់អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍តង់សង់គឺ $(-\infty, +\infty)$ ហើយរង្វង់គឺ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ។ អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍តង់សង់មានតម្លៃក្នុងកាដ្រងទី 1 និងទី 4 ។ ដំណើរការដូចគ្នានេះត្រូវ បានប្រើដើម្បីស្វែងរកអនុគមន៍ប្រាសសម្រាប់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលនៅសេសសល់ ដូចជាអនុគមន៍កូតង់សង់ជាដើម ។ល។

5. តារាងអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

អនុគមន៍	ដែនកំណត់	រង្វង់
$\sin^{-1}(x)$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
$\cos^{-1}(x)$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\tan^{-1}(x)$	$(-\infty, +\infty)$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
$\cot^{-1}(x)$	$(-\infty, +\infty)$	$(0, \pi)$

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃនៃ $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $x = \cos^{-1}(-\frac{1}{2})$ នាំឱ្យ $\cos x = -\frac{1}{2}$ ។ ដោយរង្វង់នៃ $\cos^{-1}x$ គឺ $[0, \pi]$ នោះ

យើងបានតម្លៃ $\cos^{-1}(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$ ។

- ប្រតិបត្តិ
- ក. រកតម្លៃមុំនៃ $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$
 - ខ. រកតម្លៃមុំនៃ $\tan^{-1}(1) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}) + \sin^{-1}(-\frac{1}{2})$
 - គ. រកតម្លៃមុំនៃ $\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \cot^{-1}(-\sqrt{3})$ ។

ចម្លើយ ក. $\frac{\pi}{6}$ ខ. $\frac{3\pi}{4}$ គ. $-\frac{\pi}{2}$ ។

6. លក្ខណៈអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- $\sin^{-1}(\sin x) = x$ ចំពោះ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$
- $\cos^{-1}(\cos x) = x$ ចំពោះ $0 \leq x \leq \pi$
- $\tan^{-1}(\tan x) = x$ ចំពោះ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
- $\sin(\sin^{-1} x) = x$ ចំពោះ $-1 \leq x \leq 1$
- $\cos(\cos^{-1} x) = x$ ចំពោះ $-1 \leq x \leq 1$
- $\tan(\tan^{-1} x) = x$ ចំពោះ $x \in \mathbb{R}$
- $\cot^{-1}(\cot x) = x$ ចំពោះ $x \in (0, \pi)$

ឧទាហរណ៍ : ក. $\sin(\sin^{-1} 0.5) = 0.5$, $\sin(\sin^{-1} 1.5) \neq 1.5$ ព្រោះ $-1 \leq x \leq 1$

ខ. $\sin^{-1}[\sin(-1.5)] = -1.5$, $\sin^{-1}[\sin(-2)] \neq -2$ ព្រោះ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ។

☞ **ការគណនាដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ**

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃនៃ $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ។

ដំណោះស្រាយ យើងឃើញថា $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ តាង $y = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ $\sin y = \sin\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

នោះ $\sin y = -\frac{1}{2}$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ តាមតារាងត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន

$y = -\frac{\pi}{6} = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ទោះបីជា $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ ក៏វាមិនមែនជាចម្លើយដែរ

ព្រោះ y នៅក្នុងចន្លោះ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ។ ដូច្នេះ $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$ ។

☞ **ការគណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ**

- មានប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នានៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដូច្នេះសូមអានការណែនាំនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។
- ត្រូវប្រាកដថាកំណត់ម៉ាស៊ីនគិតលេខនៅលើទម្រង់វាជូង ។
- ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនគិតលេខបង្ហាញកំហុស នោះតម្លៃឬលេខដែលប្រើមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រទេ ។

ឧទាហរណ៍ 1 : បើអ្នកចុច $\sin^{-1}(1.548)$ នៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់អ្នកឧបករណ៍នឹងបញ្ជាក់ថាមានកំហុស គឺដោយសារតែ 1.548 មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃ $\sin^{-1}$ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ក. $\cos(\cos^{-1} 0.5) = 0.5$

ខ. $\cos(\cos^{-1} 1.5) \neq 1.5$ ព្រោះ $-1 \leq x \leq 1$

គ. $\cos^{-1}[\cos(0.5)] = 0.5$

ឃ. $\cos^{-1}[\cos(-2)] \neq -2$ ព្រោះ $0 \leq x \leq \pi$ ។

☞ **ការគណនាដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ**

ឧទាហរណ៍ : រកតម្លៃនៃ $\cos(\cos^{-1} 0.6)$ ដោយ $-1 < 0.6 < 1$ នោះ $\cos(\cos^{-1} 0.6) = 0.6$ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃនៃ $\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

ដំណោះស្រាយ $\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ គឺដូចគ្នាទៅនឹង $\cos y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ដែល $0 < y < \pi$ ។

តាមតារាងត្រីកោណមាត្រនិងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេបាន $\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ ជាចម្លើយ នោះ

$$\text{គេបាន } y = \frac{3\pi}{4} = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ ។}$$

☞ ការគណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

- មានប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នានៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដូច្នេះសូមអានការណែនាំនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។
- ត្រូវប្រាកដថាកំណត់ម៉ាស៊ីនគិតលេខនៅលើទម្រង់រ៉ាដ្យង់ ។
- ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនគិតលេខបង្ហាញកំហុស នោះតម្លៃខ្លះដែលបានប្រើមិនស្ថិតនៅក្នុង

ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រទេ ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ប្រសិនបើអ្នកចុច $\cos^{-1}(1.238)$ នៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់អ្នកឧបករណ៍នឹងបញ្ជាក់ថាមានកំហុស គឺដោយសារតែ 1.238 មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃ $\cos^{-1}$ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ក. $\tan(\tan^{-1}2) = 2$

$$\text{ខ. } \tan[\tan^{-1}(-1.5)] = -1.5$$

$$\text{គ. } \tan^{-1}[\tan(-0.5)] = -0.5$$

$$\text{ឃ. } \tan^{-1}[\tan(-2)] \neq -2 \quad \text{ព្រោះ } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 1 រកតម្លៃមុំនៃ $y = \tan^{-1}(\sqrt{3})$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\tan^{-1}(\sqrt{3})$ ដូចគ្នាជាមួយនឹង $\tan y = \sqrt{3}$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ ។

$$\text{ដូច្នេះ } y = \frac{\pi}{3} = \tan^{-1}(\sqrt{3}) \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 រកតម្លៃនៃ $\tan[\tan^{-1}(56)]$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\tan(\tan^{-1}x) = x$ ដែល $-\infty < x < \infty$ នោះ

$$\text{យើងបាន } \tan[\tan^{-1}(56)] = 56 \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

$$\text{ក. រកតម្លៃនៃ } \cos^{-1}x \text{ ចំពោះ } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ។}$$

$$\text{ខ. រកតម្លៃ } \tan^{-1}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) \text{ ។}$$

$$\text{គ. រកតម្លៃ } \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{6}\right)\right) \text{ ។}$$

ចម្លើយ

$$\text{ក. } \frac{\pi}{6}$$

$$\text{ខ. } -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{គ. } \frac{\pi}{6} \text{ ។}$$

? លំហាត់

1. រកតម្លៃនៃ $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$ ។
2. រកតម្លៃ $\sin\left(\cos^{-1}\frac{3}{5}\right)$ ។
3. រកតម្លៃ $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{9\pi}{8}\right)\right)$ ។
4. រកតម្លៃ $\tan(\tan^{-1}(-4))$ ។
5. រកតម្លៃ $\sin^{-1}\left(\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\right)$ ។
6. បង្ហាញថា $\tan(\cot^{-1}x) = \cot(\tan^{-1}x)$ ។
7. បង្ហាញថា $2\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{17}{31}\right) = \frac{\pi}{4}$ ។
8. បង្ហាញថា $\cot^{-1}7 + \cot^{-1}8 + \cot^{-1}18 = \cot^{-1}3$ ។
9. ប្រៀបធៀប $\tan^{-1}1$ និង $\tan 1$ ។
10. រកតម្លៃនៃ $\sin\left(2\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)\right) + \cos(\tan^{-1}\sqrt{3})$ ។
11. ដោះស្រាយសមីការ $\tan^{-1}\left\{\frac{(1-x)}{(1+x)}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)\tan^{-1}x, x > 0$ ។
12. រកតម្លៃ x ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $\sin^{-1}x + \sin^{-1}(1-x) = \cos^{-1}x$ ។
13. ដោះស្រាយសមីការ $\sin^{-1}6x + \sin^{-1}6\sqrt{3}x = -\frac{\pi}{2}$ ។


វត្ថុបំណង

1. ដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រ
2. ដោះស្រាយវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

1. ចំណុចដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា

1.1. ការកំណត់មុំមាននិសដៅ

គេឱ្យពីរចំនួន x និង y ដែលមានកូស៊ីនុស $\cos x = \cos y$ ដូចគ្នា ។ ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O គេមាន M និង N ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែលមុំ $(\vec{OA}, \vec{ON}) = y$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM}) = x$ ។




អាប៉ូស៊ីសនៃចំណុច N គឺ $\cos y$ ។ ដោយ $\cos x = \cos y$ នោះ ចំណុច M និង N មានអាប៉ូស៊ីសដូចគ្នា ។ ដូច្នេះ គេបានករណីពីរដូចខាងក្រោម ៖

- បើ M និង N ត្រួតស៊ី នោះ x និង y ជារង្វាស់មុំតែមួយ ។ ដូច្នេះ $x = y + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ។
- បើ M និង N ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្ស $(x'x)$ នោះមុំ $(\vec{OA}, \vec{ON})$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM})$ ជាមុំផ្ទុយគ្នា ហើយ $-y$ ជារង្វាស់មួយនៃមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM})$ ។ ដូច្នេះ $x = -y + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

ជាទូទៅ គេបាន (I) ពីរចំនួន x និង y មានកូស៊ីនុសដូចគ្នា $\cos x = \cos y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = -y + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

2. ចំណុចដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា

គេឱ្យពីរចំនួន x និង y មានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ ។ ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រមានផ្ចិត O ចំណុច M និង N ជានៅលើរង្វង់ដែលមុំ $(\vec{OA}, \vec{ON}) = y$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM}) = x$ ។



$\sin x$ ជាអរដោនេនៃចំណុច M និង $\sin y$ ជាអរដោនេនៃចំណុច N ។ ដោយ $\sin x = \sin y$ នោះ M និង N មានអរដោនេដូចគ្នា ។ ដូច្នេះ គេបានករណីពីរដូចខាងក្រោម ៖

- បើ M និង N ត្រួតស៊ីគ្នា នោះ $x = y + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$)
- បើ M និង N ឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងអ័ក្ស ($y'y$) នោះមុំ $(\vec{OA}, \vec{ON})$ និងមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM})$ ជាមុំបន្ថែមគ្នា ហើយ $\pi - y$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM})$ ។ ដូច្នេះ $x = \pi - y + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

ជាទូទៅ គេបាន (II) x និង y ពីរចំនួនពិតមានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - y + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

3. សមីការត្រីកោណមាត្រ

3.1. ការដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = \frac{1}{2}$ ។

គេដឹងថា $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ សមីការអាចសរសេរ $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ តែ $\cos \frac{\pi}{3} = \cos \left(-\frac{\pi}{3}\right)$

ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$ ។

a ជាចំនួនពិតដែលគេឱ្យ ៖


- កាលណា $|a| > 1$ សមីការ $\cos x = a$ គ្មានចម្លើយ ព្រោះគ្រប់ចំនួន $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \cos x \leq 1$ ។
- កាលណា $|a| \leq 1$ គេបានករណីដូចខាងក្រោម ៖

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង A ជាចំណុចគល់នៃផ្ចុំ ហើយមុំ $(\vec{OA}, \vec{ON}) = \alpha$ ដែល

$\cos \alpha = OP = a$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត $a = OP = \cos(-\alpha)$ ដែល $-\alpha$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM})$ ។ គេបាន

- បើ $a \notin [-1, 1]$ សមីការ $\cos x = a$ គ្មានចម្លើយ ។
- បើ $a = 1$ ឬ $\cos x = 1$ នោះចុងផ្ចុំត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច A ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $x = 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។
- បើ $a = -1$ ឬ $\cos x = -1$ នោះចុងផ្ចុំត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច A' ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $x = \pi + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។



- បើ $a \in]-1, 1[$ មាន α តែមួយគត់ដែល $\cos \alpha = a = \cos x$ ។

ការដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$ គឺដោះស្រាយសមីការ $\cos x = \cos \alpha$ ។ តាមលក្ខណៈ

(I) គេបាន ៖

ចម្លើយនៃសមីការ $\cos x = \cos \alpha$ មានពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = -\alpha + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

សម្គាល់

1. បើ $a = 0$ នោះ $\cos \alpha = 0$ ។ ចម្លើយរបស់សមីការ $\cos x = 0$ គឺ $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

2. តាមលក្ខណៈមុំពីរដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា លុះត្រាតែមុំទាំងពីរស្មើគ្នា ឬផ្ទុយគ្នានោះ គេអាចដោះស្រាយសមីការ $\cos u(x) = \cos v(x)$ សមមូល $u(x) = \pm v(x) + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ 1

ដោះស្រាយសមីការ $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 3x$ រួចដោយផ្ទុយនៃចម្លើយលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ដំណោះស្រាយ

តាមផ្លូវពេញ គេបាន $\sin 3x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$ ដូច្នេះ

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) \text{ នាំឱ្យ}$$

$$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi \text{ ឬ } x - \frac{\pi}{4} = -\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{គេបាន } 4x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \text{ ឬ } -2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\text{ដូច្នេះ } x = \frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2} \text{ ឬ } x = \frac{\pi}{8} - k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

គេអាចសរសេរ $\frac{\pi}{8} - k\pi$ ទៅជា $\frac{\pi}{8} + k\pi$ ដែល $K = -k$, ($k \in \mathbb{Z}$ ដូច្នេះ $K \in \mathbb{Z}$) ។

$$\text{គេបាន (1) } x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{2}$$

$$\text{បើ } k = 0, x = \frac{3\pi}{16} \text{ ចុងផ្ចិតត្រង់ចំណុច } M_1$$

$$\text{បើ } k = 1, x = \frac{3\pi}{16} + \frac{\pi}{2} \text{ ចុងផ្ចិតត្រង់ចំណុច } M'_1$$

$$\text{បើ } k = 2, x = \frac{3\pi}{16} + \pi \text{ ចុងផ្ចិតត្រង់ចំណុច } M_2$$

$$\text{បើ } k = 3, x = \frac{3\pi}{16} + \frac{3\pi}{2} \text{ ចុងផ្ចិតត្រង់ចំណុច } M'_2$$

$$\text{បើ } k = 4, x = \frac{3\pi}{16} + 2\pi \text{ ចុងផ្ចិតត្រង់ចំណុច } M_1$$

ដូច្នេះ (1) មានសំណុំចម្លើយចុងក្រោយគឺ

$$M_1, M'_1, M_2, M'_2 \text{ ។}$$


ចំពោះ (2) $x = \frac{\pi}{8} + \pi$

បើ $k = 0$, $x = \frac{\pi}{8}$ ចុងក្រោយចំណុច N_1

បើ $k = 1$, $x = \frac{\pi}{8} + \pi$ ចុងក្រោយចំណុច N'_1

បើ $k = 2$, $x = \frac{\pi}{8} + 2\pi$ ចុងក្រោយចំណុច

N_1 ។ ដូច្នេះ (2) មានសំណុំចម្លើយចុងក្រោយគឺ N_1 និង N'_1 ។



លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \cdot \sin 2x$ ។

ដំណោះស្រាយ $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \cdot \sin 2x$

$$3\cos x + 2\cos^2 x = \cos 3x + \cos x - \cos 3x \quad \text{សមមូល} \quad 2\cos x + 2\cos^2 x = 0$$

$$2\cos x(1 + \cos x) = 0 \quad \text{សមមូល} \quad \cos x = 0 \quad \text{ឬ} \quad \cos x = -1$$

ដូច្នេះ សមីការមានឫស $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = -1 \quad \text{ខ. } \cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\text{គ. } \cos\frac{\pi}{6}\cos x - \sin\frac{\pi}{6}\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{ឃ. } \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \text{ ។}$$

ចម្លើយ ក. $x = \frac{7\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$ ឬ $x = -\frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$, ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\text{ខ. } x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad \text{ឬ} \quad -\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}, \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{គ. } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{ឬ} \quad x = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{ឃ. } x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \quad \text{ឬ} \quad x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

3.2. ការដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។

គេដឹងថា $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ សមីការអាចសរសេរ $\sin x = \sin\frac{\pi}{4}$ ។


ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ឬ} \quad x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{ឬ} \quad x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$ ។

- កាលណា $|a| > 1$ សមីការ $\sin x = a$ គ្មានចម្លើយព្រោះគ្រប់ចំនួន $x \in \mathbb{R} : -1 \leq \sin x \leq 1$ ។
- កាលណា $|a| \leq 1$ គេបានករណីដូចខាងក្រោម ៖

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង A ជាចំណុចគល់នៃផ្ចិត ហើយ $(\vec{OA}, \vec{OM}) = \alpha$ ដែល $\sin \alpha = OQ = a$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត $OQ = \sin(\pi - \alpha) = a$ ដែល $\pi - \alpha$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM'})$ ។ គេបាន



- បើ $a \notin [-1, 1]$ សមីការ $\sin x = a$ គ្មានចម្លើយ ។
- បើ $a = 1$ ឬ $\sin x = 1$ នោះផ្ចិតទាំងឡាយណាដែលមានចុងត្រង់ចំណុច B ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $\sin x = 1$ សមមូល $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a = -1$ ឬ $\sin x = -1$ នោះផ្ចិតទាំងឡាយណាដែលមានចុងត្រង់ចំណុច B' ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូច្នេះ $\sin x = -1$ សមមូល $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a \in (-1, 1)$ មាន α តែមួយគត់ក្នុងចន្លោះ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ដែល $\sin \alpha = a = \sin x$ ។

ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$ សមមូលនឹង $\sin x = \sin \alpha$ ។ តាមលក្ខណៈ (I) គេបាន ៖

សមីការ $\sin x = \sin \alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់

1. បើ $a = 0$ នោះ $\sin x = 0$ ។ ចម្លើយរបស់សមីការគឺ $x = k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។
2. តាមលក្ខណៈមុំពីរដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា លុះត្រាតែមុំទាំងពីរស្មើគ្នា ឬបន្ថែមគ្នានោះ គេដោះស្រាយសមីការ $\sin v(x) = \sin u(x)$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

$\sin v(x) = \sin u(x)$ សមមូល $u(x) = v(x) + 2k\pi$ ឬ $u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ 1

ដោះស្រាយ $\sin \frac{x}{2} \cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{x}{2} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ

គេបាន $\sin \frac{x}{2} \cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{x}{2} \sin \frac{\pi}{3} = \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ដោយ $\frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$

គេបាន $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6}$

សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ឬ $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ។

ដូច្នេះ $x = \pi + 4k\pi$ ឬ $x = \frac{7\pi}{3} + 4k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយ $2\sin x \cos x + \sqrt{3} - 2\cos x - \sqrt{3}\sin x = 0$ ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $(2\sin x \cos x - \sqrt{3}\sin x) - (2\cos x - \sqrt{3}) = 0$

$$\sin x(2\cos x - \sqrt{3}) - (2\cos x - \sqrt{3}) = 0 \text{ សមមូល } (2\cos x - \sqrt{3})(\sin x - 1) = 0$$

$$\text{គេបាន } 2\cos x - \sqrt{3} = 0 \text{ ឬ } \sin x - 1 = 0 \text{ នាំឱ្យ } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ឬ } \sin x = 1 \text{ ។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \cos x = \cos \frac{\pi}{6} \text{ នាំឱ្យ } x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ឬ } \sin x = 1 \text{ នាំឱ្យ } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ។}$$

$$\text{ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយ } x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ឬ } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$

ខ. $\sin 2x = \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$

គ. $2\sin x \cos x - 3\sin 2x = 0$ ។

ចម្លើយ

ក. $x = \frac{\pi}{8} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

ខ. $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \text{ ឬ } x = \frac{3\pi}{3} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

គ. $x = 2k\pi \text{ ឬ } x = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

3.3. ការដោះស្រាយសមីការ $\tan x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = -1$ ។

គេដឹងថា អនុគមន៍តង់សង់មានខួបស្មើនឹង π ។


ដូច្នេះគេអាចរកចំនួនពិត x មួយដែល $\tan x = -1$ ។ ដោយ

សមីការសរសេរ $\tan x = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ ។ ដូច្នេះសមីការមាន

ចម្លើយ $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ បកស្រាយតាមក្រាបចម្លើយ

របស់សមីការនេះជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរបស់ក្រាប

នៃអនុគមន៍ $y = \tan x$ និងបន្ទាត់ដេក $y = -1$ ។



ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = t$ ។

គេមានរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ (C) ហើយ $(u'u)$ ជាអ័ក្សតង់សង់ដែលប៉ះរង្វង់ (C) ត្រង់ A ។

នៅលើ $(u'Au)$ គេដោចំណុច T ដោយ $AT = t$ ។ រកចំនួន $\widehat{AM}$ ទាំងអស់ដែលមានតង់សង់ t ។

α ជារង្វាស់មួយនៃធ្នូ $\widehat{AM}$ ហើយចំណុច M និង M' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹង O ។ ធ្នូចម្លើយត្រូវមាន ចុងត្រង់ M និង M' ។ ធ្នូទាំងអស់ដែលមានចុង M មានរង្វាស់ $x = \alpha + 2k\pi$ ។

ធ្នូមួយដែលមានចុង M' មានរង្វាស់ $\pi + \alpha$ ហើយធ្នូទាំងអស់ដែលមានចុង M' មានរង្វាស់ $x = \pi + \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = \alpha + (2k+1)\pi$ ។ គេបានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

ដូច្នេះ សមីការ $\tan x = a = \tan \alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ គេបាន $\tan u(x) = \tan v(x)$ សមមូល $u(x) = v(x) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ដែល u និង v ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឧទាហរណ៍ 3 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ ។

គេបាន $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ សមមូល $3x = \frac{\pi}{3} - 2x$ សមមូល $5x = \frac{\pi}{3} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

សមីការមានចម្លើយ $x = \frac{\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}, (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = -0.7456$ ។

ដំណោះស្រាយ តាមតារាងត្រីកោណមាត្រ គេបាន $\tan 36^\circ = 0.7265$ និង $\tan 37^\circ = 0.7536$ រកម៉្លី α' ដែល $\tan \alpha' = 0.7456$
 គេបាន $\tan 36^\circ < \tan \alpha' < \tan 37^\circ$ និង $\tan 37^\circ - \tan 36^\circ = 0.0271$
 $\tan \alpha' - \tan 36^\circ = 0.0191 \quad \alpha' > 36^\circ$
 គេត្រូវថែមលើ 36° ចំនួន $\frac{60' \times 0.0191}{0.0271} \approx 42'$
 គេបាន $\alpha' = 36^\circ 42'$ ហើយ $-0.7456 = \tan(-36^\circ 42')$
 ដូច្នេះ $\tan x = \tan(-36^\circ 42')$ នាំឱ្យ $x = -36^\circ 42' + 180^\circ k \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan x \tan \frac{\pi}{4}} = \sqrt{3}$ ។

ដំណោះស្រាយ ដោយ $\frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan x \tan \frac{\pi}{4}} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ និង $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

សមីការអាចសរសេរ

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) \text{ នាំឱ្យ } x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

ដូច្នេះ $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ ។

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{ខ. } \tan 3x = \sqrt{3} \quad \text{គ. } \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \sqrt{3} \quad \text{ឃ. } \sqrt{3} \tan x = -1 \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{ក. } x &= \frac{\pi}{6} + kt, \quad (k \in \mathbb{Z}) & \text{ខ. } x &= \frac{4\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}, \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \text{គ. } x &= \frac{2\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, \quad (k \in \mathbb{Z}) & \text{ឃ. } x &= \frac{11\pi}{6} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។} \end{aligned}$$

3.4. ការដោះស្រាយសមីការ $\cot x = m$

សមីការ $\cot x = \cot \alpha$ អាចសរសេរ $\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{\tan \alpha}$ នាំឱ្យ $\tan x = \tan \alpha$ ។ ដូច្នេះ គេអាច

ដោះស្រាយសមីការ $\cot x = m$ ដូចសមីការ $\tan x = t$ ខាងលើដែរ ។

ចំពោះសមីការ $\cot u(x) = \cot v(x)$ ដូចសមីការ $\tan u(x) = \tan v(x)$ ដែរ ។

សមីការ $\cot u(x) = \cot v(x)$ សមមូល $u(x) = v(x) + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})$ ដែល u និង v ជា

អនុគមន៍នៃ x ។

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយសមីការ $\cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ ។

គេបាន $\cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} = \cot \frac{\pi}{6}$ នាំឱ្យ $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។

ដូច្នេះ $2x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} + k\pi$ នាំឱ្យ $x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ

ដោះស្រាយសមីការ $2(\cot 2x - \cot 3x) = \tan 2x + \cot 3x$ ។

ដំណោះស្រាយ

លក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $\sin 2x \neq 0, \sin 3x \neq 0, \cos 2x \neq 0$ ។ គេបាន

$$\begin{aligned} 2(\cot 2x - \cot 3x) &= \tan 2x + \cot 3x \\ 2\left(\frac{\cos 2x}{\sin 2x} - \frac{\cos 3x}{\sin 3x}\right) &= \frac{\sin 2x}{\cos 2x} + \frac{\cos 3x}{\sin 3x} = \left(2\left(\frac{\sin 3x \cos 2x - \sin 2x \cos 3x}{\sin 2x \sin 3x}\right)\right) \\ &= \frac{\sin 3x \sin 2x + \cos 3x \cos 2x}{\sin 3x \cos 2x} = \left(\frac{2 \sin x}{\sin 2x \sin 3x} = \frac{\cos x}{\sin 3x \cos 2x}\right) \\ \frac{2 \sin x \cos(2x - \sin 2x \cos x)}{\sin 2x \sin 3x \cos x} &= 0 \quad \text{សមមូល} \quad \frac{2 \sin x (\cos 2x - \cos^2 x)}{\sin 2x \sin 3x \cos x} = 0 \end{aligned}$$

សមមូល $\sin x = 0$ ។ តាមលក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $\sin 2x \neq 0$ នាំឱ្យ $\sin x \neq 0$ ។

ដូច្នេះសមីការគ្មានចម្លើយ ។

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

$$\begin{aligned} \text{ក. } \cot x &= -\frac{1}{\sqrt{3}} & \text{ខ. } \cot 3x &= \sqrt{3} \\ \text{គ. } \cot\left(\frac{x}{2} - 3\right) &= -1 & \text{ឃ. } 3 \cot x - \sqrt{3} &= 0 \quad \text{។} \end{aligned}$$

ចម្លើយ

ក. $x = \frac{11\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

ខ. $x = \frac{4\pi}{9} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

គ. $x = \frac{3\pi}{8} + \frac{3}{2} + \frac{k\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z})$


ឃ. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

4. វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x - \frac{1}{2} \geq 0$ ។

វិសមីការអាចសរសេរ $\sin x \geq \frac{1}{2}$ តែ $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = \sin \frac{5\pi}{6}$

នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានចំណុច M និង



M' ដែលធ្វើ $\widehat{AM} = \frac{\pi}{6}$ និងធ្វើ $\widehat{AM'} = \frac{5\pi}{6}$ ។ គេសង្កេតឃើញ

ស៊ីនុសនៃមួយចំនួនធំជាង ឬស្មើ $\frac{1}{2}$ លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួន

នោះលើធ្នូ $\widehat{MBM'}$ រួមទាំងចំណុច M និង M' ។

ដូច្នេះចម្លើយនៃវិសមីការ $\sin x - \frac{1}{2} \geq 0$ គឺ $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។


ជាទូទៅ

• វិសមីការ $\sin x \leq a$ គ្មានចម្លើយ កាលណា $a > 1$ ឬ $a < -1$

ហើយបើ $-1 \leq a \leq 1$ មានចម្លើយ $-\pi - \alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi$ ។

• វិសមីការ $\sin x \geq a$ គ្មានចម្លើយ កាលណា $a > 1$ ឬ $a < -1$


ហើយបើ $-1 \leq a \leq 1$ មានចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq \pi - \alpha + 2k\pi$ ។




ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $2\cos x + 1 < 0$ ។ វិសមីការអាចសរសេរ $\cos x < -\frac{1}{2}$

តែ $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} = \cos \frac{4\pi}{3}$ ។


នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានចំណុច M និង M'
ដែលធ្នូ $\widehat{AM} = \frac{2\pi}{3}$ និងធ្នូ $\widehat{AM'} = \frac{4\pi}{3}$ ។ គេសង្កេតឃើញថា
កូស៊ីនុសនៃមួយចំនួនតូចជាង $-\frac{1}{2}$ លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួន
នោះលើធ្នូ $\widehat{MA'M'}$ លើកលែងចំណុច M និង M' ។



ដូច្នេះចម្លើយនៃវិសមីការ $2\cos x + 1 < 0$ គឺ
 $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{4\pi}{3} + 3k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។



វិសមីការ $\cos x \leq a$ គ្មានចម្លើយ កាលណា
 $a > 1$ ឬ $a < -1$ ហើយបើ $-1 \leq a \leq 1$ មានចម្លើយ
 $\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។




វិសមីការ $\cos x \geq a$ គ្មានចម្លើយកាលណា
 $a < -1$ ឬ $a > 1$ ហើយបើ $-1 \leq a \leq 1$ មាន
ចម្លើយ $-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

ករណីពិសេស វិសមីការ $\sin x > 0$ មានចម្លើយ $2k\pi < x < \pi + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ ៣ : ដោះស្រាយវិសមីការ $\tan x \geq -1$ ។

ដោយ $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1 = \tan\frac{3\pi}{4}$ ។

នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមានចំណុច M និង M'
ដែល $\widehat{AM} = \frac{-\pi}{4}$, $\widehat{AM'} = \frac{3\pi}{4}$ ។ គេសង្កេតឃើញថាតង់សង់
នៃមួយចំនួនធំជាង ឬស្មើ -1 លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះ
នៅលើធ្នូ $\widehat{MAB}$ ឬ $\widehat{M'A'B'}$ ។





ដូច្នេះ វិសមីការ $\tan x = -1$ មានចម្លើយ $\frac{-\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

ជាទូទៅ

គេបាន $\tan x \leq a$ មានចម្លើយ $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \alpha + k\pi$

$\tan x \geq a$ មានចម្លើយ $\alpha + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។



សម្គាល់

ដំណោះស្រាយវិសមីការ ដូចគ្នានឹងដំណោះស្រាយវិសមីការ $\tan x$ ដែរ ។

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានរាង $\sin x \geq a, \cos x < a, \tan x > a,$

$\cot x < a, \dots$ គេត្រូវ

- រក α ដែល $\sin \alpha = a, \cos \alpha = a, \tan \alpha = a, \cot \alpha = a$
- ដោយចូលក្នុងតួតម្លៃ α រួចបកស្រាយដោយប្រើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ
- ទាញរកសំណុំចម្លើយ ។

របៀបបំប្លែងអង្គទី 1 នៃវិសមីការ គឺមានរបៀបដូចសមីការត្រីកោណមាត្រដែរ គេយក រូបមន្តត្រីកោណមាត្រមកប្រើ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) > \sin x$ ។

ដំណោះស្រាយ វិសមីការអាចសរសេរ

$$\sin x - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) < 0$$

$$2 \sin \frac{x - x + \frac{\pi}{3}}{2} \cos \frac{x + x - \frac{\pi}{3}}{2} < 0$$

$$2 \sin \frac{\pi}{6} \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) < 0$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) < 0$$

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < x - \frac{\pi}{6} < \pi + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$
 ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយវិសមីការ $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 \geq 0$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $t = \sin x$

វិសមីការអាចសរសេរ


$$2t^2 + 3t - 2 \geq 0 \text{ ឬ } (2t - 1)(t + 2) \geq 0$$

$$\text{គេទាញ } t \leq -2 \text{ ឬ } t \geq \frac{1}{2} \text{ ដោយ } -1 \leq t \leq 1$$

$$\text{យើងយកតែ } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \quad t = \sin x \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{ដោយ } \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = \sin \frac{5\pi}{6} \text{ គេបាន}$$

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ ជាសំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ ។}$$



ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos x \geq -\sqrt{2}$

ខ. $\cos 2x > \cos \frac{2\pi}{3}$

គ. $\sqrt{2}\cos x - 1 < 0$

ឃ. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) < \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{x}{2}\right)$

ង. $\cot x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ ។

ចម្លើយ

ក. $-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

ខ. $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

គ. $\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

ឃ. $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi < x < -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$

ង. $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{4\pi}{3} + k\pi$ ។

? លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ខ. } \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{គ. } \cos\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\text{ឃ. } \cos^2 x = 1$$

$$\text{ង. } \sin \sqrt{x} = -1$$

$$\text{ច. } \cot x = 1$$

$$\text{ឆ. } \frac{1}{\cos 2x} = \sqrt{2}$$

$$\text{ជ. } 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$$

$$\text{ឈ. } \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ញ. } \tan^3\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \tan(x - 1)$$

$$\text{ដ. } \cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

$$\text{ប. } \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = 5 \quad \forall$$

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \tan^3 3x - 2 \sin^3 3x = 0$$

$$\text{ខ. } \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \sqrt{2} \sin x \cos x$$

$$\text{គ. } \sin 2x = (\cos x - \sin x)^2$$

$$\text{ឃ. } \sqrt{3} \sin(x + \sin x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\text{ង. } \sin 2x + \tan x = 2$$

$$\text{ច. } \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 x} = 4 \tan x$$

$$\text{ឆ. } \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ជ. } \sin 3x + \cos 2x = 1 + 2 \sin x \cos 2x$$

$$\text{ឈ. } \sin 2(x - \pi) - \sin(3x - \pi) = \sin x$$

$$\text{ញ. } \tan x + \cot x = 2(\sin 2x + \cos 2x)$$

$$\text{ដ. } \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x} = \sqrt{3} \quad \forall$$

3. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } 2 \cos \theta \leq -\sqrt{2}$$

$$\text{ខ. } -\sqrt{2} \sin \theta + 1 \geq 0$$

$$\text{គ. } \sqrt{3} \tan \theta - 1 < 0$$

$$\text{ឃ. } \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (-\pi \leq \theta < \pi)$$

$$\text{ង. } \cos\left(\frac{1}{2}\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 \leq \theta < 2\pi) \quad \forall$$

4. រកគ្រប់មុំចន្លោះ 0° និង 360° ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

$$\text{ក. } 2 \tan y = 5 \sin y$$

$$\text{ខ. } 8 \sin x \cos x = \sin x$$

$$\text{គ. } 4 \sin^2 x = 6 - 9 \cos x$$

$$\text{ឃ. } 3 \cos y + \cot y = 0$$

$$\text{ង. } 2 \sin 2x + 1 = 0$$

$$\text{ច. } 6 \sin x - 8 \sin^2 x = 5 \cos^2 x$$

ឆ. $2 \cot 2x = 5$

ជ. $3 \sin y \tan y + 8 = 0$

ឈ. $3 \cos^2 y = 7 \sin y + 5$

ញ. $\cot\left(\frac{z}{2}\right) - 2 \cos\left(\frac{z}{2}\right) = 0$

ដ. $\tan(x - 30^\circ) \tan 50^\circ = 0$ ។

5. គេឱ្យ $x = 3 \sin \theta - 2 \cos \theta$ និង $y = 3 \cos \theta + 2 \sin \theta$

ក. រកតម្លៃនៃមុំស្រួច θ ចំពោះ $x = y$


ខ. បង្ហាញថា $x^2 + y^2$ ជាចំនួនថេរចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ θ ។

6. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មាន $\frac{\sin A + \cos B}{\sin B + \cos A} = \tan A$ ។ បង្ហាញថា $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណកែង ។

7. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មាន $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A$ ។ គេប្រភេទនៃ $\triangle ABC$ ។

8. គេឱ្យ $\triangle ABC$ មានមុំបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\tan B + \tan C = 2 \cos \frac{A}{2}$ ។

បង្ហាញថា $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសមបាត ។



វត្ថុបំណង

1. ដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រ
2. ដោះស្រាយវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

យើងបានសិក្សាចម្បងហើយពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រងាយៗ នៅក្នុងសៀវភៅគណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ។ ក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងសិក្សាពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រដែលមានទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ។

1. សមីការត្រីកោណមាត្រ

1.1. សមីការដឺក្រេទី 1 អន្សមនិង $\sin x$ និង $\cos x$

ជាសមីការត្រីកោណមាត្រដែលក្រោយពីបង្រួមហើយមានរាង $a \cos x + b \sin x = c$ ។

ដំណោះស្រាយសមីការនេះមានពីរបៀប :

របៀបទី 1 :

- បំប្លែងសមីការនេះជារាង $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, ($r \geq 0$) និង

$$\cos \theta = \frac{a}{r}, \sin \theta = \frac{b}{r} \text{ ។ ដោយ } \cos \theta = \frac{a}{r} \text{ នាំឱ្យ } a = r \cos \theta, \sin \theta = \frac{b}{r}$$

$$\text{នាំឱ្យ } b = r \sin \theta \text{ ។}$$

$$\text{សមីការ } a \cos x + b \sin x = r \cos \theta \cos x + r \sin \theta \sin x = c$$

$$r(\cos x \cos \theta + \sin x \sin \theta) = c \text{ សមមូល } r \cos(x - \theta) = c \text{ ឬ } \cos(x - \theta) = \frac{c}{r} \text{ ។}$$

- ដោះស្រាយសមីការ $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ តាមរូបមន្ត $\cos x = \cos \alpha$ ។

$$\text{ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ } \sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \quad (1)$$

$$\text{គេបាន } r = \sqrt{1+3} = 2, \cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ នាំឱ្យ } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ ។}$$

$$\text{សមីការ } \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \cos \frac{\pi}{3} \sin x + 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos x = 0$$

$$2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{3} + \cos x \sin \frac{\pi}{3} \right) = 0$$

$$2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \quad \text{ឬ} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

សមីការ (1) មានចម្លើយ $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$ នាំឱ្យ $x + \frac{\pi}{3} = k\pi$ ។

ដូច្នេះ $x = \frac{-\pi}{3} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។ ចំនួនចុងច្រើនមានពីរ ។

របៀបទី 2 : គណនា $\sin x$ និង $\cos x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\tan \frac{x}{2}$ ដោយ $x \neq \pi + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

គេជំនួស $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ និង $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ នោះសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$

ទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមាន t ជាអញ្ញាត : $(c+a)t^2 - 2bt + c-a = 0$ ។

ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 រកបូស្តរួចដោះស្រាយសមីការតាមរូបមន្ត $\tan \frac{x}{2} = \tan \alpha$ ។

សម្គាល់ : វិធីនេះអាចបាត់បួសត្រង់ $x = \pi + 2k\pi$ ។ ដូច្នេះ ដំបូងគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើ $x = \pi + 2k\pi$ ជាបូសរបស់សមីការ $a\cos x + b\sin x = c$ ឬទេ?

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\sin x + 7\cos x = 5$ ។

តាង $t = \tan \frac{x}{2}$ ($x \neq \pi + 2k\pi$) នោះសមីការសរសេរ $\frac{2t}{1+t^2} + 7\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right) = 5$

$$2t + 7 - 7t^2 = 5 + 5t^2 \quad \text{ឬ} \quad 6t^2 - t - 1 = 0$$

សមីការមានបូស $t_1 = \frac{1}{2}$, $t_2 = -\frac{1}{3}$ ។

• បើ $t_1 = \frac{1}{2}$ គេបាន $\tan \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$ នោះមាន $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ ដែល $\tan \alpha_1 = \frac{1}{2}$

គេបាន $\tan \frac{x}{2} = \tan \alpha_1$ នាំឱ្យ $\frac{x}{2} = \alpha_1 + k\pi$ ឬ $x = 2\alpha_1 + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

• បើ $t_2 = -\frac{1}{3}$ គេបាន $\tan \frac{x}{2} = -\frac{1}{3}$ នោះមាន $\alpha_2 \in \mathbb{R}$ ដែល $\tan \alpha_2 = -\frac{1}{3}$

គេបាន $\tan \frac{x}{2} = \tan \alpha_2$ នាំឱ្យ $\frac{x}{2} = \alpha_2 + k\pi$ ឬ $x = 2\alpha_2 + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយ : $x = 2\alpha_1 + 2k\pi$, $x = 2\alpha_2 + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $\sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}$ (1) ។

ដំណោះស្រាយ គេបាន $\cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x = \sqrt{2}$ ហើយ $r = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$,

$$\sin \theta = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

សមីការសរសេរ $2\left(\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x\right) = \sqrt{2}$ ឬ $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$

សមីការ (1) មានចម្លើយ : $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $x = \frac{7\pi}{24} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) និង

$$2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad x = -\frac{\pi}{24} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})$$

ចំនួនចុងផ្ចូចឆ្នើយមាន 4 ។

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$

ខ. $\cos 2x - \sin 2x = -1$

គ. $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1$

ឃ. $\cos x - \sqrt{3} \sin x = -\sqrt{2}$ ។

ចម្លើយ

ក. $\left(x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi, x = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

ខ. $\left(x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = -\frac{\pi}{4} + k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

គ. $\left(x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, x = 2k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

ឃ. $\left(x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi, x = -\frac{12\pi}{12} + 2k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

1.2. សមីការដឺក្រេទី 2 ធៀបនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x

សមីការទាំងនោះមានរាង : $a \cos^2 x + b \cos x + c = 0$, $a \sin^2 x + b \sin x + c = 0$

$a \tan^2 x + b \tan x + c = 0$ និង $a \cot^2 x + b \cot x + c = 0$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះ គេត្រូវ ៖

1. បំប្លែងសមីការឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើសិន ។
2. តាងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x ដោយ X ឬ Y ឬ $t \dots$ ។
3. ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅតាមអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលឱ្យ ។
4. ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមានអញ្ញាត X ឬ Y ឬ $t \dots$ ។
5. យកឬសដែលបានមកជំនួសជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រវិញ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ហើយដោះស្រាយតាមរូបមន្តសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

ឧទាហរណ៍ 1: ដោះស្រាយសមីការ $4 - \cos 2x - 7 \sin x = 0$ ។

ដោយ $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ សមីការអាចសរសេរ $2 \sin^2 x - 7 \sin x + 3 = 0$ (1)

តាង $t = \sin x$ ដែលមានលក្ខខណ្ឌ $-1 \leq t \leq 1$ ។

សមីការ (1) អាចសរសេរ $2t^2 - 7t + 3 = 0$, $\Delta = 25$, $t_1 = \frac{1}{2}$, $t_2 = 3$ មិន

ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ

ដូច្នេះ $t_1 = \sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$ យើងបាន $x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x_2 = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\tan^2 \frac{x}{2} - (1 - \sqrt{3})\tan \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ ។

គេតាង $\tan \frac{x}{2} = t$ សមីការ (1) សរសេរ $t^2 - (1 - \sqrt{3})t - \sqrt{3} = 0$

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t_1 = -1$, $t_2 = \sqrt{3}$

$$t_1 = \tan \frac{x}{2} = -1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) , t_2 = \tan \frac{x}{2} = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \tan \frac{x}{2} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) , \frac{x}{2} = -\frac{\pi}{4} + k\pi , x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$\tan \frac{x}{2} = \tan \frac{\pi}{3} , \frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + k\pi , x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi , (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយ : } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ និង } x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi , (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $\frac{\cos x(2 \sin x + 3\sqrt{2}) - 2 \cos^2 x - 1}{1 + \sin 2x} = 1$ ។

ដំណោះស្រាយ លក្ខខណ្ឌ $1 + \sin 2x \neq 0$, $\sin 2x \neq -1$, $2x \neq -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

$$\text{សមីការសរសេរ } \cos x(2 \sin x + 3\sqrt{2}) - 2 \cos^2 x - 1 = 1 + \sin 2x$$

$$2 \sin x \cos x + 3\sqrt{2} \cos x - 2 \cos^2 x - 1 = 1 + \sin 2x , 2 \cos^2 x - 3\sqrt{2} \cos x + 2 = 0$$

$$\text{តាង } t = \cos x \text{ សមីការទៅជា } 2t^2 - 3\sqrt{2}t + 2 = 0 \quad \text{។}$$

$$\text{ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន } t_1 = \sqrt{2} , t_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{។}$$

$$t_1 = \cos x = \sqrt{2} \text{ (មិនយក) } \quad \text{។} \quad t_2 = \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \cos x = \cos \frac{\pi}{4} \text{ នាំឱ្យ } x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi , (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

$$\text{តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើសមីការមានចម្លើយ } x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi , (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

ដោះស្រាយសមីការ

$$\text{ក. } 2 \cos^2 x - 3\sqrt{2} \cos x + 2 = 0$$

$$\text{ខ. } \frac{1}{\sin^2 x} = \cot x + 3$$

$$\text{គ. } 5 \tan^2 y + 5 \tan y = 2(1 + \tan^2 y)$$

$$\text{ឃ. } 8 \sin^2 x - 6 \sin x = 5 \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

$$\text{ក. } \left(x = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) , (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{ខ. } \left(x = \frac{7\pi}{4} + k\pi\right) , (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{គ. } \left(y = \frac{7\pi}{4} + k\pi\right) \text{ ឬ } (y = \alpha + k\pi) , (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{ឃ. } \left(x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi\right) \text{ ឬ } \left(x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right) , (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

2. សមីការដែលមានរាង $a\sin^2 x + b\sin x \cos x + c\cos^2 x = d$ ដែល $a, b, c \neq 0$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការនេះ គេត្រូវចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2 x \neq 0, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ។

គេបានសមីការ $a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ រួចដោះស្រាយតាមសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើ ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយសមីការ $3\sin^2 x + 3\sin x \cos x - 6\cos^2 x = 0$ ។

ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2 x$ សមីការសរសេរ $3\tan^2 x + 3\tan x - 6 = 0$ ។

តាង $t = \tan x$ គេបាន $3t^2 x + 3t - 6 = 0$ សមីការនេះមានឫសពីរគឺ $t_1 = 1, t_2 = -2$ ។

$t_1 = \tan x = 1$ គេបាន $\tan x = \tan \frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

$t_2 = -2$ តាង $\tan \alpha = -2, x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។ សមីការមានចម្លើយ $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$

និង $x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយសមីការ $\frac{\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2}}{1 - \sin x} - \tan^2 x \sin x = \frac{1 + \sin x}{2} + \tan^2 x$ ។

លក្ខខណ្ឌ $\sin x \neq 1, \cos x \neq 0, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ សមីការអាចសរសេរ

$$\frac{\left(\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2}\right)^2 - 2\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}}{1 - \sin x} = \frac{1 + \sin x}{2} + \tan^2 x(1 + \sin x)$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2}\sin^2 x}{1 - \sin x} = (1 + \sin x)\left(\frac{1}{2} + \tan^2 x\right)$$

$$1 - \frac{1}{2}\sin^2 x = (1 - \sin^2 x)\left(\frac{\cos^2 x + 2\sin^2 x}{2\cos^2 x}\right)$$

$$\frac{2 - \sin^2 x}{2} = (1 - \sin^2 x)\frac{(\cos^2 x + \sin^2 x + \sin^2 x)}{2(1 - \sin^2 x)}$$

$$2 - \sin^2 x = 1 + \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}, \sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}) \text{ ជាចម្លើយរបស់សមីការ ។}$$

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $3\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 2$ ។

ដំណោះស្រាយ សមីការសរសេរ $3\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x)$

$$\sin^2 x + 2\sin x \cos x - 2\cos^2 x = 0 \text{ ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង } \cos^2 x \neq 0 \text{ ។}$$

$$\text{គេបាន } \tan^2 x + 2\tan x - 2 = 0, \tan x = 1 \pm \sqrt{3} \text{ ។}$$

$$\text{តាង } \tan \alpha = 1 \pm \sqrt{3}$$

$$\tan x = \tan \alpha, x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 រកតម្លៃ m ដែលនាំឱ្យសមីការ $1 + m \cos x = m^2 - \cos^2 x$ មានឫស ។

ដំណោះស្រាយ តាង $\cos x = t$ ដែល $-1 \leq t \leq 1$ ។

$$\text{គេបាន } t^2 + mt + 1 - m^2 = 0 \quad \text{។ តាង } f(t) = t^2 + mt + 1 - m^2$$

សមីការមានឫសមួយលើចន្លោះ $[-1, 1]$ កាលណា $f(-1) \times f(1) \leq 0$ ។

$$\text{គេបាន } (2 - m - m^2)(2 + m - m^2) \leq 0$$

$$(m^2 + m - 2)(m^2 - m - 2) \leq 0, -2 \leq m \leq -1 \quad \text{ឬ} \quad (1 \leq m \leq 2) \quad (1)$$

សមីការមានឫសពីរលើ $[-1, 1]$ កាលណា

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ f(-1) > 0 \\ f(1) > 0 \\ -1 < \frac{s}{2} < 1 \end{cases} \begin{cases} m^2 - 4(1 - m^2) \geq 0 \\ -m^2 - m + 2 > 0 \\ -m + m + 2 > 0 \\ -1 < -\frac{m}{2} < 1 \end{cases} \begin{cases} m \leq -\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \leq m \\ -2 < m < 1 \\ -1 < m < 2 \\ -2 < m < 2 \end{cases}$$

$$-1 < m \leq -\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5} \leq m \leq 2 \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) នាំឱ្យសមីការមានឫសកាលណា $-2 \leq m \leq -\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ឬ

$$\frac{2\sqrt{5}}{5} \leq m \leq 2 \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ 1

ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $7 \cos^2 x + 6\sqrt{3} \sin x \cos x - \sin^2 x + 2 = 0$

ខ. $2 \cos^2 x + \cot^2 x = \frac{\sin^3 x + 1}{\sin^2 x}$

គ. $\tan^3 x + \tan^2 x - 3 \tan x = 3$

ឃ. $\sin^2 x + 3 \cos^2 x - 2 \sin 2x = 0$ ។

ចម្លើយ

ក. $(x = \alpha + k\pi \text{ ឬ } x = \beta + k\pi), (k \in \mathbb{Z})$

ខ. $(x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ឬ } x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi) \text{ ឬ } (x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi), (k \in \mathbb{Z})$

គ. $(x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k\pi), (k \in \mathbb{Z})$

ឃ. $(x = \frac{\pi}{4} + k\pi), (k \in \mathbb{Z})$

ប្រតិបត្តិ 2

រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $\sin 4x = m \tan x$ មានឫស ។

ចម្លើយ

$$\left(-\frac{1}{2} \leq m \leq 4\right), x \neq k\pi \quad \text{។}$$

3. ប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ
$$\begin{cases} x+y = \frac{\pi}{3} \\ \sin x + \sin y = 1 \end{cases}$$

ប្រើរូបមន្តបំប្លែងពីផលបូកទៅជាផលគុណ គេបានសមីការ

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = 1 \quad \text{ដោយ } x+y = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{គេបាន } 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = 1 \quad \text{។}$$

$$\text{គេមាន } \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{នាំឱ្យ } \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = 1 = \cos 0 \quad \text{គេបាន } \frac{x-y}{2} = 2k\pi \quad \text{ឬ}$$

$$x-y = 4k\pi$$

$$\text{គេបានប្រព័ន្ធ } \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{3} \\ x-y = 4k\pi \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ y = \frac{\pi}{6} - 2k\pi \end{cases}, \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធសមីការមានគូចម្លើយ } \left(x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, y = \frac{\pi}{6} - 2k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ
$$\begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} & (1) \\ \tan x + \tan y = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} & (2) \end{cases}$$

$$\text{លក្ខខណ្ឌ } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, y \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។ ដោយ } \tan y = \cot x \quad \text{តាមមុំបំពេញ}$$

$$\text{គេបាន } \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} & (1) \\ \tan x + \tan y = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} & (2) \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} \\ \tan^2 x - \left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \tan x + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{សមីការ } \tan^2 x - \left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \tan x + 1 = 0 \quad \text{មានឫសពីរគឺ } t_1 = \sqrt{3}, t_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ គេបាន } \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} \\ \tan x = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} \\ \tan x = \frac{\sqrt{3}}{3} = \tan \frac{\pi}{6} \end{cases},$$

$$\begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases},$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ y = \frac{\pi}{6} - k\pi \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ y = \frac{\pi}{3} - k\pi \end{cases}, \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{ជាចម្លើយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការ ។}$$

លំហាត់គំរូ

រកតម្លៃ m ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានចូល

$$\begin{cases} x - y = m \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} 2(\cos 2x + \cos 2y) - 1 - 4\cos^2 m = 0 \end{cases} \quad (2)$$

ដំណោះស្រាយ គេបានសមីការ (2) សរសេរ : $4\cos(x+y)\cos(y-x) - 1 - 4\cos^2 m = 0$ តាម

(1) ជំនួសចូល

$$\text{គេបាន : } 4\cos^2 m - 4\cos(x+y)\cos m + 1 = 0 ,$$

$$[2\cos m - \cos(x+y)]^2 + \sin^2(x+y) = 0$$

$$\begin{cases} \sin(x+y) = 0 \\ \cos(x+y) = 2\cos m \end{cases} , \begin{cases} x+y = 2k\pi \\ \cos m = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x-y = \pi + 2k\pi \\ \cos m = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

• ចំពោះ $\cos m = \frac{1}{2}$, $m = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ នោះ $\cos(x+y) = 1$ គេបាន

$$\begin{cases} x+y = 2k\pi \\ x-y = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} , \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ y = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases} , (k \in \mathbb{Z})$$

• ចំពោះ $\cos m = -\frac{1}{2}$, $m = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ នោះ $\cos(x+y) = -1$ គេបាន

$$\begin{cases} x+y = \pi + 2k\pi \\ x-y = m \end{cases} , \begin{cases} x+y = (2k+1)\pi \\ x-y = m \end{cases} , \begin{cases} x = \frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \\ y = -\frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \end{cases} , (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{ដូច្នេះ : } \bullet m = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ប្រព័ន្ធមានចូល } \begin{cases} x = \frac{m}{2} + k\pi \\ y = -\frac{m}{2} + k\pi \end{cases} , (k \in \mathbb{Z})$$

$$\bullet m = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ប្រព័ន្ធមានចូល } \begin{cases} x = \frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \\ y = -\frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \end{cases} , (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ 1

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\text{ក. } \begin{cases} \cos^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{4} \\ x+y = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

$$\text{ខ. } \begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{4} \\ 3 \tan x = \tan y \end{cases} \text{ ។}$$

ចម្លើយ

$$\text{ក. } x = \frac{\alpha}{2} + \frac{5\pi}{12} + k\pi, y = \frac{5\pi}{12} - \frac{\alpha}{2} - k\pi , (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{ខ. } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, y = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi , (k \in \mathbb{Z})$$

ប្រតិបត្តិ 2

គេឱ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \sin x \cos 2y = m^2 + 1 \\ \cos x \sin 2y = m \end{cases}$ ។

ក. បញ្ជាក់តម្លៃ m ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការមានចូល ដែល m ជាចំនួនគត់
វិជ្ជមាន ។

ខ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមតម្លៃ m ដែលរកបាននោះ ។

ចម្លើយ

$$\tilde{n}_\cdot \quad (m = 0)$$
$$\mathfrak{Z}. \left(x = \frac{\pi}{2}, y = 0 \right) \quad \mathfrak{C}$$

4. វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

4.1. វិសមីការដែលមានរាង $a \cos x + b \sin x > c$


ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x - \cos x > 0$ ។

គេបាន $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos x\right) > 0$

$$\sqrt{2}\left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos x\right) > 0$$

$$\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0 \quad \text{¶}$$

$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$ ត្រូវនឹងចុងផ្ចូននៅលើកន្លះរង្វង់ដែលមិនឆ្លុះ ។



ដូច្នេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $2k\pi < x - \frac{\pi}{4} < \pi + 2k\pi$ ឬ $\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$,

$$(k \in \mathbb{Z}) \quad \mathfrak{q}$$

សម្គាល់ : បើសិនមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 2 គេត្រូវ
ដោះស្រាយរកសំណុំចម្លើយដោយសិក្សាសញ្ញា ។

ឧទាហរណ៍ 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq \frac{5}{2}$

គេមាន $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq \frac{5}{2}$, $\sin x + \frac{1}{\sin x} - \frac{5}{2} \geq 0$

$$\frac{2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2}{2 \sin x} \geq 0$$

$$\frac{(\sin x - 2)(2 \sin x - 1)}{2 \sin x} \geq 0 \quad \text{ដោយ } \sin x - 2 < 0 \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } (x \in \mathbb{R})$$


គេបាន $\frac{2 \sin x - 1}{2 \sin x} \leq 0$ (1)

វិសមីការមានចម្លើយលុះត្រាតែ $\sin x \neq 0$ ឬ $x \neq k\pi$ ។

តាង $\sin x = X$ ដែល $-1 \leq X \leq 1$ វិសមីការ (1) ទៅជា $\frac{2X-1}{2X} \leq 0$

សិក្សាសញ្ញាគេបាន

X	-1	0	$\frac{1}{2}$	1
$2X - 1$	$-$	$-$	0	$+$
X	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{2X - 1}{X}$	$+$	$-$	0	$+$



គេបាន $0 < X \leq \frac{1}{2}$, $0 < \sin x \leq \frac{1}{2}$ ត្រូវនឹង $2k\pi < x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

ឬ $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \leq x < \pi + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) ចុងចុងឆ្នើយនៅលើផ្ទៃឆរណីមាត្រ (ខ្សែពេញ) ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយវិសមីការ $2\cos 2x + \sin^2 x \cos x + \sin x \cos^2 x > 2(\sin x + \cos x)$ ។

ដំណោះស្រាយ គេមាន $2\cos 2x + \sin^2 x \cos x + \sin x \cos^2 x > 2(\sin x + \cos x)$

$$2(\cos^2 x - \sin^2 x) + \sin x \cos x (\sin x + \cos x) - 2(\sin x + \cos x) > 0$$

$$(\sin x + \cos x)[2(\cos x - \sin x) + \sin x \cos x - 2] > 0$$

$$\text{តាង } f(x) = (\sin x + \cos x)[2(\cos x - \sin x) + \sin x \cos x - 2]$$

ដោយ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប 2π នោះគេអាចសិក្សាវិសមីការក្នុង

ចន្លោះ $(0, 2\pi)$ ។

$$\text{គេបាន } f(x) = 0, \cos x + \sin x = 0 \quad (1) \quad \text{ឬ}$$

$$2(\cos x - \sin x) + \sin x \cos x - 2 = 0 \quad (2)$$

$$(1) \quad \tan x = -1, \left(x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4}\right) \quad \text{។}$$

$$(2) \quad \text{តាង } t = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{ដែល } -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$$

$$t^2 = 1 - 2\sin x \cos x, \sin x \cos x = \frac{1 - t^2}{2}$$


$$(2) \quad \text{អាចសរសេរ } 2t + \frac{1 - t^2}{2} - 2 = 0 \quad \text{ឬ } t^2 - 4t + 3 = 0$$

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t = 1, t = 3$ (មិនយក)

$$t = 1, \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1, \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4} \quad \text{។}$$

$$\text{គេបាន } x = 0, x = \frac{3\pi}{2} \quad \text{។}$$

គេបានសញ្ញាដូចខាងក្រោម ៖



ដូច្នេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ឬ

$$\frac{7\pi}{4} + 2k\pi < x < 2\pi + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$

ដំណោះស្រាយ គេមាន $\frac{3}{2} - (\cos A + \cos B + \cos C) = \frac{1}{2}[3 - 2(\cos A + \cos B + \cos C)]$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - 4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} + 2 - 2\cos C\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - 4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} + 2(1 - \cos C)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - 4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} + 4\sin^2\frac{C}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - 4\sin\frac{C}{2}\cos\frac{A-B}{2} + 4\sin^2\frac{C}{2}\right]$$

$$\text{ព្រោះ } \cos\frac{A+B}{2} = \sin\frac{C}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(2\sin\frac{C}{2} - \cos\frac{A-B}{2}\right)^2 + 1 - \cos^2\frac{A-B}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(2\sin\frac{C}{2} - \cos\frac{A-B}{2}\right)^2 + 1 - \sin^2\frac{A-B}{2}\right] \geq 0$$

ដូច្នេះ $\frac{3}{2} \geq \cos A + \cos B + \cos C$ ឬ $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1

ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin x + \cos x > \cos\frac{\pi}{4}$

ខ. $\frac{2\cos x - 5\sin x}{\cos x} > 0$

គ. $\frac{\cos x}{1 - 3\cos x} < \frac{1 - \cos x}{1 - 9\cos^2 x}$

ឃ. $2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{3}\cos 2x > 0$ ។

ចម្លើយ

ក. $\left(-\frac{\pi}{12} + 2k\pi < x < \frac{7\pi}{12} + 2k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

ខ. $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \alpha + k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

គ. $(-\alpha + 2k\pi < x < \alpha + 2k\pi), \quad (k \in \mathbb{Z})$

ឃ. $\left(\frac{3\pi}{4} + k\pi < x < \frac{7\pi}{4} + k\pi\right), \quad (k \in \mathbb{Z})$

ប្រតិបត្តិ 2

បង្ហាញថាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C \leq \frac{9}{4}$ ។

លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \cos 3x$

ខ. $\sin 3x + 2 \cos x - 2 = 0$

គ. $\sin 2x + \tan x = 2$

ឃ. $\sin 5x + \cos 5x = \sqrt{2} \cos 13x$

ង. $6 \sin x - 2 \cos^3 x = 5 \sin 2x \cos x$

ច. $\sqrt{5 \cos x - \cos 2x} + 2 \sin x = 0$ ។

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $1 + \cot 2x = \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 2x}$

ខ. $\cos^6 x + \sin^6 x = \frac{7}{16}$

គ. $(1 - \tan x)(1 + \sin 2x) = 1 + \tan x$

ឃ. $3 \sin 3x - \sqrt{3} \cos 9x = 1 + 4 \sin^3 3x$

ង. $1 + 3 \cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2 \sin x \sin 2x$

ច. $\cos^4 x + \sin^6 x = \cos 2x$ ។

3. គេឱ្យសមីការ $\cos 2x - (2m + 1) \cos x + m + 1 = 0$ (1) ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (1) កាលណា $m = \frac{3}{2}$ ។

ខ. រកតម្លៃ m ដែលធ្វើឱ្យសមីការមានចូល x នៅចន្លោះ $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ ។

4. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក.
$$\begin{cases} \sin(x+y) = \frac{1}{2} \\ \cos(x-y) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

ខ.
$$\begin{cases} \sin x + \sin y = \sqrt{2} \\ \cos x + \sin y = \sqrt{2} \end{cases}$$

គ.
$$\begin{cases} \sin(x+y) = \cos(x-y) \\ \tan x - \tan y = 1 \end{cases}$$
 ។

5. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) < \cos^2 \frac{x}{2}$

ខ. $6 \sin^2 x - \sin x \cos x - \cos^2 x > 2$

គ. $\frac{\cos x}{1 + 2 \cos x} > \frac{1 - \cos x}{1 - 2 \cos x}$

ឃ. $\frac{1 - \sin x}{1 - 3 \sin x} < \frac{1 + \sin x}{1 - 9 \sin^2 x}$ ។

6. បង្ហាញថា ក. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha \geq \frac{1}{2}$ ខ. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha \geq \frac{1}{4}$ គ. $\sin^8 \alpha + \cos^8 \alpha \geq \frac{1}{8}$ ។

7. បង្ហាញថាក្នុង $\triangle ABC$ គេបាន ៖ $\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

8. បង្ហាញថាក្នុង $\triangle ABC$ ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\tan A \tan B \tan^2 \frac{C}{2} = 1$ ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

9. ក. នៅពេលដែល $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$ ហើយ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ រកតម្លៃ $\sin \theta + \cos \theta$

ខ. នៅពេលដែល $\sin \alpha + \sin \beta = \sqrt{3}$, $\cos \alpha + \cos \beta = 1$ ហើយ $0^\circ < \alpha \leq \beta < 180^\circ$

រកតម្លៃ α និង β

គ. នៅពេលដែល $\sin \theta + \cos \theta = \frac{17}{13}$ ហើយ $45^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ រកតម្លៃ $\sin \theta$, $\cos \theta$ និង $\tan \theta$ ។

- 154

មេរៀនសង្ខេប

1. រូបមន្តផលបូកនិងផលដក

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta, \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \sin\beta \cos\alpha, \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \sin\beta \cos\alpha$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \tan\beta}, \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \tan\beta} \quad \text{។}$$

2. រូបមន្តមុំឌុប

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cos\alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

3. រូបមន្តកន្លះមុំ

$$\sin \frac{\alpha}{2} = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos\alpha}{2}, \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha}, \quad \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{2},$$

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha} \quad \text{បើ} \quad \tan \frac{\alpha}{2} = t$$

$$\text{គេបាន} \quad \cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan\alpha = \frac{2t}{1-t^2} \quad \text{។}$$

4. រូបមន្តបំប្លែង

$$\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \quad \cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \quad \sin\beta \cos\alpha = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \quad \text{។}$$

5. បំប្លែងពីផលបូកទៅផលគុណ

$$\cos p + \cos q = 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

$$\sin p + \sin q = 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p - \sin q = 2\sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$$

$$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q},$$

$$\cot p + \cot q = \frac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q}$$

$$\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{2},$$

$$\cot p - \cot q = \frac{\sin(p-q)}{\sin p \sin q} \quad \text{។}$$

6. អនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

បើ $a = f(b)$ នោះអនុគមន៍ប្រាសគឺ $b = f^{-1}(a)$

- $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x), \quad x \in [-1, 1]$

- $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x), \quad x \in [-1, 1]$

- $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}(x), \quad x \in \mathbb{R}$

- $\sin^{-1}(\sin x) = x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

- $\cos^{-1}(\cos x) = x, x \in [0, \pi]$

- $\sin(\sin^{-1} x) = x, x \in [-1, 1]$

- $\cos(\cos^{-1} x) = x, x \in [-1, 1]$ ។

7. សមីការ $\cos x = \cos \alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ និង $x = -\alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

$\cos u(x) = \cos v(x) \Leftrightarrow u(x) = \pm v(x) + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

8. សមីការ $\sin x = \sin \alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ និង $x = \pi - \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\sin u(x) = \cos v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + 2k\pi$ និង $u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

9. សមីការ $\tan x = \tan \alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\tan u(x) = \tan v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

10. សមីការ $\cot x = \cot \alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\cot u(x) = \cot v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

11. វិសមីការ $\sin x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\pi - \alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\sin x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq \pi - \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\cos x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\cos x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\tan x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \alpha + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$\tan x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ។

12. ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ $a \cos x + b \sin x = c$ គេមានពីរបៀប ៖

បំប្លែងសមីការនេះជា $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2 + b^2}, (r \geq 0)$ និង

$\cos \theta = \frac{a}{r}, \sin \theta = \frac{b}{r}$ រួចដោះស្រាយសមីការ $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ តាមរូបមន្ត

$\cos x = \cos \alpha$ ។

13. គណនា $\sin x$ និង $\cos x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\tan \frac{x}{2} (x \neq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z})$ ។

គេជំនួស $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ និង $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ នោះសមីការ $a \cos x + b \sin x = c$

ទៅជា សមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមាន t ជាអញ្ញាត : $(c+a)t^2 - 2bt + c-a = 0$ ។

រកបូសសមីការដឺក្រេទី 2 រួចដោះស្រាយសមីការតាមរូបមន្ត $\tan \frac{x}{2} = \tan \alpha$ ។

14. ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ : $a \cos^2 x + b \cos x + c = 0$, $a \sin^2 x + b \sin x + c = 0$,

$a \tan^2 x + b \tan x + c = 0$ និង $a \cot^2 x + b \cot x + c = 0$ គេត្រូវ :

- បំប្លែងសមីការឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើសិន
- តាងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x ដោយ X ឬ Y ឬ $t \dots$
- ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅតាមអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលឱ្យ
- ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមានអញ្ញាត X ឬ Y ឬ $t \dots$
- យកបូសដែលបានមកជំនួសជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រវិញ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ហើយដោះស្រាយតាមរូបមន្តសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

15. ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានទម្រង់ $a \cos x + b \sin x < c$ ឬ $a \cos x + b \sin x > c, \dots$

គេត្រូវ :

- បំប្លែងអង្គទី 1 នៃវិសមីការឱ្យមានរាង $\cos(x-\theta)$ ឬ $\sin(x-\theta)$
- ដោះស្រាយវិសមីការ $\cos(x-\theta) > \cos \alpha$ ឬ $\sin(x-\theta) < \sin \alpha, \dots$

តាមរបៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cos x > a$ ឬ $\sin x < a$ ។

បើវិសមីការដែលមានទម្រង់ជាកន្សោមប្រភាគ ឬវិសមីការដឺក្រេទី 2 គេត្រូវ

ដោះស្រាយរកសំណុំបូសដោយសិក្សាសញ្ញា ។


លំហាត់ជំពូក 3

1. អង្កត់ធ្នូ AB ចែករង្វង់មួយដែលមានកាំស្មើនឹង 2 cm ជាពីរអង្កត់។ គេដឹងថា AB ស្អាត់ធ្នូដែលមានមុំផ្ចិត $= 60^\circ$ ។ គណនា

ក. ក្រឡាផ្ទៃចម្រៀកថាស AOB ។

ខ. ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ AOB ។

គ. ក្រឡាផ្ទៃអង្កត់ថាសតូច (ផ្នែកតូច)



2. គណនា ក. $\sin 960^\circ$

ខ. $\cos 1215^\circ$

គ. $\sin 2940^\circ$

ឃ. $\cos \frac{13\pi}{6}$

ង. $\tan -\frac{19}{4}\pi$

ច. $\sin -\frac{17}{3}\pi$ ។

3. គណនា ក. $\sin \theta + \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) + \sin (\theta + \pi) + \left(\theta + \frac{3}{2}\pi \right)$

ខ. $\cos \frac{20}{3}\pi \tan \frac{7}{4}\pi + \sin \frac{5}{2}\pi \cos (-3\pi)$

គ. $\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2\theta \right) + \sin (\pi - 2\theta) + \cos (\pi - \theta)$ ។

4. គេមាន $\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha, \beta, \gamma < \frac{\pi}{2} \right)$ ។ គណនាមុំ $(\alpha + \beta + \gamma)$ ។

5. គេមាន $\alpha = \cos 10^\circ$, $\beta = \cos 50^\circ$, $\gamma = \cos 70^\circ$ ។ គណនា $\alpha - \beta - \gamma$, $\alpha^2 - \beta\gamma$ និង $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ ។

6. បង្ហាញថា

ក. $(1 - \sin A + \cos A)^2 = 2(1 - \sin A)(1 + \cos A)$

ខ. $\cot A + \tan A = \frac{1}{\sin A \cos A}$

គ. $(\tan \theta + \sin \theta)(\tan \theta - \sin \theta) = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$

ឃ. $\left(1 + \frac{1}{\sin \theta} \right)(1 - \sin \theta) = \cos \theta \cot \theta$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $4\cos^2 x - \cos 2x - 4\cos x + 1 = 0$

ខ. $\sin^2 2x - \cos^2 8x = 0.5 \cos 10x$

គ. $1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0$

ឃ. $\sin^4 x + \cos^4 x - \cos 2x + \frac{1}{4}\sin^2 2x - 2 = 0$

ង. $\sin^{2007} x + \cos^{2007} x = 1$

ច. $\tan x = \cot x + 2\cot^2 2x$ ។

8. ក. គេឱ្យ $2\sin A \cos A + (\cos A + \sin A)^2 - (2\cos A + \sin A)^2 = p \sin^2 A + q$

រកតម្លៃនៃចំនួនថេរ p និង q ។

ខ. គេឱ្យ $\sin x \cos x (5 \tan x + 2 \cot x) = a + b \sin^2 x$ ។ រកតម្លៃនៃចំនួនថេរ a និង b ។

9. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ដោយដឹងថា $0 \leq x < 2\pi$

ក. $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \geq -\frac{1}{2}$

ខ. $\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq -1$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\sin^2\theta - \sqrt{2}\cos\theta = 0$

ខ. $2\cos^2\theta + \sqrt{3}\sin\theta + 1 > 0$ ។

11. គេឱ្យ $\triangle ABC$ មានមុំ 3 ជាមុំស្រួច ។

ក. បង្ហាញថា $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

ខ. តាង $T = \tan A + \tan B + \tan C$ ។ បង្ហាញថា $T \geq 3\sqrt{3}$ ។

12. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos 3x + \sqrt{3}\sin x + \cos x = 0$

ខ. $\sin^6 x + \cos^3 x = 2(\sin^6 x + \cos^8 x)$

គ. $\frac{\sin 5x}{5\sin x} = 1$

ឃ. $\sin^2 x + \sin^2 3x = \cos^2 2x + \cos^2 4x$

ង. $\cos^3 x + \frac{3\sqrt{2}}{4}\sin 2x - 2\cos x = 0$ ឬ. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x + \sin 6x = 0$ ។

13. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos^2 x - \cos x + 1 \leq 0$ ក្នុង $[0, \pi]$

ខ. $\frac{2\sin^2 x - \sin x - 1}{\sin x} > 0$ ក្នុង $[0, \pi]$

គ. $\frac{\sin x - \cos x + 1}{\sin x + \cos x - 1} > 0$ ។

14. ក. ពន្លាតកន្សោម $\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 8)(x - 1)$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $2\sin^3 x - 17\sin^2 x + 7\sin x + 8 = 0$ ។

15. គេឱ្យសមីការ $\cos 2x - (2m + 1)\cos x + m + 1 = 0$ (1) ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (1) កាលណា $m = 1$

ខ. រកតម្លៃ m ដែលធ្វើឱ្យសមីការមានចូលនៅចន្លោះ $[0, \pi]$ ។

16. គេមានវិសមីការ (E) : $2\sin^2 x - 5\sin x + 2 > 0$ ។

គេតាង $X = \sin x$ វិសមីការសរសេរ $2X^2 - 5X + 2 > 0$ ។

ក. ដាក់ជាផលគុណកត្តាកន្សោម $2x^2 - 5x + 2$ ។

ខ. បង្ហាញថាវិសមីការ (E) សរសេរជា $2(\sin x - 2)\left(\sin x - \frac{1}{2}\right) > 0$ ។

គ. សិក្សាសញ្ញា $(\sin x - 2)\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)$ នៅលើចន្លោះ $[0, 2\pi]$ ។

ឃ. រកសំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ (E) ។

17. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \begin{cases} \sin x + \sin y = \frac{3}{2} \\ \sin^2 x + \sin^2 y = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\text{ខ. } \begin{cases} \cos^3 x + \cos x + \sin y = 0 \\ \sin^3 x - \sin y + \cos x = 0 \end{cases}$$

$$\text{គ. } \begin{cases} \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \tan y \\ x - y = \frac{\pi}{6} \end{cases} \quad \text{។}$$

18. គេមាន $\triangle ABC$ ដែលមានមុំនិងជ្រុងបំពេញលក្ខខណ្ឌ : $\frac{1 + \cos A}{1 + \cos B} = \frac{2a + c}{2a - c}$ ។

បង្ហាញ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

19. មុំ A, B, C នៃ $\triangle ABC$ មួយមាន $\frac{A+C}{2} = B$ ។

រករង្វាស់មុំនៃត្រីកោណនោះបើគេដឹងថា $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ ។

ជំពូក

4

ម៉ាទ្រីស ដេទែរមីណង់ និងបម្លែងលីនេអែរ



TAKAKAZU SEKI

1

ម៉ាទ្រីស

2

ដេទែរមីណង់

3

បម្លែងលីនេអែរ

អ្នកដែលនាំឱ្យមានបញ្ញត្តិម៉ាទ្រីសមុនគេ គឺ Arthur Cayley (1875 – 1921) ។ តាមពិតរបស់ដេទែរមីណង់បានកើតឡើងមុនម៉ាទ្រីស ហើយមានប្រភពនៅក្នុងចម្លើយទូទៅនៃប្រព័ន្ធសមីការលីនេអែរ ។ ដើមកំណើតនៃដេទែរមីណង់ត្រូវបានសរសេរដោយ Leibniz នៅឆ្នាំ 1678 ស្របពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន TAKA KAZU SEKI បានសម្រេចស្នាដៃដ៏ធំធេងលើនេះក្នុងឆ្នាំ 1680 ។

នៅក្នុងសតវត្សទី 19 Cayley, Jame Sylvester and Ferdinand Frobenius បានសិក្សាទ្រឹស្តីម៉ាទ្រីស និងដេទែរមីណង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ។ ដោយមានការរីកចម្រើនក្នុងពិជគណិតលីនេអែរ ម៉ាទ្រីសត្រូវបានគេយកទៅដោះស្រាយក្នុងការបំប្លែងលីនេអែរ ឬអនុគមន៍លីនេអែរ ហើយក៏ក្លាយជាបញ្ញត្តិសំខាន់ក្នុងទ្រឹស្តីពិជគណិតលីនេអែរ ។

វត្ថុបំណង

1. កំណត់ម៉ាទ្រីស
2. ធ្វើប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីស
3. គណនាម៉ាទ្រីសប្រាសលំដាប់ 2 ។

1. សញ្ញាណនៃម៉ាទ្រីស

1.1. និយមន័យ

ឧទាហរណ៍ : ទូតាំងសៀវភៅមួយមានពីរថ្នាក់ដែលថ្នាក់លើ 1 គេតម្រៀបសៀវភៅបីប្រភេទគឺសៀវភៅគណិតវិទ្យា 13 ក្បាល រូបវិទ្យា 5 ក្បាលនិងគីមីវិទ្យា 7 ក្បាល ។ នៅថ្នាក់ក្រោម 2 មានសៀវភៅគណិតវិទ្យា 8 ក្បាល រូបវិទ្យា 10 ក្បាល និងគីមីវិទ្យា 4 ក្បាល ។

	គណិតវិទ្យា	រូបវិទ្យា	គីមីវិទ្យា
ថ្នាក់លើ	13	5	7
ថ្នាក់ក្រោម	8	10	4

គេអាចបង្ហាញព័ត៌មាននេះដោយសរសេរចំនួននីមួយៗតាមលំដាប់ដោយដាក់ក្នុងតង្កៀបជារាងចតុកោណកែង $\begin{bmatrix} 13 & 5 & 7 \\ 8 & 10 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ការតាងចំនួនដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យបែបនេះហៅថា **ម៉ាទ្រីស** ។ ចំនួននីមួយៗដែលសរសេរនៅក្នុងតង្កៀបហៅថា **ធាតុនៃម៉ាទ្រីស** ។ បើម៉ាទ្រីសមានជួរដេកពីរនិងជួរឈរបី នោះគេថាម៉ាទ្រីសមានលំដាប់ 2×3 ឬមានវិមាត្រ 2×3 ដែល 2 ជាចំនួនជួរដេកត្រូវសរសេរមុននិង 3 ជាចំនួនជួរឈរត្រូវសរសេរក្រោយ ។ គេនិយាយថាម៉ាទ្រីសលំដាប់ 2×3 (អានថា 2 ខ្វែង 3) ។

	ជួរឈរទី1	ជួរឈរទី2	ជួរឈរទី3
ជួរដេកទី1	↓	↓	↓
ជួរដេកទី2	→	→	→
	$\begin{bmatrix} 13 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

ជាទូទៅ

ម៉ាទ្រីសគឺជាការរៀបចំឆ្នួនជាតារាងចតុកោណកែងដាក់ក្នុងតង្រៀប ។ គេកំណត់តារាងម៉ាទ្រីសដោយអក្សរធំ ដូចជា $A, B, C, \dots$ និងធាតុនៃម៉ាទ្រីសតាងដោយអក្សរតូច ។ ម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ $m \times n$ កំណត់សរសេរដូចខាងក្រោម៖

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

មានន័យថា ម៉ាទ្រីស A មាន m ជួរដេកនិងមាន n ជួរឈរ

a_{11} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។

a_{12} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 2 ។

a_{13} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 3 ។

.....

.....

ឧទាហរណ៍ : គេមានម៉ាទ្រីស

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & -6 \\ -1 & 2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \text{ មាន } 3 \text{ ជួរដេក និង } 4 \text{ ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស } A \text{ មានលំដាប់ } 3 \times 4 \text{ ។}$$

$$B = [-4 \ 5 \ 1 \ -2 \ 5] \text{ មាន } 1 \text{ ជួរដេក និង } 5 \text{ ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស } B \text{ មានលំដាប់ } 1 \times 5 \text{ ហៅ}$$

ថា ម៉ាទ្រីសជួរដេក ។

$$C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -8 \end{bmatrix} \text{ មាន } 3 \text{ ជួរដេកនិង } 1 \text{ ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស } C \text{ មានលំដាប់ } 3 \times 1 \text{ ហៅថាម៉ាទ្រីស}$$

ជួរឈរ ។

លំហាត់គំរូ

អ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនបានកត់ត្រាចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីដែលបានរៀនភាសាអង់គ្លេសតាម 4 កម្រិតផ្សេងគ្នា ។ កម្រិត 1 មានសិស្សប្រុស 105 នាក់ ស្រី 63 នាក់ កម្រិត 2 មានប្រុស 132 នាក់ ស្រី 89 នាក់ កម្រិត 3 មានប្រុស 98 នាក់ ស្រី 102 នាក់ កម្រិត 4 មានប្រុស 92 នាក់ ស្រី 90 នាក់ ។ បង្ហាញពីតំលៃមាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់ម៉ាទ្រីស ។

ដំណោះស្រាយ គេអាចបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសបាន 2 របៀបគឺ

	កម្រិត 1	កម្រិត 2	កម្រិត 3	កម្រិត 4
សិស្សប្រុស →	105	132	98	92
សិស្សស្រី →	63	89	102	90

មានលំដាប់ 2×4

	សិស្សប្រុស	សិស្សស្រី
កម្រិត 1	105	63
កម្រិត 2	132	89
កម្រិត 3	98	102
កម្រិត 4	92	90

មានលំដាប់ 4×2

ប្រតិបត្តិ

ក្នុងការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យាមានសិស្ស 10 នាក់បានពិន្ទុល្អ 20 នាក់បានពិន្ទុមធ្យម និង 12 បានពិន្ទុខ្សោយ ។ បង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីសនេះ ។

ចម្លើយ

$[10 \ 20 \ 12]$ លំដាប់ 1×3 , $\begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix}$ លំដាប់ 3×1 ។

1.2. ប្រភេទនៃម៉ាទ្រីស

1.2.1. ម៉ាទ្រីសសូន្យ

ម៉ាទ្រីសដែលមានធាតុទាំងអស់ស្មើនឹងសូន្យ នោះហៅថា ម៉ាទ្រីសសូន្យតាងដោយ O ។

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad O = [0 \ 0], \quad O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

លំដាប់ 2×2

លំដាប់ 1×2

លំដាប់ 3×1

លំដាប់ 3×5

1.2.2. ម៉ាទ្រីសការេ

ឧទាហរណ៍ :

គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ មាន 2 ជួរដេក និង 2 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស A ជាម៉ាទ្រីសការេ

លំដាប់ 2 ។

$B = \begin{bmatrix} 5 & 10 & -9 \\ -7 & 0 & 2 \\ 3 & -8 & 13 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេកនិង 3 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស B ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 3 ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសការេ ជាម៉ាទ្រីសមានចំនួនជួរដេកស្មើនឹងចំនួនជួរឈរ ដោយ

$$A_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ ហៅថាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ } n \text{ ។}$$

ដែល $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ ជាធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស ។

1.2.3. ម៉ាទ្រីសឯកតា

ម៉ាទ្រីសការេដែលធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស $a_{11} = a_{22} = a_{33} = \dots = a_{nn} = 1$ ហើយធាតុផ្សេងទៀតស្មើនឹងសូន្យ ហៅថាម៉ាទ្រីសឯកតាតាងដោយ I ដែល

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

1. សរសេរម៉ាទ្រីសការេ 4×4
2. ម៉ាទ្រីសសូន្យ 2×3 និងម៉ាទ្រីសសូន្យ 1×2

ចម្លើយ

1. $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 7 & 3 \\ 5 & 6 & 8 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
 4×4
2. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $2 \times 3 \quad 1 \times 2$

2. ប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីស

2.1. ម៉ាទ្រីសស្មើគ្នា

ឧទាហរណ៍ : គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 23 & 0 \\ 12 & -5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$ មានលំដាប់ 2×3

ដូចគ្នា ។ បើ $b_{11} = 3$, $b_{12} = 23$, $b_{13} = 0$, $b_{21} = 12$, $b_{22} = -5$, $b_{23} = 6$ នោះគេថាម៉ាទ្រីស A ស្មើនឹង B ។ គេសរសេរ $A = B$ ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសពីរស្មើគ្នា កាលណាម៉ាទ្រីសទាំងពីរមានលំដាប់ដូចគ្នានិងមានធាតុត្រូវគ្នាស្មើរៀងគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1

រកតម្លៃ a, b, c, n និង m ដើម្បីឱ្យម៉ាទ្រីស $M = N$

$$M = \begin{bmatrix} c & 23 & 0 & 9 \\ 12 & -5 & n & 4 \\ a & 18 & 2 & 32 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 2 & 23 & m & 9 \\ 12 & b & 6 & 4 \\ 15 & 18 & 2 & 32 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ

ម៉ាទ្រីស $M = N$ កាលណា $c = 2, m = 0, b = -5, n = 6$ និង $a = 15$ ។

លំហាត់គំរូ 2

តើគូនីមួយៗនៃម៉ាទ្រីសខាងក្រោមនេះអាចស្មើគ្នាឬទេ ? បើស្មើគ្នាតើស្មើក្នុងករណីណា ? ហើយបើមិនស្មើគ្នាព្រោះអ្វី ?

ក. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 12 & d \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 5 & b \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 14 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 41 & 8 & -2 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 12 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & b \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$ បើ $a = 5, b = 0, d = -3$ ។

ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 14 & 8 & -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 41 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ ព្រោះធាតុនៅជួរដេកទី 2 និងជួរឈរទី 1

នៃម៉ាទ្រីសទាំងពីរខុសគ្នា ។

គ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ព្រោះមានលំដាប់ខុសគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ 1

រកតម្លៃ a, b, c និង d បើ $\begin{bmatrix} a & 2b \\ c & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2d & d \\ 4 & 3a \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

$a = 2, b = \frac{-1}{2}, c = 4, d = -1$ ។

ប្រតិបត្តិ 2

រកតម្លៃអថេរចំពោះសមភាពនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ a & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & 3 \\ 5 & c \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} a & 5 & 2 \\ 3 & 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & c & -1 \\ d & 9 & 2 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} a \\ c \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 60 \\ 50 \end{bmatrix}$

ឃ. $\begin{bmatrix} x & y \\ 9 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ c & -2 \\ 3 & d \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

ក. $a = 5, b = -2, c = 4$

ខ. $a = 0, c = 5, d = 3$

គ. $a = 30, b = 50, c = 60$

ឃ. $x = 5, y = -8, c = 9, d = 4$ ។

2.2. វិធីបូកនិច្ចនិកនៃម៉ាទ្រីស

2.2.1. វិធីបូកនៃម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 : តារាងនីមួយៗបង្ហាញពីចំនួនផលិតផល 3 ប្រភេទ M, N និង S ដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនពីរនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនា

ខែកុម្ភៈ	M	N	S
ម៉ាស៊ីនទី 1	30	20	25
ម៉ាស៊ីនទី 2	35	25	23

ខែមីនា	M	N	S
ម៉ាស៊ីនទី 1	35	28	20
ម៉ាស៊ីនទី 2	40	25	30

គេបានម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនា

$$A = \begin{bmatrix} 30 & 20 & 25 \\ 35 & 25 & 23 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 35 & 28 & 20 \\ 40 & 21 & 30 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ចំនួនផលិតផលសរុបទាំងពីរខែចំពោះ

$$\text{ម៉ាស៊ីនទី 1 : } M = 30 + 35 = 65 \quad \text{ម៉ាស៊ីនទី 2 : } M = 35 + 40 = 75$$

$$N = 20 + 28 = 48$$

$$N = 25 + 21 = 46$$

$$S = 25 + 20 = 45$$

$$S = 23 + 30 = 53 \quad \text{។}$$

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលសរុបទាំងពីរខែគឺ

$$C = \begin{bmatrix} 30 + 35 & 20 + 28 & 20 + 25 \\ 35 + 40 & 25 + 21 & 23 + 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 48 & 45 \\ 75 & 46 & 53 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

គេឃើញថាម៉ាទ្រីស C ជាផលបូកនៃម៉ាទ្រីស A និង B

$$\begin{bmatrix} 30 & 20 & 25 \\ 35 & 25 & 23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 35 & 28 & 20 \\ 40 & 21 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 48 & 45 \\ 75 & 46 & 53 \end{bmatrix}$$

គេសរសេរ $A + B = C$ ហើយម៉ាទ្រីស A, B និង C មានលំដាប់ដូចគ្នា ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសពីរអាចបូកគ្នាបានលុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទាំងពីរនោះមានលំដាប់ដូចគ្នា ហើយគេបូកធាតុត្រូវគ្នា រៀងគ្នា ។

លក្ខណៈនៃវិធីបូកម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & 8 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 12 \end{bmatrix}$

និង $E = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ ។

គេបាន

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$B + A = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដូច្នេះ $A + B = B + A$ (វិធីបូកម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈត្រួតព្រប់) ។

$$(C + D) + E = \left\{ \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 12 \end{bmatrix} \right\} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 18 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$C + (D + E) = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 18 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដូច្នេះ $(C + D) + E = C + (D + E)$ (វិធីបូកម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈផ្គុំ) ។

$$A + O = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$O + A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដូច្នេះ $A + O = O + A = A$ (ម៉ាទ្រីសសូន្យជាម៉ាទ្រីសណ្តិតចំពោះវិធីបូក) ។

លក្ខណៈ ក. $A + B = B + A$ (លក្ខណៈត្រួតព្រប់)

ខ. $(C + D) + E = C + (D + E)$ (លក្ខណៈផ្គុំ)

គ. $A + O = O + A$ (លក្ខណៈណ្តិត) ។

2.2.2. វិធីដកនៃម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ : តារាងនេះបង្ហាញពីផលិតផល 3 ប្រភេទដែលត្រូវនាំចូលនិងលក់ចេញរបស់

សាខា 2 ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ។

	ម៉ាញ៉េ	ទូរទស្សន៍	ទូរទឹកកក
សាខាទី 1	1000	500	100
សាខាទី 2	600	300	200

	ម៉ាញ៉េ	ទូរទស្សន៍	ទូរទឹកកក
សាខាទី 1	850	450	80
សាខាទី 2	480	280	150

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលនាំចូលគឺ $A = \begin{bmatrix} 1000 & 500 & 100 \\ 600 & 300 & 200 \end{bmatrix}$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលលក់ចេញគឺ $B = \begin{bmatrix} 850 & 450 & 80 \\ 480 & 280 & 150 \end{bmatrix}$ ។

ផលិតផលដែលនៅសល់ក្រោយពីបានលក់ចេញគឺ

សាខាទី 1 ម៉ាញ៉េ : $1000 - 850 = 150$

សាខាទី 2 : ម៉ាញ៉េ : $600 - 480 = 120$

ទូរទស្សន៍ : $500 - 450 = 50$

ទូរទស្សន៍ : $300 - 280 = 20$

ទូរទឹកកក : $100 - 80 = 20$

ទូរទឹកកក : $200 - 150 = 50$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលដែលនៅសល់ក្នុងសាខាទាំងពីរគឺ

$$C = \begin{bmatrix} 1000 - 850 & 500 - 450 & 100 - 80 \\ 600 - 480 & 300 - 280 & 200 - 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 & 50 & 20 \\ 120 & 20 & 50 \end{bmatrix}$$

$$\text{គេបាន } \begin{bmatrix} 1000 & 500 & 100 \\ 600 & 300 & 200 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 850 & 450 & 80 \\ 480 & 280 & 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000 - 850 & 500 - 450 & 100 - 80 \\ 600 - 480 & 300 - 280 & 200 - 150 \end{bmatrix}$$

គេសរសេរ $A - B = C$ ដែលម៉ាទ្រីស A , B និង C មានលំដាប់ដូចគ្នា ។

ជាទូទៅ

ម៉ាទ្រីសពីរដកគ្នាបាន លុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទាំងពីរមានលំដាប់ដូចគ្នា ហើយគេដកធាតុត្រូវគ្នា រៀងគ្នា ។

លំហាត់គំរូ

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix}$ និង $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ ។

គណនាប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីសខាងក្រោមបើអាច

ក. $A - B$ ខ. $B - C$ គ. គណនាម៉ាទ្រីស X បើ $A + X = B$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $A - B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 & 6 \\ -3 & 4 & 15 \end{bmatrix}$

ខ. $B - C$ មិនអាចធ្វើបាន ព្រោះ B និង C មានលំដាប់ខុសគ្នា

គ. $A + X = B$, $A + X - A = B - A$ ឬ $X + 0 = B - A$

គេបាន $X = B - A = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 7 & -6 \\ 3 & -4 & -15 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -13 & 4 \end{bmatrix}$ ។

គណនា ក. $A + B$ ខ. $B - A$ គ. $B + D$ ឃ. $C + D$ ង. $A - B$ ។

ចម្លើយ

ក. $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 10 \\ 19 & 11 \end{bmatrix}$

ខ. $B - A = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

គ. មិនអាចគណនាបាន

ឃ. $C + D = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$

ង. $A - B = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 5 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ។

2.3. ផលគុណមួយចំនួនពិតនិងម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 : គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ ។

$$\text{គេបាន } A + A = 2A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 3 \\ 2 \times 1 & 2(-5) \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$\begin{aligned} \text{ដូចគ្នាដែលគេបាន } 3A &= A + A + A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 3 & -15 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \times 2 & 3 \times 3 \\ 3 \times 1 & 3(-5) \end{bmatrix} \quad \text{។} \end{aligned}$$

$$\text{បើ } k \text{ ជាចំនួនពិតនោះ } kA = k \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k & 3k \\ k & -5k \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ បើគេមានចំនួនពិត k និងម៉ាទ្រីស A នោះម៉ាទ្រីស kA បានដោយគុណធាតុនីមួយៗនៃម៉ាទ្រីស A នឹងចំនួនពិត k ។ បើ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ នោះ

$$kA = A_k = k \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} k = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, k និង h ជាចំនួនពិត ។

គេបាន

$$\text{ក. } k(A + B) = k \left\{ \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \right\} = k \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix}$$

$$\text{ខ. } kA + kB = k \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4k & k \\ 2k & -3k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k & -k \\ k & 4k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix}$$

$$\text{គ. } (kh)A = kh \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4kh & kh \\ 2kh & -3kh \end{bmatrix}$$

$$\text{ឃ. } k(hA) = k \left\{ h \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \right\} = k \begin{bmatrix} 4h & h \\ 2h & -3h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4kh & kh \\ 2kh & -3kh \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ គេបាន 1. $k(A + B) = kA + kB$ 2. $(kh)A = k(hA)$ ។

លំហាត់គំរូ ម៉ាទ្រីស A បង្ហាញពីប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិងកម្មករជំនាញធ្វើការនៅការដ្ឋានទី 1 និងការដ្ឋានទី 2 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ។ ម៉ាទ្រីស B ជាប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ(គិតជាដុល្លារ) ។

កម្មករ កម្មករជំនាញ

$$A = \begin{bmatrix} 7000 & 13000 \\ 8000 & 14000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ការដ្ឋានទី 1} \\ \text{ការដ្ឋានទី 2} \end{matrix}$$

កម្មករ កម្មករជំនាញ

$$B = \begin{bmatrix} 8000 & 14000 \\ 9000 & 15500 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ការដ្ឋានទី 1} \\ \text{ការដ្ឋានទី 2} \end{matrix}$$

គណនាម៉ាទ្រីស $5A + 2B$ ។ តើម៉ាទ្រីស $5A + 2B$ បង្ហាញពីព័ត៌មានអ្វី ?

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} 5A + 2B &= 5 \begin{bmatrix} 7000 & 13000 \\ 8000 & 14000 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 8000 & 14000 \\ 9000 & 15500 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 35000 & 65000 \\ 40000 & 70000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16000 & 28000 \\ 18000 & 31000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51000 & 93000 \\ 58000 & 101000 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ម៉ាទ្រីសនេះបង្ហាញពីប្រាក់កម្រៃក្នុង 1 អាទិត្យរបស់កម្មករ និងកម្មករជំនាញ ធ្វើការនៅការដ្ឋានទី 1 និងការដ្ឋានទី 2 ។

ប្រតិបត្តិ

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 16 & -4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 9 & -24 \\ -9 & 14 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -13 & 5 \end{bmatrix}$ ។

រកម៉ាទ្រីសខាងក្រោម ៖

ក. $3A + B$

ខ. $B - A + C$

គ. $2C + 5C - 4D$

ឃ. $-A + 3(B - A)$

ង. $2(3C) - 7D$

ច. $-A + 2(D + C)$ ។

ចម្លើយ

ក. $3A + B = \begin{bmatrix} 18 & 39 \\ 39 & 2 \\ 2 & 33 \end{bmatrix}$

ខ. $B - A + C$ មិនអាចគណនាបាន ព្រោះមានលំដាប់ខុសគ្នា

គ. $2C + 5C - 4D = \begin{bmatrix} 8 & -83 \\ 73 & 50 \end{bmatrix}$

ឃ. $-A + 3(B - A) = \begin{bmatrix} 15 & -156 \\ -91 & 58 \\ -33 & -5 \end{bmatrix}$

ង. $2(3C) - 7D = \begin{bmatrix} -11 & -89 \\ 109 & 25 \end{bmatrix}$

ច. $-A + 2(D + C)$ មិនអាចគណនាបាន ។

2.4. វិធីគុណនៃពីរម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 : សុខត្រូវការទិញសៀវភៅ 18 ក្បាល ប៊ិក 12 ដើម និងខ្មៅដៃ 11 ដើម ។
សៅត្រូវការទិញសៀវភៅ 16 ក្បាល ប៊ិក 20 ដើម និងខ្មៅដៃ 10 ដើម ។ គេដឹងថាតូបទី 1 លក់
សៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃ 7 រយរៀល ប៊ិកមួយដើមថ្លៃ 4 រយរៀល និងខ្មៅដៃមួយដើមថ្លៃ 2 រយ
រៀល រីឯតូបទី 2 លក់សៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃ 6 រយរៀល ប៊ិកមួយដើមថ្លៃ 5 រយរៀលនិងខ្មៅដៃមួយ
ដើមថ្លៃ 2 រយរៀល ។ គេចង់ដឹងថ្លៃទិញរបស់ម្នាក់ៗក្នុងករណីដែលគេទិញនៅតូបទី 1 ឬនៅតូប
ទី 2 ។

ដំណោះស្រាយ ថ្លៃទិញរបស់សុខ : នៅតូបទី 1 $= 18(7) + 12(4) + 11(2) = 196$

$$\text{នៅតូបទី 2} = 18(6) + 12(5) + 11(2) = 190$$

$$\text{ថ្លៃទិញរបស់សៅ : នៅតូបទី 1} = 16(7) + 20(4) + 10(2) = 212$$

$$\text{នៅតូបទី 2} = 16(6) + 20(5) + 10(2) = 216 \text{ ។}$$

ដើម្បីងាយសិក្សា គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាម៉ាទ្រីស :

ម៉ាទ្រីសទំនិញ

ម៉ាទ្រីសតម្លៃ ឯកតា

$$\begin{array}{c} \text{សុខ} \\ \text{សៅ} \end{array} \begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{តូបទី 1} \\ \text{តូបទី 2} \end{array} \begin{bmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 6 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{សុខ} \\ \text{សៅ} \end{array} \begin{bmatrix} 18(7) + 12(4) + 11(2) & 18(6) + 12(5) + 11(2) \\ 16(7) + 20(4) + 10(2) & 16(6) + 20(5) + 10(2) \end{bmatrix}$$

ដោយថ្លៃទិញជាផលគុណនៃបរិមាណទំនិញ និងតម្លៃទំនិញក្នុង 1 ឯកតា នោះ

ម៉ាទ្រីសថ្លៃទិញជាផលគុណនៃម៉ាទ្រីសទំនិញនិងម៉ាទ្រីសតម្លៃក្នុង 1 ឯកតា ។

គេសរសេរ :

$$\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18(7) + 12(4) + 11(2) & 18(6) + 12(5) + 11(2) \\ 16(7) + 20(4) + 10(2) & 16(6) + 20(5) + 10(2) \end{bmatrix}$$

បើគេតាង A ជាម៉ាទ្រីស B ជាម៉ាទ្រីសតម្លៃក្នុង 1 ឯកតា និង P ជាម៉ាទ្រីសថ្លៃ

ទំនិញនោះគេបាន $A \times B = P$

សង្ខេប

$18(7) + 12(4) + 11(2)$ ជាធាតុទី 1 នៃម៉ាទ្រីសផលគុណ ទីតាំងបីតនៅត្រង់ជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។ ធាតុនេះជាផលបូករបស់ផលគុណតួនៃជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។

តាមលំនាំនេះ គេមានវិធានក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម៖

$$\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18(7) + 12(4) + 11(2) & \\ & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 18(6) + 12(5) + 11(2) \\ & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ 16(7) + 20(4) + 10(2) & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & 16(6) + 20(5) + 10(2) \end{bmatrix}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \begin{bmatrix} 18 & 12 & 11 \\ 16 & 20 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18(7) + 12(4) + 11(2) & 18(6) + 12(5) + 11(2) \\ 16(7) + 20(4) + 10(2) & 16(6) + 20(5) + 10(2) \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ដូច្នេះ បើម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ 2×3 , B មានលំដាប់ 3×2 នោះលំដាប់នៃផលគុណម៉ាទ្រីសគឺ 2×2

$$\begin{array}{ccccc} A & \times & B & = & P \\ \text{លំដាប់} & 2 \times 3 & 3 \times 2 & & 2 \times 2 \end{array}$$

ស្មើគ្នា

ជាទូទៅ គេអាចគុណម៉ាទ្រីសនឹងម៉ាទ្រីសបាន កាលណាចំនួនជួរឈរនៃម៉ាទ្រីសទី 1 ស្មើនឹងចំនួនជួរដេកនៃម៉ាទ្រីសទី 2 ។

$$\text{លក្ខណៈនៃវិធីគុណ } A \times B = P$$

$$m \times n \quad n \times c \quad m \times c$$

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

និងម៉ាទ្រីស $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

គណនាម៉ាទ្រីស ក. AB, BA ខ. $AB, A(BC)$

គ. $(A+B)C, AC+BC$ ឃ. AI, IA រួចប្រៀបធៀបគូនីមួយៗ ។

ដំណោះស្រាយ ក. $AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 13 \\ 24 & -39 \end{bmatrix}$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 24 & -48 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $AB \neq BA$ (វិធីគុណម៉ាទ្រីសគ្មានលក្ខណៈត្រឡប់ទេ) ។

$$ខ. AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 13 \\ 24 & -39 \end{bmatrix},$$

$$(AB)C = \begin{bmatrix} -8 & 13 \\ 24 & -39 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 68 & -86 \\ -6 & -204 & 258 \end{bmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 0 & -4 \\ 5 & 34 & -45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 68 & -86 \\ -6 & -204 & 258 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $(AB)C = A(BC)$ (វិធីគុណម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈផ្គុំ) ។

$$គ. (A+B)C = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 & -17 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$AC+BC = \begin{bmatrix} 1 & 10 & -13 \\ -3 & -30 & 39 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 0 & -4 \\ 5 & 34 & -45 \end{bmatrix} \text{ ។ ដូច្នេះ}$$

$(A+B)C = AC+BC$ (វិធីគុណម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈបំបែកចំពោះវិធីបូក) ។

$$ឃ. AI = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = A \text{ ។}$$

$$IA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = A \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $AI = IA = A$ (ម៉ាទ្រីសឯកតាជាម៉ាទ្រីសណិតចំពោះវិធីគុណម៉ាទ្រីស) ។

លំហាត់គំរូ 2

សុខមានរថយន្តធំ 7 មធ្យម 2 និងតូច 4 សៅមានរថយន្តធំ 5 មធ្យម 6 និងតូច 3 ។ រថយន្តរបស់អ្នកទាំងពីរបម្រើសេវាដឹកនាំភ្ញៀវទេសចរ ម្តងទៅប្រទេសថៃនិងម្តងទៀតទៅប្រទេសវៀតណាម ។ គេកំណត់តម្លៃដឹកទៅប្រទេសថៃ គឺក្នុងមួយលើក រថយន្តធំ 900\$ មធ្យម 700\$ និងតូច 500\$ រីឯប្រទេសវៀតណាម រថយន្តធំ 600\$ មធ្យម 500\$ និងតូច 400\$ ។ រកម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងថ្លៃដឹកភ្ញៀវក្នុងមួយលើកសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗរបស់សុខនិងសៅ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនរថយន្តតាមប្រភេទរថយន្ត និងម្ចាស់រថយន្ត :

$$\begin{array}{c} \text{ធំ មធ្យម តូច} \\ \text{សុខ} \begin{bmatrix} 7 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ \text{សៅ} \begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \end{array} \quad \text{ឬ} \quad \begin{array}{c} \text{សុខ} \text{ សៅ} \\ \text{ធំ} \begin{bmatrix} 7 & 6 \end{bmatrix} \\ \text{មធ្យម} \begin{bmatrix} 4 & 5 \end{bmatrix} \\ \text{តូច} \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

ម៉ាទ្រីសដែលត្រូវរកជាម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដឹក ដែលសុខនិងសៅ បានទទួលសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗគឺ

$$\begin{array}{l} \text{គេបាន ម៉ាទ្រីសចំនួនរថយន្តតាមប្រភេទ} \times \text{ម៉ាទ្រីសតម្លៃដឹកតាមប្រភេទ} \\ = \text{ម៉ាទ្រីសថ្លៃដឹក} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{ធំ មធ្យម តូច} \\ \text{សុខ} \begin{bmatrix} 7 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ \text{សៅ} \begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{ថៃ រៀតណាម} \\ \text{ធំ} \begin{bmatrix} 900 & 600 \end{bmatrix} \\ \text{មធ្យម} \begin{bmatrix} 700 & 500 \end{bmatrix} \\ \text{តូច} \begin{bmatrix} 500 & 400 \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \text{ថៃ រៀតណាម} \\ \text{សុខ} \begin{bmatrix} 9700 & 6800 \end{bmatrix} \\ \text{សៅ} \begin{bmatrix} 10200 & 7200 \end{bmatrix} \end{array}$$

គេអាចគណនាបានមួយបែបទៀត

$$\begin{array}{c} \text{ថៃ រៀតណាម} \\ \text{រៀតណាម} \begin{bmatrix} 900 & 700 & 500 \\ 600 & 500 & 400 \end{bmatrix} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{ធំ មធ្យម តូច} \\ \text{សុខ} \begin{bmatrix} 7 & 5 \end{bmatrix} \\ \text{សៅ} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \text{សុខ} \text{ សៅ} \\ \text{ថៃ} \begin{bmatrix} 9700 & 10200 \end{bmatrix} \\ \text{រៀតណាម} \begin{bmatrix} 6800 & 7200 \end{bmatrix} \end{array}$$

ម៉ាទ្រីសដែលបានគណនាទាំងពីរបែបនេះអាចឱ្យដឹងថា ថ្លៃដឹករបស់សុខសម្រាប់ប្រទេសថៃ 9700 \$ និងប្រទេសរៀតណាម 6800 \$ ចំណែកឯថ្លៃដឹករបស់សៅប្រទេសថៃ 10200 \$ និងប្រទេសរៀតណាម 7200 \$ ។

ប្រតិបត្តិ 1

សិស្សបីនាក់មានឈ្មោះ A, B និង C ដោះស្រាយលំហាត់ 8 ។ សិស្ស A ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 4 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 1 សំណួរ និងខុស 3 សំណួរ B សិស្សឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 5 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 2 សំណួរ និងខុស 1 សំណួរ រីឯសិស្ស C ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 2 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 4 សំណួរ និងខុស 2 សំណួរ ។ គេសន្មតថា ចម្លើយត្រឹមត្រូវបានពិន្ទុ 3 ត្រូវខ្លះបានពិន្ទុ 1 និងខុសបានពិន្ទុ 0 ។

ក. បង្ហាញចំនួនចម្លើយរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ជាម៉ាទ្រីសនិងពិន្ទុរបស់ចម្លើយជាម៉ាទ្រីស ។

ខ. រកម៉ាទ្រីសពិន្ទុសរុបរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ។

ចម្លើយ

ក. ម៉ាទ្រីសចំនួនចម្លើយ

$$\begin{array}{c} \text{ត្រូវល្អ} \\ \text{ត្រូវខ្លះ} \\ \text{ខុស} \end{array} \quad \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \quad \begin{array}{c} 4 \\ 5 \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 2 \end{array}$$

ម៉ាទ្រីសពិន្ទុ

$$\begin{array}{c} \text{ត្រូវល្អ} \\ \text{ត្រូវខ្លះ} \\ \text{ខុស} \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 0 \end{array} \quad \text{ឬ} \quad \begin{array}{c} \text{ត្រូវល្អ} \\ \text{ត្រូវខ្លះ} \\ \text{ខុស} \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 0 \end{array}$$

ខ. ម៉ាទ្រីសពិន្ទុសរុប

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 17 \\ 10 \end{bmatrix} \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array}$$

$$\text{ឬ } [3 \ 1 \ 0] \neq \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 17 & 10 \end{bmatrix} \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \text{ ពិន្ទុ}$$

ប្រតិបត្តិ 2

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $C = \begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 6 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនា $4D - 3D$ ខ. រកតម្លៃ a និង b បើ $DC = 8C$ ។

ចម្លើយ

ក. $4C - 3D = \begin{bmatrix} -2 & 4a+9 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ ខ. $a = -3$, $b = -2$ ។

3. ម៉ាទ្រីសប្រាស

ឧទាហរណ៍ 1 : គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 2 ។

គណនា AB និង BA ។

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \quad \text{និង} \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

គេសង្កេតឃើញថា $AB = BA = I$ ។ B ហៅថាម៉ាទ្រីសប្រាសនៃម៉ាទ្រីស A ។

គេកំណត់សរសេរ : A^{-1} ជាម៉ាទ្រីសប្រាសនៃម៉ាទ្រីស A ។

$$\text{ដូច្នេះ } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 : គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ និង $M = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ដែល $ad-bc \neq 0$ ។

ក. គណនា AM និង MA ។

ខ. រកម៉ាទ្រីស B បើ $AB = BA = I$ ដែល I ជាម៉ាទ្រីសឯកតាលំដាប់ 2 ។

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ក. } AM = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (ad-bc)I$$

$$MA = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (ad-bc)I$$

$$\text{ខ. បើ } AM = (ad-bc)I \text{ នោះ } I = \frac{1}{ad-bc}AM \quad (ad-bc \neq 0)$$

$$\text{ដោយ } AB = I, \quad AB = \frac{1}{ad-bc}AM$$

$$B = \frac{1}{ad-bc}M = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ។}$$

$$\text{បើ } MA = (ad-bc)I, \quad I = \frac{1}{ad-bc}MA$$

$$\text{ដោយ } BA = I, \quad BA = \frac{1}{ad-bc}MA$$

$$B = \frac{1}{ad-bc}M = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ។}$$

$$\text{ដូច្នេះ បើ } AB = BA = I \text{ នោះ } B = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ។}$$

$$\text{គេថា } \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ជាម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីស } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ជាទូទៅ

• បើម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ដែល $ad-bc \neq 0$ នោះម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃ A គឺ

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ។}$$

• បើ $ad-bc = 0$ នោះ A គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាស់ទេ ។

• បើ A^{-1} ជាម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីស A នោះគេបាន $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ ។

លំហាត់

1. ទិន្នន័យក្នុងតារាងលក់ភេសជ្ជៈមួយបង្ហាញថា នៅថ្ងៃសុក្រគេលក់កាហ្វេបាន 160 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 125 កែវ និងតែបៃតង 210 កែវ ។ នៅថ្ងៃសៅរ៍ គេលក់កាហ្វេបាន 145 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 130 កែវ និងតែបៃតង 275 កែវ និងថ្ងៃអាទិត្យលក់កាហ្វេបាន 120 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 155 កែវ និងតែបៃតង 325 កែវ ។ ចូរបង្ហាញពីតំរូវការនេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីសនេះ ។

2. គណនាម៉ាទ្រីសខាងក្រោម៖

ក. $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 5 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 7 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 13 & 21 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -8 & 9 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$

ឃ. $\begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 16 & -4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ -9 & 14 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 3 & 10 \end{bmatrix} \text{ និង } D = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -13 & 5 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

គណនា : ក. $3A + B$

ខ. $B - A + C$

គ. $2C + 5C - 4D$

ឃ. $-A + 3(B - A)$

ង. $2(3C) - 7D$

ច. $-A + 2(D + C)$ ។

4. គណនា ក. $\begin{bmatrix} 12 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 \end{bmatrix}$ ។

5. គេឱ្យ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b-7 \\ a & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 6 & 3c \end{bmatrix}$ ។ រកតម្លៃ a, b និង c ។

6. គេដឹងថាតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាពីរណ៍មួយសន្លឹកសម្រាប់កូនក្មេង 2000 រៀល មនុស្សចាស់ 5000 រៀល និងជនបរទេស 10000 រៀល ។ ចំនួនសំបុត្រដែលបានលក់នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ មានសង្ខេបក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

	កូនក្មេង	មនុស្សចាស់	ជនបរទេស
ថ្ងៃសៅរ៍	205	160	70
ថ្ងៃអាទិត្យ	310	200	65

ក. តាងតម្លៃសំបុត្រជាម៉ាទ្រីសជួរឈរ C ។

ខ. តាងព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងលើជាម៉ាទ្រីស N ។

គ. គណនាផលគុណ NC ។ តើធាតុរបស់ម៉ាទ្រីស NC តាងឱ្យអ្វី ?

7. គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & k \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -9 & m \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនា A^2 និង A^{-1} ដែលជាម៉ាទ្រីសប្រាស់នៃ A

ខ. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ AB ជាម៉ាទ្រីសឯកតា

គ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យដេទែរមីណង់ A ស្មើនឹងដេទែរមីណង់ C ។

8. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ។ គណនា

ក. AB និង $(AB)^{-1}$

ខ. A^{-1} , B^{-1} , $B^{-1}A^{-1}$

គ. តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាចំពោះ $(AB)^{-1}$ និង $B^{-1}A^{-1}$ ។

9. រកម៉ាទ្រីស X ដែល

ក. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}X = \begin{bmatrix} -11 \\ 9 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}X = 2\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ។

10. រកតម្លៃ p , q , a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\begin{bmatrix} 10 & 3 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ b \end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix} -1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ។

11. ក្នុងសមីការ $M \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ចូរប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស M និងរកម៉ាទ្រីស M ។

រូបបំណង

1. គណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 2 និងលំដាប់ 3
2. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរដោយប្រើដេទែរមីណង់ ។

1. ដេទែរមីណង់លំដាប់ 2

កន្សោម $ad-bc$ ដែលបានពីម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ហៅថា ដេទែរមីណង់លំដាប់ 2 នៃ

ម៉ាទ្រីស A ។ គេកំណត់សរសេរ $\det(A)$ ឬ $|A|$ ឬ $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ។

តម្លៃដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ គឺ $\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$ ។

លំហាត់គំរូ

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $M = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$ និង $P = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនាដេទែរមីណង់និងម៉ាទ្រីសច្រាស់ (បើមាន)នៃម៉ាទ្រីសនីមួយៗ ។

ខ. គណនាម៉ាទ្រីស X បើ $MX = N$

គ. គណនាម៉ាទ្រីស Y បើ $YM = N$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. $|M| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 + 12 = 18$ និង $M^{-1} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$ ។

$|N| = \begin{vmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{vmatrix} = (-4)(10) - 14(10) = -180$ និង

$N^{-1} = -\frac{1}{180} \begin{bmatrix} 10 & -14 \\ -10 & (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{18} & \frac{7}{90} \\ \frac{1}{18} & \frac{1}{45} \end{bmatrix}$

$|P| = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = -12 + 12 = 0$, P គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាស់ទេ ។

ខ. គេមានសមីការម៉ាទ្រីស $MX = N$

បើគេគុណពីខាងឆ្វេងអង្គនីមួយៗនៃសមីការម៉ាទ្រីសនឹង M^{-1} នោះគេបាន

$$M^{-1}MX = M^{-1}N \Rightarrow IX = M^{-1}N \quad (\text{ព្រោះ } MM^{-1} = I)$$

$$\Rightarrow X = M^{-1}N \quad (\text{ព្រោះ } IX = X)$$

$$X = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 18 & 72 \\ 36 & -36 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

គ. គេមានសមីការម៉ាទ្រីស $YM = N$

បើគេគុណពីខាងស្តាំអង្គនីមួយៗនៃសមីការម៉ាទ្រីសនឹង M^{-1} នោះគេបាន

$$YMM^{-1} = NM^{-1} \Rightarrow YI = NM^{-1} \quad (\text{ព្រោះ } NM^{-1} = I)$$

$$\Rightarrow Y = NM^{-1} \quad (\text{ព្រោះ } YI = Y)$$

$$Y = \begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} -68 & 16 \\ -10 & 50 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} -\frac{34}{9} & \frac{8}{9} \\ -\frac{5}{9} & \frac{25}{9} \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

$$\text{គេមានម៉ាទ្រីស } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ និង } B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ក. រកម៉ាទ្រីស X ដែល $AX = B$ ។

ខ. គណនា $(AB)^{-1}$ និង $B^{-1}A^{-1}$ រួចសន្និដ្ឋាន ។

ចម្លើយ

$$\text{ក. } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -8 & 6 \end{bmatrix}$$


$$\text{ខ. } AB = \begin{bmatrix} 17 & -4 \\ 10 & 0 \end{bmatrix}, \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{4} & \frac{17}{40} \end{bmatrix}, \quad B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{4} & \frac{17}{40} \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

2. ដេទែរមីណង់លំដាប់ 3

2.1. គណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមក្បួនរបស់សារុស

$$\text{គេមានដេទែរមីណង់ } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{។}$$

គេអាចយកជួរទី 1 និងទី 2 សរសេររូបនៃមេគុណបន្តបន្ទាប់ពីដេទែរមីណង់




បន្ទាប់មកគេគណនាផលគុណនៃធាតុដែលតាមសញ្ញាព្រួញនីមួយៗ

គេបាន
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - a_3 b_2 c_1 - b_3 c_2 a_1 - c_3 c_2 b_1 \quad ។$$

សម្គាល់ ក្បួនសារុសប្រើបានតែដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តែមួយគត់ ។

ឧទាហរណ៍ គណនាតម្លៃដេទែរមីណង់
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad ។$$



គេបាន

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3 - 40 + 0 - 36 - 0 + 12 = -61 \quad ។$$

2.2. ការគណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមមីនរ

គេមាន
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - a_3 b_2 c_1 - b_3 c_2 a_1 - c_3 c_2 b_1$$

គេអាចសរសេរ

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (a_1 b_2 c_3 - a_1 c_2 b_3) - (b_1 a_2 c_3 - b_1 c_2 a_3) + (c_1 a_2 b_3 - c_1 b_2 a_3)$$

$$= a_1 (b_2 c_3 - c_2 b_3) - b_1 (a_2 c_3 - c_2 a_3) + c_1 (a_2 b_3 - b_2 a_3)$$

ដូច្នេះ
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} \quad ។$$

ហៅថាវិធីពន្លាតមីនរតាមជួរដេកទី 1 ព្រោះ a_1, b_1, c_1 ជាធាតុស្ថិតនៅជួរដេកទី 1

$\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ មីនរនៃធាតុ a_1 , $\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$ មីនរនៃធាតុ b_1 , $\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$ មីនរនៃធាតុ c_1 ។

មីនរនៃធាតុ a_1 បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ a_1
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad ។$$

$$\begin{aligned} \text{មិនរំលែកធាតុ } b_1 \text{ បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ } b_1 & \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{។} \\ \text{មិនរំលែកធាតុ } c_1 \text{ បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ } c_1 & \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{។} \end{aligned}$$

ប្រតិបត្តិ

$$\text{គេមានម៉ាទ្រីស } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 13 & -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

ក. គណនាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស A និង B តាមវិធីសាស្ត្រ

ខ. គណនាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស A និង B តាមមិនរំលែក ។

ចម្លើយ

$$|A| = -44, |B| = 57 \quad \text{។}$$

3. ការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរតាមរូបមន្តក្រាម៖

ឧទាហរណ៍ 1 : គេមានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x + b_1y = m_1 \\ a_2x + b_2y = m_2 \end{cases}$ ។

$$\text{គេអាចសរសេរប្រព័ន្ធសមីការនេះជាសមីការ} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

ម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ហៅថា ម៉ាទ្រីសមេគុណ ។

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ជាម៉ាទ្រីសអថេរ} \quad \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} \text{ ជាម៉ាទ្រីសចំនួនថេរ}$$

គេប្រើម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីសមេគុណ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការម៉ាទ្រីសនេះ ។

$$\text{ដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \text{ គឺ } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 \quad \text{។}$$

$$\text{ម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីស} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \text{ គឺ } \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \begin{bmatrix} b_2m_1 & -b_1m_2 \\ -a_2m_1 & a_1m_2 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

គេសង្កេតឃើញថា

$$a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \text{ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីសមេគុណ } \mathbf{A}$$

$$b_2m_1 - b_1m_2 = \begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix} \text{ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស } \begin{bmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{bmatrix} \text{ ដែលធាតុមិនមែនជា}$$

មេគុណនៃ x ។

$$a_1m_2 - a_2m_1 = \begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix} \text{ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស } \begin{bmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{bmatrix} \text{ ដែលធាតុមិនមែនជា}$$

មេគុណនៃ y ។

$$\text{ដូច្នេះ ក្នុងករណីនៃប្រព័ន្ធសមីការ} \begin{cases} a_1x + b_1y = m_1 \\ a_2x + b_2y = m_2 \end{cases} \text{ គឺ } x = \frac{\begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \text{ ។}$$

$$\text{បើគេតាង } D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, D_x = \begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}, D_y = \begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix} \text{ នោះគេបាន } x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D}$$

បើ $D = 0$ និង $D_x \neq 0$ ឬ $(D_y \neq 0)$ នោះប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

បើ $D = 0$ និង $D_x = 0$ (ឬ $D = 0$ និង $D_y = 0$) នោះប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

$$\text{ឧទាហរណ៍ 2 : គេមានប្រព័ន្ធសមីការ} \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = m_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = m_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = m_3 \end{cases}$$

$$\text{គេអាចសរសេរជាសមីការម៉ាទ្រីស} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} \text{ ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ}$$

នេះ ។ តាមលំនាំកំរិតដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេបានចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការមាន

3 អញ្ញាត

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} m_1 & b_1 & c_1 \\ m_2 & b_2 & c_2 \\ m_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & m_1 & c_1 \\ a_2 & m_2 & c_2 \\ a_3 & m_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, z = \frac{D_z}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & m_1 \\ a_2 & b_2 & m_2 \\ a_3 & b_3 & m_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}$$

លំហាត់គំរូ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\text{ក. } \begin{cases} 3x + 7y = -6 \\ 4x - 2y = 26 \end{cases}$$

$$\text{ខ. } \begin{cases} 4x - 5y = 13 \\ -8x + 10y = 18 \end{cases}$$

$$\text{គ. } \begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ -2x + y + 2z = 1 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$$

$$\text{ឃ. } \begin{cases} 2x + 2y + 2z = 0 \\ -2x + 5y + 2z = 1 \\ 8x + y + 4z = -1 \end{cases}$$

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ក. } \begin{cases} 3x + 7y = -6 \\ 4x - 2y = 26 \end{cases} \quad \text{គេបាន } D = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -34$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -6 & 7 \\ 26 & -2 \end{vmatrix} = -170, \quad D_y = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 26 \end{vmatrix} = 102$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-170}{-34} = 5, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{102}{-34} = -3$$

ដូច្នេះ $x = 5, y = -3$ ជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

$$\text{ខ. } \begin{cases} 4x - 5y = 13 \\ -8x + 10y = 18 \end{cases} \quad \text{គេបាន } D = \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -8 & 10 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 13 & -5 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = 170 \neq 0, \quad D_y = \begin{vmatrix} 4 & 13 \\ -8 & 8 \end{vmatrix} = 32 + 104 = 136 \neq 0$$

គេសង្កេតឃើញថា $\frac{4}{-8} = \frac{-5}{10} \neq \frac{13}{18}$ ។ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

$$\text{គ. } \begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ -2x + y + 2z = 1 \\ 4x - y = 3 \end{cases} \quad \text{គេបាន } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 12$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 4, \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -20, \quad D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 20$$

$$\text{គេបាន } x = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{-20}{12} = -\frac{5}{3}, \quad z = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

ដូច្នេះ $x = \frac{1}{3}, y = -\frac{5}{3}, z = \frac{5}{3}$ ជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

$$\text{ឃ. } \begin{cases} 2x + 2y + 2z = 0 \\ -2x + 5y + 2z = 1 \\ 8x + y + 4z = -1 \end{cases} \quad \text{គេបាន } D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 8 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad D_x = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

ប្រព័ន្ធមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។ រកចម្លើយរាប់មិនអស់របស់ប្រព័ន្ធសមីការនេះ :

$$\begin{array}{rcl} & 2x + 2y + 2z = 0 \\ + & -2x + 5y + 2z = 1 \\ \hline & 7y + 4z = 1 \end{array} \quad \text{យើងក } z = l \quad \text{គេបាន } y = \frac{1-4l}{7}, \quad x = -\frac{1+3l}{7}$$

ដូច្នេះចម្លើយរាប់មិនអស់នៃប្រព័ន្ធសមីការគឺ

$$x = \frac{1+3l}{7}, \quad y = \frac{1-4l}{7}, \quad z = l$$

លំហាត់គំរូ 2

គេដឹងថាក្នុងមួយលើករថយន្តរបស់សុខដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃបានថ្លៃដឹក 9700 \$ និងរៀតណាមបាន 6800 \$ រីឯរថយន្តសៅទៅប្រទេសថៃបាន 10200 \$ និងរៀតណាមបាន ។ រថយន្តរបស់អ្នកទាំងពីរដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសនីមួយៗ រាល់លើកដូចគ្នា ដែលនៅពេលដំណាច់ខែ សុខទទួលបានថ្លៃដឹកសរុប 86400 \$ ហើយសៅបាន 98200 \$ ។ តើរថយន្តអ្នកទាំងពីរដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃបាន ប៉ុន្មានលើកនិងរៀតណាមបានប៉ុន្មានលើក ?

ដំណោះស្រាយ

តាង x ជាចំនួនដងនៃការដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃ

y ជាចំនួនដងនៃការដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសរៀតណាម

តាមសម្មតិកម្មគេបានប្រព័ន្ធសមីការ :
$$\begin{cases} 9700x + 6800y = 86400 \\ 10200x + 8200y = 98200 \end{cases} \quad ។$$

តាមវិធីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ គេបាន

$$D = \begin{vmatrix} 9700 & 6800 \\ 10200 & 8200 \end{vmatrix} = 10180000$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 86400 & 6800 \\ 98200 & 8200 \end{vmatrix} = 40720000, \quad D_y = \begin{vmatrix} 9700 & 86400 \\ 10200 & 98200 \end{vmatrix} = 71260000 \quad ។$$

$$\text{ដូច្នេះ } x = \frac{40720000}{10180000} = 4, \quad y = \frac{71260000}{10180000} = 7 \quad ។$$

រថយន្តសុខនិងសៅដឹកភ្ញៀវទៅប្រទេសថៃបាន 4 ដងនិងរៀតណាមបាន 7 ដង ។

ប្រតិបត្តិ 1

គេមានប្រអប់ 2 ដែលប្រអប់នីមួយៗមានតែសន្លឹកក្រដាសប្រាក់ 5 ពាន់រៀល និង 10 ពាន់រៀល ។ គេដឹងថាប្រអប់ទី 1 មានប្រាក់ចំនួន 250 ពាន់រៀល និងប្រអប់ទី 2 មាន 275 ពាន់រៀល ហើយចំនួនសន្លឹក 5 ពាន់ ក្នុងប្រអប់ទី 1 ស្មើនឹងចំនួនសន្លឹក 10 ពាន់ ក្នុងប្រអប់ទី 2 ។ តើក្នុងប្រអប់ទី 1 មានសន្លឹក 5 ពាន់ ប៉ុន្មានសន្លឹក ? 10 ពាន់ ចំនួនប៉ុន្មានសន្លឹក ?

ចម្លើយ

$$x = 20, \quad y = 15 \quad ។$$

ប្រតិបត្តិ 2

វត្ថុបីធ្វើអំពីប្លាទីនុមមាននិងប្រាក់ ។ វត្ថុទី 1 មានម៉ាស់ 62 g ដែលក្នុងនេះមានប្លាទីនុម 1 cm^3 ម៉ាស់ 1 cm^3 និងប្រាក់ 1 cm^3 ។ វត្ថុទី 2 មានម៉ាស់ 83 g ដែលមានប្លាទីនុម 2 cm^3 ម៉ាស់ 2 cm^3 និងប្រាក់ 1 cm^3 ។ វត្ថុទី 3 មានម៉ាស់ 71 g ដែលក្នុងនោះមានប្លាទីនុម 1 cm^3 ម៉ាស់ 2 cm^2 និងប្រាក់ 1 cm^2 ។ កំណត់រកម៉ាស់មាឌរបស់លោហធាតុនីមួយៗគិតជាក្រាមក្នុង 1 cm^2 ។

ចម្លើយ

$$x = 12, \quad y = 9, \quad z = 41 \quad ។$$

លំហាត់

1. គណនាដេទែរមីណង់

ក. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 7 \end{vmatrix}$

ខ. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

គ. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -5 & -1 \\ 4 & 4 & 1 \end{vmatrix}$ ។

2. គណនាដេទែរមីណង់ ដោយប្រើការពន្លាតតាមមីន័រ

ក. $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \end{vmatrix}$

ខ. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{vmatrix}$

គ. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{vmatrix}$ ។

3. បរិមាត្រចតុកោណកែងមួយមានប្រវែង 86 cm ។ គេដឹងថាប្រវែងទទឹង 2 ដងលើសប្រវែងបណ្តោយ 2 cm ។ រកបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងដោយប្រើការដោះស្រាយតាមវិធីក្រាម័រ ។

4. គេលក់ផ្លែពុទ្រា 50 kg ក្នុង 1 kg មានតម្លៃ 3500 រៀល ។ ប៉ុន្តែដោយពុទ្រានេះមានផ្លែធំ និងផ្លែតូច នោះផ្លែតូចគេលក់តែ 3000 រៀលក្នុង 1 kg និងផ្លែធំលក់ថ្លៃ 5000 រៀលក្នុង 1 kg ។ តើផ្លែពុទ្រាធំមានប៉ុន្មានគីឡូក្រាមនិងតូចប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

5. គេដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួនស្មើនឹង 20 ចំនួនទី 1 ស្មើនឹងផលបូកនៃចំនួនទី 2 និងទី 3 ស្មើនឹង 3 ដងចំនួនទី 1 ។ រកចំនួននីមួយៗ

6. បរិមាត្រត្រីកោណមួយមានប្រវែង 18 m ។ គេដឹងថាជ្រុងដែលវែងជាងគេស្មើនឹង 2 ដងជ្រុងដែលខ្លីជាងគេ ។ ជ្រុងមួយទៀតជាមធ្យមនព្វន្ឋនៃជ្រុងដែលវែងជាងគេនិងជ្រុងខ្លីជាងគេ ។ រកប្រវែងជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ ។

7. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} \frac{3}{4}x - y = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 6 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} x + y = -6 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 15 = -6y \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} 2x + 3y + 2z = 14 \\ 4x + 2y - z = 15 \\ x + y + 2z = 8 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} x + 2y - 3z = 10 \\ 4x + y - z = -10 \\ 3x - 7y + 2z = 5 \end{cases}$

ច. $\begin{cases} -2x + y + 3z = 2 \\ x - 7y - 3z = -4 \\ 4x - 2y - 6z = 1 \end{cases}$ ។

វត្ថុបំណង

1. បកស្រាយបំប្លែងលីនេអ៊ែរជាម៉ាទ្រីស
2. កំណត់រូបភាពតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ
3. កំណត់រូបភាពតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់
4. កំណត់រូបភាពតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់ក្នុងត្រីកោណមាត្រ ។

1. ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ

1.1. សញ្ញាណ

យើងធ្លាប់បានរៀនរួចមកហើយនូវបំប្លែងចំណុច មួយចំនួននៅក្នុងប្លង់ ។

ឧទាហរណ៍ : បើគេបំប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅជា $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែង H ដែលមាន

ផ្ចិត O និងផលធៀប 4 នោះគេបានសមីការ $\begin{cases} x' = 4x \\ y' = 4y \end{cases}$

សមីការនៃការបំប្លែងចាំងដែលសរសេរបែបនេះ ហៅថាសមីការដឺក្រេទី 1 ឬហៅថា

សមីការលីនេអ៊ែរ ។

ក្នុងករណីនេះ គេថាបំប្លែងចាំងជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ។

ជាទូទៅ ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបំប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ កំណត់ដោយសមីការ $x' = ax + cy$, $y' = bx + dy$

ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាទៅមុខ គេអាចបកស្រាយបំប្លែងលីនេអ៊ែរឱ្យមានទម្រង់ជាម៉ាទ្រីស

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។ ក្នុងករណីនេះគេថា $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសនៃបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ។

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ A ។

គេអាចគណនា x', y' បានដោយគេគុណម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ រួចផ្ដើមតួម៉ាទ្រីសនៃអង្គ

ទី 1 និងតួម៉ាទ្រីសនៃអង្គទី 2 ។

សម្គាល់ : ដើម្បីសម្រួលក្នុងសំណួរ គេអាចប្រើអក្សរ A ដដែលនេះសម្រាប់សម្គាល់ថា ជាម៉ាទ្រីសផង និងជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរផង ។

ឧទាហរណ៍ 1 : រូបភាពនៃចំណុច $(2, \frac{1}{2})$ តាមការបំប្លែង $A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \times 2 + 1 \times \frac{1}{2} \\ 4 \times 2 + 3 \times \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{19}{2} \end{bmatrix}$$

ដូច្នេះ រូបភាពនៃ $(2, \frac{1}{2})$ គឺ $(-\frac{1}{2}, \frac{19}{2})$ ។

ចំពោះបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលមានម៉ាទ្រីស $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

រូបភាពវាគឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+0 \\ 0+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ។}$$

គេសង្កេតឃើញថា រូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ត្រួតលើភាពដើម $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

គេថា I ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរដដែល ។ មានន័យថាចំណុចដែលប្លែងដោយ I នៅតែជា ចំណុចនោះដដែល ។

ឧទាហរណ៍ 2 : រូបភាពនៃចំណុច $(-\frac{1}{2}, 3)$ តាម $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 3 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $x' = -\frac{1}{2}$, $y' = 3$ ។

លំហាត់គំរូ 1 បង្ហាញថា បើម៉ាទ្រីស A បំប្លែងចំណុច $M \neq 0$ នៅតែជាចំណុច M ដដែល នោះម៉ាទ្រីស $A = I$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសដែលបំប្លែង $M(x, y)$ ទៅ $M(x, y)$ ដដែល

$$\text{យើងបាន } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ឬ } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy \\ bx + dy \end{bmatrix}$$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} x = ax + cy \\ y = bx + dy \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1, c = 0 \\ b = 0, d = 1 \end{cases}$$

$$\text{ដូច្នេះ } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់ម៉ាទ្រីស A ដែលបំប្លែងពីចំណុច $(1, 2)$ ទៅចំណុច $(8, 1)$ និងបំប្លែងពីចំណុច $(-1, 1)$ ទៅ $(1, 2)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសបំប្លែងពីចំណុច $(1, 2)$ ទៅចំណុច $(8, 1)$

$$\text{នោះយើងបាន } \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{យើងបានសមីការ } \begin{cases} a + 2c = 8 & (1) \\ b + 2d = 1 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{យើងបានសមីការ } \begin{cases} -a + c = 1 & (3) \\ -b + d = 2 & (4) \end{cases}$$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ (1) និង (3) យើងបាន $a = 2, c = 3$ ។

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ (2) និង (4) យើងបាន $b = -1, d = 1$ ។

$$\text{ដូច្នេះ ម៉ាទ្រីសដែលត្រូវរកគឺ } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

1. គេបំប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមម៉ាទ្រីស A ដែល

$$x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha, \quad y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \text{ ។ កំណត់ម៉ាទ្រីស } A \text{ ។}$$

2. កំណត់ α ដើម្បីឱ្យចំណុច M' ត្រួតលើ M ។

ចម្លើយ

$$1. A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$2. \alpha = 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ ។}$$

1.2. ចំណុចឥតប្រែប្រួល

ឧទាហរណ៍ : កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $P(3, 2)$ និង $Q(5, 2)$ ដែលបំប្លែងដោយបំប្លែងលីនេអ៊ែរ $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ ។

តាមបម្រាបរូបភាពនៃ P កំណត់ដោយ :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 3 - 5 \times 2 \\ 2 \times 3 - 4 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \text{ដូច្នេះ } P'(-1, -2) \text{ ។}$$

រូបភាពនៃ Q កំណត់ដោយ :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 5 - 5 \times 2 \\ 2 \times 5 - 4 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{ដូច្នេះ } Q'(5, 2) \text{ ។}$$

តាមបំប្លែង A រូបភាពនៃ $P(3, 2)$ គឺ $P'(-1, -2)$ ហើយ $Q(5, 2)$ គឺ $Q'(5, 2)$

នោះគេសង្កេតឃើញថា ចំណុច Q មិនផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅតាម A នោះទេ

ព្រោះរូបភាពរបស់វា Q' នៅតែជាចំណុច Q ដដែល។

ក្នុងករណីនេះ គេថា Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង A ។

ជាទូទៅ Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង A កាលណា $A(Q) = Q$ ។

- ចំពោះបំប្លែងចាំង $H(0, k)$ កំណត់ដោយ $x' = kx$, $y' = ky$ ។
- គល់ O គឺជាចំណុចឥតប្រែប្រួល។ ព្រោះ $O(0, 0)$ ផ្តល់រូបភាព $O(0, 0)$ ដដែល។
- ចំពោះបំប្លែងដែលមានម៉ាទ្រីសឯកតា I គឺ $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។
- គ្រប់ចំណុចនៃប្លង់ដែលប្លែងតាម I នៅតែជាចំណុចខ្លួនឯងដដែល

$$\text{ព្រោះ } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 1 គេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ កំណត់ដោយ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$ ។

កំណត់ចំណុចឥតប្រែប្រួល។

ដំណោះស្រាយ បើ $M(x, y)$ ជាចំណុចឥតប្រែប្រួល លុះត្រាតែ $x' = x$, $y' = y$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2x - y \\ 3x + 4y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y + 3 \\ 3x + 4y - 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{យើងបានប្រព័ន្ធ } \begin{cases} 2x - y + 3 = x \\ 3x + 4y - 3 = y \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x - y = -3 \\ 3x + 3y = 3 \end{cases}$$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ យើងបាន $x = -1$, $y = 2$ ។

ដូច្នេះ ចំណុចឥតប្រែប្រួលគឺ $(-1, 2)$

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ ប្លែងតាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ បានរូបភាពខ្លួនឯង ដដែល ។

ដំណោះស្រាយ យក $M(x, y)$ ប្លែងទៅ $M'(x', y')$ តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ នោះយើងបាន

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

បើ M ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ នោះ M មានកូអរដោនេ $(a, 2a - 1)$ ។

$$\text{ដូច្នេះ } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 2a - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a - 2a + 1 \\ 4a - 2a + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + 1 \\ 2a + 1 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

នោះយើងបាន $x' = a + 1$, $y' = 2a + 1$ ។

ដោយបំបាត់ a យើងបាន $y' = 2x' - 1$ ដែលជារូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ ។

បន្ទាត់ដើម និងរូបភាពវាមានសមីការដូចគ្នាគឺ $y = 2x - 1$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ កំណត់ដោយ

$$\text{ក. } x' = 2y - 3, \quad y' = x + 1$$

$$\text{ខ. } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{កំណត់ចំណុចឥតប្រែប្រួល ។}$$

2. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ប្លែងតាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ បានរូបភាពខ្លួនឯង ដដែល ។

ដដែល ។

3. រកចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ។

4. រកចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមការបំប្លែង $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

$$1. \text{ ក. } \begin{bmatrix} 2y - 3y \\ x \\ y \end{bmatrix}, \quad y = \frac{-2}{3}x$$

$$2. M(-1, 2) \quad \text{។}$$

$$2. \quad y = \frac{1}{4}x + \frac{15}{4}$$

$$3. \quad y = -x$$

$$4. \quad y = -x \quad \text{។}$$

1.3. ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ

ឧទាហរណ៍ : គេបំប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែងចាំបំបែងដែលមាន

ម៉ាទ្រីស $H = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ ដែល $k \neq 0$ ។

គេបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx \\ ky \end{bmatrix}$ នាំឱ្យគេបាន $\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$

គេថា M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែង H ។

ឥឡូវនេះ គេយក M ជារូបភាពនៃ M' វិញ ហើយក្នុងករណីនេះគេត្រូវ

គណនា x, y ជាអនុគមន៍នៃ x' និង y' ។

គេបាន $x = \frac{1}{k}x'$ និង $y = \frac{1}{k}y'$ បកស្រាយសមីការនេះជាម៉ាទ្រីសគឺ

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ នោះគេថា M ជារូបភាពនៃ M' តាមការបំប្លែងចាំបំបែង H ។

គេកំណត់បំប្លែងចាំបំបែងនៃ H ដោយ H^{-1} ដែលមានម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ $H^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសប្រាសនៃ $H = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ គេបំប្លែង $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ នោះ

$M' = A(M)$ ឬ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} x' = ax + cy \\ y' = bx + dy \end{cases}$ ។

ដើម្បីកំណត់បំប្លែងប្រាស A^{-1} ដែលបំប្លែង $M'(x', y')$ ទៅ $M(x, y)$ វិញនោះ គេត្រូវ គណនា (x, y) ជាអនុគមន៍នៃ (x', y') ។

$\begin{cases} ax + cy = x' \\ bx + dy = y' \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} adx + cdy = dx' \\ -bcx - cdy = -cy' \end{cases}$ សមមូល $(ad - bc)x = dx' - cy'$

ក្នុងករណី $ad - bc \neq 0$ នាំឱ្យគេបាន

$x = \frac{1}{ad - bc}(dx' - cy')$, $y = \frac{1}{ad - bc}(-bx' + ay')$

បកស្រាយជាម៉ាទ្រីស គេបាន

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad \text{ឬ} \quad M = A^{-1}(M') \quad \text{។}$$

$$\text{គេថា } A^{-1} \text{ ជាបំប្លែងប្រាស់ដែលមានម៉ាទ្រីសប្រាស់ } A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

ដែល $ad-bc \neq 0$

$$\text{ដូច្នេះ ម៉ាទ្រីសប្រាស់នៃ } A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \text{ គឺ } A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix} \text{ ដែល } ad-bc \neq 0 \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 1 L ជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x+3y-3=0$ ។

$$\text{រកបំលាស់ទីនៃ } L \text{ តាមម៉ាទ្រីស } \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ តាង L' ជាបំលាស់ទីនៃ $L : x+3y-3=0$ តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ដើម្បីកំណត់ L' គេត្រូវរកចំណុច A', B' ដែលជារូបភាពរៀងគ្នារបស់ចំណុច A, B នៃបន្ទាត់ L ហើយបំលាស់ទីនៃ L គឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A', B' ។
គេយក $A(0, 1)$ និង $B(3, 0)$ ជាចំណុចនៃ L នោះគេបានរូបភាពនៃ A'

$$\text{កំណត់ដោយ } \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$


$$\text{នាំឱ្យ } A'(-1, 4) \quad \text{។}$$

$$\text{រូបភាពនៃ } B' \text{ គឺ } \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{នាំឱ្យ } B'(3, 6) \quad \text{។}$$

ដូច្នេះ បន្ទាត់ L' កាត់តាមពីរ

ចំណុច A' និង B' កំណត់ដោយសមីការ : $L' : x-2y+9=0$ ។



ជាទូទៅ ដើម្បីកំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ L គេត្រូវគណនា x, y ជាអនុគមន៍នៃ x', y' រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការ $L : x+3y-3=0$ ។

$$\text{បើ } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ នោះ } A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4x' + y' \\ -2x' + y' \end{bmatrix}$$

$$\text{យើងបាន } x = \frac{4x' + y'}{6}, y = \frac{-2x' + y'}{6}$$

$$\text{ជំនួសក្នុងសមីការបន្ទាត់ } L : \frac{4x' + y'}{6} + 3\left(\frac{-2x' + y'}{6}\right) - 3 = 0 \quad \text{ឬ}$$

$$x' - 2y' + 9 = 0 \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ បន្ទាត់ } L : x + 3y - 3 = 0 \quad \text{ផ្លាស់ទីបន្ទាត់ } L : x - 2y + 9 = 0 \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់រូបភាពនៃរង្វង់ $C : x^2 + y^2 = 4$ តាម $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ។

ដំណោះស្រាយ $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ នោះ $A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}x' \\ \frac{1}{3}y' \end{bmatrix}$$

ជំនួស x, y ក្នុងសមីការរង្វង់


$$\left[\frac{1}{3}x'\right]^2 + \left[\frac{1}{3}y'\right]^2 = 4$$

$$\left[\frac{1}{9}x'^2\right] + \left[\frac{1}{9}y'^2\right] = 4$$

$$x'^2 + y'^2 = 36 \quad \text{។}$$

ដូច្នេះ រូបភាពនៃរង្វង់ $x^2 + y^2 = 4$ គឺជារង្វង់ដែលមានសមីការ

$$x'^2 + y'^2 = 36 \quad \text{។}$$



លំហាត់គំរូ 3 កំណត់រូបភាពនៃសមីការវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ ដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ប្លែងទៅ $\vec{r} = \vec{a}' + \lambda \vec{b}'$ ។

$$\text{ក្នុងករណីនេះកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ } \vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{និង } \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \vec{a}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{និង } \vec{b}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះរូបភាពនៃសមីការវ៉ិចទ័រគឺ } \vec{r} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ

1. កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ក. $y = 2x + 1$

ខ. អ័ក្សអាប់ស៊ីស

គ. $2x + y + 1 = 0$ ។

2. កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ ។

3. កំណត់រូបភាពនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ដែលប្លែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

1. ក. $y' = \frac{11}{5}x' + \frac{2}{5}$

ខ. $y' = 2x'$

គ. $3x' - 3y' - 2 = 0$ ។

2. $y' = \frac{1}{4}(x' + 15)$

3. $P = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ។

2. ការបំប្លែងឆ្លុះ

2.1. ការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស x'

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមការបំប្លែង

ឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស x' នោះគេបាន $HM' = HM$ ហើយ


កូអរដោនេនៃចំណុច $x' = x$, $y' = -y$ ។

M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹង

អ័ក្ស x' គឺ $M \xrightarrow{S_{x'x}} M'$ ។

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x', y') ជា

អនុគមន៍នៃ (x, y) ។



តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស x' គេបាន : $\begin{cases} x' = 1 \cdot x + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + (-1) \cdot y \end{cases}$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីស

ដូចខាងក្រោម ៖

$$S_{x'x} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$


ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស x' ។

ជាទូទៅ

ការបំប្លែងលីនេអ័រឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស x' គឺ $S_{x'x} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

2.2. ការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ នោះគេបាន $HM' = HM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = -x$, $y' = y$ ។



M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $M \xrightarrow{S_{y'y}} M'$ ។ ដូច្នេះគេបានបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$

$$\text{គឺ } \begin{cases} x' = (-1) \cdot x + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + y \end{cases} \quad \text{។}$$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖


$$S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

ជាទូទៅ ការបំប្លែងលីនេអ័រឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

2.3. ការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។ នោះគេបាន $OM' = OM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = -x$, $y' = -y$ ។



M' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ $M \xrightarrow{S_o} M'$ ។ ដូច្នេះគេបានបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់

$$O \text{ គឺ } \begin{cases} x' = (-1) \cdot x + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + (-1) \cdot y \end{cases} \quad \text{។}$$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$S_o : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

ជាទូទៅ

ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះរៀបនឹងគល់ O គឺ $S_0: \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ

ក. បំប្លែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ ។

ខ. បំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y = (x+1)^2$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ដោយ $ax + by + c = 0$ នាំឱ្យ $by = -(ax + c)$ នោះ $y = -\left(\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$

តាងកូអរដោនេ $\left(k, -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b}\right)$ នៅលើបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ នោះគេបាន

បំប្លែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ គឺ

$$S_{y'y}: \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k \\ \frac{a}{b}k + \frac{c}{b} \end{bmatrix}$$

នាំឱ្យ $x' = -k$, $y' = \frac{a}{b}k + \frac{c}{b}$ នោះ $y' = \frac{a}{b}x' - \frac{c}{b}$ គេបាន $-ax + by - c = 0$ ។

ខ. ដោយ $y = (x+1)^2$ នោះ $y = x^2 + 2x + 1$

តាងកូអរដោនេ $(m, m^2 + 2m + 1)$ នៅលើប៉ារ៉ាបូល $y = (x+1)^2$ នោះ

គេបានបំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y = (x+1)^2$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ គឺ ៖

$$S_{x'x}: \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ m^2 + 2m + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -m \\ -m^2 - 2m - 1 \end{bmatrix} \text{ នាំឱ្យ}$$

$x' = -m$, $y' = -m^2 - 2m - 1$ នោះ $y' = -x'^2 - 2x' - 1 = -(x' + 1)^2$ នាំឱ្យ

$y = -(x+1)^2$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. បំប្លែងបន្ទាត់ $2x + 3y - 6 = 0$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ និង $S_{x'x}$ ។

ខ. បំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y = (x-1)^2$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ និង $S_{y'y}$ ។

គ. កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $A(2, 3)$ និង $B(-2, -5)$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{x'x}$,

$S_{y'y}$ និង S_o ។

ចម្លើយ

ក. $2x - 3y + 6 = 0$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះរៀប $y'y$ ។

$2x - 3y - 6 = 0$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះរៀប $x'x$ ។

ខ. $y = -(x-1)^2$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះរៀប $x'x$ ។

$y = -(-x-1)^2$ ជារូបភាពដែលប្លែងតាមការបំប្លែងឆ្លុះរៀប $y'y$ ។

គ.

3. ការបំប្លែងចំងាយ

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមការបំប្លែងចំងាយ H ដែលមានផលធៀប k ដែល $k \neq 0$ នោះគេបានកូអរដោនេ $x' = kx$, $y' = ky$ អាចសរសេរជា
$$\begin{cases} x' = kx + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + ky \end{cases}$$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំប្លែងចំងាយ H នោះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូច្នេះ

$$H(O, k) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$\text{បើ } k = 1 \quad \text{នោះ } H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{បើ } k = -1 \quad \text{នោះ } H = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ ការបំប្លែងចំងាយ H ដែលមានផលធៀប k គឺ $H(O, k) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$

លំហាត់គំរូ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $A(2, 4)$, $B\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ តាមការបំប្លែងចំងាយ $H(O, 2)$ និង $H(O, -1)$ ។

ដំណោះស្រាយ តាមការបំប្លែងចំងាយ $H(O, k)$ គឺ $H(O, k) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$

$$\bullet \text{ ចំណុច } A(2, 4) \text{ គឺ } H(O, 2) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$H(O, -1) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$\bullet \text{ ចំណុច } B\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \text{ គឺ } H(O, 2) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

$$H(O, -1) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ ក. បំប្លែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមការបំប្លែងចំងាយ $H(O, 1)$ និង $H(O, -1)$ ។

ខ. បំប្លែងប៉ារ៉ាបូល $y = x^2$ តាមការបំប្លែងចំងាយ $H(O, 1)$ និង $H(O, -1)$ ។

ចម្លើយ


$$\text{ក. } \begin{bmatrix} k \\ -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -k \\ \frac{a}{b}k + \frac{c}{b} \end{bmatrix} \quad \text{ខ. } \begin{bmatrix} m \\ m^2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -m \\ m^2 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

4. ការបំប្លែងវិល

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, \alpha)$ នោះគេបាន $OM' = OM$, $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \alpha$ ។

គេនឹងបកស្រាយបំប្លែងវិលជាសមីការ ។

ដើម្បីគណនា x', y' ជាអនុគមន៍នៃ x, y គេត្រូវ ដៅ P និង Q ជាចំណោលកែងរៀងគ្នានៃ M មកលើអ័ក្ស ox និង oy ។



បើ M ផ្លាស់ទីមក M' តាមមុំ α នោះ P និង Q ក៏ផ្លាស់ទីរៀងគ្នាមក P' និង Q' តាមមុំ α ដែរ ។ ឥឡូវគេគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច P' និង Q'

តាមរូបបើគេយកកូអរដោនេ

$$P'(x \cos \alpha, x \sin \alpha), \quad Q'(-y \sin \alpha, y \cos \alpha)$$

ចំពោះចតុកោណ $OP'M'Q'$ គេមាន $\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OP'} + \overrightarrow{OQ'}$

$$\overrightarrow{OM'} = x'i + y'j \quad \text{និង} \quad \overrightarrow{OP'} + \overrightarrow{OQ'} = (x \cos \alpha i + x \sin \alpha j) + (-y \sin \alpha i + y \cos \alpha j)$$

$$x'i + y'j = (x \cos \alpha i + x \sin \alpha j) + (-y \sin \alpha i + y \cos \alpha j)$$

$$= (x \cos \alpha - y \sin \alpha)i + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)j \quad \text{។}$$

$$\text{គេទាញបាន : } x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha, \quad y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha$$

ក្នុងករណី $\alpha = 60^\circ$ សមីការទៅជា

$$x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \quad y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \quad \text{។}$$

បំប្លែងវិលបកស្រាយដោយសមីការដឺក្រេទី 1 ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ។

គេអាចបកស្រាយបំប្លែងវិលពីសមីការទៅជាម៉ាទ្រីស


$$x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \quad y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \quad \text{។}$$

$$\text{គេអាចសរសេរជាទម្រង់ម៉ាទ្រីស} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ	ការបំប្លែងវិលនៃមុំ α កំណត់ដោយ	$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$	។
--------	--------------------------------------	---	---

ឧទាហរណ៍ : រូបភាពនៃចំណុច $(-1, 3)$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, 60^\circ)$ កំណត់ដោយ

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{3}-1}{2} \\ \frac{3+\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad \text{។} \end{aligned}$$




• ករណី $\alpha = 180^\circ$ នោះ $\mathcal{H} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = S_o$

កាលណាមុំនៃការបំប្លែងវិលស្មើនឹង 180° នោះ

បំប្លែងវិលជាបំប្លែងឆ្លុះរៀបនឹងគល់ O ។

• ករណី $\alpha = 360^\circ$ នោះ $\mathcal{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$



កាលណាមុំនៃការបំប្លែងវិលស្មើនឹង 360° នោះបំប្លែងវិលជាបំប្លែងដដែលក្នុងករណីនៃរូប

ភាព M' ត្រួតលើធាតុ M ។

• បំប្លែងវិលមានម៉ាទ្រីសច្រាស

$$\mathcal{H}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad \text{ព្រោះដេទែរីណង់វ៉ា} \quad \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $(2, \sqrt{3})$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, 30^\circ)$ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងវិលតាមមុំ 30°

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

រូបភាពនៃចំណុច $(2, \sqrt{3})$ តាម $\mathcal{H}$ កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \\ \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ $D : y = 2x - 1$ តាមការបំប្លែង $\mathcal{H}(O, 45^\circ)$ ។

ដំណោះស្រាយ ម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងវិលតាមមុំ 45°

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

រូបភាពនៃ D តាម $\mathcal{H}$ តាងដោយ D' ដើម្បីកំណត់ D' គេត្រូវជ្រើសរើសយក A និង B នៃបន្ទាត់ D រួចកំណត់រក A' និង B' ។ បន្ទាត់ដែលកាត់តាម A' និង B' គឺជារូបភាពនៃ D ។

ចំណុច $A(1, 1)$ និង $B(2, 3)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការបន្ទាត់ $y = 2x - 1$

នោះរូបភាពនៃ A' និង B' កំណត់ដោយ

$$A' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$B' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{5\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

សមីការបន្ទាត់ D' កំណត់ដោយសមីការ

$$\frac{x-0}{-\frac{\sqrt{2}}{2}-0} = \frac{y-\sqrt{2}}{\frac{5\sqrt{2}}{2}-\sqrt{2}} \quad \text{យើងបានរូបភាពនៃ } D \text{ គឺ } D' : y = -3x + \sqrt{2} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ គេគណនា x, y ជាអនុគមន៍នៃ x', y' រួចជំនួស x, y ក្នុងសមីការ $y = 2x - 1$ ។
គេនឹងបានសមីការ D' ដែលជារូបភាពនៃ D ។

$$\text{បើ } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \mathcal{H} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{នោះ } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathcal{H}^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad \text{ដែល } \mathcal{H}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ជំនួស $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y')$ និង $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x' + y')$ ទៅក្នុងសមីការ $y = 2x - 1$ យើងបាន

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(-x' + y') = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') - 1 \quad \text{យើងបាន } y = -3x' + \sqrt{2} \quad \text{។}$$

ដូច្នេះរូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ តាមការបំប្លែងវិល គឺបន្ទាត់ $y = -3x + \sqrt{2}$ ។


- ប្រតិបត្តិ**
1. កំណត់ចំណុចដែលមានរូបភាព $(-2, 2)$ តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ 120° ។
 2. កំណត់រូបភាពនៃ $y = x$ ដែលវិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ 130° ។

- ចម្លើយ**
1. $\begin{bmatrix} 1 + \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} \end{bmatrix}$
 2. $y = \frac{\cos 130^\circ + \sin 130^\circ}{\cos 130^\circ - \sin 130^\circ} \cdot x$ ។

5. ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរចំនុច

5.1. បណ្តាញនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ

ឧទាហរណ៍ : គេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែងឆ្លុះរៀបនិងអ័ក្ស $y'y$ រួចគេបន្តប្លែងចំណុច $M'(x', y')$ ទៅ $M''(x'', y'')$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 2)$ ។ តើចំណុច M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងអ្វី? M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបន្តបន្ទាប់ $M \xrightarrow{S} M' \xrightarrow{H} M''$ ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x'', y'') ជាអនុគមន៍នៃ (x, y) តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម ៖



តាមការបំប្លែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x' = -x$, $y' = y$ ។

តាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 2)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x'' = 2x'$, $y'' = 2y'$ ។

ជាសរុប យើងបាន $x'' = (-2x)$, $y'' = 2y$

បកស្រាយសមីការជាម៉ាទ្រីស យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ដូច្នេះ M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងដែលមានម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងដែលប្លែងចំណុច M ទៅ M'' កកើតដោយបំប្លែងពីរ ហៅថា **បំប្លែងបណ្តាក់** ។

ជាទូទៅ បើ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}$ ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្លែងចំណុចរៀងគ្នាពី

M ទៅ M' និងពី M' ទៅ M'' យើងបាន

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xrightarrow{A} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \xrightarrow{B} \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} \quad \text{ដែល} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{និង} \quad \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

បំប្លែងលីនេអ៊ែរណ៍បណ្តាក់ដែលប្លែងពី $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ទៅ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ម៉ាទ្រីសបំប្លែងបណ្តាក់ដែលប្លែងពី M ទៅ M' ស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ។

ដើម្បីកំណត់វិធានគណនាផលគុណម៉ាទ្រីស គេត្រូវគណនា x'', y'' ជាអនុគមន៍នៃ x, y

តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម :

$$x' = ax + cy \quad x'' = a'x' + c'y'$$

$$y' = bx + dy \quad y'' = b'x' + d'y'$$

$$\text{នោះ} \quad x'' = (aa' + bc')x + (a'c + c'd)y$$

$$y'' = (ab' + bd')x + (c'b + d'd)y \quad \text{។}$$

$$\text{បកស្រាយជាម៉ាទ្រីស} \quad \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + bc' & a'c + c'd \\ ab' + bd' & c'b + d'd \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{យើងបានវិធានផលគុណនៃម៉ាទ្រីសគឺ :} \quad \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + bc' & a'c + c'd \\ ab' + bd' & c'b + d'd \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ជាទូទៅ បើគេប្លែងចំណុច M ទៅ M'' តាមម៉ាទ្រីសបន្តបន្ទាប់ A និង B

$$\text{នោះ} \quad M'' = BA(M) \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $(2, -1)$ តាមម៉ាទ្រីស BA ដែល

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ តាង $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $(2, -1)$ នោះ

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} &= BA \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \cdot 2 + 2 \cdot 1 & -\frac{1}{2}(-1) + 2 \cdot 0 \\ 4(2) + (-5) & 4(-1) + (-5) \cdot 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 10 \end{bmatrix} \quad \text{។} \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $M'(\frac{3}{2}, 10)$ ជារូបភាពនៃចំណុច $(2, -1)$ តាម BA ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យបំប្លែងពីរ $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $M'(2, 3)$ តាម AB និង BA ។

ដំណោះស្រាយ រូបភាពនៃ $(2, 3)$ តាម AB គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = AB \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34 \\ 29 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

រូបភាពនៃ $(2, 3)$ តាម BA គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 1 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 38 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

យើងឃើញថារូបភាពនៃ $(2, 3)$ តាម AB មិនស្មើគ្នានឹងរូបភាពតាម

BA នោះទេ ។

ប្រតិបត្តិ

កំណត់រូបភាពនៃចំណុច (x, y) តាមការបំប្លែង AA ដែល $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

$$\begin{bmatrix} 4x \\ 4y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

5.2. បណ្តាញរាង H និង H

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, \alpha)$ ហើយ $M''(x'', y'')$ ជារូបភាពនៃ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, \alpha)$ នោះ M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបណ្តាក់ដែលគេកំណត់ខាងក្រោម ៖

M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបន្តបន្ទាប់ $M \xrightarrow{H} M' \xrightarrow{\mathcal{H}} M''$

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x'', y'') ជាអនុគមន៍នៃ (x, y) តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម ៖

តាមការបំប្លែងចាំង $H(O, k)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x' = kx$, $y' = ky$ ។

តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, \alpha)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ។

នាំឱ្យ $x'' = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$, $y'' = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$

ជាសរុប យើងបាន $x'' = k(x \cos \alpha - y \sin \alpha)$, $y'' = k(x \sin \alpha + y \cos \alpha)$

បកស្រាយសមីការជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cos \alpha & -k \sin \alpha \\ k \sin \alpha & k \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ដូចគ្នាដែរបណ្តាក់រវាង H និង $\mathcal{H}$ ។

ជាទូទៅ បើគេប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែងចាំង $H(O, k)$ រួចគេបន្តប្លែងចំណុច $M'(x', y')$ ទៅ $M''(x'', y'')$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{R}(O, \alpha)$ នោះគេបាន M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបណ្តាក់ដែលគេកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

$$\left. \begin{array}{l} H(O, k) : M \rightarrow M' \\ \mathcal{R}(O, \alpha) : M' \rightarrow M'' \end{array} \right\} \text{ នាំឱ្យ } M'' = \mathcal{R}H(M)$$

$$\text{បានន័យថា } \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cos \alpha & -k \sin \alpha \\ k \sin \alpha & k \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

លំហាត់គំរូ គេមានចំណុច $M(2, 1)$ ដែលចំណុច M នេះប្លែងតាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{R}(O, 30^\circ)$ និងបន្តប្លែងតាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 2)$ ។ ចូរកំណត់រូបភាព M តាម $\mathcal{R}H$ ។

ដំណោះស្រាយ រូបភាពនៃ M តាម $\mathcal{R}H$ គឺ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cos \alpha & -k \sin \alpha \\ k \sin \alpha & k \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} - 1 \\ 2 + \sqrt{3} \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យចំណុច $P(2, 5)$, $Q(-3, 4)$ ដែលចំណុច P និង Q នេះប្លែងតាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{R}(O, 60^\circ)$ រួចបន្តប្លែងតាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 2)$ ។ រករូបភាពរបស់ P និង Q តាម $\mathcal{R}H$ ។

ខ. គេមានត្រីកោណ ABC មួយ ដែលកំពូល $A(4, 3)$, $B(2, 1)$ និង $C(6, 3)$ ដែលកំពូល A, B និង C ប្លែងតាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{R}(O, 60^\circ)$ រួចបន្តប្លែងតាមការបំប្លែងចាំង $H(O, 3)$ ។ ចូររករូបភាពនៃកំពូល A, B និង C តាមការបំប្លែង $\mathcal{R}H$ ។

ចម្លើយ ក. រូបភាព P : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 5\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} + 5 \end{bmatrix}$, រូបភាពរបស់ Q : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 - 4\sqrt{3} \\ -3\sqrt{3} + 4 \end{bmatrix}$

ខ. A : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - \frac{9\sqrt{3}}{2} \\ 6\sqrt{3} + \frac{9}{2} \end{bmatrix}$, B : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ 6\sqrt{3} + \frac{9}{2} \end{bmatrix}$, C : $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 - \frac{9\sqrt{3}}{2} \\ 9\sqrt{3} + \frac{9}{2} \end{bmatrix}$ ។

5.3. ការអនុវត្តក្នុងត្រីកោណមាត្រ

នៅមេរៀនត្រីកោណមាត្រ យើងបានបកស្រាយនូវរូបមន្តវិធីបូកកូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \quad ។$$

ឥឡូវនេះ យើងនឹងបកស្រាយរូបមន្តនេះឡើងវិញដោយប្រើបំប្លែងបណ្តាក់នៃការបំប្លែងវិលពីរ ។

គេប្លែង M ទៅ M' តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ a គឺ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

គេបន្តប្លែង M' ទៅ M'' តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ b គឺ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ។

យើងបាន M'' ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងបណ្តាក់នៃការបំប្លែងវិលទាំងពីរ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a \cos b - \sin a \sin b & -\sin a \cos b - \sin b \cos a \\ \sin b \cos a + \sin a \cos b & \cos a \cos b - \sin a \sin b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ម្យ៉ាងវិញទៀត M'' ក៏ជារូបភាពនៃ M តាមការបំប្លែងវិលនៃមុំ $a+b$ ដែរ គឺ ៖

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ផ្ទឹមជួរទី 1 នៃម៉ាទ្រីសទាំងពីរ យើងបាន ៖

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \quad ។$$

លំហាត់គំរូ 1 គេប្លែងចំណុច $(2, 1)$ តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{R}(O, 30^\circ)$ រួចបន្តប្លែងតាម $\mathcal{R}(O, 45^\circ)$ ។ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់វា ។

ដំណោះស្រាយ តាង a និង b ជាមុំដែលងាយរករបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស នោះគេបាន

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a \cos b - \sin a \sin b & -\sin a \cos b - \sin b \cos a \\ \sin b \cos a + \sin a \cos b & \cos a \cos b - \sin a \sin b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \cos 45^\circ - \sin 30^\circ \sin 45^\circ & -\sin 30^\circ \cos 45^\circ - \sin 45^\circ \cos 30^\circ \\ \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ & \cos 30^\circ \cos 45^\circ - \sin 30^\circ \sin 45^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} & \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{4} \\ \frac{3\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 គេប្លែងចំណុច (3, 2) តាមការបំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, 12^\circ)$ រួចបន្តប្លែងតាម

$\mathcal{H}(O, 18^\circ)$ ។ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់វា ។

ដំណោះស្រាយ តាង a និង b ជាមុំដែលលំបាករករបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស នោះគេបាន

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{3}-2}{2} \\ \frac{3+2\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ

កំណត់រូបភាពចុងក្រោយនៃចំណុច (3, 0) ដោយដឹងថា គេប្លែងវាតាមការ

បំប្លែងវិល $\mathcal{H}(O, 60^\circ)$ រួចបន្តប្លែងតាម $\mathcal{H}(O, -45^\circ)$ ។

ចម្លើយ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4}(\sqrt{2}+\sqrt{6}) \\ \frac{3}{4}(\sqrt{6}-\sqrt{2}) \end{bmatrix} \text{ ។}$$

លំហាត់

- តើបំប្លែងនីមួយៗដែលបំប្លែងចំណុច $P(x, y)$ ទៅចំណុច $P'(x', y')$ នៅលើប្លង់មួយដែលបញ្ជាក់ បំប្លែងលីនេអ៊ែរ ឬមិនបំប្លែងលីនេអ៊ែរខាងក្រោម ៖
 - ចំណុច P' គឺជាចំណុចឆ្លុះទៅនឹងចំណុច P ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ $x = 1$ ។
 - ចំណុច P' ជាចំណុចកែងទៅនឹងបន្ទាត់គូសពីចំណុច P ទៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
 - ចំណុច P' ជាចំណុចដែលបានដោយការបំប្លែងចំណុច P តាមវ៉ិចទ័រ $(1, -2)$ ។
 - ចំណុច P' ជាចំណុចដែលបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច P ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស 2 ហើយប្រសព្វទៅនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។
- យក f ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលបំប្លែងពីរចំណុច $(1, 0)$ និង $(0, 1)$ ទៅចំណុច $(-1, 2)$ និង $(3, 1)$ ។
 - រកម៉ាទ្រីសនៃ f ។
 - រកភាពនៃចំណុច $(-3, 2)$ តាម f ។
 - រករូបភាពនៃចំណុច $(5, -3)$ តាមបំប្លែងប្រាស់នៃ f ។
- គេឱ្យបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f ។ រក $f(3\vec{u} - 2\vec{v})$ ចំពោះ $f(\vec{u}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ និង $f(\vec{v}) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ។
- តើរូបអ្វី ដែលប្លង់មួយបំប្លែងតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលបង្ហាញដោយម៉ាទ្រីសខាងក្រោម ៖
 - $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ។
- រករូបធរណីមាត្រដែលបន្ទាត់ $2x - y + 3 = 0$ បំប្លែងតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ $(x, y) \rightarrow (3x - y, -2x + y)$ ។
- រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ដែលបំប្លែងដោយពីរចំណុច $(2, 1)$ និង $(-1, 3)$ ទៅចំណុច $(8, -5)$ និង $(-11, 6)$ រៀងគ្នា ។
- រករូបភាពនៃចំណុច $(-6, 7)$ តាមការបំប្លែងបណ្តាក់ $g \circ f^{-1}$ ដែលឱ្យដោយម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f និង g គឺ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ រៀងគ្នា ។

1. បំប្លែងលីនេអ៊ែរ

បំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបំប្លែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M(x', y')$ កំណត់ដោយសមីការ

$$x' = ax + cy, \quad y' = bx + dy$$

2. ចំណុចឥតប្រែប្រួល

បើ Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលនៅតាមការបំប្លែង A កាលណា $A(Q) = Q$ ។

- ចំពោះបំប្លែងចាំង $H(O, k)$ កំណត់ដោយ $x' = kx, y' = ky$ ។

គល់ O គឺជាចំណុចឥតប្រែប្រួល ព្រោះ $O(0, 0)$ ផ្តល់រូបភាព $O(0, 0)$ ដដែល ។

- ចំពោះបំប្លែងដែលមានម៉ាទ្រីសឯកតា I គឺ $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

- គ្រប់ចំណុចនៃប្លង់ដែលប្លែងតាម I នៅតែជាចំណុចខ្លួនឯងដដែល ។

$$\text{ព្រោះ } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

3. បំប្លែងលីនេអ៊ែរច្រាស់

គេប្លែង $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមការបំប្លែង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ នោះ

$$M' = A(M), \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \begin{matrix} x' = ax + cy \\ y' = bx + dy \end{matrix} \quad \text{។}$$

ម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ គឺ $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ។

4. បំប្លែងលីនេអ៊ែរ

បំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះរៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ $S_{x'x} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះរៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះរៀបនឹងគល់ O គឺ $S_O : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k គឺ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំប្លែងវិលនៃមុំ α កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

- ករណី $\alpha = 180^\circ$ នោះ $\mathcal{R} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = S_o$

កាលណាមុំនៃការបំប្លែងវិលស្មើនឹង 180° នោះ

បំប្លែងវិលជាបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

- ករណី $\alpha = 360^\circ$ នោះ $\mathcal{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

កាលណាមុំនៃការបំប្លែងវិលស្មើនឹង 360° នោះ


បំប្លែងវិលជាបំប្លែងដដែល ក្នុងករណីនេះ

រូបភាព M' ត្រួតលើធាតុ M ។

- បំប្លែងវិលមានម៉ាទ្រីសប្រាស

$$\mathcal{R}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

ព្រោះដេទែមីណង់វា $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ ។



5. បំប្លែងលីនេអ៊ែរណ្តាក់

បើគេប្លែងចំណុច M ទៅ M'' តាមម៉ាទ្រីសបន្តបន្ទាប់ A និង B នោះ $M'' = BA(M)$

6. បណ្តាក់រវាង R និង H

- $\left. \begin{array}{l} \mathcal{R}(O, \alpha) : (M \rightarrow M') \\ H(O, k) : (M' \rightarrow M'') \end{array} \right\} \Rightarrow M'' = H\mathcal{R}(M)$ ។

បានន័យថា
$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cos \alpha & -k \sin \alpha \\ k \sin \alpha & k \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

- $\left. \begin{array}{l} H(O, k) : (M \rightarrow M') \\ \mathcal{R}(O, \alpha) : (M' \rightarrow M'') \end{array} \right\} \text{ នាំឱ្យ } M'' = \mathcal{R}H(M)$ ។

បានន័យថា
$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cos \alpha & -k \sin \alpha \\ k \sin \alpha & k \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

លំហាត់ជំពូក 4

1. គេមានម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \begin{bmatrix} -3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{ខ. } \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 5 \\ 7 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{គ. } \begin{bmatrix} -6 \\ 7 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ឃ. } \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 4 & 7 \\ 11 & 0 & -13 \end{bmatrix} \text{ ចូរកំណត់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស ។}$$

2. គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ -2 & x & 9 \\ \sqrt{16} & x & 9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ចូរកំណត់តម្លៃ x និង y ដើម្បីឱ្យ $A = B$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 8 & -2 \end{bmatrix}$ ។

គណនា ក. $3A - B + 2C$

ខ. $2(A - B + 2C) + 3B - C$ ។

4. រកតម្លៃ p, q, a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖

$$\text{ក. } \begin{bmatrix} 10 & 3 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{ខ. } \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ b \end{bmatrix} \quad \text{គ. } \begin{bmatrix} -1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{។}$$

5. គេឱ្យសមីការម៉ាទ្រីស $M \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ។ ចូរកំណត់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស M និងរកម៉ាទ្រីស M ។

6. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\text{ក. } \begin{cases} 2x - 3y = -4 \\ 2x + 7y = 0 \end{cases} \quad \text{ខ. } \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

$$\text{គ. } \begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ 2x + y - 4z = 3 \\ -3x + 4y - z = -2 \end{cases} \quad \text{ឃ. } \begin{cases} 4x + 2y + 7z = 35 \\ 3x + y + 8z = 25 \\ 5x + 3y + z = 40 \end{cases} \quad \text{។}$$

7. នារីទៅផ្សារទិញសាច់ដើម្បីធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ ។ លើកទី 1 នារីទិញសាច់មាន់ 3 kg ត្រី 1 kg និងសាច់គោ 2 kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 90 ពាន់រៀល លើកទី 2 នារីទិញសាច់មាន់ 2 kg ត្រី 1 kg និងសាច់គោ 3 kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 94 ពាន់រៀល ហើយលើកទី 3 ទិញសាច់មាន់ 3 kg ត្រី 2 kg និងសាច់គោ 1 kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 84 ពាន់រៀល ។ តើសាច់មាន់ ត្រី និងសាច់គោ 1 kg ថ្លៃប៉ុន្មានពាន់រៀល ?

8. រកតម្លៃនៃ x និង y ដែល $x \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^3$ ពិត ។

9. រកតម្លៃ x និង y ដែលម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x & 5 \\ -7 & y \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃខ្លួនវា ។

10. កំណត់តម្លៃនៃចំនួនថេរ k ដែលប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} 2x + 3y = kx \\ 4x + 3y = ky \end{cases}$ មានចម្លើយផ្សេងទៀត
 $x = y = 0$ ។
11. បង្ហាញថា $ps - qr = (ad - bc)(a'd' - b'c')$ បើ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ ។
12. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងចាំងដែលប៉ារ៉ាបូល $y = ax^2$ ប្លែងទៅប៉ារ៉ាបូល $y = x^2$ ។
13. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅលើបន្ទាត់
 $3x + 2y - 1 = 0$ ទៅចំណុច $(-1, 1)$ ។
14. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់លើប្លង់ទៅបន្ទាត់
 $y = 2x$ ។
15. យក L ជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចគល់តម្រុយ ហើយបង្កើតបានមុំ θ ជាមួយអ័ក្ស
 អាប់ស៊ីស ។
 ក. យក P' ជាចំណុចឆ្លុះគ្នាជាមួយចំណុច P ធៀបទៅនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយបំប្លែងវិល
 ជុំវិញគល់តម្រុយតាមមុំ 2θ ។ បង្ហាញថា P' ស៊ីមេទ្រីទៅនឹង P ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ L ។
 ខ. រកម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបង្ហាញពីការឆ្លុះគ្នាធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ L ។
16. គេតាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L គឺ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ។ តើរូបនៃ L ប្លែងតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ
 ដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ គឺជារូបអ្វី?
17. យក $\begin{bmatrix} -2 & a \\ a & 0 \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសនៃការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f ដែល $a \neq 0$ ។
 ក. តើរូបអ្វីដែលអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងអ័ក្សអរដោនេប្លែងតាម f ?
 ខ. បង្ហាញថាមានបន្ទាត់ពីរកាត់តាមគល់តម្រុយដែលមិនប្លែងតាម f ហើយវាប្រសព្វគ្នាបាន
 មុំកែង ។
18. រកតម្លៃនៃ a និង b បើបន្ទាត់ $3x - 4y + 1 = 0$ ប្លែងទៅបន្ទាត់ $3x + 2y - 1 = 0$ តាម
 ការបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 5 \end{bmatrix}$ ។
19. បន្ទាត់ពីរ $x + y = 1$ និង $2x - y = 1$ ប្លែងទៅនីមួយៗផ្សេងទៀតតាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ f ។
 រកម៉ាទ្រីស f ។

20. បើចំណុច P_1 និង P_2 ប្លែងទៅចំណុច P'_1 និង P'_2 តាមការបំប្លែងលីនេអ៊ែរ

$$f: (x, y) \rightarrow ax + by, (cx + dy) \quad \text{ហើយបើ } P_1 P_2 = P'_1 P'_2 \quad \text{ពិតនោះ } a^2 + c^2 = b^2 + d^2 = 1$$

$$\text{និង } ab + cd = 0 \text{ ។}$$

21. យក f ជាបំប្លែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ ។ រកសមីការនៃបន្ទាត់ L_1

និង L_2 បើ L_1 ប្លែងទៅ L_2 តាម f ហើយ L_1 និង L_2 ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច $P(0, 1)$ ។

22. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស $C = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $AC = CA$ និង $BC = CB$ សម្រាប់ម៉ាទ្រីស

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ និង } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាឯកលក្ខណៈភាព } XC = CX \text{ ត្រឹមត្រូវគ្រប់}$$

ម៉ាទ្រីស X ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 ។

23. ចំពោះម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម ៖

ក. គណនា B^2 និង $(BA)^2$

ខ. គណនា ABA និង BA^2BA^2

គ. គណនា BA^nBA^n ។

24. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស A , B និង C ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 បំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$AB^2C = AB = \begin{bmatrix} 4 & -11 \\ -5 & 14 \end{bmatrix} \text{ និង } ACB = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ ។ ចូររកម៉ាទ្រីស } A, B \text{ និង } C \text{ ។}$$

25. នៅពេល $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ចូរគណនា $A^4 - 4A^3 - 6A^2 - 5A - I$ ។

26. ពិនិត្យសំណើខាងលើអំពីម៉ាទ្រីស A ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 ។ ប្រសិនបើសំណើនេះពិត ចូរស្រាយបញ្ជាក់វា ។ ប្រសិនបើវាមិនពិត ចូរបង្ហាញឧទាហរណ៍ប្រាស (counter example) ។

ក. ប្រសិនបើ $A^2 = 0$ នាំឱ្យ $A = 0$

ខ. ប្រសិនបើ $A^3 = 0$ នាំឱ្យ $A^2 = 0$ ។

27. ឧបមាថាចំនួនពិត k និងវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ $\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ បំពេញទំនាក់ទំនង $\begin{bmatrix} 12 & 24 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ចូររកតម្លៃ k និងវ៉ិចទ័រ $\vec{x}$ ។

28. ចំពោះម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម ៖

ក. រកចំនួនពិត a និង b ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $A \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ និង $A \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ខ. គណនា $A^n \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ និង $A^n \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

គ. កំណត់រក A^n ។

29. តាង A ជាម៉ាទ្រីស 2×2 ដែល $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ។ នៅពេលម៉ាទ្រីស P ដែលជាម៉ាទ្រីស 2×2 មាន

ម៉ាទ្រីសប្រាស់និងបំពេញលក្ខខណ្ឌ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ ដែល $\alpha \geq \beta$ ចូរឆ្លើយសំណួរដូចខាង

ក្រោម ៖

ក. រកតម្លៃ α និង β

ខ. រក A^n ដែល n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។

តារាងនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
0°	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	—
1°	0.0175	0.0175	0.9998	0.0175	57.29
2°	0.0349	0.0349	0.9994	0.0349	28.64
3°	0.0524	0.0523	0.9986	0.0524	19.08
4°	0.0698	0.0698	0.9976	0.0699	14.30
5°	0.0873	0.0872	0.9962	0.0875	11.43
6°	0.1047	0.1045	0.9945	0.1051	9.514
7°	0.1222	0.1219	0.9925	0.1228	8.144
8°	0.1396	0.1392	0.9903	0.1405	7.115
9°	0.1571	0.1564	0.9877	0.1584	6.314
10°	0.1745	0.1736	0.9848	0.1763	5.671
11°	0.1920	0.1908	0.9816	0.1944	5.145
12°	0.2094	0.2079	0.9781	0.2126	4.705
13°	0.2269	0.2250	0.9744	0.2309	4.331
14°	0.2443	0.2419	0.9703	0.2493	4.011
15°	0.2618	0.2588	0.9659	0.2679	3.732
16°	0.2793	0.2756	0.9613	0.2867	3.487
17°	0.2967	0.2924	0.9563	0.3057	3.271
18°	0.3142	0.3090	0.9511	0.3249	3.078
19°	0.3316	0.3226	0.9455	0.3443	2.904
20°	0.3491	0.3420	0.9397	0.3640	2.747
21°	0.3665	0.3584	0.9336	0.3839	2.605
22°	0.3840	0.3746	0.9272	0.4040	2.475
		cos	sin	cot	tan

ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
23°	0.4014	0.3907	0.9205	0.4245	2.356
24°	0.4189	0.4067	0.9135	0.4452	2.246
25°	0.4363	0.4226	0.9063	0.4663	2.145
26°	0.4538	0.4384	0.8988	0.4877	2.050
27°	0.4712	0.4540	0.8910	0.5095	1.963
28°	0.4887	0.4695	0.8829	0.5317	1.881
29°	0.5061	0.4848	0.8746	0.5543	1.804
30°	0.5236	0.5000	0.8660	0.5774	1.732
31°	0.5411	0.5150	0.8572	0.6009	1.664
32°	0.5585	0.5299	0.8480	0.6249	1.600
33°	0.5760	0.5446	0.8387	0.6494	1.540
34°	0.5934	0.5592	0.8290	0.6745	1.483
35°	0.6109	0.5736	0.8192	0.7002	1.428
36°	0.6283	0.5878	0.8090	0.7265	1.376
37°	0.6458	0.6018	0.7986	0.7536	1.327
38°	0.6632	0.6157	0.7880	0.7813	1.280
39°	0.6807	0.6293	0.7771	0.8098	1.235
40°	0.6981	0.6428	0.7660	0.8391	1.192
41°	0.7156	0.6561	0.7547	0.8693	1.150
42°	0.7330	0.6691	0.7431	0.9004	1.111
43°	0.7505	0.6820	0.7314	0.9325	1.072
44°	0.7679	0.6947	0.7193	0.9657	1.036
45°	0.7854	0.7071	0.7071	1.000	1.000
		cos	sin	cot	tan

បទានុក្រម

កូអរដោនេ	:	ចំនួនពិតត្រូវនឹងទីតាំងចំណុចមួយលើបន្ទាត់ ។
កូដ្លាដែ	:	ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ ។
កំណើនអថេរ	:	$x_1 \leq x_2$ នោះ $x_2 - x_1$ ហៅថាកំណើនអថេរ ។
កំណើនអនុគមន៍	:	$x_1 \leq x_2$ នោះ $f(x_2) - f(x_1)$ ហៅថាកំណើនអនុគមន៍ ។
កំពូល	:	ជាចំណុចដែលខ្សែកោងយកតម្លៃអតិបរមា ឬអប្បបរមា ។
ការដង្ហើម	:	ផ្នែកមួយនៃតំបន់ទាំងមូលដែលបានមកពីការប្រសព្វគ្នារវាងអ័ក្សទាំងពីរ ។
ក្រាប	:	ក្រាបនៃអនុគមន៍ជាសំណុំចំណុចដែលមានកូអរដោនេ (x, y) បង្កើតបានជារូបក្នុងប្លង់ ។
កត្តា	:	តួនៃផលគុណ ។
គល់តម្រុយ 0	:	ចំណុចប្រសព្វនៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងអ័ក្សអរដោនេ ។
ចែកដាច់	:	ជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការចែកតំណាង ចែកនឹងតួចែក ។
ចំនួនពិត	:	ចំនួនរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនសនិទាន ។
ចំនួនគត់ធម្មជាតិ	:	ចំនួនដែលគេប្រើសម្រាប់រាប់ ដូចជា 1, 2, 3, ... ។
ចំនួនសនិទាន	:	ចំនួនដែលមានទម្រង់ប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល $b \neq 0$ ។
ចំនួនអសនិទាន	:	ចំនួនដែលមិនអាចសរសេរជាប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល $b \neq 0$ ។
ចំនួនកុំផ្លិច	:	ចំនួនដែលមានទម្រង់ $a + ib$ ក្នុងនោះ a ជាផ្នែកពិត ib ជាផ្នែកនិមិត្ត ហើយ i ជាឯកតានិមិត្ត $i^2 = -1$ ។
ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់	:	$a - ib$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $a + ib$
ចំណុចចុង និងចំណុចគល់	:	ចំពោះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ A ជាចំណុចគល់ ហើយ B ជាចំណុចចុង ។
ចំណុចចែកក្នុង	:	P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុង កាលណា P ជាចំណុចនៃអង្កត់ AB ដែល $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$ ($m > 0$; $n > 0$)
ចំណុចចែកក្រៅ	:	P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅ កាលណា P ស្ថិតនៅលើបន្ទាយនៃអង្កត់ AB ដែល $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$ ($m > 0$; $n > 0$)
ឈ្មាប់	:	ការភ្ជាប់រវាងសំណើពីរដោយពាក្យ ឬសញ្ញាបង្កើតបានសំណើថ្មីហៅថា ឈ្មាប់
ឈ្មាប់និង	:	$p \wedge q$
ឈ្មាប់ឬ	:	$p \vee q$
ឈ្មាប់នាំឱ្យ	:	$p \Rightarrow q$
ឈ្មាប់សមមូល	:	$p \Leftrightarrow q$

- ដែនកំណត់ : សំណុំចំនួននៃអថេរ x ដែលនាំឱ្យអនុគមន៍ $f(x)$ មានតម្លៃ
- ដឺក្រេនៃឯកធា : ផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗនៃឯកធា
- ឌីសក្រីមីណង់ : រូបមន្ត $\Delta = b^2 - 4ac$ ក្នុងសមីការដឺក្រេទី ២ $ax^2 + bx + c = 0$
- តួចែករួមធំបំផុត : តួចែករួមធំបំផុតនៃកន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តារួមដែលមាន
និទស្សន្តធំជាងគេ និងកត្តាមិនរួមទាំងអស់
- តម្លៃដាច់ខាត : តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនពិត x តាងដោយ $|x|$
- តម្រុយកូអរដោនេ : ប្លង់ដែលមានបន្ទាត់ក្រិតដេក និងបន្ទាត់ក្រិតឈរស្របគ្នាត្រង់ O ។
- ទ្វេធា : ពហុធាដែលមានតួតែពីរគត់ ។
- ប្រេកង់ : ចំនួនដងដែលកើតឡើងលើតម្លៃអថេរនីមួយៗ
- ប្រេកង់ធៀប : ផលធៀបរវាងប្រេកង់និងប្រេកង់សរុប
- ការបំប្លែងកិល : បំប្លែងរូបដោយរំកិលតាមវ៉ិចទ័រ (រក្សាទំហំ)
- ការបំប្លែងវិល : បំប្លែងរូបដោយវិលជុំវិញអ្វីមួយ (រក្សាទំហំ)
- ការបំប្លែងឆ្លុះ : បំប្លែងរូបដោយឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចឬអ័ក្ស (រក្សាទំហំ)
- ការបំប្លែងចាំង : បំប្លែងរូបដោយបង្រួមឬពង្រីកតាមផលធៀប ។
- ផលគុណបូស : រូបមន្ត $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
- ផលបូកបូស : រូបមន្ត $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$
- ផលគុណស្កាលែ : ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$
ដែល θ ជាមុំធ្មេញដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។
- ផ្ចិតឆ្លុះ : បើ P' ជារូបឆ្លុះនៃចំណុច P ធៀបនឹងចំណុច O នោះ O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។
- ពហុគុណរួមតូចបំផុត : ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃកន្សោម A និង B គឺជាផលគុណកត្តារួមមាន
និទស្សន្តធំជាងគេ កត្តាមិនរួមទាំងអស់ ។
- ពហុធា : ជាផលបូកនៃច្រើនឯកធា ។
- ម៉ូត : ជាតម្លៃរបស់អថេរដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។
- វ៉ិចទ័រ : អង្កត់មានទិសដៅ និងប្រវែងដោយមិនគិតពីទីតាំងហៅថា វ៉ិចទ័រ ។
- វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា : វ៉ិចទ័រពីរផ្ទុយគ្នា លុះត្រាតែវាមានប្រវែងស្មើគ្នា និងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។
- វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា : វ៉ិចទ័រពីរស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមិនទិសដៅដូចគ្នា និងមានប្រវែងស្មើគ្នា ។
- វ៉ិចទ័រឯកតា : វ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើ 1 ។
- វ៉ិចទ័រកម្លាំង : គេតាងកម្លាំងត្រង់ចំណុចចាប់មួយដោយវ៉ិចទ័រ ដែលទិសដៅនៃវ៉ិចទ័រគឺជា
ទិសដៅនៃកម្លាំង ហើយទំហំវ៉ិចទ័រសមាមាត្រទៅនឹងទំហំកម្លាំង ។

- វិច្ឆ័យល្បឿន : គេតាងល្បឿននៃចលនាមួយនៅខណៈ t ដោយវិច្ឆ័យដែលទិសដៅវិច្ឆ័យ គឺជាទិសដៅបំលាស់ទីចលនា ហើយទំហំនៃវិច្ឆ័យសមាមាត្រទៅនឹងទំហំ នៃល្បឿន ។
- វិសមភាព : ទំនាក់ទំនងរវាងពីរកន្សោមមិនស្មើគ្នាដោយប្រើសញ្ញា $>$ ឬ $<$
 $\geq$ ឬ $\leq$ ។
- សំណើ : ជាអំណះអំណាងទាំងឡាយណាដែលគេអាចសម្រេចថាពិត ឬក៏មិនពិត
- សំណុំរាប់អស់ : សំណុំដែលមានធាតុរាប់អស់
- សំណុំដាច់គ្នា : សំណុំពីរដាច់គ្នា កាលណាវាគ្មានធាតុរួម
- សំណុំអនន្ត : សំណុំដែលមានធាតុរាប់មិនអស់
- សំណុំស្មើគ្នា : សំណុំដែលមានធាតុដូចគ្នា
- សំណុំទទេ : សំណុំដែលគ្មាន
- សំណុំសាកល : សំណុំមនុស្ស វត្ថុ ឬសត្វ ដែលគេត្រូវអង្កេតក្នុងការសិក្សាស្ថិតិ
- សំណុំរង : ចំពោះសំណុំពីរ A និង B កាលណាគ្រប់ធាតុនៃ B ក៏ជាធាតុនៃ A គេថា B ជាសំណុំរងនៃ A ។
- សំណុំសំណាក : ជាផ្នែកមួយនៃសំណុំសាកលដែលគេយកមកសិក្សា
- សំណុំដើមនិងសំណុំចុង : f ជាអនុគមន៍ពីសំណុំ A ទៅ B ហៅថាសំណុំដើម ហើយ B ហៅថា សំណុំចុង
- សំណុំចំណុច : រូបធរណីមាត្រផ្គុំដោយចំណុចទាំងអស់ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌណាមួយ ។
- សំណល់ : ចំនួនមួយដែលនៅសល់ពីការចែក សំណល់នៃ $10 : 3$ គឺ 1 ។
- អនុគមន៍ : f ភ្ជាប់ធាតុនីមួយៗនៃសំណុំ A ទៅនឹងធាតុតែមួយគត់នៃសំណុំ B
- អ័ក្សឆ្លុះ : បើ P' ជារូបឆ្លុះនៃចំណុច P ធៀបនឹងបន្ទាត់ L នោះបន្ទាត់ L ហៅថា អ័ក្សឆ្លុះ ។
- អតិបរមា : ចំពោះ $\forall x \in D \quad f(c) \geq f(x)$ នោះ $f(c)$ ជាតម្លៃអតិបរមានៃអនុគមន៍ ។
- អប្បបរមា : ចំពោះ $\forall x \in D \quad f(c) \leq f(x)$ នោះ $f(c)$ ជាតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ ។
- អនុគមន៍សនិទាន : អនុគមន៍ដែលមានភាគយកនិងភាគបែងជាពហុធាតុនៃ x ។
- អាស៊ីមតូត : ជាបន្ទាត់ដែលក្រាបនៃអនុគមន៍កាន់តែខិតជិតវា ។
- អ័ក្សអាប់ស៊ីស : ជាបន្ទាត់ចំនួនពិតដេក ក្នុងតម្រុយអរដោនេ ។
- អ័ក្សអរដោនេ : ជាបន្ទាត់ចំនួនពិតឈរ ក្នុងតម្រុយអរដោនេ ។
- ឯកធា : កន្សោមដែលប្រមាណវិធីលើអថេរ មានតែវិធីគុណ និងស្វ័យគុណដែល មាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ឬសូន្យ ។

ចូរថែទាំសៀវភៅរបស់អ្នក



សូមអ្នក :

១. ដាក់ក្របសៀវភៅរបស់អ្នកដោយប្រាកដ ឬក្រដាស (ក្រដាសកាសែតឬទស្សនាវដ្តីក៏អាចប្រើបានដែរ) ។
២. សម្អាតដៃរបស់អ្នកឱ្យបានស្អាត មុនពេលចាប់កាន់ឬបើកទំព័រសៀវភៅ។
៣. នៅពេលប្រើប្រាស់សៀវភៅថ្មីជាលើកដំបូង សូមដាក់សៀវភៅផ្នែកជាមុន រួចបើកមួយពីរ ឬបីទំព័រសិន។ នៅពេលបើកទំព័រសៀវភៅ សូមសង្កេតមើលគល់សន្លឹកសៀវភៅផង។ បើមានរបើកឬរលួយចេញ សូមរកការបិទវិញយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។
៤. ប្រើក្រដាសមួយសន្លឹក ដើម្បីសៀតសម្គាល់ទំព័រក្នុងសៀវភៅ។
៥. បិទទំព័រសៀវភៅដែលរំហែកឱ្យបានភ្លាមៗ។
៦. កាន់សៀវភៅដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលហុចពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀត។
៧. ទុកសៀវភៅកន្លែងស្ងួតស្អាតជានិច្ច។
៨. នៅពេលអ្នកបាត់សៀវភៅ សូមជម្រាបលោកគ្រូ អ្នកគ្រូភ្លាម។



សូមអ្នក :

១. កុំបត់ទំព័រសៀវភៅ។
២. កុំសរសេរនៅលើក្រប ឬទំព័រសៀវភៅ។
៣. កុំកាត់រូបភាពចេញពីសៀវភៅ។
៤. កុំរំហែក ឬផ្តាច់ទំព័រណាមួយចេញពីសៀវភៅ។
៥. កុំបើកចំហរសៀវភៅ ឬផ្តាច់ទុកចោលនៅពេលមិនប្រើប្រាស់។
៦. កុំប្រើខ្នៅដៃ បិត ឬវត្ថុក្រាស់ៗទៅសៀតសម្គាល់ទំព័រក្នុងសៀវភៅ។
៧. កុំបង្ខំញាត់សៀវភៅទៅក្នុងសំពៀតដែលមានរបស់របរពេញហើយ។
៨. កុំយកសៀវភៅទូលបាំងថ្លៃ ឬភ្លៀង។
៩. កុំអង្គុយលើសៀវភៅ។



មានលក់
គ្រប់ទីកន្លែង

ការលក់ឬទិញសៀវភៅសិក្សាគោលនេះ ជាអំពើខុសច្បាប់ !

ជនល្មើសនឹងត្រូវដាក់ទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន !



Selling or purchasing this textbook is illegal !

Offender will be prosecuted to the full extent of the law in force !

