

Entregar Exercício ?? em 29/09/2011

Exercício 1. (*Meyer E. 7.4 p.180*) Na produção de petróleo, a temperatura de destilação T (graus centígrados) é decisiva na determinação da qualidade do produto final. Suponha-se que T seja considerada uma variável aleatória uniformemente distribuída sobre $(150, 300)$, ou seja, $f(x) = 1/150, 150 < x < 300$. Admita-se que produzir um galão de petróleo custe C_1 dólares. Se o óleo for destilado a uma temperatura menor do que 200°C , o produto é conhecido como nafta e se vende por C_2 dólares por galão. Se o óleo for destilado a uma temperatura maior que 200°C , o produto é denominado óleo refinado destilado e se vende por C_3 dólares o galão. Determinar o lucro líquido esperado (por galão).

Exercício 2. (*Meyer E. 7.6 p.180*) Suponha que um dispositivo eletrônico tenha uma duração de vida X (em unidades de 1000 horas), a qual é considerada como uma variável aleatória contínua, com fdp $f(x) = e^{-x}, x > 0$. Suponha que o custo de fabricação de um desses dispositivos seja \$2,00. O fabricante vende a peça por \$5,00, mas garante o reembolso total se $X \leq 0,9$. Qual será o lucro esperado por peça, pelo fabricante?

Exercício 3. (*Meyer E. 7.7 p.180*) As 5 primeiras repetições de um experimento custam \$ 10 cada uma. Todas as repetições subsequentes custam \$ 5 cada uma. Suponha que o experimento seja repetido até que o primeiro resultado bem sucedido ocorra. Se a probabilidade de um resultado bem sucedido for sempre igual a 0,9, e se as repetições forem independentes, qual será o custo esperado da operação completa?

Exercício 4. (*Meyer E. 7.7 p.180*) Suponha que D , a demanda diária de uma peça, seja uma variável aleatória com fp $P(D = d) = C2^d/d!, d = 1, 2, 3, 4$.

- (a) Calcule C .
- (b) Calcule a demanda esperada.
- (c) Suponha que uma peça seja vendida por \$ 5. Um fabricante produz diariamente K peças. Qualquer peça que não tenha sido vendida ao fim do dia, deve ser abandonada, com um prejuízo de \$ 3. Determine a distribuição de probabilidade do lucro diário, com uma função de K . Quantas peças devem ser fabricadas para tornar máximo o lucro diário esperado?

Exercício 5. (*Meyer E. 7.13 p.181*) Suponha que X tenha a fdp $f(x) = 8/x^3, x > 2$. Seja $W = (1/3)X$.

- (a) Calcule $E(W)$, empregando a fdp de W .
- (b) Calcule $E(W)$, sem empregar a fdp de W .

Exercício 6. (*Meyer E. 7.27 p.182*) Um alvo é constituído de três círculos concêntricos de raios $1/\sqrt{3}$, 1 e $\sqrt{3}$. Tiros dentro do círculo interior valem 4 pontos, dentro do anel seguinte valem 3 pontos, e dentro do anel exterior valem 2 pontos. Tiros fora do alvo valem zero. Seja R a variável aleatória que representa a distância do ponto de impacto ao centro do alvo. Suponha que a fdp de R seja $f(r) = 2/\pi(1 + r^2), r > 0$. Calcule o valor esperado do escore depois de 5 tiros.

Exercício 7. (*Meyer E. 7.28 p.182*) Suponha que a variável aleatória contínua X tenha fdp $f(x) = 3xe^{-x^2}, x \geq 0$. Seja $Y = X^2$. Calcule $E(Y)$:

- (a) Diretamente, sem primeiro obter a fdp de Y .
- (b) Primeiramente, obtendo a fdp de Y .