

HW1 ANSWER

9.


The transfer function is $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s^5 + 2s^4 + 4s^3 + s^2 + 4}{s^6 + 7s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 5}$.

Cross multiplying, $(s^6 + 7s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 5)C(s) = (s^5 + 2s^4 + 4s^3 + s^2 + 4)R(s)$.

Taking the inverse Laplace transform assuming zero initial conditions,

$$\frac{d^6 c}{dt^6} + 7 \frac{d^5 c}{dt^5} + 3 \frac{d^4 c}{dt^4} + 2 \frac{d^3 c}{dt^3} + \frac{d^2 c}{dt^2} + 5c = \frac{d^5 r}{dt^5} + 2 \frac{d^4 r}{dt^4} + 4 \frac{d^3 r}{dt^3} + \frac{d^2 r}{dt^2} + 4r.$$

15b. Transforming the network yields,



Writing the loop equations,

$$\begin{aligned} (s + \frac{s}{s^2 + 1})I_1(s) - \frac{s}{s^2 + 1}I_2(s) - sI_3(s) &= V_i(s) \\ -\frac{s}{s^2 + 1}I_1(s) + (\frac{s}{s^2 + 1} + 1 + \frac{1}{s})I_2(s) - I_3(s) &= 0 \\ -sI_1(s) - I_2(s) + (2s + 1)I_3(s) &= 0 \end{aligned}$$

Solving for $I_2(s)$,

$$I_2(s) = \frac{s(s^2 + 2s + 2)}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 3s + 2} V_i(s)$$

But, $V_o(s) = \frac{I_2(s)}{s} = \frac{(s^2 + 2s + 2)}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 3s + 2} V_i(s)$. Therefore,

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 3s + 2}$$

18a.

$$Z_1(s) = 4 \times 10^5 + \frac{1}{4 \times 10^{-6} s}$$

$$Z_2(s) = 1.1 \times 10^5 + \frac{1}{4 \times 10^{-6} s}$$

Therefore,

$$G(s) = \frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)} = 1.275 \frac{(s + 0.98)}{(s + 0.625)}$$

21.

The system has two independent translational displacements, so we can write the following two equations:

$$\begin{aligned} X_1: \quad & (s^2 + 2s + 7)X_1(s) - (s + 5)X_2(s) = 0 \\ X_2: \quad & -(s + 5)X_1(s) + (2s^2 + 3s + 5)X_2(s) = F(s) \end{aligned}$$

Solving we get:

$$\begin{aligned} X_2(s) &= \frac{\begin{vmatrix} s^2 + 2s + 7 & 0 \\ -(s + 5) & F(s) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s^2 + 2s + 7 & -(s + 5) \\ -(s + 5) & 2s^2 + 3s + 5 \end{vmatrix}} = \frac{(s^2 + 2s + 7)F(s)}{(s^2 + 2s + 7)(2s^2 + 3s + 5) - (s + 5)^2} \\ &= \frac{(s^2 + 2s + 7)F(s)}{2s^4 + 7s^3 + 24s^2 + 21s + 10} \end{aligned}$$

The resulting transfer function can be written as $\frac{X_2(s)}{F(s)} = \frac{1}{2} \frac{s^2 + 2s + 7}{s^4 + 3.5s^3 + 12s^2 + 10.5s + 5}$.

35.

The parameters are:

$$\frac{K_t}{R_a} = \frac{T_s}{E_a} = \frac{5}{5} = 1; \quad K_b = \frac{E_a}{\omega} = \frac{5}{\frac{600}{\pi} 2\pi \frac{1}{60}} = \frac{1}{4};$$

$$J_m = 18 \left(\frac{1}{4} \right)^2 + 4 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1 = 3.125; \quad D_m = 36 \left(\frac{1}{4} \right)^2 = 2.25$$

Thus,

$$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{\frac{1}{3.125}}{s(s + \frac{1}{3.125}(2.25 + (1)(\frac{1}{4})))} = \frac{0.32}{s(s + 0.8)}$$

Since: $\theta_2(s) = \frac{1}{4} \theta_m(s)$; then:

$$\frac{\theta_2(s)}{E_a(s)} = \frac{0.08}{s(s + 0.8)}$$