

Tên hoạt chất	Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022	Sanford guide (update 12.2025)	HD hiệu chỉnh liều ở BN suy thận - BV Bạch Mai 2023	Renal Pharmacotherapy 2021																																																
Doripenem	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 50</td><td>500mg/8h</td></tr><tr><td>30-50</td><td>250mg/8h</td></tr><tr><td>11-29</td><td>250mg/12h</td></tr><tr><td>HD</td><td>ND</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	500mg/8h	30-50	250mg/8h	11-29	250mg/12h	HD	ND	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 50</td><td>500mg/8h</td></tr><tr><td>30-50</td><td>250mg/8h</td></tr><tr><td>10-30</td><td>250mg/12h</td></tr><tr><td>&lt; 10</td><td>ND</td></tr><tr><td>CRRT</td><td>500mg/8h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	500mg/8h	30-50	250mg/8h	10-30	250mg/12h	< 10	ND	CRRT	500mg/8h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 50</td><td>0,5g/8h</td></tr><tr><td>30-50</td><td>0,25g/8h</td></tr><tr><td>10-29</td><td>0,25g/12h</td></tr><tr><td>&lt;10</td><td>ND</td></tr><tr><td>CVVH</td><td>0,5-1g/8h</td></tr><tr><td>CVVHD</td><td>0,5-1g/8h</td></tr><tr><td>CVVHDF</td><td>0,5-1g/8h</td></tr><tr><td>HD</td><td>0,25g/12-24h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	0,5g/8h	30-50	0,25g/8h	10-29	0,25g/12h	<10	ND	CVVH	0,5-1g/8h	CVVHD	0,5-1g/8h	CVVHDF	0,5-1g/8h	HD	0,25g/12-24h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 50</td><td>0,5-1g/8h</td></tr><tr><td>30-50</td><td>0,25g/8h</td></tr><tr><td>11-29</td><td>0,25g/12h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	0,5-1g/8h	30-50	0,25g/8h	11-29	0,25g/12h
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																			
> 50	500mg/8h																																																			
30-50	250mg/8h																																																			
11-29	250mg/12h																																																			
HD	ND																																																			
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																			
> 50	500mg/8h																																																			
30-50	250mg/8h																																																			
10-30	250mg/12h																																																			
< 10	ND																																																			
CRRT	500mg/8h																																																			
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																			
> 50	0,5g/8h																																																			
30-50	0,25g/8h																																																			
10-29	0,25g/12h																																																			
<10	ND																																																			
CVVH	0,5-1g/8h																																																			
CVVHD	0,5-1g/8h																																																			
CVVHDF	0,5-1g/8h																																																			
HD	0,25g/12-24h																																																			
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																			
> 50	0,5-1g/8h																																																			
30-50	0,25g/8h																																																			
11-29	0,25g/12h																																																			
Doxycyclin	<p>- Thường không phải chỉnh liều</p> <p>- Ngày đầu tiên, 100mg/12h, tiếp theo là 100mg/24h. Nếu NK nặng, duy trì liều 100mg/12h.</p>	Không phải chỉnh liều	Không phải chỉnh liều: 100mg/12h	Không phải chỉnh liều																																																
Ertapenem	<p>- ClCr &gt; 30ml/ph/1,73m<sup>2</sup>: Không phải chỉnh liều.</p> <p>- ClCr ≤ 30ml/ph/1,73m<sup>2</sup>: 500mg/24h.</p> <p>- HD: 500mg/24h</p> <p>+ Thời gian dùng trước HD ≤ 6h: bổ sung 150mg sau lọc.</p> <p>+ Thời gian dùng trước HD &gt; 6h: Không phải bổ sung.</p> <p>- CAPD: ND</p>	<table><tr><th>ClCr (ml/ph/1,73m<sup>2</sup>)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 30</td><td>1g/24h</td></tr><tr><td>≤ 30</td><td>500mg/24h</td></tr><tr><td>HD</td><td>500mg/24h bổ sung 150mg sau lọc nếu dùng thuốc ≤ 6h trước lọc; hoặc 500mg x 3 lần/tuần sau lọc</td></tr><tr><td>CAPD</td><td>500mg/24h</td></tr><tr><td>CRRT</td><td>0,5-1g/24h</td></tr><tr><td>SLED</td><td>1g/24h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph/1,73m <sup>2</sup> )	Liều dùng	> 30	1g/24h	≤ 30	500mg/24h	HD	500mg/24h bổ sung 150mg sau lọc nếu dùng thuốc ≤ 6h trước lọc; hoặc 500mg x 3 lần/tuần sau lọc	CAPD	500mg/24h	CRRT	0,5-1g/24h	SLED	1g/24h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 30</td><td>1g/24h</td></tr><tr><td>≤ 30</td><td>0,5g/24h</td></tr><tr><td>CVVH</td><td>0,5 - 1g/24h</td></tr><tr><td>CVVHD</td><td>0,5g/12h hoặc 1g/24h</td></tr><tr><td>CVVHDF</td><td>0,5g/12h hoặc 1g/24h</td></tr><tr><td>HD</td><td>0,5g/24h, bổ sung 150mg sau lọc nếu đã dùng thuốc ≤ 6 giờ trước lọc; hoặc 0,5g x 3 lần/tuần sau lọc; hoặc 1g sau lọc</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 30	1g/24h	≤ 30	0,5g/24h	CVVH	0,5 - 1g/24h	CVVHD	0,5g/12h hoặc 1g/24h	CVVHDF	0,5g/12h hoặc 1g/24h	HD	0,5g/24h, bổ sung 150mg sau lọc nếu đã dùng thuốc ≤ 6 giờ trước lọc; hoặc 0,5g x 3 lần/tuần sau lọc; hoặc 1g sau lọc	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>&gt; 30</td><td>1g/24h</td></tr><tr><td>≤ 30</td><td>0,5g/24h</td></tr><tr><td>HD</td><td>500mg/24h + Dùng trước HD ≤ 6h: bổ sung 150mg sau lọc. + Dùng trước HD &gt; 6h: Không bổ sung.</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 30	1g/24h	≤ 30	0,5g/24h	HD	500mg/24h + Dùng trước HD ≤ 6h: bổ sung 150mg sau lọc. + Dùng trước HD > 6h: Không bổ sung.												
ClCr (ml/ph/1,73m <sup>2</sup> )	Liều dùng																																																			
> 30	1g/24h																																																			
≤ 30	500mg/24h																																																			
HD	500mg/24h bổ sung 150mg sau lọc nếu dùng thuốc ≤ 6h trước lọc; hoặc 500mg x 3 lần/tuần sau lọc																																																			
CAPD	500mg/24h																																																			
CRRT	0,5-1g/24h																																																			
SLED	1g/24h																																																			
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																			
> 30	1g/24h																																																			
≤ 30	0,5g/24h																																																			
CVVH	0,5 - 1g/24h																																																			
CVVHD	0,5g/12h hoặc 1g/24h																																																			
CVVHDF	0,5g/12h hoặc 1g/24h																																																			
HD	0,5g/24h, bổ sung 150mg sau lọc nếu đã dùng thuốc ≤ 6 giờ trước lọc; hoặc 0,5g x 3 lần/tuần sau lọc; hoặc 1g sau lọc																																																			
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																			
> 30	1g/24h																																																			
≤ 30	0,5g/24h																																																			
HD	500mg/24h + Dùng trước HD ≤ 6h: bổ sung 150mg sau lọc. + Dùng trước HD > 6h: Không bổ sung.																																																			