

Tên hoạt chất	Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022			Sanford guide (update 12.2025)	HD hiệu chỉnh liều ở BN suy thận - BV Bạch Mai 2023	Renal Pharmacotherapy 2021	
Amoxicillin	CICr (ml/ph)	Đường uống	Đường tiêm	Đường tiêm: ND Đường uống:			
	> 30	Không phải chỉnh liều					
	10 - 30	250 - 500mg/12h	IM: 500mg/12h; IV: 1000mg, sau đó 500 - 1000mg/12h				
	< 10	250 - 500mg/24h	IM: 500mg/24h; IV: 1000mg, sau đó 500 - 1000mg/24h				
	HD	250 - 500mg/24h Thêm 1 liều trong và sau mỗi lần lọc máu	IM: 500mg/24h, bổ sung thêm 1 liều 500mg trong và sau lọc; IV: 1g sau thẩm tách, sau đó 500mg/24h				
Amoxicilin + acid clavulanic	CICr (ml/ph)	Đường uống	Đường tiêm	Đường uống:			
	> 30	Không phải chỉnh liều					
	10-30	250/125mg-500/125mg mỗi 12h	1000/200mg, sau đó 500/100mg mỗi 12h				
	< 10	250/125mg-500/125mg mỗi 24h	1000/200mg, sau đó 500/100mg mỗi 24h				
	HD	250/125mg-500/125mg mỗi 24h, bổ sung thêm một liều trong và sau lọc	1000/200mg, sau đó 500/100mg mỗi 24h, bổ sung 500/100mg sau lọc		ND		
Ampicilin + sulbactam	- Đường tiêm:			- Đường tiêm:			
	CICr (ml/ph)	Liều dùng		CICr (ml/ph)	Liều dùng		
	≥ 30	1,5-3g/6-8h		≥ 30	1,5-3g/6h		
	15 - 29	1,5-3g/12h		15 - 29	1,5-3g/12h		
	5 - 14	1,5-3g/24h		5 - 14	1,5-3g/24h		
	HD	1,5-3g/lần/24h, tốt nhất là ngay sau khi lọc		HD	1,5-3g/24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)		
	</						