

Tên hoạt chất	Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022	Sanford guide (update 12.2025)	HD hiệu chỉnh liều ở BN suy thận - BV Bạch Mai 2023	Renal Pharmacotherapy 2021																																												
			- CVVH, CVVHD, CVVHDF: 1 - 2g/12h. - HD: 1 - 2g/12 - 24h.																																													
Cefuroxim	Đường tiêm:	Đường tiêm:	Đường tiêm:	Đường tiêm:																																												
	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 20</td><td>0,75 - 1,5g/6 - 8h</td></tr><tr><td>10 - 20</td><td>0,75g/12h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>0,75g /24h</td></tr><tr><td>HD</td><td>0,75g/sau lọc</td></tr><tr><td>APD</td><td>0,75g/12h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 20	0,75 - 1,5g/6 - 8h	10 - 20	0,75g/12h	< 10	0,75g /24h	HD	0,75g/sau lọc	APD	0,75g/12h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 50</td><td>0,75 - 1,5g/8h</td></tr><tr><td>10 - 50</td><td>0,75 - 1,5g/8 - 12h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>0,75 - 1,5g/24h</td></tr><tr><td>HD</td><td>0,75 - 1,5g/24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)</td></tr><tr><td>CAPD</td><td>0,75 - 1,5g/24h</td></tr><tr><td>CRRT</td><td>0,75 - 1,5g/8-12h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	0,75 - 1,5g/8h	10 - 50	0,75 - 1,5g/8 - 12h	< 10	0,75 - 1,5g/24h	HD	0,75 - 1,5g/24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)	CAPD	0,75 - 1,5g/24h	CRRT	0,75 - 1,5g/8-12h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 50</td><td>0,75 - 1,5g/8h</td></tr><tr><td>10 - 50</td><td>0,75 - 1,5g/8 - 12h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>0,75 - 1,5g/24h</td></tr></table> Đường uống:	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	0,75 - 1,5g/8h	10 - 50	0,75 - 1,5g/8 - 12h	< 10	0,75 - 1,5g/24h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 20</td><td>0,75 - 1,5g/8h</td></tr><tr><td>10 - 20</td><td>0,75g/12h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>0,75g/24h</td></tr><tr><td>HD</td><td>0,75g/24h, thêm 1 liều 0,75g vào cuối phiên lọc</td></tr></table> Đường uống:	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 20	0,75 - 1,5g/8h	10 - 20	0,75g/12h	< 10	0,75g/24h	HD	0,75g/24h, thêm 1 liều 0,75g vào cuối phiên lọc
	ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																														
	> 20	0,75 - 1,5g/6 - 8h																																														
	10 - 20	0,75g/12h																																														
< 10	0,75g /24h																																															
HD	0,75g/sau lọc																																															
APD	0,75g/12h																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
> 50	0,75 - 1,5g/8h																																															
10 - 50	0,75 - 1,5g/8 - 12h																																															
< 10	0,75 - 1,5g/24h																																															
HD	0,75 - 1,5g/24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)																																															
CAPD	0,75 - 1,5g/24h																																															
CRRT	0,75 - 1,5g/8-12h																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
> 50	0,75 - 1,5g/8h																																															
10 - 50	0,75 - 1,5g/8 - 12h																																															
< 10	0,75 - 1,5g/24h																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
> 20	0,75 - 1,5g/8h																																															
10 - 20	0,75g/12h																																															
< 10	0,75g/24h																																															
HD	0,75g/24h, thêm 1 liều 0,75g vào cuối phiên lọc																																															
	Đường uống: ND.	Đường uống:																																														
		<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>≥ 30</td><td>250 - 500mg/12h</td></tr><tr><td>10 - 29</td><td>250 - 500mg/24h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>250 - 500mg/48h</td></tr><tr><td>HD</td><td>250 - 500mg/48h, thêm 1 liều 250 - 500mg sau lọc</td></tr><tr><td>CAPD</td><td>250 - 500mg/24h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	≥ 30	250 - 500mg/12h	10 - 29	250 - 500mg/24h	< 10	250 - 500mg/48h	HD	250 - 500mg/48h, thêm 1 liều 250 - 500mg sau lọc	CAPD	250 - 500mg/24h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>≥ 30</td><td>0,5g/12h</td></tr><tr><td>10 - 29</td><td>0,5g/24h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>0,5g/48h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	≥ 30	0,5g/12h	10 - 29	0,5g/24h	< 10	0,5g/48h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>≥ 30</td><td>250 - 500mg/12h</td></tr><tr><td>10 - 30</td><td>250 - 500mg/12h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>250 - 500mg/48h</td></tr><tr><td>HD</td><td>Thêm một liều 250 - 500mg vào cuối mỗi phiên lọc</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	≥ 30	250 - 500mg/12h	10 - 30	250 - 500mg/12h	< 10	250 - 500mg/48h	HD	Thêm một liều 250 - 500mg vào cuối mỗi phiên lọc														
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
≥ 30	250 - 500mg/12h																																															
10 - 29	250 - 500mg/24h																																															
< 10	250 - 500mg/48h																																															
HD	250 - 500mg/48h, thêm 1 liều 250 - 500mg sau lọc																																															
CAPD	250 - 500mg/24h																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
≥ 30	0,5g/12h																																															
10 - 29	0,5g/24h																																															
< 10	0,5g/48h																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
≥ 30	250 - 500mg/12h																																															
10 - 30	250 - 500mg/12h																																															
< 10	250 - 500mg/48h																																															
HD	Thêm một liều 250 - 500mg vào cuối mỗi phiên lọc																																															
Cefalexin	- ClCr > 40ml/ph: Không phải chỉnh liều - ClCr < 40ml/ph: liều đầu tiên bằng liều thông thường, sau đó chỉnh liều theo ClCr:		ND																																													
	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng (mg)</th><th>Cách dùng</th></tr><tr><td>11 - 40</td><td>500</td><td>8-12h/lần</td></tr><tr><td>5 - 10</td><td>250</td><td>12h/lần</td></tr><tr><td>< 5</td><td>250</td><td>12-24h/lần</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)		Liều dùng (mg)	Cách dùng	11 - 40	500	8-12h/lần	5 - 10	250	12h/lần	< 5	250	12-24h/lần	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 50</td><td>250-1000mg/6h</td></tr><tr><td>10-50</td><td>250-1000mg/8-12h</td></tr><tr><td>< 10</td><td>250-1000mg/24-48h</td></tr><tr><td>HD</td><td>250-500mg/12-24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)</td></tr><tr><td>CAPD</td><td>250-500mg/12-24h</td></tr><tr><td>CRRT</td><td>ND</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	250-1000mg/6h	10-50	250-1000mg/8-12h	< 10	250-1000mg/24-48h	HD	250-500mg/12-24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)	CAPD	250-500mg/12-24h	CRRT	ND	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 60</td><td>Không phải chỉnh liều</td></tr><tr><td>30-59</td><td>Không phải chỉnh liều, liều tối đa hằng ngày không vượt quá 1g</td></tr><tr><td>15-29</td><td>250mg/8h hoặc 12h</td></tr><tr><td>5-14</td><td>250mg/24h</td></tr><tr><td>1-4, chưa HD</td><td>250mg/48h hoặc 60h.</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 60	Không phải chỉnh liều	30-59	Không phải chỉnh liều, liều tối đa hằng ngày không vượt quá 1g	15-29	250mg/8h hoặc 12h	5-14	250mg/24h	1-4, chưa HD	250mg/48h hoặc 60h.						
	ClCr (ml/ph)	Liều dùng (mg)		Cách dùng																																												
	11 - 40	500		8-12h/lần																																												
5 - 10	250	12h/lần																																														
< 5	250	12-24h/lần																																														
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
> 50	250-1000mg/6h																																															
10-50	250-1000mg/8-12h																																															
< 10	250-1000mg/24-48h																																															
HD	250-500mg/12-24h (dùng sau lọc vào ngày lọc)																																															
CAPD	250-500mg/12-24h																																															
CRRT	ND																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																															
> 60	Không phải chỉnh liều																																															
30-59	Không phải chỉnh liều, liều tối đa hằng ngày không vượt quá 1g																																															
15-29	250mg/8h hoặc 12h																																															
5-14	250mg/24h																																															
1-4, chưa HD	250mg/48h hoặc 60h.																																															