

E

肺動静脈瘻

pulmonary arteriovenous malformations

到達目標

- 肺動静脈瘻の病因・病態や遺伝性出血性毛細血管拡張症 (HHT) との関連について説明ができる
- 肺動静脈瘻の症候と身体所見が説明できる
- 肺動静脈瘻の画像と診断時に必要な検査が説明できる
- 肺動静脈瘻の治療法について説明できる

病因・病態・疫学


肺動静脈瘻は、肺動脈と肺静脈が肺内で毛細血管を介さないで異常短絡 (シャント) をきたす血管奇形である。本邦での有病率は 38 人/10 万人と報告されている。多くが先天性であり、その中には特発性のものと、遺伝性出血性毛細 (末梢) 血管拡張症 (hereditary

tary haemorrhagic telangiectasia : HHT) の部分症状として出現するものがある^{1, 2)}。HHT は常染色体顕性遺伝、皮膚粘膜や内臓の多発性末梢血管拡張、反復する出血を 3 主徴とする疾患である。責任遺伝子として ENG, ACVRL-1, MADH4, GDF2 が同定されているが、検出できるのは 80~85% にとどまる。


病変数から単発性、多発性に分類される。肺動静脈瘻の 33~50% は単発性であるが、HHT に合併した肺動静脈瘻は多発性が多い³⁾。病変は下葉に分布することが多い (65%)。

症候・身体所見

無症状であることが多く、健康診断の胸部異常陰影や、他疾患のために撮影した CT で偶発的に発見され




a.



b.



c.



d.



e.

図 1 肺動静脈瘻の画像 (20 歳代女性、右 S₆)

- a : 胸部 X 線写真で円形の境界明瞭な結節影を認め、これに流入および流出する血管を示す帯状の陰影を認める。
 b : 胸部 X 線写真の病変部の拡大
 c : 胸部造影 CT から構築した三次元立体画像。これにより病変の形態を詳細に把握することができる。
 d : 肺動脈造影
 e : 胸部 CT (肺野条件)