




図1 前浸潤性病変例の高分解能 CT

同一症例において右上葉に (a) 多発するすりガラス陰影と (b) 内部濃度上昇を伴うすりガラス陰影を認める。右上葉切除を行った結果、病理学的に内部濃度上昇を伴うすりガラス陰影は AIS と確定し、その他に多発する AAH を認めた。

治療と予後

i) AAH, AIS

AAH に関しては治療の必要はないが、AIS や微小浸潤型・浸潤型肺腺癌に進展する可能性を考慮し定期的な経過観察が必要である。AAH, AIS とともに外科的切除後の無再発生存率は 100% とされる。

ii) dysplasia, squamous cell carcinoma in situ

dysplasia に関しては治療の必要はないが、一部は squamous cell carcinoma in situ に進展することが認められており、定期的な経過観察が必要である。squamous cell carcinoma in situ では光線力学的治療法 (photodynamic therapy: PDT) が検討される。

iii) DIPNECH

外科的切除や、吸入ステロイド薬、 β 刺激薬の吸入などが治療として行われる。これらの治療が予後に及ぼす影響についてのまとまった報告や長期的な予後に関する報告は乏しい。

Advanced

■次世代シーケンサーを用いた遺伝子解析

進行期肺癌と同様に次世代シーケンサーを使用し、前浸潤性病変における遺伝子変異の解析が可能である。これらと併存する浸潤癌の遺伝子変異を同時に解析することで肺癌の多段階発癌の過程が明確に解明され、予防や、診断、治療に役立つことが期待される。

2

腺癌

adenocarcinoma

到達目標

- ◆肺癌全般の診療の要点を概説できる
- ◆腺癌の病因・病態が説明できる
- ◆腺癌の診断、検査について説明ができる
- ◆腺癌の病期別治療を説明できる

本項目名は、「腺癌」であるが、理解を容易にするために、肺癌全体に関する概要についても触れる。

概要

肺癌は肺に発生する悪性腫瘍で、肺そのものから発生したものを原発性肺癌といい、通常肺癌といえば原発性肺癌を指す。一方、他の臓器から発生し、肺に転移したものを転移性肺腫瘍（癌）、または、肺転移と定義される。

疫学

a 肺癌一般

2023 年に癌で死亡した患者数は 382,504 人である。原発性肺癌は癌死亡の約 1/5 を占め、2022 年には 76,663 人（男性：53,750 人、女性：22,913 人）が亡くなる極めて予後不良な悪性腫瘍である⁴⁾。現在、日本人における癌死の第 1 位は肺癌である（肺癌は男性で第 1 位、女性で第 2 位である）。2020 年の罹患数は男性で第 3 位（第 1 位は前立腺、第 2 位は大腸）、女性で第 3 位（第 1 位は乳房、第 2 位は大腸）である⁴⁾。