




図6 肺胞道の実体顕微鏡像（肉眼像）

肺胞道の壁に白い亀甲模様がみえるが、これが肺胞入口である（RB：呼吸細気管支，AD：肺胞道）。




図7 肺胞道および肺胞壁の弾性線維（弾性線維染色，EMG 染色）

AD：肺胞道，ALV：肺胞，⇒：肺胞入口（肺胞道）の弾性線維，→：肺胞壁の弾性線維

る。隣接した肺胞隔壁に Kohn 孔と呼ばれる小孔が観察されることがあり、肺胞間での空気の移動がありうるということが知られている。肺全体に Kohn 孔がどの程度存在しているのかは不明であり、これが換気にどのような影響を持ちうるのかについても不明であるが、副行換気の一役を担っているとの考えもある。

4 肺の実質と間質

“実質”という用語の定義からすれば、肺の実質は肺胞上皮のみということになる。しかし、肺胞が開いていて、かつ、そこに空気がなければガス交換は不可

能であることを踏まえれば、上皮とともに肺胞腔内の空気を実質と捉えるのが理に適っている⁴⁾。このことは、胸部画像と実際の病変（病理像）を対比するうえでも重要な点で、胸部X線写真やCT像では「空気のあるところ」、「空気のないところ」、「空気のあるところ」という繰り返しの構造の陰影の濃度差によって肺構造を把握し、「空気のあるところ」が実質であり「空気のないところ」を間質と理解している。

生理的状态での解剖学的構造と画像の対比は問題がないが、間質性肺病変における“間質”という用語には注意を払う必要がある⁵⁾。「狭義の間質」（ガス交換