

M. kansasii, *M. szulgai*, *M. marinum*, *M. goodii* などと交叉反応がみられる可能性があることに注意する。また、感染から IGRA 陽性化まで 8~10 週間が必要であること、既感染例においても IGRA は陽性になることなどを考慮して判定する。

4 遺伝子診断法

PCR 法などの遺伝子増幅法を応用することにより、感度・特異度の高い遺伝子検出系が可能となる。しかし、これまでの遺伝子検査法では検査開始から結果の報告まで少なくとも 3~6 時間が必要であり、抗菌薬投与前の診断法としては時間がかかり過ぎるという問題があった。また、必要とされる機器やコスト面からも、ルーチンで実施される検査法としては高いハード

ルが存在している。さらに、“原因不明の呼吸器感染症”のように、一般細菌からウイルス、マイコプラズマ、クラミジア、抗酸菌、真菌と多岐にわたる病原体の可能性を考えなければならない感染症の場合には、原因の確定までに多くの遺伝子検査が必要となる症例も多い。このような状況の中で、複数の病原体の存在を一度に検出する遺伝子増幅法（FilmArray など）、特異なプライマーにより鎖置換反応を一定温度かつ高い増幅効率で実現する方法（LAMP 法）、さらには手のひらサイズのカセットに検体を接種したのち約 1 時間で原因菌の推定ができる方法などが開発され注目されている。表 3 に代表的な呼吸器感染症における核酸検出検査法を示す。