

構造多型 (SSCP) 法などの方法を用いる。

iii) 肺リンパ脈管筋腫症

(pulmonary lymphangioleiomyomatosis : LAM)

結節性硬化症に合併した LAM (TSC-LAM) なのか、孤発性 LAM (sporadic LAM) なのか判断する。TSC-LAM では *TSC1*, *TSC2* 生殖細胞突然変異がみられるが、孤発性 LAM では体細胞突然変異が検出されることがある。

iv) 遺伝性肺胞蛋白症

まれな潜性遺伝疾患で GM-CSF 受容体 α 鎖あるいは β 鎖遺伝子 (*CSF2RA* あるいは *CSF2RB*) の変異により発症する。肺胞蛋白症が認められ、抗 GM-CSF 抗体が陰性の場合には本疾患を疑って検査する³⁾。

c その他

家族性の間質性肺炎と関連する遺伝子としてサーファクタント関連遺伝子として SP-A 遺伝子

(*SFTPA*) や SP-C 遺伝子 (*SFTPC*) や *ABCA3*, テロメラーゼ遺伝子 (*TERT*, *TERC*) が報告されている。また、常染色体潜性遺伝疾患である *Hermansky-Pudlak* 症候群 (HPS) の一部で、*HPS-1*, *HPS-2*, *HPS-4* などのいくつかの HPS 遺伝子変異を持つ患者では間質性肺炎を合併することが報告されている⁴⁾。

文献

- 1) 日本肺癌学会 (編) : 肺癌診療ガイドライン 2025 年版 — 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む
- 2) 日本呼吸器学会 : α_1 -アンチトリプシン欠乏症 診療の手引き 2021, 日本呼吸器学会, 2021
- 3) 日本呼吸器学会 : 肺胞蛋白症診療ガイドライン 2022, 日本呼吸器学会, 2022
- 4) 日本呼吸器学会 (監修) : 難治性びまん性肺疾患診療の手引き, 南江堂, 2017