

F

抗アレルギー薬
antiallergic agent

到達目標

- ◆ 抗アレルギー薬の種類と作用を列挙できる
- ◆ 抗アレルギー薬のガイドラインにおける位置づけを説明できる
- ◆ 抗アレルギー薬を実臨床において使用できる

1 抗アレルギー薬とは

呼吸器領域では喘息や咳喘息、アトピー咳嗽/喉頭アレルギーなどで使用される。表1にわが国で主に使用されている抗アレルギー薬を作用別に示した。

以下では、ロイコトリエン受容体拮抗薬 (leukotriene receptor antagonist: LTRA) とそれ以外の薬剤に分けて解説する。

2 ロイコトリエン受容体拮抗薬 (LTRA)

ロイコトリエン (LT) C₄, D₄, E₄ はシステニル LT (CysLTs) と称され、その受容体には CysLT₁, CysLT₂, CysLT₃ の各受容体が存在する。現在ある LTRA は CysLT₁ 受容体拮抗薬である¹⁾。

a ガイドラインにおける位置づけ

LTRA は、喘息の長期管理薬の喘息治療ステップ1~4まで基本治療に記載されている¹⁾。吸入ステロイド薬 (inhaled corticosteroids: ICS) と長時間作用性β₂刺激薬 (long-acting β₂ agonist: LABA) の配合剤 (ICS/LABA) が治療の第一選択薬として位置づけられているが、LTRA は内服薬で、LABA にはみられない特徴を有している。

LTRA は気管支拡張作用と気道炎症抑制作用を有し、喘息症状、呼吸機能、喘息増悪回数および患者のQOLを有意に改善させる。単剤での効果は低用量ICSに劣るため、主にICSに併用する薬剤として用いられるが、抗炎症作用を有するため単剤でも使用できる¹⁾。ICSへの上乗せ効果はLABAと比較してやや劣る¹⁾。しかし、内服薬の特性として、治療ステップ1では、吸入が不可能な場合や吸入による副作用が現れる場合はLTRAやtheophylline徐放製剤の投与で代替してもよい¹⁾と記載されている。咳喘息に対しては、軽症例において、吸入手技、アドヒアランスや局所副作用のためICSを使用しにくい場合にはLTRAを代替薬として用いる。ただし、典型的喘息への移行防止作用は現時点では不明である²⁾。

中等症以上では中~高用量ICSへの追加を考慮する²⁾。

b 実臨床における活用法

アレルギー性鼻炎合併喘息、運動誘発喘息、aspi-

表1 わが国で主に使用されている抗アレルギー薬

1. ロイコトリエン受容体拮抗薬
 - ・ pranlukast*
 - ・ montelukast*
2. メチエーター遊離抑制薬
 - ・ sodium cromoglicate*
 - ・ tranilast*
 - ・ amlexanox*
 - ・ repirinast*
 - ・ ibudilast*
 - ・ pemirolast*
3. ヒスタミンH₁受容体拮抗薬
 - ・ ketotifen*
 - ・ azelastine*
 - ・ oxatomide*
 - ・ mequitazine*
 - ・ epinastine*
 - ・ olopatadine
 - ・ cetirizine
 - ・ fexofenadine
 - ・ loratadine
 - ・ ebastine
 - ・ emedastine
 - ・ bepotastine
 - ・ levocetirizine
 - ・ desloratadine
 - ・ bilastine
 - ・ ropatadine
4. トロンボキサンA₂合成阻害薬
 - ・ ozagrel*
5. トロンボキサンA₂受容体拮抗薬
 - ・ seratrodast*
 - ・ ramatroban
6. Th2サイトカイン阻害薬
 - ・ suplatast*

*喘息治療薬

rin 喘息 (NSAIDs 過敏性喘息) 患者の長期管理において有用性が高い¹⁾。LTRA は一般的に安全な薬剤だが、CYP2C9で代謝されるために、warfarinなどの薬剤と相互作用が生じる可能性があることに注意する¹⁾。妊婦には比較的安全性が高い²⁾。喫煙喘息ではステロイド反応性の低下が示されており、LTRAは喫煙による減弱効果を認めず、むしろ喫煙喘息治療に有用である可能性が示唆されている³⁾。肥満喘息でもICSが効きにくく、LTRAは肥満でも効果があることが報告されている³⁾。一部の患者ではLTRAの内服早期 (数時間後~翌日) より呼吸機能が改善するので、発作治療後の追加効果が期待できる。LTは気道のリモデリングに関与し、LTRAがそれを抑制するという動物実験の成績がある。また、内服薬であるため、末梢気道の炎症を抑制する作用も報告されている。

3 LTRA以外の抗アレルギー薬

I型アレルギー反応に関与する化学伝達物質の遊離