

3 成人一次・二次救命処置 adult basic life support (BLS), advanced life support (ALS)

到達目標

- 標準的な救命処置を理解し、実施できる
- AED の操作を理解し、使用できる
- 二次救命処置に用いる薬剤を理解し、使用できる

1 一次救命処置 (BLS)

患者が倒れたら、周囲の安全を確認し、以下の処置を行う (図 1)¹⁾。

a 意識 (反応) の確認、緊急通報、体外式自動除細動器 (AED) の要請

患者の肩をたたきながら大声で呼びかけて反応 (手足の動き・発声) の有無を確認する。手足を動かす、または声を出せば反応ありと判断できる。

反応がなければ周囲に救援を求め、緊急通報 (院内

コール, 119 番通報) と AED 持参を依頼する。

b 呼吸・脈拍の確認

胸と腹部の動きをみて呼吸を確認し、同時に頸動脈を触知して脈拍を 10 秒以内に確認する。脈拍の有無がわからない場合、呼吸停止や死戦期呼吸を認めれば、心停止と判断する。

c 胸骨圧迫

胸骨圧迫から開始する。胸骨下半分中央に手掌基部を置き、両手を重ね、肘関節を伸ばし両手の上に肩を位置させる。毎回 5~6 cm の深さ、100~120 回/min の速さで圧迫し、1 回ごとに完全に解除する。

d 気道確保

頭部後屈顎先挙上法で気道確保する。片方の手掌を患者の前額部にあて頭部を後方に傾け、同時に他方の手の示指と中指を顎先に置いて下顎を前方に持ち上げ




図 1 BLS アルゴリズム

(Kleibman ME, et al : Circulation 152 : S448, 2025 より引用)