

II

呼吸不全

重要度	設問
1~5 ★★★	癌性胸水に対して胸腔ドレナージを実施した後に、再膨張性肺水腫を疑う両側肺のうっ血と意識障害（JCS II-30）が出現した。リザーバーマスク 10 L/分による酸素投与でも酸素化を維持できない場合の正しい呼吸管理方法はどれか。
1 ☑☑☑	高流量鼻カニューラ酸素療法
2 ☑☑☑	リザーバーマスク継続
3 ☑☑☑	分離肺換気
4 ☑☑☑	非侵襲的陽圧換気療法
5 ☑☑☑	気管挿管
6~9 ★★★	既往歴のない2歳の男児。枝豆を食事中に泣き出した、その後呼吸の異常がみられたため救急外来を受診した。右肺に wheeze を聴取し、鼻カニューラ 1 L/分下の SpO ₂ 96%であった。胸部単純写真では異常がみられなかった。対応として正しいものはどれか。
6 ☑☑☑	経過観察
7 ☑☑☑	鎮静をかけて CT を撮影する。
8 ☑☑☑	短時間作用型 β_2 刺激薬の吸入とステロイド薬の点滴静注
9 ☑☑☑	気管支鏡検査実施の準備のため、麻酔科医に連絡をとる。