

- 10★★★
☑☑☑ 間質性肺炎では肺胞と動脈血の間で拡散障害が起こる。
- 11★★★
☑☑☑ 肺水腫では肺胞と動脈血の間での拡散障害は起こりにくい。
- 12★★★
☑☑☑ メトヘモグロビン血症の患者では、 SpO_2 は実際よりも高く表示される。
- 13★★★
☑☑☑ 右左シャントによる呼吸不全をきたしている場合、酸素投与を行っても SpO_2 の上昇が得られにくい。
- 14★★★
☑☑☑ 急性心不全では、platypnea-orthodeoxia syndrome をきたすことがある。
- 15★★★
☑☑☑ 肝肺症候群では、platypnea-orthodeoxia syndrome をきたすことがある。
- 16★★★
☑☑☑ ARDS による急性呼吸不全には 1 回換気量を制限した呼吸が有効である。
- 17★★★
☑☑☑ ARDS では肺血管抵抗が低下する。
- 18★★★
☑☑☑ ARDS による急性呼吸不全の管理中は、高二酸化炭素血症を回避する。
- 19★★★
☑☑☑ ARDS の重症度は $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ と呼気終末陽圧 (positive end-expiratory pressure: PEEP) により分類される。
- 20★★★
☑☑☑ ARDS の死亡率は 10~30% である。
- 21★★★
☑☑☑ ARDS では循環動態が安定している症例においては水分制限を行い、水分バランスをドライサイドに保つ。
- 22★★★
☑☑☑ 成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際、プラトー圧は可能な限り高く設定する。
- 23★★★
☑☑☑ L 型 COVID-19 肺炎には、腹臥位による呼吸法は有効ではない。
- 24★★★
☑☑☑ COVID-19 肺炎による人工呼吸管理が必要な急性呼吸不全には、副腎皮質ステロイドの使用が推奨されている。
- 25★★★
☑☑☑ H 型 COVID-19 肺炎には、1 回換気量制限が必要である。