

- 26★★★
☑☑☑ COVID-19 肺炎患者に気管挿管を実施する際は、直前にバグマスクで十分な換気を行う。
- 27★★★
☑☑☑ アスピリン喘息患者の発作にステロイド薬の全身投与を行う場合、コハク酸エステル型ステロイドを使用する。
- 28★★★
☑☑☑ 間質性肺炎合併肺癌患者に対する術後急性増悪の予防には、副腎皮質ステロイドが有効である。
- 29★★★
☑☑☑ 特発性肺線維症の死因で最も多いのは急性増悪である。
- 30★★★
☑☑☑ 特発性肺線維症慢性安定期には副腎皮質ステロイド単独療法が有効である。
- 31★★★
☑☑☑ 特発性肺線維症慢性安定期には呼吸リハビリテーションが有効である。
- 32★★★
☑☑☑ 在宅酸素療法導入の原因疾患の中で、最も多いのは COPD である。
- 33★★★
☑☑☑ 免疫不全、免疫抑制下の急性呼吸不全患者は非侵襲的陽圧換気療法 (noninvasive positive pressure ventilation: NPPV) の良い適応である。
- 34★★★
☑☑☑ COPD 増悪時の換気補助療法の第一選択は、侵襲的陽圧換気療法である。
- 35★★★
☑☑☑ 肺高血圧症では、動脈血酸素分圧の値に関わらず、在宅酸素療法の社会保険適用となる。
- 36★★★
☑☑☑ 無筋症性皮膚筋炎では慢性進行型の間質性肺炎を合併する。
- 37★★★
☑☑☑ 無筋症性皮膚筋炎では血清フェリチンが病勢のマーカーとなる。
- 38★★★
☑☑☑ 逆ゴットロン徴候は無筋症性皮膚筋炎に特徴的な皮膚病変である。
- 39★★★
☑☑☑ 肥満低換気症候群に持続陽圧呼吸療法 (continuous positive airway pressure: CPAP) を実施する場合、nasal bilevel CPAP や auto CPAP を検討する。
- 40★★★
☑☑☑ 肋骨骨折やフレイルチェストによる換気障害に対して、NPPV は禁忌である。