

- 29★★★
☑☑☑ 胸腔超音波検査は胸膜癒着や胸腔内隔壁形成の有無の判断、血胸や膿胸で二層に分離する hematocrit sign の検出にも有用である。
- 30★★★
☑☑☑ 膿胸が疑われる場合には胸水培養は好気性菌だけでなく、嫌気性培養も合わせて行う。
- 31★★★
☑☑☑ 胸管損傷による乳び胸は左胸水となる。
- 32★★★
☑☑☑ 乳び胸の原因は、外傷性と非外傷性に大別され、外傷性では手術によるものが最も多い。
- 33★★★
☑☑☑ 非外傷性乳び胸の原因は、悪性腫瘍によるものが良性疾患によるものよりも多い。
- 34★★★
☑☑☑ 外傷性乳び胸は受傷直後、早期に生じることが多い。
- 35★★★
☑☑☑ 乳び胸水は、小腸上皮から吸収された脂肪が**カイロミクロン**となり含有されているため、乳白色を呈する。
- 36★★★
☑☑☑ 腰リンパ本幹や肝からのリンパ漏は無色透明である。
- 37★★★
☑☑☑ 保存的治療に反応しない難治性乳び胸水や排液量が 1,000 mL/日以上の乳び胸水では、胸管塞栓術が検討される。
- 38★★★
☑☑☑ 乳び胸に対する保存的治療では、ソマトスタチンアナログ製剤であるオクトレオチドが用いられる。
- 39★★★
☑☑☑ 乳び胸の胸水中細胞組成ではリンパ球が多い。
- 40★★★
☑☑☑ 乳白色の外観を呈する胸水は高脂肪成分を含むことを示唆し、乳び胸(chylothorax)と乳び状胸水(chyliform effusion)に分類される。
- 41★★★
☑☑☑ コレステロール胸膜炎は乳び胸に分類される。
- 42★★★
☑☑☑ 乳び状胸水(chyliform effusion)中のカイロミクロンは増加しない。

