

- 43★★★
☑☑☑ 乳び胸の原因となる悪性腫瘍のうち、最多の疾患は悪性リンパ腫である。
- 44★★★
☑☑☑ 胸管のリンパ流は、肝、小腸、腰リンパ流が合流して乳び槽を経て合流したものである。
- 45★★★
☑☑☑ アスベストに関する労災保険の給付対象外とされた場合であっても、「石綿健康被害救済制度」により救済を図る仕組みがある。
- 46★★★
☑☑☑ 石綿関連健康被害の労災対象は悪性胸膜中皮腫、石綿肺癌で、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚は労災補償の対象外である。
- 47★★★
☑☑☑ 「石綿による肺癌」の労災認定において、石綿吹付作業は石綿曝露作業の中で最も高濃度の作業であり、5年以上の従事歴があれば、画像所見と関係なく、認定の対象となる。
- 48★★★
☑☑☑ 「石綿による肺癌」の労災認定において、重喫煙者は石綿以外の要因の関与も考えられるため、認定の対象から除外される。
- 49★★★
☑☑☑ 胸膜プラークは石綿やエリオナイトなどの繊維状珪酸塩鉱物の気道内吸引に起因する壁側胸膜の変化である。
- 50★★★
☑☑☑ 良性石綿胸水でも長期の経過ではびまん性胸膜肥厚へと進展し呼吸機能障害を呈することがある。
- 51★★★
☑☑☑ 悪性中皮腫は体腔内面を広く覆う中皮細胞から発生する悪性腫瘍であり、発生部位は胸膜 80~85%、心膜 10~15%、腹膜 1~2%である。
- 52★★★
☑☑☑ 悪性胸膜中皮腫では 90%以上に明らかな石綿曝露歴があり、曝露後の潜伏期間は 5~10 年と報告されている。
- 53★★★
☑☑☑ 悪性胸膜中皮腫による死亡者数は 2017 年以降、急激な増加傾向にある。
- 54★★★
☑☑☑ 悪性胸膜中皮腫は組織学的に上皮型、肉腫型、二相型に分類される。
- 55★★★
☑☑☑ 悪性胸膜中皮腫の画像所見では胸水の貯留が約 80%にみられ 早期の場合は明らかな胸膜肥厚や腫瘤形成を伴わない例もある。
- 56★★★
☑☑☑ 肉腫型中皮腫では胸水に腫瘍細胞が出現しやすく、胸水細胞診検査での診断が容易である。

