

- 70★★★
☑☑☑ 胸膜悪性中皮腫の予後評価には体重減少、PS (performance status)、血中ヘモグロビン値、血中アルブミン値、組織型によって4群に分類する Brims' decision tree が有用である。
- 71★★★
☑☑☑ 悪性中皮腫と反応性中皮過形成の鑑別には desmin による免疫染色が有用であり、上皮型中皮腫では約 80% が陽性となる。
- 72★★★
☑☑☑ 良性胸膜腫瘍で最も頻度が高いのは孤立性線維性腫瘍 (solitary fibrous tumor: SFT) である。
- 73★★★
☑☑☑ SFT は良性腫瘍であり、悪性化の報告はない。
- 74★★★
☑☑☑ 胸膜由来の SFT は、大多数が壁側胸膜から発生する。
- 75★★★
☑☑☑ SFT は画像上、境界明瞭な腫瘤で約 40% は有茎性で可動性をもつ。
- 76★★★
☑☑☑ 膿胸関連リンパ腫 (pyothorax-associated lymphoma: PAL) は慢性膿胸、結核性胸膜炎への人工気胸術後 20 年以上を経た患者の胸腔内に発生するびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫である。
- 77★★★
☑☑☑ 胸膜プラークは限局性、板状の胸膜肥厚であり、横隔膜ドーム部、胸壁背外側、傍椎体領域が好発部位である。
- 78★★★
☑☑☑ 胸膜プラークのみで有症状となることはない。
- 79★★★
☑☑☑ 胸膜プラークは局所麻酔下胸腔鏡下生検による病理診断例が増加している。
- 80★★★
☑☑☑ 手術困難な難治性気胸に対しては、シリコン塞栓子 (Endobronchial Watanabe Spigot: EWS) による気管支充填術が有用である。
- 81★★★
☑☑☑ 肺吸虫症では腹腔から胸腔に肺吸虫が侵入し、胸膜炎を引き起こす。
- 82★★★
☑☑☑ 胸水貯留の原因となる肺吸虫症は、日本では宮崎肺吸虫が最も多い。
- 83★★★
☑☑☑ 腹腔から胸腔に侵入した肺吸虫は、さらに肺内に侵入し気胸や肺野病変を形成することもある。

