

- 84★★★★
☑☑☑ 肺吸虫症は幼虫が寄生する中間宿主の淡水系カニ（モクズガニやサワガニ）の生食のほか、カニを摂食する待機宿主のイノシシ肉の摂食も原因となる。
- 85★★★★
☑☑☑ 原発性滲出性リンパ腫（primary effusion lymphoma: PEL）は HIV 陽性者に多い。
- 86★★★★
☑☑☑ HIV 陽性の PEL では、抗 HIV 療法に伴う免疫再構築による治療効果がみられることがある。
- 87★★★★
☑☑☑ 悪性胸水では胸水をドレナージしても約 30% で肺の拡張が得られない。
- 88★★★★
☑☑☑ 悪性胸水の予後予測には胸水中 LDH、performance status (PS)、胸水中の好中球 / リンパ球比率（neutrophil lymphocyte ratio: NLR）、腫瘍の組織型によるスコアリングが有用である。
- 89★★★★
☑☑☑ 悪性胸水に対する胸膜癒着術の成功率はタルク、ピシバニールともに 70% 台である。
- 90★★★★
☑☑☑ 悪性胸水の病理学的検査において、TTF-1 と NapsinA は肺腺癌のマーカーとして有用である。
- 91★★★★
☑☑☑ 悪性胸水の病理学的検査において、P40、P63、MOC-31、Ber-EP4 は扁平上皮癌のマーカーとして有用である。
- 92★★★★
☑☑☑ ダサチニブによる副作用として、胸水貯留が約 20% の頻度でみられる。
- 93★★★★
☑☑☑ ダサチニブによる胸水はリンパ球優位の滲出性胸水であり、ダサチニブの投与中断によって減少することが多い。
- 94★★★★
☑☑☑ 肝性胸水は非代償性肝硬変患者の 4~10% にみられ、多くは両側性胸水である。
- 95★★★★
☑☑☑ 肝性胸水は横隔膜の小孔を通して腹水が胸腔に移動する Porous diaphragm syndrome の 1 つと考えられている。
- 96★★★★
☑☑☑ Meigs 症候群における胸水は、卵巣腫瘍の摘出により消失する。