

IV

横隔膜疾患

重要度

設問

1★★★
☒☒☒

横隔神経は主に第7頸椎から出る。

2★★★
☒☒☒

横隔神経は鎖骨下動静脈の間を下り、肺門部の前方を通り横隔膜に到達する。

3★★★
☒☒☒

両側性横隔神経麻痺は、全身性の筋力低下をきたす疾患の部分症としてみられることが多い。

4★★★
☒☒☒

両側性横隔神経麻痺では起坐呼吸が特徴である。

5★★★
☒☒☒

片側性横隔神経麻痺は腫瘍などによる機械的圧迫が原因であることが多い。

6★★★
☒☒☒

後縦隔に発生した神経原性腫瘍では、ほとんどの例で横隔神経麻痺がみられる。

7★★★
☒☒☒

横隔神経麻痺では、胸部単純写真は臥位での撮影の方が診断しやすい。

8★★★
☒☒☒

横隔神経麻痺ではFEV1が著しく低下する。

9★★★
☒☒☒

横隔神経麻痺では最大吸気圧、最大呼気圧ともに低下する。

10★★★
☒☒☒

横隔膜の三裂孔は大動脈裂孔、食道裂孔、大静脈孔である。

11★★★
☒☒☒

傍食道型食道裂孔ヘルニアでは逆流性食道炎をきたしやすい。

12★★★
☒☒☒

症状を伴う食道裂孔ヘルニアでは、酸分泌抑制薬や抗コリン薬を用いる。