

11★★★★
☑☑☑

高ガンマグロブリン症を合併するものは Good 症候群と呼ばれる。

12★★★★
☑☑☑

完全切除不能であった正岡分類Ⅲ期に対しては、術後放射線療法を行う。

13★★★★
☑☑☑

切除不能例に対して行う化学療法の第一選択はアンスラサイクリン系を含むレジメンを考慮する。

14★★★★
☑☑☑

切除不能例に対してカルボプラチン+パクリタキセルは適応がない。

15★★★★
☑☑☑

レンバチニブの適応がある。

16★★★★
☑☑☑

WHO 分類 B 型は腫瘍上皮細胞が紡錘形～卵円形である。

17★★★★
☑☑☑

WHO 分類 B1 は B3 に比べてリンパ球の割合が多い。

18★★★★
☑☑☑

WHO 分類 C 型は胸腺癌である。

胸腺癌

19～21

19★★★★
☑☑☑

組織型は腺癌が多い。

20★★★★
☑☑☑

化学療法はシスプラチン+ペメトレキセドが第一選択である。

21★★★★
☑☑☑

完全切除されたⅠ期胸腺癌では術後放射線治療が行われる。

22★★★★
☑☑☑

縦隔上部の上縁は左腕頭静脈が気管正中線と交差する高さである。

23★★★★
☑☑☑

縦隔上部には甲状腺腫、甲状腺嚢胞、リンパ管腫が好発する。

24★★★★
☑☑☑

後縦隔には心膜嚢胞や気管原性嚢胞が好発する。

