

8★★★★
☑☑☑

呼吸不全を呈している場合に行われる内固定術では、NPPV（非侵襲的陽圧換気）を用いることもできる。

9★★★★
☑☑☑

肋骨の変形が強い場合でも、観血的肋骨固定（外固定術）は生存率やQOLの改善に寄与しないことから推奨されていない。

10★★★★
☑☑☑

重症例では、疼痛管理法として持続硬膜外麻酔が推奨されている。

外傷性血胸 11～13

11★★★★
☑☑☑

胸腔ドレナージ施行時に500 mLの血液が吸引された場合、開胸での止血術の適応となる。

12★★★★
☑☑☑

ドレナージ施行後から200 mL/時の出血が数時間持続している場合、開胸での止血術の適応となる。

13★★★★
☑☑☑

鈍的外傷の場合、出血量よりもバイタルサインなど生理学的異常に基づいて開胸止血術の適応を判断することが望ましい。

14★★★★
☑☑☑

肺挫傷は、受傷直後からX線で明瞭な変化を認めることが特徴的である。

15★★★★
☑☑☑

胸部鈍的外傷による気管損傷は、頸部気管の損傷であることが多い。

16★★★★
☑☑☑

気管損傷の診断に気管支鏡検査は有用である。