

27★★★★
☑☑☑

肺表面活性物質を産生するのはⅡ型肺胞上皮細胞である。

28★★★★
☑☑☑

Miller の二次小葉の中心には細気管支と肺静脈が併走する。

29★★★★
☑☑☑

Miller の二次小葉の支配気管支は終末細気管支である。

30★★★★
☑☑☑

小葉が集まって細葉を形成する。

31★★★
☑☑☑

右心室から出た肺動脈本幹は上行大動脈の後面・大動脈弓部の直下で左右肺動脈に分岐する。

32★★★★
☑☑☑

気管支動脈は気管支にまわりつきながら走行する。

33★★★★
☑☑☑

右気管支動脈は肋間動脈から起始することが多い。

34★★★★
☑☑☑

気管支動脈の血流量は心拍出量の 5% 程度といわれる。

35★★★
☑☑☑

臓側胸膜と壁側胸膜に連続性はない。

36★★★
☑☑☑

胸膜の中皮細胞は主に脂質の代謝に関与する。

37★★★
☑☑☑

中皮細胞は外胚葉由来である。

38★★★★
☑☑☑

中皮細胞はヒアルロン酸を分泌する。

胸部単純 X 線写真とシルエットサイン

39 ~ 43

39★★★★
☑☑☑

左 S^{10} と下行大動脈は接する。

40★★★★
☑☑☑

右 S^4 と上行大動脈は接する。

41★★★★
☑☑☑

左 S^3 と心臓左縁は接する。