

42 ★★★
☑☑☑

右 S^5 と上大静脈は接する。

43 ★★★
☑☑☑

右 S^7 と横隔膜は接する。

呼吸生理

44 ~ 58

44 ★★★
☑☑☑

第 6 頸髄レベル以上の頸髄損傷では呼吸筋麻痺が必発する。

45 ★★★
☑☑☑

中枢化学受容器は延髄腹側に存在する。

46 ★★★
☑☑☑

中枢化学受容器では動脈血酸素分圧 (partial pressure of arterial oxygen: PaO_2) の感受性が高い。

47 ★★★
☑☑☑

末梢化学受容器は 1 か所だけに存在する。

48 ★★★
☑☑☑

二酸化炭素に対する応答は肺胞気 PaO_2 が上昇すると低下する。

49 ★★★
☑☑☑

二酸化炭素に対する応答は睡眠時に増加する。

50 ★★★
☑☑☑

$PaCO_2$ が上昇すると、低酸素に対する応答は低下する。

51 ★★★
☑☑☑

圧 - 容量曲線の傾き ($\Delta V / \Delta C$) はコンプライアンスを表す。

52 ★★★
☑☑☑

立位における換気量は肺底部で小さくなる。

53 ★★★
☑☑☑

肺血管抵抗は低酸素により減少する。

54 ★★★
☑☑☑

運動時の分時換気量は増加する。

55 ★★★
☑☑☑

運動時の分時死腔換気量は減少する。