

- 25★★★★**
☑☑☑ 潜在性結核感染症 (LTBI) 治療開始者で最も脱落・中断割合が高いのは 20 歳代である。
- 26★★★★**
☑☑☑ 潜在性結核感染症患者のうち、約半数が医療従事者である。
- 27★★★★**
☑☑☑ 15~24 歳の新届出結核患者における外国生まれの割合は、過半数を超える。
- 28★★★★**
☑☑☑ 非結核性抗酸菌 (nontuberculous mycobacteria: NTM) 症の発病率は近年増加傾向である。
- 29★★★★**
☑☑☑ 風呂場は NTM 症の感染源の 1 つといわれている。
- 30★★★★**
☑☑☑ 北海道では NTM 症の中で *Mycobacterium abscessus* の占める頻度が高い。

気管支喘息の疫学 31 ~ 32

- 31★★★★**
☑☑☑ 喘息死は年間約 3,000 人である。
- 32★★★★**
☑☑☑ 小児喘息は大半が学童期以降に発症する。
- 33★★★★**
☑☑☑ 小児喘息の約 10% が成人喘息に移行する。

慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) の疫学

- 34★★★★**
☑☑☑ 本邦での有病率は 40 歳以上において約 8% である。
- 35★★★★**
☑☑☑ COPD 死は年間約 18,000 人である。
- 36★★★★**
☑☑☑ 本邦における COPD 有病率は高齢者ほど高くなる。
- 37★★★★**
☑☑☑ 睡眠時無呼吸症候群の有病率は欧米人に比べて日本人の方が高い。
- 38★★★★**
☑☑☑ 特発性間質性肺炎の中で特発性肺線維症 (idiopathic pulmonary fibrosis: IPF) は最も頻度が高い。