

重要度

設問

1★★★★
☑☑☑

咳嗽の持続期間が2週間以上の場合、遷延性咳嗽に分類される。

2★★★★
☑☑☑

本邦では、慢性咳嗽の原因疾患の頻度は咳喘息が最も高い。

3★★★★
☑☑☑

咳喘息は気管支喘息に移行することはない。

4★★★★
☑☑☑

アトピー咳嗽は気管支喘息に移行することはない。

5★★★★
☑☑☑

成人の14日以上持続する咳嗽に加えて、「発作性の咳き込み」「吸気性笛声」「咳込み後の嘔吐」のいずれかを伴う場合、臨床的に百日咳と診断できる。

6★★★★
☑☑☑

血清PT IgG値が10 EU/mL以上であれば単回の検査で百日咳と診断可能である。

7★★★★
☑☑☑

COPD質問表(COPD assessment test: CAT)には咳嗽、喀痰のQOLへの影響を評価する項目がある。

8★★★★
☑☑☑

喉頭アレルギーは慢性咳嗽や咽喉頭の異常感を自覚し、かつ気道過敏性の亢進を伴う。

9★★★★
☑☑☑

特発性肺線維症(IPF)の患者で咳嗽を伴うのは半数程度である。

10★★★★
☑☑☑

RADSとは高濃度の刺激性物質の吸入直後から咳嗽、喘鳴、呼吸困難で発症し、その後も非特異的な気道反応性亢進状態が続く病態である。