

- 11★★★
☑☑☑ 真菌関連慢性咳嗽の原因菌として *Bjerkandera adusta* が知られている。
- 12★★★
☑☑☑ 薬物治療、理学療法に抵抗性の咳嗽に麻薬が有効である。
- 13★★★
☑☑☑ 好中球性副鼻腔炎では夜間の喘鳴を伴う咳嗽が特徴的である。
- 14★★★
☑☑☑ 好酸球性副鼻腔炎では嗅覚障害を合併しやすい。
- 15★★★
☑☑☑ 気道粘膜下腺のうち、漿液腺には α アドレナリン受容体、粘液腺には β アドレナリン受容体が多く分布する。
- 16★★★
☑☑☑ 粘液性痰の大量排泄がみられる場合、粘液性腺癌を鑑別に加える。
- 17★★★
☑☑☑ Miller & Jones 分類は喀痰の肉眼的な性状を判定する基準である。
- 18★★★
☑☑☑ Geckler 分類 4 群では、1 視野あたりに上皮細胞は 10 個未満、好中球は 25 個以上である。
- 19★★★
☑☑☑ 喀血および血痰の 90% は気管支動脈系の破綻による。
- 20★★★
☑☑☑ ニューモシスチス肺炎では血痰および喀血がみられることが多い。
- 21★★★
☑☑☑ 肺吸虫症は血痰および喀血の原因となる。
- 22★★★
☑☑☑ 肺放線菌症は血痰の原因となる。
- 23★★★
☑☑☑ 妊娠可能女性の喀血および血痰は月経随伴性気胸を鑑別に加える。
- 24★★★
☑☑☑ 血痰の原因として肺胞出血が疑われる患者では気管支肺胞洗浄が診断に有用である。
- 25★★★
☑☑☑ 大量喀血に対して気管支動脈塞栓術を施行する場合、気胸が重要な合併症である。