

- 慢性咳嗽を訴える患者の中で、喀痰から環境真菌、特に糸状担子菌 (f-BM) が繰り返し検出される症例があり、*Bjerkandera adusta* (ヤケイロダケ) との関連性が示唆されている。
- コデインは代表的な中枢性鎮咳薬である。また、激しい咳嗽に対してはモルヒネの使用も認められている。
- × 夜間の喘鳴を伴う咳嗽は好酸球性副鼻腔炎に特徴的である。
- 好中球性副鼻腔炎では鼻閉、鼻漏、頭痛を合併しやすい。
- 気管支喘息に対して β 刺激薬を過剰に用いると粘液性の気道分泌物が増加する可能性がある。
- × 粘液性腺癌では泡沫が混ざった卵白様の漿液性痰 (ブロンコレア) が大量にみられる。
- M1 および M2 は粘液性痰、P1~P3 は膿性痰を表す。P2 以上は微生物検査に適しているとされる。
- × Geckler 分類 4 群では、1 視野あたりに上皮細胞は 10~25 個、好中球は 25 個以上である。左記の説明は Geckler 分類 5 群の定義である。
- 肺動脈系由来の出血は少ない。稀に体循環動脈 - 肺動脈吻合からの出血がみられる。
- × 発熱、乾性咳嗽、進行性の呼吸困難が 3 大症状であり、血痰および喀血を伴うことはほとんどない。
- 肺結節影を伴うことが多く、結核や腫瘍との鑑別がしばしば困難となる。
- 肺放線菌症の主な原因菌は *Actinomyces israelii* であり、症状としては血痰や喀血の頻度が高くおよそ 30% に認められる。
- 典型的には月経開始 3 日前~月経開始 5 日後に発症する。
- 洗浄液の血性が徐々に濃くなること、ヘモジデリン貪食マクロファージが診断に有用である。
- × 気管支動脈塞栓の際に誤って前脊椎動脈を塞栓することにより、脊髄梗塞を発症するリスクがあり、発症率は 0.2% 程度である。