

26★★★
☑☑☑

呼吸困難は酸素飽和度の低下と相関して強まる。

27★★★
☑☑☑

加齢とともに、Kohn 孔は減少する。

28★★★
☑☑☑

加齢とともに、胸壁コンプライアンスは低下する。

29★★★
☑☑☑

周期性四肢麻痺では呼吸筋障害が出現しやすい。

30★★★
☑☑☑

修正 Borg スケールでは、呼吸困難をごくわずかに感じる場合、スコアは 1 点である。

31★★★
☑☑☑

「平坦な道を数分歩くと息切れて立ち止まる」場合、mMRC では grade 2 である。

32★★★
☑☑☑

低酸素血症が臥位で改善し、坐位や立位で増悪する場合、platypnea-orthodeoxia 症候群の可能性を考慮する。

33★★★
☑☑☑

胸郭外の病変では吸気時の喘鳴、胸郭内の病変では呼気時の喘鳴を聴取することが多い。

34★★★
☑☑☑

吸気性喘鳴に加えて強い咽頭痛、嚥下困難を伴っている場合、急性喉頭蓋炎を考慮する。

35★★★
☑☑☑

Ludwig's angina では thumb sign が診断に有用である。

36★★★
☑☑☑

呼気性喘鳴の原因に再発性多発軟骨炎がある。

37★★★
☑☑☑

呼気性喘鳴の原因に奇異性声帯運動がある。

38★★★
☑☑☑

若年者の反復する胸痛は僧帽弁逸脱症を鑑別する。

39★★★
☑☑☑

急性の嚔声の原因は喉頭の炎症性疾患が最多である。