

- 高齢者や糖尿病患者では酸素飽和度が低下しても呼吸困難を自覚しにくい。COVID-19 では低酸素血症に呼吸困難を伴わない happy hypoxia が特徴的な症状である。
- Kohn 孔は加齢ともに径が増すことが知られている。Kohn 孔が高度に拡大し、肺の線維構造が破綻すると肺気腫に至る。
- 結合組織の弾性力の低下、線維化などが胸壁コンプライアンス低下の原因である。重度肥満や胸部の広範囲熱傷なども胸壁コンプライアンス低下の原因となる。
- 低カリウム性、高カリウム性のいずれの場合も、周期性四肢麻痺で呼吸筋症状が出現することは稀である。
- 修正 Borg スケールでは「非常に弱い (very very weak) 息切れ」は 0.5 点である。
- mMRC grade 2 の定義は「同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道で息切れのため立ち止まることがある」である。左記の説明は mMRC grade 3 である。
- 原因として卵円孔開存などによる心内シャントの存在、または肝肺症候群や間質性肺炎による換気血流比不均等などが考えられている。
- 呼吸機能検査の P-V curve も診断の一助となる。
- Dysphagia (嚥下困難)、Drooling (流涎)、Dyspnea (呼吸困難)、Dysphonia (発声困難、嚔声) の 4 徴候で、気道緊急疾患である。
- 口腔底の蜂窩織炎であり、炎症に伴い口腔底が上方に偏位して double tongue sign を認める。
- 耳介、咽頭、気管気管支などの軟骨に炎症を反復し軟骨破壊に至る。二次的に気管・気管支軟化症をきたし呼気性喘鳴を聴取する。
- 吸気時に声帯の内転をきたし吸気性喘鳴の原因となる。重度のストレス、心的外傷後ストレス障害 (PTSD) などの精神疾患との関連性が示唆されている。
- 聴診上、収縮中期のクリック音が特徴的である。
- アレルギー、刺激物 (アルコールや煙草)、感染症、音声酷使などによる喉頭炎症が原因としてもっとも多い。