

40★★★★
☑☑☑

吸入ステロイドでは嗄声が起こりやすい。

41★★★★
☑☑☑

嗄声をきたす悪性腫瘍のうち頻度がもっとも高いのは肺癌である。

42★★★★
☑☑☑

胸部術後の反回神経麻痺は右側で好発する。

43★★★★
☑☑☑

アミロイドーシスで嗄声をきたすことがある。

44★★★★
☑☑☑

チアノーゼの発生は還元型ヘモグロビンの相対量で決まる。

45★★★★
☑☑☑

チアノーゼは還元型ヘモグロビンが 5 g/dL 未満で診断される。

46★★★★
☑☑☑

末梢性チアノーゼでは口腔粘膜はピンク色である。

47★★★★
☑☑☑

心拍出量の低下により末梢性チアノーゼが出現する。

48★★★★
☑☑☑

多血症では軽度の低酸素血症でもチアノーゼを認める。

49★★★★
☑☑☑

メトヘモグロビンの減少によって末梢性チアノーゼが出現する。

50★★★★
☑☑☑

末梢性チアノーゼは保温により改善することがある。

51★★★★
☑☑☑

ばち指では DPD/IPD 比が 1.0 以上となる。

52★★★★
☑☑☑

ばち指ではシャムロス徴候陽性が診断に有用である。

53★★★★
☑☑☑

ばち指の形成に VEGF (血管内皮細胞増殖因子) が関与していると考えられている。

